





*Cecilia Bibliothéque  
Cec. M<sup>r</sup> Rullier D. M. P.*

D307.f 151.2661969

UNIVERSITY COLLEGE, BRISTOL.

Medical Library.


PRESENTED BY

*Mrs J. Ramsay Brush*

*June 15 1893*

*Wash. Overly Med. Lib.*











SCRIPTORES  
NEVROLOGICI MINORES  
SELECTI.

*TOMVS QVARTVS.*



*J. R. Bush.*

NEUROLOGICAL MEMOIRS

OF

TOMAS JENNINGS



SCRIPTORES  
NEVROLOGICI MINORES SELECTI

SIVE

*W. Brash*

OPERA MINORA

AD

ANATOMIAM PHYSIOLOGIAM ET  
PATHOLOGIAM NERVORVM  
SPECTANTIA.

---

TOMVS IV.

CVM TABVLIS AENEIS ET INDICIBVS

---

EDIDIT ET PRAEFATVS EST

CHRISTIANVS FRIDERICVS LVDWIG

PROF. LIPS.

---

LIPSIÆ

APVD IO. GOTTLOB FEIND

MDCCXCV.



Digitized by the Internet Archive  
in 2015

[https://archive.org/details/b21441169\\_0004](https://archive.org/details/b21441169_0004)



---

## LECTORI BENEVOLO

EDITOR.

**I**taque hoc quarto tomo hos scriptores neurologicos quemadmodum ante hos duos annos promiseramus, finire curauimus, non quod ex auctorum inertia ad ipsos continuandos materies et opuscula deficerent, sed quoniam, ne iste thesaurus ad adeo magnum volumen excresceret, moniti sumus. Nec praetermittenda esse videtur alia ratio, studii medici in uniuersum hodierna facies et recentissimus decursus et omnium earum rerum, quae ad artem salutarem spectant, immutatus complexus.

Ista enim chemiae antiphlogisticae ad physiologiam et pathologiam accommodatio, istae ad Galuanianum inuentum spectantes explicationes, isti SPALLANZANI noui atque inauditi sensus, istae vitae animalis cum vegetabili comparationes, istae de vi vitali continuatae disputationes et totius in uniuersum philosophiae noua facies et forma sperare nos iubent, sub finem huius seculi ad physiologicae et pathologicae neurologiae cultum quoque ex his praesidiis profecturos esse insignes fructus. Iam igitur edent noua

alacritate medici ad publicae rei utilitatem frugifera atque ad faciendam medicinam salutifera opuscula proxime plura.

HALLERUM etenim excitauerat BOERHAVIUS artis medicae institutor; ille IO. FRID. MECKELIUM, IO. GOTTER. ZINNIUM, IO. IAC. HUBERUM, IO. GEORG. ZIMMERMANN aliosque plures. SAM. TH. SOEEMMERRINGIUM ad anatomes in uniuersum et neurologiae quoque cultum producebant VRISBERGIUS, primus eiusdem magister, qui cum ipse sua inuenta publici iuris facere omitteret, discipulo suo proponenda commisit, CAMPERUS et MONROUS Fil. Interim tamen Itali inprimis quoque egregiam posuerant operam in reuelanda et peruestiganda neruorum structura, quorum nuperius studium, aliquoties in notulis a me adiectis laudatum, non praeteruidendum est, quamuis neque ab his omnes istae quaeestiones ad finem perducerentur; in qua medicae disciplinae parte egregia nuper quoque praestitit IO. CHRISTIANUS REILIUS. Audio vero eundem virum, subtilissimum hominem, variis artificiis adhibitis nobis reuelaturum esse neruorum structuram atque telam.

En in tabula quasi historiae litterariae neurologiae breuem picturam. Speramus quoque ab Edinenſi litterarum societate, ni fallimur, ad sic dictae animalis electricitatis et GALVANI experimentorum leges explicandas expositum praemium idearum vicissitudines et dubitationes plures soluturum esse.

Fiant haec omnia in rationalis medicinae laudem et incrementum quam proxime et quam feliciter.

Quae maxime igitur exculta esse videbatur de neruis doctrina, quam parum ipsa profecta sit, apparet ex physiologorum conquestionibus atque pathologorum haesitationibus. — —

Haec



Haec haftenus. Pauca adhuc modo adicienda sunt de nostra sylloge et hacce collectione in uniuersum.

Recusae nimirum sunt in ipsa commentationes quinquaginta sex, quibus adiectae sunt tabulae viginti octo, a CAPIESIO summa fide et diligentia aeri incisae. Indices additi sunt tres, quos ex meo consilio colligere commisi G. FISCHERO meo, artis salutaris studioso, qui quemadmodum assolet, accurate eos composuit. Quos omissarum commentationum catalogus sequitur.

Cum vero inter omissa minora scripta quaedam sint, quae omnino nouam editionem mereantur, forsitan eorum impressionem cum aliis uno vel altero supplemento curabimus. Sicque vale B. L. nobisque faue.

Scripti in Vniuersitate litteraria Lipsiensi in mercatu vernali A. MDCCLXXV.

---



# ENVMERATIO OPVSCVLORVM TOMI QVARTI.

I. AD. THEOPHIL. NICOLAUS ZERENER an Cor neruis careat et iis carere possit?	pag. 1
II. IO. FRID. MECKEL de ganglio secundi rami quinti paris neruorum cerebri nuper detecto, deque vera gangliorum neruorum utilitate	7
III. ID. de glandula pineali, septo lucido, et origine paris septimi neruorum cerebri	9
IV. IO. GOTTLIB HAASE de neruis narium internis	11
V. HENR. AUG. VRISBERG de neruo phrenico	16
VI. GOSW. FRID. PEIPERS tertii et quarti neruorum ceruicalium descriptio	18
VII. HENR. AUG. VRISBERG de neruis viscerum abdominalium	50
VIII. GEORG. CHRISTI. FROTSCHER de medulla spinali eiusque neruis	70
IX. IO. GOTTFR. ZINN Experimenta quaedam circa corpus callosum, cerebellum, duram meningem, in viuis animalibus instituta	106
X. PET. CASTELL Experim. quibus varias c. h. partes sentiendi facultate carere constitit	133
XI. GEORG. HENR. MUELLER Series experimentorum in musculis et neruis animalium quorundam institutorum horumque organorum functionem s. effectus naturales illustrantium	170
XII. IO. TRAUG. ADOLPH de neruorum longitudine in compensationem multitudinis et vice versa	181
XIII. CHPH. BERNH. CRUSEN de tensione neruorum	189
XIV. CORN. IO. VOSS de nutritione imprimis neruosa	202
XV. AD. MURRAY de sensibilitate ossium morbofa	252
XVI. IO. HENR. RAHN de miro inter caput et viscera abdominis commercio	266
XVII. CHPH. GUIL. HENR. DE MARE'ES de animi perturbationum in corpus potentia	344
XVIII. CAR. GEORG. THEOD. KORTUM de apoplexia neruosa	379

## TABVLARVM EXPLICATIONES.

Tabulae primae figurae primae	pag. 8	Tabulae secundae	47
— — fig. 2. 3. 4.	10	Tabulae tertiae	104



I.

AD. THEOPHIL. NICOLAVS ZERENER

AN

COR NERVIS CAREAT ET IIS CARERE POSSIT?

ERFORDIAE 1794.

I.

**A**b iisdem fere temporibus, cum post varia veterum tentamina <sup>1)</sup>, immortalis HALLER vim fibrae musculari insitam et propriam, *irritabilitatem* ab inuentore HALLERIANAM dicendam, detexisset et quam plurimis experimentis comprobasset, inter eruditos disputatum est: quatenus irritabilitas a vi neruea dependeret, nec ne? Omnes quidem in eo conveniunt, ut irritabilitas musculari unice fibrae competat; de fonte autem irritabilitatis differentes, in varias abeunt partes: alii enim omnem irritabilitatem a nervis deriunt, eamque sensibilitati, tanquam vi in corpore organico cardinali, subordinatam esse docent; alii irritabilitatem vim sui generis salutant, quae a nervorum vi haud dependet; alii proprium et quasi specificum principium irritabile, corpori inesse perhibent, cui ex varia doctorum virorum sententia, plus minusve commercii cum genere nervoso intercedit. Quae in utramque partem disputata sunt, et in hunc usque diem adhuc disputantur, in libris HALLERI <sup>2)</sup>, HAENII <sup>3)</sup>, PLATNERI <sup>4)</sup>, YPEI <sup>5)</sup>, HEBENSTREITII <sup>6)</sup>, WEBERI <sup>7)</sup>, GIRTANNERI <sup>8)</sup>, et SCHAEFERI <sup>9)</sup> legimus.

2. Sen-

1) E. G. BALDINGER Opuscula medica. Goetting. 1787. 8. p. 63. 95. 138.

2) Comment. societ. scient. Goettingens. T. II. Nov. Comment. T. IV. — Opera minora. T. I. — Elementa Physiologiae. T. IV. — Memoires sur la nature sensible et irritable des parties du corps humain. Laufann. 1756 . . . 1759. IV. Vol. 12.

3) Ratio medendi Pars IX. p. 103. P. X. p. 282. P. XII. p. 263. P. XIV. p. 83.

4) Ueber einige Schwierigkeiten des Hallerschen Systems, in editione germanica rationis medendi HAENII, P. III. p. 265.

Ludwig script. neur. min. T. IV.

5) Physikalische Betrachtungen über die willkührliche und unwillkührliche Muskelbewegung. Leipzig 1789. 8.

6) Prüfung der vornehmsten Beweise für die Unabhängigkeit der Reizbarkeit von der Nervenkraft; in FONTANA Beobachtungen und Versuchen. Leipz. 1785. 8.

7) De initiis atque progressibus irritabilitatis. Halae 1784. 8.

8) Ueber Irritabilität als Lebensprincip in der organischen Natur; in GREN Journal der Physik. III. Band.

9) Ueber Sensibilität als Lebensprincip in der organischen Natur. Frankf. 1793. 8.



2.

Sententiae, ex qua irritabilitas vis sui generis et fibrae musculari propria, neque a systemate nervoso dependens proponitur, licet inter omnes vexatissimae, novum robur et firmissimum argumentum accrescere videbatur, cum nuper demonstrarent: partem corporis animalis maxime irritabilem, cor puta, nervis plane carere<sup>10)</sup>. Corde enim nervis destituto, ad aliud principium confugiendum est, ex quo summa singularis huius muscoli irritabilitas dependet; hoc est principium irritabile, quo cor absque vi nervea, accedente sanguinis vel alio stimulo, movetur.

3.

Cor nervis carere, et hinc vi propria irritabili gaudere, argumentis iisque gravissimis comprobavit cl. BEHREND. Res nova est et plane inaudita, hinc accuratissima disquisitione digna; maximi enim momenti est tam in theoretica, quam in practica medicina. Argumentis pro absentia nervorum in corde gravissima quidem intersunt, et singulari ingenii acumine ab auctore prolata; sed rei probandae haud sufficere mihi videntur, ita ut in aliam partem disputari non possit. Hinc non dubito fore plerosque, qui spretis his argumentis, adhuc cordi et nervos adscribere, et cordis irritabilitatem a nervis deducere mallent. Quae cum ita sint, non inutile forsitan erit, argumenta a cl. BEHREND. proposita recensere, eaque subiungere, quae iis ex aduerso opponi possunt.

4.

*Primum* et firmissimum sane argumentum, a nervorum s. d. cardiacorum disquisitione anatomica desumitur. Nervorum cordis examen scrupulosius intendens didicit auctor: nullos omnino nervos, ne furculum quidem, in ipsam cordis carnem dispergi. Nervos omnes, quotquot a magnis vasis ad cor descendunt, arterias coronarias sequi vidit comites, absque ullo ramulo cordis carni immisso. Omnes quotquot venerant nervi ad coronarias arterias, harum ramos comitantur, ne unum nervulum in cordis musculos immittentes. Vidit etiam aliquot nervos ab arteriis deflexisse, *cordisque carni intrare visos*. — Illustrantur haec observata egregia tabula aere incisa.

Ex primo hoc argumento, licet summa dexteritate et oculorum acie lente aucta, eruto, plenarius nervorum in cordis substantia defectus, haud sequitur; nam 1) Omnes fere nervi musculos ingredientibus, arterias sequuntur<sup>11)</sup>; 2) Finis nervorum, praesertim in musculis, oculo licet optime armato, plane effugit, nec ulla arte anatomica demonstrari potest<sup>12)</sup>. Hinc fieri potest, et probabiliter etiam fit, ut substantia medullaris

10) I. B. I. BEHREND. Diff. qua demonstratur: Cor nervis carere. Mogunt. 1792.  
4. Recus. in LUDWIGII scriptor. neurolog. Tom. III.

11) SOEMMERING Muskellehre. §. 10.  
„Gewöhnlich treten die Nerven, durch

Isokern Zellstoff, mit den Blutgefäßen, besonders mit den Arterien zusammengeheftet, in die Muskeln.“

12) SOEMMERING Nervenlehre. §. 163.  
„Die Endigung der Nervenfasern ist nicht überall deutlich; mehrentheils entgehen sie



medullaris nervuorum, fibris muscularibus cordis ita intermixta et quasi subacta deprehendatur, ut eam nec videre, nec cultro anatomico extricare, nec maceratione aliove artificio visibilem reddere liceat <sup>13)</sup>. Ex dicto igitur auctoris obseruato, nervuorum cordis visibilium cum unicis arteriis connubium comprobante, haud sequitur: cor nervis carere; — sed potius: cor talibus carere nervuorum ramis vel furculis, qui arte anatomica possunt demonstrari. Imo haud exinde sequitur: cor paucissimis gaudere nervis; forsan paucissimi cordis nervi, magnam substantiae medullaris portionem cordi vel impertuntur, vel cum eadem substantia, cordi propria, communicant, sicque mutuam inter cerebrum et cor commercium sustentant <sup>14)</sup>.

## 5.

Alterum quod protulit cl. BEHREND'S argumentum ex analogia desumitur: cum certum sit, nervos arteriarum ab iis, qui musculos ingrediuntur, differre et *origine* et *structura* et *magnitudinis* proportionem ad vasa arteriosa, cumque nervuorum cardiacorum idem sit character, qualis in ceteris arteriarum nervis deprehenditur, nemo dubitabit, quin nervi cardiaci dicti, arteriis quoque solummodo inseruiant. Quod *originem* attinet, nervi cardiaci ex solo nervo sympathico nascuntur, cuius rami ad vasa arteriosa tantum distribuuntur. Producentur insuper cordis nervi ex gangliis, et vasorum nervi quoque ex gangliis oboriuntur. Quoad *structuram* et *magnitudinem*, nervuorum, qui vasa adeunt, ea est natura, ut simulac ad vasa peruenerint, flauidi siue rubelli, molliores, pulposique, plani magis quam cylindracei, ex gangliis nati, intime cum tunicis arteriarum irretiti appareant, etc. Vasorum nervi, a nervis muscutorum magnitudine superantur, illi enim fibrarum arteriosarum tenuitati ac paruitati respondere debent. Quae omnia in nervis s. d. cardiacis deprehenduntur.

Obseruata anatomica, ad quae prouocat auctor, cum vera sint, haud nego: id vero nego, his obseruatis probari, cor absque nervis esse. Nervus, licet ratione originis, structurae, magnitudinis, rel. arteriis, quantum scimus, destinati, omnino alias quoque partes adire possunt, quamuis cultro anatomico id demonstrari non semper potest. Nulla est veritas, cui hoc contradiceret. Nonne ex uno eodemque nervo saepe rami et ad musculos, glandulas, viscera, ossa, membranas, organa sensuum etc. et ad vasa progrediuntur? Cur non ex nervo sympathico, maxima quidem ex parte arteriis destinato <sup>14)</sup>, ad cor? Nec desunt argumenta, intimum nervi

A 2

sym-

sie; dem Auge, bevor man sie rein bis ganz zum Ende verfolgt hat.“

13) SOEMMERING Muskellehre. §. 44. „Es müßte denn seyn, daß wirklich das Herz viele *innere* Nerven *aufs feinste verwebt* mit dem eigentlichen Fleische besäße, und daß diese nur durch seine äußern Nerven mit dem Hirne und dem Rückenmarke in Verbindung stünden.

14) Et paucis abhinc diebus quoque ex Io. AUG. SCHMIDTIO V. Exp. et KREY-

SIGIO V. Cl. amicis meis, qui ante mensum et quod excurrit e Ticinensi litterarum universitate redires sunt facti, audiui, Celer. ANT. SCARPAM, neurologiae magistrum eximium, nervos cordis plures, maiores nudis oculis in equino, minores armatis in humano corde inuenisse ipsumque iam per duos integros annos occupatum esse in edenda nervuorum cardiacorum descriptione. L.

14) SOEMMERING Nervenlehre. §. 337. „Der sympathische Nerve scheint *fast bloß* den

sympathici cum musculis visceribusque commercium comprobantia<sup>15)</sup>. Et si vera esset ill. SOEMMERINGII coniectura de nervis internis cordis<sup>16)</sup>, nonne mutuum inter cerebrum et cor commercium, mediante nervo sympathico, persisteret posset?

## 6.

*Tertium* quod nunc considerandum venit argumentum pro defectu nervorum in corde, a numero nervorum desumitur: lex enim est constituta, ut quo magis saepiusque musculus moveatur aliquis, eo plures maioresque nervi ad illum perveniant; nervi cordis autem, cui densissima caro est, quodque continuo per vitam agitur, eoque multis nervis indigere videtur, ab ea lege abhorreant.

Leuissimum mihi videtur hoc argumentum; cum enim cor, momentis quasi plurimis, ab omnibus reliquis musculis differat, omnino, ratione numeri nervorum, quoque differre potest.

## 7.

*Quartum* argumentum. Cor non habere nervos, insensibilis sua docet natura. Insensibilitatem cordis cl. auctor inde probat, quod in cadaveribus cor morbo affectum, erosum, totum fere absumentum (?), ruptum (?), inflammatum, vermibus, (si fabula vera!) obsessum, etc. inuentum sit, sine ullo aegri doloris sensu. Si de dolore cordis conquestos fuisse aegros narrant, nervi vasorum in causa erant \*).

Multa sunt, quae insensibilitatem cordis (in genere haud concedendam) explicare possunt, citra nervorum defectum. Quae cum propter angustissimas libelli limites enumerari haud possunt, monuisse sufficiat: saepe saepius anatoime pulmones, hepar, ventriculum, renes, rel. morbo eoque interdum gravissimo affectos deprehendit, absque ullo aegri dolore aliaque molesta sensatione. Quis inde concludere auderet: pulmones, hepar, ventriculum, renes, rel. nervis carere? Fatendum tamen est, exiguam esse sensibilitatem, qua cor gaudet.

## 8.

*Quinto* ad experimenta in brutis provocat cl. BEHREND. Cordis vel ex corpore euulsi vel non euulsi nervi irritati<sup>17)</sup>, eius motus non excitant; rursusque, ubi eius discissi sunt nervi, neque ipsum cor e corpore sit euulsum, suos tamen motus aequae diu perficit, ac si nervi cardiaci non essent destructi. Dissecta quoque vel irritata

den Blutgefäßen, vorzüglich den Arterien anzugehören.“

15) Ibid. praefertim §. 338. Phaenomena pathologica, quae hic enumerantur, plane non explicari possunt, nisi intimam nervi sympathici cum musculis et visceribus concedatur commercium.

16) Vid. Not. 13.

\*) cf. Primas lineas Anat. path. a me editas. Lipsi 1785. 8. p. 96. L.

17) SOEMMERING Muskellehre. §. 26. „Nur das Herz soll eine starke Ausnahme machen, und auf einen Reiz seiner Nerven kaum seine Reizbarkeit äussern. Allein es ist die Frage: ob diese Nerven, die man reizte, auch wirklich dem Herzen selbst, und nicht bloß den großen Gefäßen gehörten.“



irritata spinali medulla, neque cordis motum languentem, neque auctum vidit HAL-  
 LERVS.

His experimentis probatur: 1) maxima diuque persistens cordis irritabilitas, qua reliquos omnes musculos longe superat; 2) minimum neruorum in cor imperium. Plenarium vero nervorum in corde defectum exinde demonstrari haud posse, quis non videt?

9.

*Sexto:* Verum est, punctum saliens in pullo incubato, ante visum cerebrum, micasse.

Ipse auctor hoc argumentum incertius prioribus salutat, dubiusque in medio relinquit; hinc silentio praetereundum.

10.

*Septimum* argumentum ab opii effectibus repetitur; opium nempe cordis vires non extinguit. Opium cordi non nocet, quod animaduersum est in experimentis, cum opio soluto, cordique circumfuso, motumque cordis nihil mutante. Augetur imo ab opio, certa dosi quadam sumpto, cordis motus, licet musculorum vires opio, vel ipsis musculis vel nervis, qui hos adeunt, illito, frangantur. Cuius rei explicatio desideratur, nisi cor absque nervis esse statuas; nam neruorum tantum vires ab opio offenduntur.

Contra hoc argumentum, licet eo magnam vim tribuat auctor, monendum est: 1) parvam opii dosin non solum cor, sed omnes musculos, vini instar<sup>18)</sup>, stimulare, motumque eorum ad tempus augere, vnde nouum illud: *Opium mehercle non sedat*<sup>19)</sup>. Opium praeterea externe cordi circumfusum, mechanico id afficit stimulo. 2) Falsum esse assertum, quod adstruit: cordis vires ab opio non extingui; serius tantum et a maiori opii dosi in corde vires pereunt, quam in reliquis musculis<sup>20)</sup>. Inde sequitur, cor longe maiori gaudere irritabilitate; non: cor nervis carere. 3) Actionein cordis et diaphragmatis in homine opio forsitan necando, aequae diu durare et tandem simul extingui; — an inde sequitur: diaphragma nervis carere? — Vix crederem! Res, ut ego quidem sentio, ita est comparata, ut irritabilitas omnium corporis partium, a vi nervosa dependeat. Vi igitur nervosa opio sopita, irritabilitas quoque perit, ocyus in partibus minori gradu irritabilibus, serius in iis, quibus irritabilitas maior inest. Hinc opium cordi serius et largiori dosi exhibitum, nocet, uti et diaphragmati, ratione irritabilitatis cordi proxime accedenti.

A 3

11. *Octavo:*

18) Quod egregie demonstravit G. C. SIEBOLD in Comment. de effectibus opii in corpus animale sanum etc. Goetting. 1789. 4.

19) I. BRVNONIS Elementa medicinae, ed. P. MOSCATI. Mediol. 1792. 8. p. XIX. in praefat.

20) SOEMMERING Muskellehre. §. 43. „Da das Herz die kleinsten Nerven (maximam potius irritabilitatem) hat, und der Mohnsaft durch die Nerven wirkt, so ist es begreiflich, warum das Herz *weniger* als alle übrigen Muskeln durch Mohnsaft geschwächt wird.“

## 11.

*Octavo:* In his, qui apoplexia tentantur, laesis licet omnibus functionibus quae nervis reguntur, attamen motus cordis perdurat.

Exinde absentiam nervorum in corde haud probari, vix est monendum. Motus diaphragmatis in apoplexia attonitis quoque perdurat; an ergo diaphragma absque nervis? Apoplexia attoniti saepe vomunt; an ergo ventriculus nervis careat? Quae in apoplexia primo pereunt functiones, sensus sunt tam externi quam interni; pereunt deinde motus voluntarii, et ultimo motus involuntarii, qui maximo irritabilitatis gradu haud facile delebili, reguntur atque peraguntur.

## 12.

*Nonum* denique et ultimum argumentum, pro defectu nervorum in corde, notissima GALVANI experimenta, ab auctore in hunc finem repetita, suppeditant. Acerrimum irritamenti genus in nervos, his experimentis detectum est, quod autem in cor nullam habet vim, eiusque motum nihil mutat.

Cum contrarius dicti experimenti in corde effectus ab aliis observatus sit <sup>21)</sup>, ultimum hoc argumentum sicco pede transire malo.


## 13.

His omnibus expositis, vix arbitror, auctorem demonstrasse: nullos in cordis carnem immitti nervos. Quibus accedit: 1) Analogia, quae docet: omnes corporis animalis partes irritabiles, irritabilitatem suam a genere nervoso repetere. Haec universalis in oeconomia animali lex est, et nullam inveniō rationem, cordis irritabilitatem aliunde deriuandi. Unde irritabile cordis principium, si non ex generali virium vitalium fonte, omnibus partibus vitam impertiente? — 2) Actio mutationum, genus nervosum afficientium, v. g. animi pathematum, in cor, quae citra intimum inter cor et nervos commercium, explicari haud possunt. — 3) Actio medicamentorum quorundam — — sed praefixis libelli paginis, filum hic abrumpere cogor.

21) Journal der Erfindungen etc. Gotha. II. Stück, pag. 96. — Plura eaque lectu digna, subtiliter disputata et concinne proposita inuenies in eodem diario VII. Stück, p. 3 — 54. — Praeterea duo Itali (Estratto di alcune sperienze fatte da Sign. Dott. CARLO GIULIO Prof. d'anatomia nella regia universita di Torino, e FRANCESCO ROSSI Assistente all' ospedale maggiore etc.) referunt, cor electricitate ani-

mali sive Galvaniana arte adhibita convulsam esse et eadem observavit Exp. SCHMUCK junior medicus meritissimus, qui pro dolor, nimis acerbo fato iam obiit supremum diem. Idem et ego cum meis auditoribus plus una vice observavi. Adiciam plura huc spectantia alio tempore et loco paulo inferius, ubi de recentissimis horum experimentorum fati atque de meis exponam observatis. — L.





## II.

IO. FRID. MECKEL

DE

GANGLIO SECUNDI RAMI QUINTI PARIS  
NERVORUM CEREBRI NUPER DETECTO,

DE QUE

VERA GANGLIORUM NERVOSORUM  
UTILITATE \*).

BEROLINI 1749.

**P**raetermissimus ea, quae de ramis secundi rami quinti paris nervorum cerebri posita leguntur alio in loco horum scriptorum neurologicorum minorum \*\*). Iam potius interest novum describere ganglion, quod ad ossum maxillae superioris eum locum conspicitur, ex quo nervi intercostalis radix, nasales palatinique nervi, modo dicti nervi propagines enascuntur. Collocatum est in angusta fossa, quae os maxillare superius et pterygoideos sphenoidei ossis processus intercedit; obvolutum est molli pinguedine et quoniam pone foramen sphenopalatinum situm est, etiam ab isto ganglii *sphenopalatini* nomen accepit. Caeterum hocce ganglion rubicundum est, duriusculum atque triangularis vel cordiformis figurae, exterius convexum interius magis planum. Ex hoc ganglio egredientium nervorum numerum et progressum tabula exhibet \*\*\*).

Triplex coniicitur esse gangliorum nervosorum usus. Adfunt nimirum ganglia vel ut minor nervus dividatur in plures, vel ut varia et omnino idonea directio nervorum in eas partes, quibus nervi destinati sunt, ex gangliis locum habeat vel tandem ut plurium nervorum minorum in maiorem unum fieri possit congregatio. Quod exemplis a MECKELIO probatur sequentibus. Sic ganglion nervi intercostalis semilunare ex tenuibus splanchnicis nervis exortum copiosiores emittit ramos. Idem pate-

\*) Hoc excerptum desumptum est ex monumentis Academiae Scientiarum Berolinensis (Histoire de l'acad. roy. des Sciences, Année 1749. à Berlin 1751. p. 84.) omisis iis, quae ad explicationem tabulae non omnino pertinebant. L.

\*\*) Tom. I. p. 145. et seqq.

\*\*) Praeterea ad hunc locum adiecit nuper praestantissima omnino ANT. SCARPA in Annotatt. acad. Tom. II. L.

patefaciunt ganglia cardiaca, ophthalmica, mesaraica, maxillare et sphenopalatinum. Inde non consequi amplius proponit, nouos in gangliis nasci neruos, sed ex tubulis subtilissimis compositos neruos ganglion intrantes duram matrem deponere suam, tubulos a se invicem separare atque rubicunda ganglii membrana inuestiri. Hinc explicatur cur procedant ex ganglio plures, quam intrauerant ramuli neruosi, qui subtiles teneri tubuli medullares dura matre orbat, aliud velamentum recipiunt a gangliis ipsis, quod ex tela cellulosa densa multisque vasculis instructa sit atque ex his ipsis vasculis separatur in ipsum contextum cellulosum spissum fluidum, quod congelatum exteriorum nouum neruorum tunicam constituit. Altera gangliorum utilitas unicuique statim in oculos incurrit et conspicitur in distributione neruorum ex gangliis secundum diuersissimas directiones. Non omnes vero nerui ganglia acceperunt et excepti sunt praecipue isti nerui, qui musculorum motui inferuient et duriores ad perferendos impetus varios membranam nanciscerentur, qua carent ab insolenti irritatione et compressione liberi nerui, e. g. acusticus. Uniendis ramusculis nerueis minoribus in maiorem inferuunt ganglia sic dicta simplicia, e quorum numero vertebralia sunt.

### EXPLICATIO TAB. I. FIG. I.

- |  |   |
|--|---|
| a. Arteria carotis interna, quae cavitatem cranii cerebrumque ingreditur.  | m. Ramus minor descendens posterior eiusdem rami ad ganglion sphenopalatinum spectans.  |
| b. Flexura eiusdem arteriae Cowperiana.  | n. Ganglion sphenopalatinum.  |
| c. Flexura eiusdem arteriae prima, qua introgreditur canalem suum temporum ossis.                                      | o. Rami nasales minores superiores anteriores, qui ex interna superficie huius ganglii enascuntur.  |
| d. Flexura secunda.  | p. Ramus Vidianus, qui exit ex parte posteriori huius ganglii.  |
| e. Flexura tertia.   | q. Rami nasales superiores posteriores.   |
| f. Flexura quarta.   | r. Ramus superficialis s. petrosus nerui Vidiani, qui communicat cum portione dura nerui paris septimi.   |
| g. Nervus sextus cerebialis ibi praescissus, ubi orbitam intrat.   | s. Ramus profundus eiusdem nerui s. radix nerui intercostalis.  |
| h. Ramus anterior nerui sexti paris, qui ad sinum caernosum radicem nerui intercostalis delegat.                       | t. Conspiratio huius nerui per unum nervi filamentum cum ramo descendente nerui sexti paris ad secundam flexuram arteriae carotidis: est initium nerui intercostalis. |
| i. Ramus posterior eiusdem nerui. Qui duo rami se coniungunt in canali carotico, distantia aliqua inter eos remanente. | u. Nervus intercostalis descendens in origine sua ad primam flexionem arteriae carotidis.   |
| k. Ramus secundus quinti paris a trunco seiunctus ibidemque disiectus ubi fissuram sphenoidalem orbitae intrat.        |   |
| l. Huius rami ramus descendens minor siue radix anterior ganglii sphenopalatini.                                       |   |

v. Ganglion



- v. Ganglion ceruicale primum aut longum nervi intercostalis e canali carotico eductum.
- w. Nervus palatinus descendens e ganglio sphenopalatino.
- x. Nervus palatinus anterior maior.
- y. Nervus palatinus posterior minor.
- z. Nervus palatinus exterior minimus natus ex trunco rami secundi quinti paris.
- α. Ramus descendens huius nervi insertus in palatinum anteriorem.
- β. β. Rami nasales inferiores nervi palatini magni anterioris.



III.

IO. FRID. MECKEL

OBSERVATIONES ANATOMICAE

DE

GLANDULA PINEALI, SEPTO LUCIDO,

ET

ORIGINE PARIS SEPTIMI NERVORUM  
CEREBRI \*).

BEROLINI 1765.

Glandula pinealis non modo petiolis medullaribus et cylindricis nervorum optico-  
rum thalamis imponitur ita, ut hos introgrediatur et in posteriori sede lamina  
medullaris conspiciatur, quae cum posteriori cerebri commissura coniuncta est. Re-  
periuntur etiam propemodum semper lapilli sive calculosa grana in conario, sine dubio  
a stagnante lymphâ.

Septum lucidum fit ex duplici lamina medullari, quae posterius paullulum a se  
inuicem distant, dein vero per medullarem striam uniuntur tandemque ita confluunt,  
ut unicam tantum laminam efficiant. Inter quas laminas, quae antè iterum a se  
inuicem recedunt, saepe effusa lymphâ reperitur. Nullam communicationem inter  
ventriculos tricornes existere, a dissectoribus demonstratum est, sed isti a septo lucido  
perfectè separantur. Fornix brevior est, quam septum pellucidum, quod antè  
inter duo crura fornici cerebro nec fornici incumbit, non ubique eiusdem magni-  
tudinis, versus anteriora altius, posteriora versus depressius.

Nervus

\*) Cf. Histoire de l'acad. roy. des Sciences, Année 1765. à Berlin. p. 91.

Nervus acusticus, cuius portionem mollem e quarto cerebri ventriculo, ex fibris medullaribus transuersis, ex calamo sic dicto scriptorio prodeuntibus egredi plurimi dissectores autumarunt, potius e margine posteriori protuberantiae Willisianae vel magis adhuc ex cerebelli pedunculis enascitur, filo a radice nerui duri plane discrepante, quae ad medullam oblongatam sita est.

### EXPLICATIO FIGURAE SECUNDAE, TERTIAE ET QUARTAE TABULAE PRIMAE.

#### *Figura secunda.*

Quaedam cerebri partes adspectae a parte anteriori.

- A. Glandula pinealis in situ naturali supranates, retro commissuram posteriorem cerebri.
- B. Commissura posterior cerebri.
- C. Lamina medullaris alba, quae coniungit glandulam pinealem cum hac commissura.
- D. D. Pedunculi glandulae pinealis.
- E. E. Nates.
- F. F. Testes.
- G. Fascia transuersalis cerebri.
  - a. Origo nerui quarti paris ex hac fascia transuersali cerebri.
- H. Valuula magna cerebri.
- I. I. Thalami neruorum opticorum.
- K. Vermes cerebelli.
- L. L. Pars loborum lateralium cerebelli.
- M. Ventriculus tertius.

#### *Figura tertia.*

Partes cerebri quaedam adspectae a posteriori facie.

- A. Glandula pinealis reuerfa a posteriori ad anterius et eleuata per nates versus ventriculum, ita ut lamina eam coniungens cum commissura eo melius in conspectum veniat.

- B. Commissura posterior cerebri.
- C. Lamina, quae descendit ex basi glandulae pinealis ad hanc commissuram.
- D. D. Pedunculi glandulae pinealis una cum glandula reclinati.
- E. E. Nates, quibus adiuncta est pinealis glandula.
- F. F. Testes.
- G. Fascia transuersalis cerebri.
  - a. Origo nerui quarti paris ex hac fascia.
- H. Magna cerebri valuula.
 

Reliqua quemadmodum in figura antecedente.

#### *Figura quarta.*

- A. Origo nerui mollis septimi paris.
- B. Initium nerui duri septimi paris.
- C. Nervus quinti paris.
- D. Pons Varolii.
- E. Pedunculi cerebelli, qui per conuentum formant pontem.
- F. Medulla oblongata.
- G. G. Pyramidalia corpora medullae oblongatae.
- H. H. Oliuaria corpora.
- I. I. Initium nerui octauis paris. (secundi medullae oblongatae secundum Recentiores.)
- K. K. Fibrae nerui noni paris. (tertii medullae oblongatae.)
- L. L. Pars loborum cerebelli.





## IV.

## IO. GOTTLÖB HAASE

## DE

## NERVIS NARIUM INTERNIS.

LIPSIÆ 1791.

Nares earundemque inprimis internas partes nervis instructas esse, quarum difficilis sit disquisitio, et omnes, qui in iis inuestigandis cum laude sunt versati, fatentur, et usus quemque facile docet. Nam, si truncos eorum spectas, omnes fere ossis canalibus reconduntur, nec, nisi ossium laciniis vossella refractis, recte ad oculos exponuntur, sin ramos, extremi eorum in pulpofam membranam finiuntur, cuius quidem cum tela tam arctus obscurusque est nexus, ut, antequam certi quid de iis nobis constaret, plerique primum vini spiritu constringendi, postea membranae pituitariae inuolucra maceratione a nobis emollienda et laxanda essent. Factum inde est, ut, qui eam neurologiae partem tractarent, truncos egregie quidem persequerentur, minores tamen eorum ramos vel non omnes, vel ita describerent, ut laboris partem aliis relinquerent. Quanta cum laude MECKELIVS nerui Vidiani ramos, firmis ossium repagulis reclusos, explorarit, veramque nerui Sympathici magni originem monstrarit, neminem fere fugit, non pauca tamen de ramis quinti nervorum cerebri paris iis, unde nares internae nervis instruuntur, extant, quae postea in clariorem lucem ab aliis eam ob causam producta sunt, quoniam a magno illo incisore via iis est aperta, quam ad hanc neurologiae particulam perficiendam sequi potuerint. Quominus vero quisque dubitabit, partes quascunque aliorum diligentia recens demonstratas, tum eam ob causam, quoniam, eorum laborem imitati, ipsi scientia proficimus, tum, quoniam varia notantur, quae aliis tradi possunt, dignas esse, quae, tanquam novis observationibus, in conspectum producantur, eo minus ea, quae de nervis narium internis collegeramus, hac scribendi occasione reticere volumus.

Hos autem plerique autorum, qui ortus rationem habuere, in istos, qui nerui olfactorii sunt, et in illos, qui paris quinti, diuiserunt; nos, non tam originem, quam progressum ac distributionem eorum spectaturi, narium cauo verticali sectione diuiso, alios anteriores, alios posteriores, utrosque paris quinti, aliosque medios eosque nerui olfactorii ramos esse dicimus.

De nervis, in narium internas regiones distributis, mediis acturi a fossa cranii anteriore eiusque inprimis ea caua parte, quam, a variis ossibus compositam, spheno-ethmoideo-frontalem appellant, ordiendum putamus. Continetur in ea a latere cristae galli, ex osse ethmoideo prominentis, bulbus nerui olfactorii, cuius primae,

praecipue a METZGERO <sup>1)</sup>, SOEMMERINGIO <sup>2)</sup>, MALACARNIO <sup>3)</sup>, PROCHASKA <sup>4)</sup> et SCARPA <sup>5)</sup> descriptae, radices e fissura SYLVII inde a lobo cerebri anteriore ac sub eodem in latefcentem et ganglio haud absimilem partem se proferunt, quae ut filamentis processibus firmitas redderetur ac robur, teneris primum cerebri inuolucris, arachnoidea et pia meninge, inuoluitur, hisque munimentis filamenta tuetur, donec, densioris durae matris inuolucris cincti, ramuli e cranio progrediantur. Ad has bulbi fibrillas, quas VIEVSSSENIUS <sup>6)</sup> omnium primus ex parte delineavit, quarumque decursum nec RVYSCHIVS <sup>7)</sup> ignoravit, suscipiendas et ad nares dimittendas tota comparata esse videtur horizontalis ossis ethmoidea lamina, quae tamen magis caua est, quam plana, et in qua describenda, ut in totius organi olfactorii nervuola parte, summam diligentiam AL MONROVS <sup>8)</sup> et SCARPA <sup>9)</sup> posuere. Est illa a parte cranii tot foraminibus patula, quot sufficiunt ad transmittendos per eam olfactorii paris ramulos. Duae per cristam galli diremtae partes triplicis generis poris pertusae sunt, quorum alii huic eminenti parti vicini et interiores, alii exteriores, medii his interiecti sunt; interiorum exteriorumque magis canaliculorum forma est, quam mediorum. Fibrillae nerueae cum pororum siue canaliculorum tractum sequantur, modo simplices, modo duplices per interiores canales ad septi narium superiorem mediamque partem immo ad imum usque marginem et per exteriores ad os turbina- tum superius diuiduntur. Perlustrata a nobis posteriore ac superiore hac narium regione, quae descensuris his nervulis proxima et laminae transversali cribriformi continua est, saepius in ossibus membranisque narium, ad hunc laborem diuisis ac praeparatis, vidimus, filamenta nervi olfactorii, per ossis cribriformis laminam nares ingressura, in canali, quem intrant, in nonnullas esse diuisa fibrillas, quarum quamlibet, e communi canali in proprium ingressam, ad pituitariam membranam discessisse. Eadem experimenta nos docuerunt, non solum posteriores fibrillas per longiores canales retrorsum deorsumque ad septum et turbinata ossa ossis ethmoidei descendere, sed singulas etiam, vaginulis durae matris cinctas, in progressu cum aliis partibus commisceri. Durae matris et, quod sponte sequitur, fibrillarum vaginarum vinculo cum periosteo et membrana pituitaria non levis nexus est, qua de re certior quisque fieri potest, si, cauo narium e longitudine diuiso remiotoque septo narium osseo, frustula laminae cribriformis remouerit; dura matre enim nonnihil tracta, vaginulae, si spiritu vini paullulum induratae fuerint, periosteum cum pituitaria membrana facile attrahunt. In udis his partibus quaedam quasi radiata fibrillarum directio in septo narium, eius scilicet membranae pituitariae auersa parte, iam animad-

verti

1) Dissert. de primo pare nervor. cerebri. — hor. script. neurol. T. I.

2) de basi enceph. tab. I. II. — hor. sc. neur. T. II.

3) Osseru. di chirurg. Part. II. cap. 5.

4) de struct. neru. Sect. II. cap. 3.

5) Annotat. anatom. lib. II. de organo olfactus praecipuo et de nervis nasalibus

interioribus e pari quinto nervorum cerebri cap. 2.

6) Neurogr. uniuers. tab. 17. fig. 1.

7) Epistol. anatom. problem. XII. tab. 13.

8) Obs. on the structure and functions of the nervous System. cap. XXI.

9) l. c. et in Eiusd. anatom. disquisit. de auditu et olfactu. fol. Ticin. 1789. lib. II.



verti videtur, unde ea coniunctura attinguntur, quae, apertis vaginulis, vere reperiuntur. Duram matrem malleinus credere sub forma telae cellulosae in narium membranam finiri, quam eam ad finem usque contenta sua filamenta concomitari.

Nervi anteriores narium rami sunt nasalis nervi rami ophthalmici quinti paris, nec, nisi orbita nariumque ossibus diffractis, ad oculum plane exponuntur. Lacunari igitur superiore osseo, quod lobo cerebri anteriori oculoque intercedit, resecto, et pingui cellulosa, quae bulbum partesque ei annexas, nervos, vasa et musculos involuit, remota, non solum lacinias laminae ossis ethmoidei transversae separandas, sed ad persequendos etiam minores ramos cavum narium verticali sectione diuidendum esse, eaque encheiresi eorum omnium distributionem optime explorari, saepius experti sumus. Hoc enim facto apparet, nervum nasalem primi rami paris quinti siue ophthalmici, origine nervo frontali profundiore, ad internum parietem orbitae una cum arteria ethmoidali siue ethmoideo-nasali flecti, et proxime per foramen orbitarium internum in canalem periosteo orbitae obductum intrare, ramo ad orbitae anteriorem partem dimisso, qui ad oculi partes quasdam, in isto angulo positas, distribuitur. Egreditur autem per hunc canalem, obductus periosteo orbitae, ut intret cranium per foramen laminae cribriformis; in eo tectus a dura matre sub ea introrsum et antrorsum ad latus cristae galli flectitur et in depresso loco per foramen ossis ethmoidei post ossium nasi averfam partem in nares immittitur, ubi periosteo et membranae pituitariae interceptus in ramum internum et externum diuiditur.

Nervi nasalis paris quinti ramus internus super anteriorem marginem septi inter periosteum et membranam pituitariam descendit et in duos diuiditur ramos, quorum alter in ossis nasi averfa superficie in sulco osseo ad inferiora descendit et in cutim nasi reflexam finitur, alter in membrana septi pituitaria terminum habet <sup>10)</sup>. Ramus externus in eo, cuius ad exemplum hunc nervum descripsimus, capite, mox ortus, deorsum leuiterque retrorsum ramum tenuem longumque inter periosteum et membranam pituitariam dimisit, qui interiore loco ante extremam anteriorem partem ossis turbinati medii in inferiorem fere membranam pituitariam lateralis parietis caui narium finiebatur. Truncus ipse rami externi nervi nasalis, in canalem ossis nasi ingressus, per spatium dimidii pollicis in eo latebat; postea, egressus exinde, per averfam superficiem ossis nasi descendit, et iam in exitus loco e canali in duos ramos minores, fulcis osseis inclusos et angulo acuto distinctos, diuidebatur, quorum anterior ad interiorem superficiem pinnae narium dextri lateris decessit, exterior cum ramo, a nobis superius descripto, qui altiore loco et ante ingressum in canalem osseum nasalis ossis ortus erat, anastomosi iunctus, ramum per foraminulum ossis nasi ad cutim nasi emisit <sup>11)</sup>.

Nervi narium interni posteriores omnes a ramo maxillari superiore proficiscuntur, eosque vel superiores, vel inferiores, superiores autem anteriores et posteriores

B 3

esse

10) III. SCARP. annotat. anatom. lib. II. tab. 1. fig. 1.

11) Conferri haec nostra descriptio potest cum iis, quae III. SCARP. annotat. anatom. tab. 1. fig. 1. continentur.

esse ratio, quam ipsa natura in iis inde ab ortus loco distribuendis sequitur, quemque facile docet. Hi tam sollicitè ossibus inclusi tenentur, ut, nisi ea multis modis suspensa manu et instrumentis diffingas, eos funditus perlustrare non possis; diffractione tamen canali, qui ossis sphenoidi laterali parti inest et per quem ramus iste secundus paris quinti in summam fossam pterygopalatinam sese profert, remotisque iis, quae interius in posteriore narium regione canalem pterygopalatinum anteriorem effingunt, ossis palatini partibus, investigationem eorum facilem esse, usu didicimus. Hoc enim facto nervi huius maxillaris superioris progressum eiusdemque ramos eos, qui foramine sphenopalatino e fossa pterygopalatina nares et canales pterygopalatinos intrant, perlustrare et laborem SCARPAE <sup>12)</sup> ac WRISBERGII <sup>13)</sup> ex voto imitari potuimus.

Rami scilicet secundi paris quinti tenuissimus exteriorque, subcutaneus malae, fere horizontalis a latere exteriori canalis infraorbitalis per fissuram sphenomaxillarem in orbitam intrat, perforatoque periosteo orbitae e latere interiore exterioris parietis orbitae reperitur; medius, infraorbitalis, maximus est; interius duo ut plurimum filamenta, pinguedine cincta, ganglion sphenopalatinum intrant, cui exterius arteria sphenopalatina est appositae. Vidianum et Palatinum duos istos, in quos hoc ganglion findatur, ramos esse, vel eosdem communi radice, quam nervum sphenopalatinum dicunt, natos inveniri cuique est notissimum, uti et hoc, nervos narium interiores superiores posteriores, diffractione canali Vidiani, inde a Vidiani ramo petendos esse. Nervi nasales interni superiores anteriores vel ex isto ganglio, vel nervo sphenopalatino, ad os spongiosum superius ascendunt, membrana pituitaria tecti et cum ea commixti, in aqua cum fibrillis posterioribus nervi olfactorii per patulos huius turbinati ossis canaliculos anastomosis esse non negamus.

Eodem loco ex eodem ganglio vel nervo sphenopalatino origo est nervi nasopalatini SCARPAE <sup>14)</sup>. Is, flexus ad superiorem vomeris partem, ab ea inter membranam pituitariam et periosteum a superiore ad inferiorem anterioremque partem septi descendit, adglutinator quasi vomeris periosteo. Ubi ad inferiorem et anteriorem partem vomeris accessit, periosteum nobis, nisi fallimur, visus est perforare et post dimidii pollicis progressum in canalem incisivum intrare, qui ossi maxillari incisus est, et a lamina tenui superiore in cavo narium tegitur et post dentem incisivum medium in cavum palatinum patet. Optime hoc conspicitur, si os narium ad verticem in capite macerato ita diuiditur, ut ferra per sellam turcicam perque os cribiforme penetrarit et vomer cum spina sphenoidali ossis sphenoidi et lamina perpendiculari et septo cartilagineo in nexu relictus sit. Ceterum nostrae observationes nos docuerunt, nervum non solitarium a sua origine ad canalem ossis maxillaris incisivum descendere, sed diu antequam in eum intret, deorsum retrorsumque ramum unum duosque inter periosteum et membranam pituitariam dimittere. Haec manifesta

<sup>12)</sup> l. c. lib. 11. cap. 4.

<sup>13)</sup> Syllog. Comment. anatom. de membranis ac involucribus continuationibus, nervis arteriis comitantibus et nervis

pharyngis. p. 37. — cf. Script. neur. min. T. III.

<sup>14)</sup> l. c. tab. 1. ff.



festi sunt, si in inacerato nonnihil, iunioris inprimis hominis, capite periosseum una cum pituitaria membrana a vomere caute reflexo deglubitur et separatur, qua encheiresi ingressus huius nervi in canalem incisum egregie cernitur.


Inferiores nasales nervi interni ad nervum palatinum maiorem referendi sunt. Is brevi post suum ex ganglio sphenopalatino ortum intervallo canalem pterygopalatinum ingreditur, in quo a latere arteriae palatinae interiore duos ad nares dimittit ramos, quorum superior sub origine nervorum nasalium internorum anteriorum, perforata nasali parte ossis palatini, altero et superiore ramulo ad extremam posteriorem partem ossis turbinati medii, altero et inferiore ad os turbinatum inferius dirigitur ibique inter periosseum pulposamque narium membranam finitur. Inferior nasalis ramus huius palatini nervi maioris, itidem parte nasali ossis palatini perforata, ramulis suis in pulposa membrana ossis turbinati inferioris terminatur. Truncus nervi palatini maioris, ramulo per canaliculum ad tonsillam dimisso, foramine palatino postico canalisi pterygo-palatini egreditur, tribusque ramis ad gingivas fornicisque palati membranam diuiditur.

Haec de hoc nervorum genere nobis in promptu erant, eo consilio commemoranda, ut quousque nostro labore ad exemplum aliorum, qui cum magna laude in hoc exercitationis genere versati sunt, accesserimus, alii iudicent; eos nervos, qui, ab alveolari et ab infraorbitali paris quinti nervorum cerebri ramo orti, sinum maxillarem ingrediuntur, cum hoc limites istius commentationis non permittant, oratione ne attingere quidem hoc tempore volumus. Eadem ex causa, praesertim cum ad palatum faucesque pertineant, nervus palatinus minor et exterior, qui, ganglio sphenopalatino nati, suis canalibus ad tonsillas velumque palatinum demittuntur, et quos, remota ossis palatini nasali parte, nobis ob oculos posuimus, eiusmodi nobis esse visi sunt, ut ab nostra argumenti tractatione abesse possent.

Non omnes igitur organi olfactorii partes sensibilitate sibi aequiparandas esse facile nobis persuaderemus. Quo enim quaevis habet nervos trunco, e cerebro progresso, propiores, et quo magis iis est conferta, eo magis alias, posita eadem filamentorum nervosorum finis ratione, sensu antecellet. Quibus positis intelligimus, ossis ethmoidi os turbinatum superius et medium, septumque narium ceteras sentiendi facultate superare iisque sensus odoratus praecipuam partem attribuendam esse. Os turbinatum inferius convexa sua mole irruentis aeris impetum, ne pulmones nimis expandantur, moderari, opinio est, quam casus, in quo, polypo narium exciso, donec ille recreuerit, respiratio perturbata erat <sup>15)</sup>, confirmare videtur; cum tamen membrana pulposa, huic ossi imposita, non careat nervis a palatino maiore productis, isti, certe non minus molli, quam ceteri, termino praediti <sup>16)</sup>, odoratus sensus expertes nobis non videntur.

15) Ill. SCARP. l. c. cap. 3. p. 52.

16) HALLER. elem. physiolog. Tom. V. lib. IV. sect. III. p. 178.



## V.

HENRICUS AUGUSTUS WRISBERG  
DE  
NERVO PHRENICO  
QUAEDAM ANIMADVERSIONES <sup>1)</sup>.

GOTTINGAE 1763.

**A**lterni et inspirationis et expirationis diuersi motus rationem, ex nervo phrenico defuntam mihi perpendenti, sententiae cuiusdam ab alio quodam prolatae impugnationem, propria exhibita explicatione longe esse faciliorem, luculenter convictus sum. Tensionis a descendente diaphragmatis musculo in nervo phrenico enatae subsidia, et pressio eiusdem nerui a pleno pulmone, pro explicando alterno et inspirationis et expirationis munere, a magni nominis viris, multo probabilissimis adscribuntur veritatibus <sup>2)</sup>. Optandum fane esset, elegans hoc eruditionisque plenissimum systema cum nostra et observationum et ratiociniorum conciliare ut possimus serie.

<sup>1)</sup> Repugnat huic sententiae anatomia comparatiua, alternam enim hanc et inspirationis et expirationis mutationem in illis etiam videmus animalibus, quibus nec diaphragma uti auiibus, quantum mihi saltem constat plerisque, nec verus diaphragmaticus nervus, in quibus tenuis quaedam diaphragmatis instar membrana, nullo tamen motu, nullo respirationem adiuuandi munere praedita.

<sup>2)</sup> Aperui.

<sup>1)</sup> Aliquoties elapsa hyeme ceruicales examinauimus nervos, et phrenicum semper ex magno plexu, cui quartum ceruicalem nervorum par immiscetur, oriri deprehendimus. Totus quantus prodibat ex pari quarto, in directione trunci ab origine ramulo quodam associatur exilissimo, a phrenico potius ad quintum par descendente. EUSTACH. Tab. VI. f. 9. X. edit. Lanc. Thoracem intrat, inter arteriam et venam subclauiam progreditur, ante scalenum anteriorem, retro extremitatem claviculae anteriorem, ad introitum in thoracem cum primo dorsali communicat et intercostali, et assumpto exilissimo qui facile

nisi suspensa procedamus manu, distrumpitur, ab octauo pare ramo, ad latus octavi paris lateraliter pericardio incumbit et telae cellularis molliissimae ope illi adhaeret. Dexter superioris venae cauae ductu descendit, anterior et breuior est, sinister posterior et longior. Plura multo memorabilia legi possunt in Perill. de HALLER l. c. pag. 88. seq.

<sup>2)</sup> III. LUDWIGVS in Institutionibus Physiologiae §. 436. Cl. KRÜGER de nervo phrenico p. 37. Cl. GEORG. MARTINE in Essays of a society at Edinb. Vol. I. p. 164.



2. Aperuimus in variis diuersae speciei canibus thoracem, nudauimusquē phrenicum neruum, atque pulmonum imitati sumus pressionem, qualis in statu solet esse naturali, a modica tunc digiti, viuentis adhuc in animante cuius alter residuus integer thorax erat, pressione, aut saltem prehensione, nec diaphragmatis motus impeditur, nec demortuo in cane cui utrumque aperuimus pectus, ullus inuoluntarii huius apparere voluit motus musculi.

3. Eodem in animante, metallico corpore prehensus phrenicus neruus, pressus, vellicatus, et motus suspensionem produxit, et a leuiore irritatione in alio mox demortuo cane, et diaphragmatis et hepatis enata est commotio.

4. Si scalpello, forcipe quadam fortiter comprehensus phrenicus neruus, irritabatur ex parte a diaphragmate auersa, nullum diaphragmatis motus videre potui vestigium. Ubi verò infra forcipem, eodemque in demortuo cane diaphragma versus duro tangitur instrumento neruus, et motus et contractionis luculentiora comparuere testimonia. Ad impediendam itaque diaphragmatis actionem, longe validior sane requiritur uti eiusmodi a corpore metallico est compressio, illa, quam et pulmonum et digitorum limitata praestare vis valet<sup>3)</sup>.

5. In thorace quodammodo phrenici nerui compressio contradictionem inuolueret omnino mihi videtur. Adest et inuoluit neruum dura mater, eo scopo ne premi possit. Abesse nunc sine dubio haec deberet meninx, si mutatio quaedam a pressione locum haberet, nam in plerisque illis neruis, ne dicam in omnibus, ubi necessaria est, ad subeunda neruorum munera specialia, compressio, dura meninx, uti in intercostali ad carotidum latera videtur, abesse debet. Pulmones nunc expansi, pericardium tanquam membranam mollem versus premunt, durius resistit nerui inuolucrum, nullum ergo pressio habere poterit locum.

6. Nunc ponamus neruum reuera premi, et ab eius pressione alternum thoracis pendere motum, quaerendum omnino erit, quo tempore plus premi possit an inspirationis, aut expirationis momento, cum pectus uno tempore eandem habeat plenitudinem quam alio, pulmo enim in utraque periodo, in eadem manet proportione, qua aer efflatur, abdomen subsidet, nouus aer intrat, nec unquam ab omni aere liber est: hinc viuo in homine plenissimum semper videre possumus pulmonem, maiorem quidem inspirationis tempore quoniam thorax amplior fit, minorem sub expiratione, thorace iterum descendente, et in angustius spatium redacto.


7. Suis quoque tensionis theoria premitur difficultatibus, quas pace Illustrum illius hypotheseos fautorum in medium producere, nec ab hoc loco nec ab officio meo alienum esse puto. Peculiaris huius nerui situs eiusque structura contrarium augurantur effectum. Solutus enim ab omni cohaerente et affigente cellulosa tela, neruus adeo longus adeo latus iacet, ut nulla tensionis suspicio oriri possit, diaphragmatis descensus ad umbilici profundam dirigendus esset regionem, si ulla tensio, si ulla nerui attractio statuenda. Tensus praeterea neruus non minus agit, ut potius propter excitatum qui sequitur, dolorem, longe validiorem proferat actionem, et ad diuturniorem irritet contractionem.

VI. GOS.

3) Perill. de HALLER l. c. p. 92.

Ludwig script. neur. min. T. IV.

C



## VI.

GOSWINI FRIDERICI PEIPERS

## TERTII ET QUARTI NERVORUM CERVICALIUM DESCRIPTIO

CUI ACCEDIT

SUCCINTA EORUNDEM NERVORUM QUINTI; NERVI PHRENICI, PRAESERTIM RATIONE ORIGINIS; NERVI ACCESSORII WILLISII; NERVI DURI, EIUSQUE PRAECIPUE RAMI INFERIORIS; NERVI HYPOGLOSSI ET OCCIPITALIS MAXIMI A SECUNDO CERVICALIUM NERVO ADUMBRATIO.

H A L A E 1793.

## SECTION I.

D E

## NERVIS CERVICALIBUS IN GENERE.

## §. 4.

Cum sufficienter a plurimis atque clarissimis viris demonstratum sit, quod omnium iure octo cervicalium paria numerari possint, omnem ulteriorem circa hanc rem praetermitto disquisitionem. Ea tantum ex anatomicorum scriptis, de his nervis repetere mihi liceat, quae ad clariorem nervorum nostrorum descriptionem propiora facere possunt. Generaliora scilicet de origine et incipiente cervicalium progressu.

## §. 2.

Nervi cervicales omnium fere spinalium maximi, sequentia communia habent:

- 1) Oriuntur ab utroque latere e medullae spinalis bina parte, virga dicta, hinc et duplicem agnoscunt radicem; anteriorem unam, posteriorem alteram<sup>1)</sup>.

2) Harum

- 1) I. I. HUBER de medulla spinali speciatim de nervis ab eo provenientibus. 4. Gotting. 1741. §. 3. etc. etc.



- 2) Harum radicum utraque ex pluribus filamentis vel fibrillis conflata est; quarum numerus diuersus obseruatur, in diuersis hominibus. Immo nec semper in utroque latere numerus, nec filamenta ipsa aequalia sunt <sup>2)</sup>).
- 3) Filamenta haec conuergendo, ita ut suprema descendant, media transuersa sint, aliquantulum ascendant ima; in fasciculos anteriorem et posteriorem se colligunt; qui fasciculi per ligamentum denticulatum a se inuicem separantur, et pia matre obducuntur <sup>3)</sup>).
- 4) Ex hisce filamentis infimum ex superius sito fasciculo cum supremo inferioris coniungitur <sup>4)</sup>).
- 5) Fasciculus siue radix anterior posteriori gracilior aliquantulum est, primo pare excepto. Huius radices filamenta paullo sunt tenuiora posterioribus atque proximiora sibi, numero tamen vix pauciora <sup>5)</sup>). Vel et reticula inter se formant, ut lingualis medius <sup>6)</sup> in ortu suo et ad arteriam vertebralem.
- 6) Radix posterior magis cylindrica est; eius autem filamenta simpliciora sunt anterioribus <sup>7)</sup>. Numero vel plura sunt, vel saltem robore suo paulo maiora, quam antica <sup>8)</sup>. Nec non medullae mediae parti propiora oriuntur.
- 7) Utraque sic formata radix, anterior et posterior, separatim, sed magis magisque sibi conuergens, ad proprium sibi destinatum durae matris foramen procedit. Hic nouum ab hac membrana radices induunt inuolucrum, et absque alterius nerui combinatione, antequam tamen e vertebri egrediantur, sursum aliquantulum vergentes ganglion efformant <sup>9)</sup>. Obseruatur vero leue quoddam discrimen inter hanc directionem radicum; primorum enim parium radices sursum magis feruntur; sequentes quatuor transuersaliter et directe; infimi vero deorsum obliquum seruant decursum <sup>10)</sup>.
- 8) Ganglia Nro. antecedenti dicta, proprie tantum a funiculis radicum posteriorum, qui in illa intrant, formantur; anteriorum filamenta gangliis hisce tantum adhaerent, quin admisceantur. In ipso foramine arcuum vertebrarum sita sunt, nec in omnibus cervicalibus eandem figuram, nec crassitiem agnoscunt <sup>11)</sup>. In secundo et quarto cervicalium oblongiuscula atque maiora sunt, quam in reliquis, in quibus minora simulque rotundiora obseruantur. Ad simplicia Cl.

C 2

SOEM-

2) HUBER l. c. §. 17. p. 45.

3) R. VIEUSSSENS neurographia uniuersalis. fol. Lugd. 1684. L. 2do. Tab. 20. p. 153. HALLER. element. Physiolog. 4. Lausan. 1762. T. IV. Sect. VI. §. 35. pag. 243. Eius fascic. VII. Tab. 4. 5. — HUBER l. c. Icon. II.

4) Ibidem.

5) HUBER l. c. §. IV. et V. TH. ASCH

de primo pare neruor. medul. spinal. Goettingae 1750. §. 27. — hor. script. T. I.

6) TH. SOEMMERING Hirnlehre und Nervenlehre. 8. Frankfurt 1791. p. 123. e.

7) Ibidem.

8) HUBER l. c. §. 17. p. 43.

9) ASCH l. c. §. 28.

10) ROL. MARTIN institut. neurolog. 8. Holm. et Lips. 1781. Sect. 2da. §. 157.

11) HUBER l. c. §. 12. 13. 19. 20.

SOEMMERING <sup>12)</sup> haec ganglia refert. Externe obducuntur dura matre, interne vero a pia matre <sup>13)</sup>.

9) Superato ganglio anteriora cum posterioribus conueniunt filamentis, ita, ut vel in unum cum illis funiculum iungantur, vel separati appareant, per strias exiguas, aut pluribus tantum nerueis filamentis anastomoticis procedant <sup>14)</sup>. Sic ex coniunctis utrisque radicibus oritur breuissimus ramus communis, qui vero mox iterum se diuidit in ramum anteriorem et posteriorem. Anteriores hi inter se dato et emissio ramo in arcus speciem uniuntur <sup>15)</sup>.

10) Utriusque radicis filamenta ad constituendum neruum intercostalem suum conferunt ramulum <sup>16)</sup>.

### §. 3.

Sufficiant haec, quae de neruis cervicalibus generatim dixi. Propius accedo ad tertii et quarti paris descriptionem, cui vero adhuc praemittam enumerationem anatomicorum, qui his de neruis peculiarem fecerunt mentionem. Exiguus vero horum tantum exstat numerus. Inueniuntur quidem in omnibus compendiis anatomicis horum neruorum descriptiones; verum tamen in veterum scriptis rarissime nisi originis descriptionem legimus. Mediae aetatis autores diligentius iam describere, nec uni vel alteri acuratio ipsius ulterioris neruorum nostrorum distributionis explanatio deficit. Inter omnes vero ad recentiorum usque tempora maximus deprehenditur dissensus, quod attinet ad rationem paria cervicalia numerandi. Hinc et in descriptionibus tertii et quarti paris, non leuis confusio obseruatur; praecipue quoad ramos illos, qui ad formandum neruum phrenicum inseruiunt, et illos anastomoticos cum nerui facialis ramis et aliis. Hanc ob causam non a re nostra alienum erit, aliquantulo accuratius perlustrare, quid singuli et veteres et recentiores in tanta rerum dissensione praestiterint.

## SECTIO II.

### DE

## TERTIO ET QUARTO CERVICALIUM PARE SPECIATIM.

### AUTORES, QUI DE HIS SCRIPSERUNT.

#### §. I.

*Claudius Galenus.*

Cum hoc sui temporis industria atque ingenio Viro Excellentissimo exordiar. Quae enim in scriptis hippocraticis aliisque ante eum leguntur de neruis nimis generatim

12) l. c. §. 154.

13) Ibid. §. 156.

14) MARTIN l. c. §. 156. p. 180.

15) HALLER l. c. §. 33. p. 240.

16) SOEMMERING l. c. p. 129. §. 158.



ratim atque obscure dicta sunt, quam ut huc applicari possint. GALENUS octo numerat neruorum cervicalium paria et primum ei illud par est, quod intra occiput ac primam colli vertebra[m] egreditur. In opere suo, cui titulus est, *de usu partium* <sup>1)</sup>, de tertio cervicali et auricularibus et superficialibus colli, ex eo oriundis neruis sic loquitur: *Naturam non piget ad caput ex spinali medulla colli nervos sursum ducere, omnino exiguos iis animantibus, quibus temporalis musculus est minimus, atque aurium substantia parva nec multum movetur ut homini ac simiae. — Ob eam igitur causam nervi iis animantibus exigui ad caput ascendunt. Duo quidem ex partibus posterioribus, duo autem a lateribus in cutem distributis, et aurem utramque. Porro quemadmodum delineamenta musculorum ipsis sunt circum aurem, sic et nervi minimi ad illum locum veniunt. — Distribuntur autem ii a secunda colli coniugatione. Cum enim ad capita musculorum nervos omnes ire oporteret, necesse fuit ipsis inferne sursum ascendere, ut in musculo temporali videre est. — Cum musculi huius principia sint multa, desinent autem in buccas et labia os aperiens ad latera: idcirco fibras omnes habet ad eas partes tendentes et cum eis nervos. Una autem cum fibris, quae a spondylis spinæ colli producuntur, nervi feruntur per collum ad anteriora, transversi, iidemque maximi ac plurimi. — Natura propaginem a singulis omnium nervorum colli productionibus, quae secundae vertebrae insunt, ducens transversam, ad posteriora per profundum usque ad spinæ radicem. Hinc ducit sursum cum spina usque ad praedictum ligamentum tenue ac latum instar membranae. Deinde ipsum pertundens foraminibus tenuissimis, nervis aequalibus, rursus nervos antrorsum per collum reducit.*

Ex quarto cervicalium neruum phrenicum oriri ait <sup>2)</sup>. In libello autem, cui titulus est, de dissectione neruorum pag. 206; eum ex tertio oriri dicit. Pariter in Lib. VIII. de administratione anatomica pag. 191. nervi phrenici ortum ex tertio aut quarto cervicali describit.

## §. 2.

*A v i c e n n a.*

Hic post GALENUM maxime celebris medicus Arabs sequentem tertii et quarti paris descriptionem nobis tradidit <sup>3)</sup>. *Paris tertii, ait, origo et ipse egressio est a foramine, quod est inter secundam et tertiam vertebra[m], et unusquisque eorum in duos partitur ramos. Ab uno sparguntur frondes in profundo musculorum, qui sunt ibi, et proprie caput cum collo in pyrum moventium. Deinde ad vertebra[m] ascendunt spinas, et cum in earum rectitudine veniunt, ad radices tenentur earum et post ad ipsarum elevantur capita et cum ligamentis miscentur pannicularibus, quae ab illi nascuntur processibus; postea ad partem aurium reflectendo penetrant et in nonnullo homine ad aures perveniunt et aurium musculos movent. Et ramus secun-*

C 3

dus

1) Edit. graec. Oppor. Basil. 1538. Vol. I. lib. XVI. c. 6. p. 541.

2) l. c. lib. XIII. c. q. p. 516.

3) in Canon. lib. I. fem. r. doctr. 5. summ. 3. c. 3. pag. 62. edit. Paulin. fol. Venet. 1595.

ad anteriora vadit, donec ad muscolum pervenit latum. Et hic quam primum ascendit, miscetur cum venis et musculis, qui ipsum cooperiunt, propterea ut in se ipso sit fortior. Et est etiam, quando cum musculis miscetur temporum et cum musculis aurium in bestiis. Plurimum tamen sparsionis ipsius non est, nisi in musculis maxillarum. Quarti vero paris egressio est a foramine, quod inter tertiam existit et quartam; et partitur sicut ille, qui est ante ipsum parte antecedente, et parte posterioris consequente. Sed pars eius quae antecedit est parva et ideo cum quinto miscetur. Et quidam iam dixerunt, quod ab eo penetrant rami, sicut araneae tela extensi super venam soporariam, donec ad diaphragma perveniunt, quod pectus bipartit. Sed eius pars maior ad posteriora reflectitur, inque fundo musculorum profundatur, donec ad processus vadit et musculis mandat ramos, qui inter caput et collum sunt communes: et deinde itinere suo ad anteriora reflectendo vadit, et cum musculis maxillae et aurium in animalibus continuatur. Et dixerunt, quod ab eo ad dorsum descendit ramus.

Isdem fere verbis BERENGARIUS CARPENSIS repetit, quae AVICENNA ex GALENO habet <sup>4)</sup>).

## §. 3.

## Andreas Vesalius.

Reformator Galenicorum, magnus VESALIUS, septem tantummodo agnoscit nervorum cervicalium paria, quorum primum quidem inter os occipitis ac primam vertebrae egredi dicit, ultimum vero siue septimum illud nominat, quod sextam et septimam inter prorupit. In immortali suo opere <sup>5)</sup> sequenti modo nervos nostros describit:

Tertium par, ex communi foramine secundae cervicis vertebrae et tertiae prociat; mox ab egressu in duos discissum ramos. Posterior retrorsum flectitur, ac inter musculos cervicem extendentes, qui dorsum mouentium septimus et octavus numerantur: (transversales cervicis) ac deinde inter caput mouentium secundum par (complexi) occultatus, ad secundae vertebrae spinam contendit: atque hinc ex mutuo musculorum posteriorem cervicis sedem occupantium concursu excidens, ad cervicis prope rat latera, musculo suffultus, qui ex carnea membrana constitutus, buccarum motibus praest. Anterior autem tertii paris ramus, in quatuor spargitur propagines, ac prima musculorum dorsum mouentium primum par (longi colli, recti interni capitis maiores) implicat. Secunda propago declivis ducta, quartum adit nervorum par, cuiusdam ipsius furculo commiscenda, in dictos nuper musculos absumpto. Tertia autem sursum contendit, ac posterioris secundi propaginis ramo in verticis cutem excurrenti, congregitur, una cum illo dispergenda. Quarta cutem tertii paris anterioris rami propago in musculos digeritur, qui transversis vertebrarum processibus connati,

cer-

4) Commentar. super anatomiam Mundi. 4. Bonon. 1520. f. 590. b. 501. a.

5) De humani corporis fabrica Edit. Albin. fol. Lugd. Bat. 1725. T. I. Lib. IV. Cap. XII. p. 379. Tb. 45. 46.



*cervicem in latera movent: et eum pariter, qui a transversis vertebrarum cervicis processibus principium ducens, scapulam sursum vellit.*

Quartum cervicis nervorum par e communi tertiae et quartae vertebrarum foramine, excidens, tertio pari similiter in duos partitur ramos. Posterior, aliorum, qui retrorsum ad spinam inter musculos occulati reflectuntur, modo, versus tertiae cervicis vertebrae spinam contendit, in progressu illis, quibus intertextitur musculi, surculos diffundens. Quando autem spinam contingit, per mutuum elabitur congressum musculorum posteriorem cervicis regionem occupantium, atque hinc in latum membraneumque digeritur musculus, buccarum motus autorem praecipuum. Anterior autem quarti paris ramus, ternas educit propagines, ac una promit, cui tertii paris propago commiscetur, quaeque in musculos deperditur stomacho substratos, ac cervicem flectentes. Secundum vero propaginem in musculos distribuit vertebrarum lateribus adnatos: cuiusmodi sunt, quorum beneficio cervix in latera ducitur, ac is, qui a transversis colli vertebrarum processibus principium ducens, scapulam sursum allicit. Tertia propago, duabus nuper dictis gracilior, declivis fertur, cum quinti paris sobola congressura, ac simul cum illa et sexti paris prapagine septi transversis nervum constitutura.

En clarissimi Viri diligentissimam descriptionem, quae imperfecta quidem, multo tamen accuratior omnium eius antecessorum.

§. 4.

Vesalium plurimi post eum anatomici secuti sunt, quorum immo plures verbotenus eum repetunt. Sunt praecipui sequentes: PARAEUS <sup>6)</sup>, IUL. CASSERIUS <sup>7)</sup>, CASP. BAUHNUS <sup>8)</sup>, ARCHANG. PICCOLHOMINUS <sup>9)</sup>, REALD. COLUMBUS <sup>10)</sup>, ADRIAN. SPIGELIUS <sup>11)</sup>, VIDUS VIDIUS <sup>12)</sup>, IOH. RIQLANUS filius <sup>13)</sup>, TH. BARTHOLINUS <sup>14)</sup>, ISBRAND DE DIEMERBROEK <sup>15)</sup>. Alium, scil. VALVERDUM, qui et huc referri meretur, magis infra seorsim adducam, cum non plane cum VESALIO in sua descriptione consentiat.

§. 5.

6) Opera omnia, Edit. gall. fol. L. B. 1641. L. VI. ch. 24. p. 138.

7) Tab. anatom. 4. Frcf. 1632. L. VII. T. II.

8) Theatr. anatom. 4. Francof. 1621. L. III. c. 24. p. 348. et Eius instit. anat. 8. Francof. 1616. p. 164.

9) Praelect. anatom. fol. Romae 1586. p. 265.

10) de re anatomica, 8. Paris. 1572. L. VIII. c. 4. p. 371.

11) Opera omnia; edid. van der Linden. Amstelod. 1645. de h. c. fabrica. L. VII. p. 195.

12) De anatome corp. hum. in eius operibus. fol. Francof. 1626. Vol. I. L. III. c. 3. p. 88—89.

13) Opera omnia. fol. Paris. 1649. Anthropographia. L. V. C. 50. p. 350.

14) Anatom. reformata. Hagae 1655. de nervis. C. 3. p. 464.

15) Opera omnia. fol. Ultraiekti 1685. Anatomie. L. VIII. C. 2. p. 510.

## §. 5.

Carolus Stephanus.

Hic VESALII coaeuus octo iterum neruorum ceruicalium paria agnoscit, et quidem duo paria a tertia ceruicis vertebra oriri dicit, unica inter omnes vertebrae, in qua talia obseruentur <sup>16</sup>). Sic tamen et eius ultimum par ceruicale numero foraminum per quae egrediuntur septimum est, ut illorum, qui reuera septem tantum paria numerant. Pag. 74. l. c. ad descriptionem paris tertii et quarti accedit. GALENI explicationes praemittit, dein sua obseruata adiicit. Non differt eius descriptio ab illa antecessorum, breuissima attamen est, et nequaquam ad illam VESALII accuratam accedit.

## §. 6.

Valverde di Hamusco.

Plerumque hic autor exscribere solet VESALIUM, tamen et proprii nonnulla habet. Sic primam VESALII ex anteriori tertii paris ramo propaginem iam cum quarti paris furculis connubium inire statuit, quod VESALLUS de propagine secunda docuerat. Dicit enim <sup>17</sup>): *Il ramo di nanzi si sparte in quatro ramuscelli. Il primo di loro si distribuisce per lo primo e secondo muscolo, che muouono la schiena, e caminando all' ingiù si congiunge ad un ramuscello del quarto paio di nerui, che si distribuisce per gli muscoli detti.*

Dum loquitur de ramo primo quarti paris rami anterioris, bene euitat confusionem, quam vox stomachi apud VESALIUM creat; ponit enim eius loco: gola: *Il ramo di nanzi, ait, si sparte in tre ramuscelli, cio è, in uno, di qual si congiunge l'altro ramuscello del terzo paio, e si distribuisce per gli muscoli, che sono sotto la canna della gola, e piegano il collo.* — Neruum phrenicum ex quarti cum quinti paris coniugatione oriri dicit.

## §. 7.

Bartholomaeus Eustachius.

Venio ad hunc VESALII celeberrimum aemulum. Hic in tabulis suis, tanta cum industria delineatis atque aere incisus tertii et quarti paris originem atque partem eorum progressus, optime ante oculos posuit <sup>18</sup>). Tab. XVII. fig. 2. originem neruorum spinalium representat, sed ab uno tantum latere, dextro scilicet. — Tab. XVIII. fig. I. litt. V. originem tertii ceruicalis, et ramum ab eo prodeuntem ad recurrentem neruum. Fig. 2. nr. 15. 16. tertium et quartum ab exitu e foramine interuertebrale. nr. 21. ramus qui tertium cum secundo pare coniungit. nr. 22. 23. Rami, quibus ceruicalium tertii cum quartis coniunguntur. 23. Ramus quarti ceruicalium

<sup>16</sup>) De dissectione corp. human. fol. Paris. 1545. L. I. Cap. 41.

<sup>17</sup>) In Anatomia del corpo umano. fol. Rom. 1560. cap. 9. p. 144.

<sup>18</sup>) B. S. ALBINI explicatio tabular. anatom. B. EUSTACHII. fol. L. B. 1744. — Edit. Lancisiana Colon. Allobrog. 1716. Tab. VI. fig. 2. 9. Tab. VII.



calium, qui accedit ad spinalem recurrentem. 24. Origo nerui diaphragmatici a quarto cervicalium. Tab. XIX. nr. 2. litt. h. Nerui spinalis recurrentis coniunctio cum tertio cervicali; quae in antecedente sub litt. i. indicata erat. u. o. Rami a cervicalibus ad intercostalem. D. Neru. cervical. tertii. C. rami quibus cum secundis coniunguntur. E. rami eorum cum quartis coniuncti. F. Neru. cervical. quarti. H. origo nerui phrenici ex quarto cervicalium. Tab. XX. nr. 2. b. ramus quarti cervicalis, qui spinali recurrenti iunctus, promit ueruum ad cucullarem muscolum. i. k. l. m. p. q. rami posteriores tertii et quarti cervicalis ad musculos cervicis progredientes.

## §. 8.

Thomas Willisius.

Hic fuit ille diligens neruorum inuestigator, qui primus initio seculi decimi septimi systemata neurologiae hucusque stabilita euertere audebat, et nouum neruorum paria numerandi ordinem proponebat. In libello suo anatomico <sup>19)</sup> breuissime quidem de neruis cervicalibus agit, originem vero tertii et quarti eorumque ulteriorem distributionem Tab. IX. pag. 223. non male delineauit. Neruum, cuius originem sub litt. L in latere sinistro depinxit et quem primum vertebralem dicit, est tertius noster. Sequentes ex hoc ramos figura dicta repraesentat: litt. g. furculus ab hoc neruo in ramum decimi paris. (Secundum cervicalium nostrum, dicit enim eum egredi inter primam et secundam vertebralem.) σ. ramulus alius in spinalem patheticum. (accessorium.) s. ramus insignis in musculos cervicis et aurium emissus. T. furculus a neruo incuruato (litt. s. praecedenti) in musculos cervicis anteriores. 7. Neruus ab hoc pari in primum brachialem, a quo ueruus diaphragmaticus radicem supremam habet.

Quartum nostrum cervicalem vel eius secundum vertebralem sub litt. M delineatum videmus. δ. ramus insignis ab hoc pari in plexum cervicalem, quo hic cum neruo diaphragmatis in prima radice sua communicat. v. ramus supremus brachialis.

Ex hac descriptione ac delineatione neruorum clare patet, quanta fuerit cl. huius anatomici cognitio; et quantum adhuc praestare potuisset, si modo minus artificiosus in enumeratione sua parium neruorum, et magis naturae consentaneus in ea fuisset.

## §. 9.

Raymundus Vieussenius.

WILLISII doctrinam §. 8. explicatam Cl. VIEUSSENIUS denuo interpolauit, non parum ab illius sententia recedens. Hic enim decem quidem cum WILLISIO agnoscit cerebri neruorum paria, quorum vero ultimum per foramen inter primam  
verte-

<sup>19)</sup> Cerebri anatome, cui accessit neruorum descriptio et usus. 8. Lond. 1654.

vertebram et occiput egredi dicit<sup>20)</sup>, cum tamen secundum WILLISIUM inter secundam et primam vertebra egreditur<sup>21)</sup>. Septem deinde numerat neruorum cervicalium paria, quorum primum inter primam et secundam vertebra prorumpit. Hinc eius par secundum, tertium nostrum et eius tertium quartum nostrum est. Descriptionem vero horum neruorum progressus sequenti modo in tabulis operi additis describit<sup>22)</sup>. *Tab. XXIII. octauis paris et intercostales neruos designat.* 88. *ganglion ceruicale secundum et tertium. m. ramulos ex eius primo pare in hoc ganglion.* 89. *ramuli quos nerui spinales circa singula vertebrarum internodia neruo intercostali largiuntur.* *Tab. XXIV. septem cervicalium et dorsalium neruorum paria repraesentat.* a. *ganglia neruorum sex cervicalium inferiorum.* c. *fibrae horum neruorum, quae in ceruicis musculos absumuntur.* d. *ramuli abscissi ad neruum intercostalem.* ee. *fibrae duae recisae, quarum interuentu neruus secundus cervicalis cum neruo octauis paris communicat.* f. *nerui tres cervicales, secundus, tertius et quartus, qui ramulorum g. interis iunguntur.* h. *Ramuli duo secundi nerui cervicalis, qui sursum reflexi, per aurem et musculos illius, parotides, et occipitis integumenta distribuuntur.* i. *Ramulus secundi nerui cervicalis, qui per musculum trapezium, ipsique superstrata integumenta disseminatur.* k. *fibra eiusdem nerui, quae in venam iugularem externam inseritur.* l. *Ramuli secundi, tertii et quarti cervicalis, qui musculis quibusdam colli, transversali scilicet, ac spinato, et capitis, videlicet splenio, complexo, paruo et crasso, recto maiori, recto minori obliquo superiori atque inferiori, nec non homoplatae nimirum trapezio, rhomboidi et levatori propiciunt.*

Neruus diaphragmaticus praecipuo suo ramo ex quarto VIEUSSENII cervicali oritur. *Tab. XXIV. m.*

Haec descriptio insignis huius neruorum indagatoris certe multo accuratior ac naturae magis consentanea, excepto parium numero, omnium antecessorum suorum inuenitur.

#### §. 10.

Multi post VIEUSSENIUM anatomici hanc WILLISII a VIEUSSENIO interpolatam doctrinam secuti sunt, praesertim Britanniae et Galliae medici. Verum enim vero antecessorum scriptorum negligentiores maximam suis descriptionibus confusione attulerunt: alii, quod decimum WILLISII et primum par ceruicale separauerint, alii quod assumendo par cerebrale decimum nec tamen a primo vertebrali distinxerint. Sic SAMUEL COLLINS<sup>23)</sup> decimum cerebri neruorum par eodem modo ac WILLISIUS describit. Dein assumendo octo neruorum cervicalium paria<sup>24)</sup>, primum

20) Neurographia uniuersalis. fol. Lugd. 1684. Lib. III. cap. VI. p. 212.

21) WILLISII l. c. cap. 29. p. 214.

22) Hae Tabul. a I. IAC. MANGETO in eius theatrum anatom. fol. Geneu. 1716. receptae sunt, ubi T. I. p. 176 et seq. Tab.

45 ad 47. iisdem Vieussenii verbis neruos nostros describit.

23) System of anatomy. fol. Lond. 1685. Lib. III. Vol. II. Cap. LV. p. 1053.

24) l. c. Cap. LIX. p. 1082. Attamen hic et pag. 1080. sibi contradicere videtur; cum



num cervicalē etiam inter atlantem et occiput egredi dicit. Tertiū paris eius descriptio ac quarti, maxime cum illa Vesalii convenit: quorum parium exitum etiam inter secundam et tertiam atque tertiam et quartam ponit vertebra.

Alius, IAC. DRAKE <sup>25)</sup>, etiam decem cerebri paria agnoscit, septem tantum cervicalium paria; quorum primum illud dicit, quod inter primam et secundam vertebra exit. Hinc tertium nostrum eius par secundum constituit, a quo secundo etiam diaphragmaticum nervum oriri dicit.

Cum hoc prope in omnibus consentit WIL. CHESELDEN <sup>26)</sup>; tantum in eo differt, quod phrenicus ex eius tertiū paris cum quarto (*nostrī quarti cum quinto*) conjunctione oriatur.

LEOPOLD BACCHETTONUS <sup>27)</sup> etiam decem numerat cerebri nervorum paria, tamen ipse dubitat, num iure id fiat. Septem enumerat nervorum colli paria, e quorum secundo, (*tertio nostro*), phrenicum oriri ait.

## §. II.

### *Benignus Winslow.*

Praecipue hic magnus ac solertissimus vir prae aliis huc referri meretur. Cum perfectiorem omnium suorum antecessorum nobis dederit tertiū et quarti paris nervorum cervicalium descriptionem, minime a re nostra erit eius ipsissima verba hic inferre <sup>28)</sup>: *La seconde paire cervicale, ait, passe entre la seconde et la troisième vertebre du Col. En sortant elle communique d'abord en devant avec le gros ganglion du nerf intercostal, ou grand sympathique. Elle communique aussi en haut avec la première paire cervicale, et en bas avec la troisième. Le tronc de chaque côté se divise ensuite en plusieurs branches, mais auparavant il sort de son union avec la première paire cervicale un petit filet, et il en part un autre de son union avec la troisième paire cervicale. Ces deux filets s'unissent en bas et n'en font qu'un, qui descend le long de la Veine jugulaire interne, et fait en bas une anse considérable pour remonter le long de l'artère Carotide, jusqu'à la glande parotide, où il se détourne pour s'unir ou communiquer avec le tronc de la neuvième paire du Cerveau. La Courbure de l'anse donne un filet, qui se distribue aux muscles Coraco-hyoidien, sterno-hyoidien, et sterno-Thyroidien. Le tronc même jette vis-à-vis le muscle mastoïdien une branche qui communique derrière ce Muscle avec le nerf accessoire de la huitième paire et cela simplement ou en manière de plexus. Cette branche va en-*

D 2

*suite*

cum hic ait: „seven appertaining to the vertebres of the neck“ et loco antea dicto p. 1082. dicit: „the eighth pair of nerves relating to the neck, which some call the first of the back etc.

25) Anthropolog. noua: anglie con-scripta. 8. Lond. 1717. Vol. II. book. III. chap. VIII. p. 303.

26) Anatomy of the human body. 8. Lond. 1722. Edit. 2da. L. III. Chap. XV. p. 208. — Huc quoque pertinet PHIL. VERHEYN anatomia corp. hum. 4. Colon. 1712. T. II. et 8. Amstel. 1731.

27) Anatomia. 4. Oniponti 1740.

28) Exposition anatomique. 8. Amstel. 1732. T. III. traité des Nerfs. p. 161.

suite derriere le muscle splenius, perce la portion superieure du muscle trapeze entre le grand nerf occipital et l'oreille, et monte à la partie laterale de l'occiput, où elle communique avec la pareille branche de l'autre Côté. Elle se distribue de côté et d'autre aux muscles ci-dessus nommés et au muscle angulaire de l'omoplate. Le tronc de la seconde cervicale jette encore en bas des branches à la partie moyenne du muscle trapeze, au muscle sterno-mastoydien et aux muscles vertebraux voisins. On trouve quelque fois en arriere une communication particuliere entre ce tronc et la troisième cervicale. Après ces branches le tronc s'avance vers le bord posterieur de la portion moyenne du muscle sterno-mastoydien et fait un contour de derriere en devant sur ce muscle. Dans ce contour il jette plusieurs branches. Il en jette d'abord une qui descend en arriere et se distribue par plusieurs rameaux au muscle scalene et au transverse etc. Il jette une autre branche, qui communique avec la troisième paire cervicale, à l'endroit où cette paire produit le nerf diaphragmatique et ainsi contribue à la formation de ce nerf. Il part encore du même contour un filet qui monte et communique avec un ou deux filets de la branche inferieure de la portion dure du nerf auditif. L'extremité du contour sur le devant du muscle sterno-mastoydien se divise en deux branches dont l'une va en haut et l'autre en bas. La branche superieure monte sur le muscle jusqu'au bas de l'oreille où elle donne un rameau derriere l'oreille, et un autre à la glande parotide, qui s'y rencontre avec le tronc de la portion dure du nerf auditif, et monte devant l'oreille. La branche inferieure de l'extremité du contour se jette de derriere en devant, se ramifie sur le muscle peucier et se distribue sur les tegumens de la gorge, en donnant des rameaux aux sterno-hyoidiens et se perd dans ces tegumens vers le larynx. Elle communique aussi avec une branche descendante de la portion dure et avec une de la neuvième paire du Cerveau. Cette branche inferieure dès son origine donne un rameau qui descend tout le long de la partie posterieure du sterno-mastoydien, jette des rameaux aux glandes jugulaires, à la graisse et aux tegumens de la partie inferieure du col, passe par devant la partie moyenne de la clavicule et va se perdre au dessous dans les tegumens de ce Côté de la poitrine.

La troisième paire cervicale passe entre la troisième et quatrième vertebre du col, et communique en haut avec la seconde paire, en bas avec la quatrième, en devant avec le grand nerf sympathique et avec un filet de la neuvième paire du crâne. Elle communique encore avec le nerf accessoire du nerf sympathique moyen par un filet, qui va au muscle trapeze. Chaque tronc de la troisième paire jette plusieurs branches aux parties anterieures, posterieures et laterales du col, savoir aux muscles, aux glandes, aux membranes, à la graisse et à la peau, jusqu'aux parties voisines du thorax et de l'épaule. Parmi les branches posterieures il y en a une qui va au muscle surépineux, et en passant par dessus l'échancrure de la Côté superieure de l'omoplate, donne des filets à l'extremité du muscle omo-hyoidien; et il y en a une petite, qui en allant au muscle trapeze communique avec un filet du nerf accessoire de la huitième paire. Parmi les branches moyennes il y en a, qui vont aux glandes jugulaires, au muscle sous-clavier, aux portions voisines du muscle pectoral, du deltoide et du trapeze,



et aux tegumens qui y repondent. Parmi les branches anterieures il y en a une qui étant fortifiée par un rameau de la seconde paire cervicale, s'unit d'abord en dessous avec un autre de la quatrième paire, et forme par ce concours un cordon appelé nerf diaphragmatique.

Huius nervi nunc insequens ulterior descriptio proprie huc non pertinet. Eam ergo omittamus.

## §. 12.

*L i e n t a u d i u s.*

Inter cives suos hic praecipue WINSLOWIUM sequitur. Sub nomine secundi et tertii paris tertium nostrum et quartum describit<sup>29)</sup>, sed brevissime tantum. CL. PORTAL eum, in descriptione secundi eius paris sequenti modo, naturae magis consentaneo emendat: *ordinairement elle ne se divise d'abord (à une très-petite distance du trou intervertebrale) qu'en deux branches, les quelles fournissent divers rameaux. De ces deux branches l'une est anterieure, et est plus grosse que l'autre; la branche anterieure donne cinq ou six rameaux etc. La branche posterieure, qui communique avec la dernière paire de la tête, et avec la seconde paire cervicale, répand ses ramifications dans le petit et le grand complexus, dans le splenius et autres muscles extenseurs de la tête.*

## §. 13.

*Albertus ab Haller. Iac. Huber.*

Ad illa nunc venio tempora, quibus anatomici iterum veterum more, accuratiori naturae habita ratione, novum incipiebant ordinem nervorum cervicalium paria numerandi. Immortalis HALLERUS eiusque solertissimi discipuli IAC. HUBER atque TH. ASCH, viam aperiebant, quam deinde recentiores praesertim secuti sunt, ita ut ad hodierna usque tempora octo parium cervicalium numerentur; quorum inter tertium par illud est, quod inter secundam et tertiam vertebraem emergit, et sic porro. Hallerus quidem nusquam haec duo nervorum paria cervicalia singula describit; tamen in eius scriptis ubique ramorum singulorum horum parium dispersas leguntur descriptiones<sup>30)</sup>.

HUBERUS accuratius iam de iis loquitur<sup>31)</sup>. Attamen ortum ac progressum eorum ad foramen osseum usque secundum libelli sui institutum, tantum describit; haec autem descriptio diligentissima est, ut ex autoris ipsis verbis videre est. Tertium, ait, *par fere ut secundum se habet et quisque eius nervus ex continua, utriusque faciei medullae, serie filamentorum conflatur, ad formandum nervum suum,*

D 3

priori

29) Essais anatomiques. 8. Paris 1742. p. 453. et anatomie historique et pratique ed. cl. PORTAL. 8. Paris 1777. Vol. II. p. 661. T. I.

30) l. c. T. IV. Lib. X. Sect. VI. §. 28.

anastomoses ramor. tertii cum illis nervi duri. §. 32. cum noni paris descendente. Auricularem tertii in lib. de auditu et sic porro.

31) l. c. §. XVIII.

priori in omnibus fere aequalem, nisi quod iste filamenta nervea habet plerumque paulo plura, tam ab antica quam a postica medullae facie. Filamentorum posticorum sunt plerumque novem vel decem; anticorum fere totidem, sed exiliora, exilis surculus in fini filamentum, utriusque faciei, ad supremum insequentis nervi abiens et communicationem intra thecam a dura matre factam efficiens, rarissime conspici non potest. Attamen probe attendendum est, ne filamenta ista communicantia in facie postica cum radiculis nervi accessorii confundantur; cum distinctissima sunt ab iis, nec facile cum iis confundi possunt, si modo ad eorum directionem attendatur. Surculi enim hi communicantes a superiori ac interiori parte deorsum et extrorsum incedunt, et in superficie maxime postica conspiciuntur; cum contra ea radiculae nervi accessorii sunt paulo anteriores, et ab interna ac inferna origine sua extrorsum ac sursum ferantur. Itaque se decussatim praetereunt. Ab antica facie hac cautela non opus est, ubi plane nihil communicationis filamentorum anteriorum cum nervo accessorio intercedit; quod ligamentum denticulatum prohibet. Ceterum nervus in quo versamur tertius, ut prior, oblique sursum fertur, quam primum involucri suum a dura matre accepit. In ipso foramine suo secundae ac tertiae vertebrae in ganglion degenerat, ubi in trochlea quasi, ut illud secundi paris, latet; quia etiam oblongiusculum est, et foramen osseum altius positum habet foramine durae matris. Ganglion istud prioris in modum obiectum est musculis, duosque, sed longe diversos, ramos, sibi e directo oppositos, dimittit; quorum prior, truncus merito dicendus, per hiatum anticum processum transversariorum, posterior exilis admodum ad spinam properat. Haec de tertio. Quartum cum quinto pare simul §. 19. describit. Idem cum prioribus filamentorum ortus. — Filamentum communicans a facie postica raro abest; ab antica non semper aequae distinctum inuenitur. Ex aequali filamentorum numero, quo superiores, oritur quivis nervus. — Nervus ipsi superioribus paulo minores; ganglia minora simulque rotundiora. Eorum posticum surculum tenue tantum, trunco antrorsum verso. — Ceterum eadem cum prioribus sursum versus foramina ossea directio. Vix dum intra thecam osseam conspici possunt.

## §. 14.

Pauci tantum anatomicorum HALLERI coeui hunc meliorem numerandi ordinem non secuti sunt. Nec plurimorum post HALLERUM neurologicorum opinio tanti huc refert, ut omnes nunc adducam. Generatim enim et potius compendiorum more illa nervorum cervicalium paria, de quibus hic praecipue agitur, tantum descripserunt, e.g. ALEXANDER MONRO, qui adhuc WINSLOVII partibus fauet, brevissimam tantum descriptionem habet <sup>32)</sup>.

ROLAND. MARTIN, BANGIUM, de quo postea fusius agam, praefertim secutum fuisse videtur <sup>33)</sup>. Cum neotericis octo cervicalium enumerat, quorum tertium et quartum pag. 190 et seq. ac in adiecta tabula VI. amplissime describit.

I. GOTTL.

32) Nervor. anatome contracta. 8. Fra. nequerae 1754.

33) Institut. neurolog. siue de nervis corp. hum. tractatio. 8. Holm. et Lips. 1781.



I. GOTTL. HAASIVS breuiorem antecedenti horum neruorum descriptionem nobis tradidit <sup>34)</sup>. In adiecta tabula, quae ex Cl. ANDERSCH tractatu <sup>35)</sup> sumpta est, pars neruorum cervicalium tertii et quarti depingitur; nempe ramus muscularis, ramuli ad intercostalem et ad phrenicum neruum.

D. E. GUENTHERI descriptio horum neruorum in compendio suo breuissimo allata, ab aliis accuratis descriptionibus non differt. Latine et germanice eius libellus editus est; prima editio sine autoris nomine <sup>36)</sup>.

TH. SOEMMERING, vir celeberrimus de neurologia perquam meritis, in libro suo supra citato §. 275 et seq. neruos nostros breuiter quidem, sed accuratissime deferibit.

Restat adhuc recentissimorum autor, Cl. FR. HILDEBRANDT, professor Brunovicensis, cuius anatomiae <sup>37)</sup> Tom. ultimus, qui angiologiam ac neurologiam continet, anno demum praecedente in lucem venit. Huius descriptio tertii et quarti cervicalis in genere parum differt ab illa Cl. SOEMMERING; tantum nunc accuratorem, nunc minus accuratam esse inueni.

Singulorum horum omnium descriptiones hic exscribere, valde supervacaneum atque ingratum laborem esse credo. Attamen in descriptione, quam, praemissis antea paucis adhuc hic pertinentibus, tradere conabor, semper eorum descriptiones cum mea conferre, easque in usum vocare non praetermittam.

§. 15.

*Ianus Bangius.*

Inter illos, qui praecipuam adhibuerunt operam, ut neruorum cervicalium decursum clariorem descriptionibus suis nobis redderent, BANGIUM hic praesertim adducere, non iniquum credo. Huius enim succincta atque accurata enodatio non solum legi, sed ab unoquoque in describendis neruis imitari meretur; modo in adiecta tabula filamenta neruea non sola sine nexu cum reliquis adiacentibus partibus expressisset, quo certo perspicuitas non parum minuitur <sup>38)</sup>. Omnium cervicalium decursum, ab eorum gangliis describere incipit. Tertii paris sequentes numerat ramos praecipuos: *I. ramum anteriorem (litt. e) et II. posteriorem ramum, (f)*. Rami anterioris iterum sequentes: *a. anastomoticum cum intercostali (nr. 22), b. anastomot. cum quarti paris ramo posteriori (25). c. Occipitalem paruum e coniunctione cum ramulo a secundi paris ramo anteriori (26). d. Ramum communem, e quo oriuntur: α. auricularis principalis, vel magnus posterior (30), et β. superficialis colli (40): e. ramulum cum quarti paris anteriori ramo communicantem.* — Nerui occipitalis parui sequentes ramos delineavit: *1. ramum descendente cum accessorio*

34) Cerebri neruorumque corp. human. anatome repetita. Lipf. 1781.

35) de neruis cordis.

36) Cerebri et neruorum distributionis expositio. 8. Duisburg. 1786. et Kurzer

Entwurf der anatomischen Nervenlehre. 8. Düsseldorf 1789.

37) Lehrbuch der Anatomie des Menschen. 8. Braunschweig 1792. 4 Theile.

38) Neruor. cervical. anatome. 8. Havn. 1772. et in LUPWIG script. neurol. min. selectis. 4. Lipf. 1791. T. I. p. 343.

forio octavi paris communicantem (28), 2. ramulum a tertii paris ramâ posteriori (27). 3. *Ultior progressus nervi occipitalis parvi, usque ad communicationem cum occipitali magno secundi et auriculari magno posteriori tertii cervicalis.* — Auricularis magni sequentes in tabula nervi exprimuntur: *α. ramus anterior (31) et huius: 1. ramus anterior (32), qui cum superficiali colli medio (33) et cum auriculari nervi duri anteriori (34) communicat ac deinde ad et pone helicem se diffundit. 2. ramus medius (37) et 3. ramus posterior, qui cum auriculari posteriori nervi duri communicat (38). β. Ramus posterior auricularis magni, ad musculos auris retractores (39).* — Superficialis colli rami principales sunt: *α. superior seu superficialis medius, communicans cum superficiali colli ex nervo duro. β. Superficialis interior sive infimus, qui cum medio communicat et ad integumenta se distribuit.* — II. Rami posterioris tertii paris sunt musculosi: *superficiales (47) et profundi (48): tunc anastomotici cum posteriori secundi cervicalis (17) et cum occipitali parvo tertii cervicalis (27).* — Paris cervicalium quarti sequentes enumerat ramos. I. *Anteriorem iterum (g) et II posteriorem (h). Ille dat ramulum (49) ad intercostalem, et anastoticum cum anteriore tertii paris. Porro nervi diaphragmatici primam radicem (50). Denique se dissipat in tres ramos: 1. posteriorem seu superficalem scapulae (51): qui ramus est musculosus. 2. Ramum medium (54) iterum musculosum, qui communicat cum accessorio octavi paris, et nervos format acromiales (56). 3. Ramum anteriorem ad claviculam, et partes adiacentes.* — II. Posterior quarti cervicalis ramus facia cum illo tertii paris anastomosi; ut ille etiam dividitur in superficalem (62) et ramum profundum (63) musculosos ramos.

## §. 16.

Exstant adhuc descriptiones nervorum tertii praesertim cervicalis, quae cum ad singulos tantum pertineant ramos eo accuratiores sunt, hinc minime hic omittendas esse credo. Inuenimus eas dispersas in singulis aliorum nervorum descriptionibus, quibuscum rami cervicalium communicant. Inter has prae ceteris hic adduci meretur illa ramorum praecipuorum tertii cervicalis descriptio, quam celeberrimus I. FRID. MECKEL nobis tradidit <sup>39)</sup>, additaque tabula aenea horum nervorum decursum clariorem adhuc reddidit. Sunt vero *auricularis posterior magnus, occipitalis parvus et subcutaneus colli tertii cervicalium*, quos in commentatione adducta descripsit.

Alium tertii paris ramum insignem descriptum legimus apud Cl. BOEHMERUM <sup>40)</sup>, NEUBAUERUM <sup>41)</sup>, nec non apud ANDERSCH <sup>42)</sup>, quorum omnium descriptiones,

39) De nervis faciei 1751. Vide in *memoires de l'academie royale des sciences à Berlin, année 1752. T. VII.* — LUDWIG script. *neurolog. minor. T. II. Tab. VI. p. 206.*

40) De nono pare. nervor. cerebri. Goetting. 1777. §. 45 etc. — hor. script. I.

41) Descriptio nervor. cardiacor. 4. Lips. 1772. c. tab. aen.

42) Fragmentum descriptionis nervor. cardiacorum etc. Anno demum 1791 sub iuncta auctoris tabula notulisque adiectis edidit SOEMMERING. Vide LUDWIG script. *neurolog. minor. T. II. p. 113.*



scriptiones, in quantum nempe a nostra desciscunt, huic magis infra sequenti adiungam. Tantum ex Cl. ANDERSCH tractatu hic fusius adducere mihi liceat, eorum ex tertio cervicalium ramorum descriptionem, qui cum nervo intercostali communicant. Sequentibus fere verbis eam §. 61. legimus. *Tertius nervus colli, quem vix e foramine suo egressus est, ramum edit, qui cum infimo nervo molli externi lateris primi ganglii colli coniungitur. Hic ramus ab ortu suo in prima prorumpit atque a latere suo inferiori ramum primum emittit, qui transuersali ductu versus musculi interni recti magni capitis externum marginem abit, et in duos crassos ramos diuiditur. Horum superior per posteriorem huius musculi partem transeunt in musculum longum colli tribus intrat ramulis. Inferior continuo fere ductu in infimi nervi mollis arcuatum latus introrsum adscendit, eique inseritur, ubi in duos primarios suos ramos diuisus est. Antea vero ramum demittit longiorem priori, qui in musculi recti interni magni capitis internum marginem ingreditur, et ultra duos pollices per eius mediam carnem descendit, ut ad usque sextae vertebrae processum prominentem ob oculos veniat, ubi radiorum adinstar fibras suas dispergit. Praeter hunc ramum tertius nervus colli adhuc communicat cum tribus ramis, ex inferiori ramo nervi inferioris mollis ganglii primi; quorum unus se inserit in mediam anteriorem conuexitatem tertii colli, qua parte fulcato processui incumbit; alius in superius tertii colli latus, ubi ipsi secundus processus transuersarius imminet.*

Apud Cl. NEUBAUERUM hisce de nervis sequentia vidimus. Tab. II. fig. 1. ex conuexitate rami anterioris tertii cervicalium ascendit ramus, qui cum alio descendente ex secundi paris anteriori coniungitur in ramulum comunem, qui in ganglion primum se inserit. In eadem tabula fig. II. eundem habemus ramum. Fig. Ima vero alium praeter illum ex tertio colli nervo descendere videmus, qui ramulum emittit ad quarti paris anteriorem, communicat cum ramulo ex radice phrenici ex quarto pare cervicalium, et accipiens ramulum a quinto pare tandem in quartum inferiusque ganglii in hoc casu longissimi tuber, intrat. Tab. III. fig. 1. habet rubellum, ramum gangliiformem a tertio cervicalium prouenientem, paululum descendendo; ramulum quarto pari porrigit, vel ab eo assumit, deinde mutato itinere oblique ascendens sensimque crassescens inferiorem ganglii primi partem petit, cuius quasi caudam sistere videtur.

Haec, beneuoli lectores, sunt, quae ex variis auctoribus collecta, accuratori ac specialiori nervorum nostrorum enucleationi praemittere, non inutile credebam; ipsam hanc descriptionem in sectione sequenti habetis.

SECTIO III.  
 DESCRIPTIO NERVORUM IN TABULA  
 ADIECTA DEPICTORUM.

CAPUT I.  
 DE TERTIO CERVICALIUM NERVO.

§. 1.

Tertius cervicalis nervus profunde retro musculos cervicis tunc demum conspicendus, cum hi in integrum dissecti fuerint, variaequae eorum caudae ita ab invicem separatae, ut eae aequae bene, ac eorum ventres ad multifidum spinae usque exacte discerni possint, oritur ex utroque medullae spinalis latere bina radice, *anteriori ac posteriori*. Illa ex septem ad octo, haec vero ex octo ad decem filamentis conflatur. Ex utriusque fasciculi vel radices ultimo filamento exiguum abit filamentum, quod cum supremo quarti paris fasciculi filamento communicationem efficit. Servant haec filamenta directionem a superiori ac interiori parte deorsum et extrorsum, et praesertim in facie postica conspiciuntur; qua directione sat satis a radícula nervi accessorii WILLISII distinguuntur <sup>1)</sup>. Radices hae tunc, ut illae reliquorum cervicalium conuergendo ad foramen suum osseum secundam ac tertiam vertebrae inter properant, perforando duram matrem, a qua obducuntur et quidem oblique sursum adscendentes, cum illud foramen osseum altius positum habeant, foramine durae matris. Formant nunc ganglion oblongiusculum, e quo tunc ramus communis brevissimus exit, qui ex intersitio inter processum transversum epistrophei et tertiae vertebrae colli lateraliter emergit. Excipitur tunc immediate a musculus intertransversalibus minoribus, ita, ut alter eorum ante truncum, alter vero pone hunc conspiciatur.

§. 2.

Primus ab eo secedens ramus, (quem posteriorem totius nervi, ac si in hunc et in anteriorem diuideretur truncus, dicere solent) profunde e foraminis intervertebralis posteriori regione emergit, et ita processibus vertebrarum obliquis pressim alligatur, ut stipata cellulosa cum ligamento eorum connexus, hac demum soluta appareat pone M. intertransversarium minorem.

Licet profundus hicce nervi tertii cervicalium ramus ipse tenuis sit, vix dimidia lineae diametri, notabiles tamen ramos largitur. Eorum *primus* vel simplicem vel duplicem anastomosis cum musculosis in scalenum medium terminatis ramis a secundo cervicalium posteriori ramo enatis efficit. — *Secundus* muscularis descendens priori maior est, et externo M. cervicis complexi margine adiacens; tunc sub complexo musculo absconditur; huic mediae et inferiori parte furculos tribuit; deinde vero maiori quodam ramo, complexum perforante, in splenium capitis musculum

<sup>1)</sup> HUBERI l. c. Icon. 2. litt. kk.



lum finitur. — *Tertius* profundus muscularis est, et altera ex parte in M. spinalem colli, ex altera vero in M. complexum tendit. — Truncus ipse transuerso demum ductu spinalem inter muscolum et complexum primo profunde incedit, emergit vero ultimo in ceruicis regione superiori, quam occupat M. trapezii portio ad occiput tendens, ultimosque ramos tam tenui huic M. trapezii portioni, quam cuti illam in occipitis regione obtegenti, exhibet.

§. 3.

Alter nerui huius cervicalis tertii ramus posteriori longe maior<sup>2)</sup>, et truncus merito dicendus (quem ramum anteriorem appellare solent) inter fasciculum superiorem musculi angularis scapulae (litt. I) et M. scaleni medii caudam ad processum transuersum vertebrae colli tertiae accedentem, pone muscolum sterno-mastoideum, a quo ita in progressu tegitur, ut hic, uti in figura habetur, interiora versus distrahi et reclinari debuerit, locatus, variis ramis originem praebet. Sunt vero:

1) *Ramus muscularis* in muscolum rectum capitis anteriorem, simplex quidem ad hunc muscolum accedens, dum vero in eum dispergitur, plura in filamenta diuisus.

§. 4.

2) Radix altera ansa neruosa, quam nerui hypoglossi descendens ramus cum hac, et superiori alia, ex anastomosi secundi cervicalium cum huius anteriore exorta radice, efficit circa venam iugularem<sup>3)</sup>. Decursus huius nerui<sup>4)</sup> is est, ut retro M. sterno-mastoideum mox abscondatur, deinde vero inter arteriam carotidem et venam iugularem ante truncum nerui vagi descendendo post duorum pollicum iter coniungatur cum neruo descendente hypoglossi (Nro. VII), unde simul producit retro finem inferiorem M. sterno-mastoideum emergens ramus, ventrem externum M. omo-hyoidei (litt. L) et legens, et furculis suis adeuns<sup>5)</sup>.

E 2

3) Muscu-

2) Vide Tab. nostr. Nro. I.

3) SOEMMERING l. c. §. 270. pag. 260. cum tribus radicibus, aut a tertio et secundo, aut a secundo vel tertio, aut a tertio et quarto cervicali oriri dicit. — ASCH l. c. Tab. 3. fig. 3. n. 19. a secundo tantum eum habet. — NEUBAUER l. c. Tab. III. fig. III. litt. p. q. r. ex primo et tertio cervicali eum habet. — Cl. ANDERSCH l. c. §. 45. 48 et 65. huius nerui ortum tribus radicibus ex tertio neruo colli et secundo, eiusque decursum describit.

4) Tab. nostr. n. 1.

5) Huc adducere mihi non iniquum videtur, quae NEUBAUER de hoc habet nervi ulteriori decursu. Tab. II. fig. I. ansa

iam formata, ex ipso descendente tertii cervicalium continuatur ramus externus, qui, unitus cum ramulo ex ansa ipsa orto magis interno descendit, bifurcatur, et pluribus furculis M. sterno-thyreoideo inseritur. Inflectitur deinde is ramus, et posteriora petens, coniungitur cum ramo quodam ab anteriori quarti cervicalis descendente. Ex hac sic formata secunda ansa iterum exeunt rami ad inferiorem M. coraco-hyoidei ventrem, ad sterno-hyoideum et sterno-thyreoideum. — Tab. 3. fig. 3. ex ansa pergit ramus, propago ex tertii colli descendente, qui in thoracem descendit et sub arcus forma cum cardiaco ex ganglio cervicali infimo coniungitur. — HALLERUS l. c. lib. VIII. ex descendente cervicali

3) Muscularis levatoris anguli scapulae (Nro. 2) plerumque simplici ductu ante fasciculum superiorem huius musculi per duorum pollicum spatium descendens et plurimis ramis in eundem distributus. Hic vero ramum circumflexum (Nro. 4) largitur in M. sterno-mastoidei carnes decurrentem. Hunc ultimum vidimus anastomoticum potius cum ramo M. sterno-mastoidei ab accessorio WILLISII evato.

4) Muscularis iterum in musculus sterno-mastoideum minor (Nro. 3).

#### §. 5.

Exhibitis minoribus hisce ramis, vix ultro simplex decurrit nervus, sed, natura docente, diuiditur in duos ramos, diametro sat aequales; decursu vero ita diuersus, ut eorum alterum *superiorem ascendentem*, alterum vero *descendentem* dicere possis. Habes, quae natura eloquitur, Nris. 27 et 32 in figura indicata.

A superiori ramo recurrunt primi circa nervum accessorium WILLISII notabiles duo rami, quorum posterior crassior (Nro. 5) nervus *occipito-auricularis*; anterior tenuior (Nro. 6) *anastomotico-auricularis* a decursu et distributione omnino optime denominantur.

Finditur iam *occipito-auricularis*, postquam cutem inter et M. sterno-mastoideum per unius et ultra pollicis distantiam adscenderat, et sic a media colli regione ad pollices usque duos sub linea semicirculari externa ossis occipitis (litt. AA) pervenerat in duos eos ramos, a quorum distributione nomen suumactus est. Alter eorum enim (Nro. 7) *occipitalis* est, qui *minor* bene diceretur, ratione ad *maio-rem* habita (Nro. VIII) a secundo ceruicalium. Alter vero *auricularis, superior* est (Nro. 8).

#### §. 6.

*Occipitalis minor*, dum inter crassam et tendineam quasi cellulofam, quae hicce locorum semper M. sterno-mastoidei tendinem obtegit, ascendit, breui ductu simplex decurrit et mox iterum in duos ramos finditur, quorum posterior *occipitalis anastomoticus* (Nr. 9) cum occipitali magno a secundo ceruicalium, anterior vero *cutaneus occipito-synypitalis* (Nro. 10).

*Occipitalis anastomoticus* exhibitis furculis cutaneis supra lineam semicircularem ossis occipitis superiorem, correspondentibus in eadem insertionem M. sterno-mastoidei et adhaesione M. occipitalis, insigni, ramos (Nris. 82, 83) nervi occipitalis profundi a duro decussatim transgrediens, sursum fertur. Cutem inter et M. occipitalem retrorsum crassam largitur anastomosis cum occipitali magno a secundo ceruicalium concurrentem. Quatuor partim ex hac anastomosi, partim ex occipitali hoc ipso rami cutanei e regione temporali inde ad eam synypitis sparsi sunt. Extinus horum ramorum longissime sursum extensus denuo per anastomosis con-

nectitur

ceruicali ramum pene visibilem oriri se vidisse ait, qui per sterno-thyreoideum retro a nervo phrenico adauctus, huic vel in superiore vel ima parte pericardii inferebatur.



nectitur cum ramulo occipitalis magni. Intimus (Nr. 11) in cutem pone aurem terminatur.

§. 7.

*Nervus auricularis superior* (Nro. 8) exhibitis cutaneis minoribus in cutis partem M. sterno-mastoideum obtegentem, singulari infula, non constante, facta, trunco, volumine quasi aucto, eandem stipatam cellulofam, quae sterno-mastoidei tendinem obtegit, permeans, simul supra neruum occipitalem a duro e regione baseos processus mamillaris ossis temporum ascendens, pressim hinc in plica inter auriculam et hunc processum haerens, supra musculos auris retrahentes ita antrorsum fertur, ut ad auriculae partem superiorem et posteriorem perveniat. Hicce locorum in plures ramos dispergitur, quorum posterior partim in M. auris attollentem (litt. FF) et eius cutem finitur, dum reliqui rami in auriculae extremitatem superiorem, cartilagini pressim adhaerentes, ad helicem usque, ramis reflexis supra helicem ad cavitatis naucularis cutem, plurimis ramis distribuuntur (Nro. 12).

§. 8.

*Nervus anastomoticus auricularis* (Nro. 6) per trium pollicum spatium ascendit, absque ramo, postquam sub accessorio WILLISII neruo sese relexit; exhibitisque parvis ramis in cutem, quae M. sterno-mastoideum obtegit, per notabilem anastomofin (Nro. 13) iungitur profundo occipitali a duro pressim tendini M. sterno-mastoidei adjacentem. Ultra pergit hic nervus in plica aurem inter et processum mastoideum, alteramque notatu dignam exhibet supra meatus auditorii et conchae unitos limites reflexam anastomofin (Nro. 14) cum ramo a duri occipitali profundo, unde ramus a retrahentibus auris obtectus ad levatorem auris pervenit. Reliqui eius rami supra convexitatem conchae et incisuram auris in media auris externa parte decurrunt, partim in huius cutem terminati, partim in cavitatis naucularis cutem, supra helicem reflexi finiuntur (Nro. 15). Praecipui huius nervi rami, cum supra medium auriculae partem incedunt, ultimus ipsius furculi truncus saltem, *auricularis medius* dici meretur; licet omnino nunc descripto trunco ob duplicem cum profundo duri anastomofin denominatio supra designata, *anastomotico-auricularis* potius conveniat <sup>6)</sup>.

E 3

Re-

6) Diverfitas in horum ramorum decursu in diversis subiectis non parum variantes descriptiones creavit, hinc et non leviem autores intelligendi difficultatem, necessario quam maxime adauctam diversis ab invicem nominibus, quae ramis tribuere. Praesertim hoc in illa Clar. I. F. MECKEL horum ramorum eximia ac praeclara descriptione ac figura, quam in supra citato tractatu proposuit, videre est, quam

et exempli causa comparatim cum nostra, breviter hic excerpere conabor. In fig. dicta sub litt. π. neruum indicatam videmus, quem *occipitalem parvum* nominat vel *parvum auricularem posteriorem*, (is est, qui in nostra fig. sub litt. nr. 5. indicatus est) Ascendit hic a media colli parte legens posteriorem M. sterno-mastoidei marginem, et in regione etiam in nostra tab. indicata scinditur in duos ramos; *posteriorem*,

Recurrentibus hisce ramis propinatis, tenues descendentes proueniunt ex eodem nostro ramo superiori tertii ceruicalium neruuli (tab. nostr. Nris. 16, 17). Anastomoses sunt cum neruo accessorio WILLISII, quarum prior breuis, inferior longior, supra levatorem anguli scapulae descendentes trunco nerui accessorii WILLISII alligantur. Saepius duas hasce minores anastomoses in unum sat fortem neruum nexas, simplicemque anastomosin efficientes, vidimus.

## §. 9.

Qui insequitur neruus *subcutaneus colli medius superficialis minor* (Tab. nostr. Nro. 18) crassius iterum neruus, exinde dictus, quod ratione ad trunci iter habita, per mediam colli partem immediate sub cute transuersim incedat. Anastomosi cum neruo colli medio profundo maiori ab unitis iam quarto ceruicali cum nostro tertio inferiori effecto, facta, supra venam iugularem externam immediate sub cute incedens, peracto fere pollicis itinere, exhibet a superiori parte ascendentem ramum  
sub-

*riorem*, qui distribuitur ramis suis in cutem regionis occipitalis, communicans insuper cum occipitali secundi paris, et cum cutaneo temporali posteriori duri nerui (tab. nostra n. 7.) et *anterior* (tab. nostra n. 8.) qui distribuitur sub cute conuexae superioris partis auris, et in M. attolentem auris, simul communicans cum cutaneo duri temporali posteriori. Sub litt. A. neruum habemus maximum ex tertio pare, *neruum auricularem magnum posteriorem*, qui hic omnes illos emittit ramos, qui in fig. nostr. separati, nunc ex hoc, nunc ex alio trunco oriuntur. Antea tectus hic neruus a M. sterno-mastoideo descendens, nunc supra eius marginem posteriorem in media musculi parte reflectitur. antrosum ascendens supra eum procedit, donec anteriorem sterno-mastoidei marginem legens sub angulo maxillae inferioris in ramos suos diuiditur. In hoc suo decursu sequentes emittit ramos. 1. Ab externo latere, eo in loco ubi circa sterno-mastoideum Musculum reflectitur: *ramum posteriorem*. (Tab. nostr. n. 6.) Sursum ascendit hic ramus supra M. sterno-mastoideum ad usque processum mastoideum. Hic emissio ramo anastomotico duplici cum nerui duri occipitali siue auriculari posteriori profundo (tab. nostr. 13. 14.) ascendit sub cute conuexitatis posterioris auris et pluribus ramis, partim hic, partim reflexis supra

cartilaginem helices sub cute internae auris superficie siue cavitatis naucularis finitur (Tab. nostr. n. 15). 2. In media M. sterno-mastoidei parte *ramum medium auricularem*. In duos hic in regione sub aure partitur ramos subcutaneos in parte conuexa auris retro cartilaginem helices. His emissis ramis ultro ascendit *neruus auricularis posterior magnus* et legens anteriorem M. sterno-mastoidei marginem in regione anguli maxillae inferioris emittit ramum anastomoticum cum digastrico duri (Tab. nostra 46.) ascendit deinde iuxta marginem anteriorem M. sterno-mastoidei, et sub auricula in tres diuiditur ramos, quorum anterior anastomoticus est cum neruo auriculari anteriori facialis nerui; medius cum tragico nerui cutanei temporalis posterioris facialis; posterior vero intrat helices cartilaginem et in cavitatem internam in-nominata auris externae sub cute helicem inter et antitragum ramis suis desinit (49. Tab. nostr.). — Ex anteriori *nerui auricularis posterioris magni* parte alius exit insignis ramus *cutaneus lateralis facialis*, (Tab. nostr. 42.) qui incedit transuersali ductu sub cute, quae tegit partem inferiorem glandulae parotidis et dispergit ramos suos sub cute genae ad usque oris angulum. Magis infra hunc ramum anastomoticus ex eodem auriculari magno oritur, qui communicat cum cutanei medii colli ramis,



*subcutaneum mastoidei*, f. *cutaneo anastomotico ascendente* (Tab. nostr. Nro. 19). Hic anastomosi cum ascendente a cutaneo colli magno facta, quibusdam ramulis in cutem musculi mastoidei terminatur. Huic pene immediate ex aduerso a nervi inferiori superficie producitur neruulus anastomoticus reflexus (Tab. nostr. Nro. 20) ansam efficiens; cum eodem nervo in Nro. 31 coniunctus. Exhibito adhuc paruo ramo cutaneo supra M. sterno-mastoideum *cutaneus colli medius superficialis* finditur duos in ramos: superiorem ascendente alterum (Tab. nostr. Nro. 21) nervum *maxillarem externum* siue *cutaneum faciei externum ascendente* et descendente inferiore (Tab. nostr. Nro. 22) *subcutaneum colli descendente superficiale*. Horum prior musculum inter platysmamyoideum et sterno-mastoideum oblique sursum progreditur, et maxillam inferiorem ramis suis transgrediens in cutem anguli oris et sub labio inferiori, medio inter maxillae inferioris angulum et mentum, loco, finitur. Alter vero descendendo supra M. sterno-mastoideum pergit ad cutem ipsius adhaesionem ad claviculam obtegentem, factaque anastomosi cum subcutaneo infimo colli (Tab. nostr. Nro. 35) a subcutaneo colli magno tribus vel quatuor furculis in hanc cutem obliteratur.

Praeter ramos hosce a trunco nervi *colli superficialis medii* continuos, tres notabiles ex eius trunco, posteriora et inferiora versus continui rami exhibentur. Eorum primi duo simplici trunco oriuntur, mox in duos ramos (Nris. 24, 25) divisio. Horum prius posterior est: *cutaneus cervicis posterior inferior*, f. *cutaneus partis cervicalis musculi trapezii* (Nro. 24) in cutem musculi trapezii (litt. N) finitur. Anterior vero, *anastomosis brevior*, (Nro. 25), cum nervo *anastomotico subcutaneo colli* (Tab. nostr. Nro. 26) in ganglion cervicale ipsum terminatur. Ex duabus hisce radicibus quasi, adiuncto nervo anastomotico colli subcutaneo, nascitur *ganglion cervicale subcutaneum*, unde varii producuntur rami. Horum prior a nervo (Nro. 34) enatus cutaneus communis est, per anteriorem internum ramum in cutem M. sterno-mastoidei (litt. P); per posteriorem vero in eam M. trapezii supra externam claviculae portionem, terminatus. E *ganglio* vero *cervicali subcutaneo* ipso praeter neruulum cutaneum duo maiores exsurgunt cutanei ascendentes, quorum prior superior minor exhibitis duobus ramis in cutem cervicis mediam, ascendendo pergit, dum alter crassior, atque recurrens supra tendinem M. sterno-mastoidei ascendendo pergens et serpentino tractu incedens in cutem cervicis posteriorem, occipiti proximam, abit.

#### §. 10.

Nervi nostri, exhibitis hisce ramis, portio altera sursum fertur reflexis fibris, quae crassum funiculum constituentes, inter levatorem anguli scapulae et sterno-mastoideum, musculos sursum pergendo anastomosi cum descendente ramo nervi cervicalium secundi (Tab. nostr. Nro. 27) efficiunt. Altera descendens ita connectitur cum nervi cervicalis quarti ascendente fibris, ut nervus *subcutaneus colli magnus profundus* (Tab. nostr. Nro. 32) eodem ex communi fonte, ab anastomosi nempe quarti cervicalium rami ascendente (Tab. nostr. Nro. 31) cum tertio cervicalium

calium et quarti ceruicalium ipsius (Nro. II) repetendus esse videatur. Haec ratio, cur ad descriptionem nerui quarti ceruicalium transimus.

## CAPUT II.

## QUARTUS NERVORUM CERVICALIUM.

## §. 1.

Egreditur huius nerui truncus (Nro. II), eodem fere modo, ac ille tertii ceruicalium exortus, crassior priori, profunde inter processum transversum tertiae et quartae vertebrae colli, lateraliter a musculis intertransuersalibus minoribus, uti tertius ceruicalium ex anteriori ac posteriori parte tectus. Ex hoc aequae ac ex tertio ceruicalium enascitur primo ramus *posterior profundus* (quem posteriorem ramum, ac si omnis neruus in hunc et in anteriorem diuideretur, dixerunt, licet anterior omnino potius pro trunco haberi debeat, cuius hic ramus est). Minor est hic ramus, quam idem a tertio ceruicalium emanans; uti ille procedit inter M. intertransuersarium colli posteriorem; exhibitoque in complexum ceruicis furculo, transversò ductu fertur inter M. hunc et spinalem colli; largitur huic musculo sat insignem ramum, plurimis fibris in hunc dispersum; aliisque minorem, sed longum, in M. complexum ceruicis descendentem. His largitis, aliisque nonnunquam a nobis visis, in M. multifidi spinae partem ceruicalem dispersis, truncus ipse, inter complexum et trapezium musculum perforando, in cutem ceruicis, quae musculum nunc dictum obducit, distribuitur.

Truncus ipse nunc, latera et anteriorem versus faciem colli emergens, exhibet prae caeteris ramum musculum paruum in rectum capitis anteriorem maiorem furculis suis terminatum. Secundus ramus est anastomoticus (Tab. nostr. Nro. 28) cum ganglio ceruicali supremo, quem saepius vidimus in truncum ipsum nerui intercostalis continuum, ramulis quibusdam in M. rectum capitis anteriorem maiorem nonnunquam finitum. Accidit saepe ut ex eodem trunci loco emergat radix ad descendentem nerui hypoglossi ramum accedens<sup>7)</sup>, quae tamen non, ut reliquae iam antea dictae, constans est. Ab externo ipsius latere exeunt rami musculares duo (Nro. 29, 30) in M. levatoris anguli scapulae diuersos fasciculos, ventremque terminati.

## §. 2.

Tres magnos in ramos secedit tunc neruus noster: *adscendentem* nempe crassum anastomoticum reflexum ad tertium ceruicalium anastomosi nexum (Tab. nostr. Nro. 31); ex unito hoc cum descendente tertii ceruicalium oblique ad colli mediam partem tendentem *subcutaneum profundum colli medium* (Nro. 32) et descendentem *subcutaneum scapulae et supraclavicularem communem*; missis reliquis in truncum nerui ceruicalium quinti finitis plurimis fibris, exactius rimandos.

A primo

7) Huc refert et el. NEUBAUER Tab. II. scriptus ex quarto pare ramus ad descendentem colli.  
fig. 1. n. 50 supra §. 4. not. n. iam de-



A primo *anastomotico* nempe *adscendente* cum tertio cervicalium (Tab. nostr. Nro. 31) notatu dignus est nervus, *anastomotico-cutaneus communis* (Nro. 34) cum nervis supra descriptis (Nro. 25, 26) conueniens, ad efformandum ganglion cervicis subcutaneum, unde cutanei nervi, tum ad cutem colli, tum ad eam cervicis tendentes, iam supra descripti.

## §. 3.

Secundus vero *profundus subcutaneus colli medius* (Tab. nostr. Nro. 32) suscepto furculo e tertii cervicalium cutaneo colli medio superficiali, exhibitaeque radícula nervosa, in primum iam paulo ante descriptum ramum continua, longissimo tractu sursum antrorsumque dispersis ramis pergit. Horum primus (Nro. 35) *cutaneus colli inferior* marginem externum M. sterno-mastoidei a posteriori facie pene legens, comes venae cuiusdam vertebralis accessoriae (litt. f.) descendit, nunc, ut plerumque fit, circa externum venae iugularis externae ambitum volutus, nunc ut in figura observatur inter eius ramos perforans. In duos ramos mox partitur; horum *interior* et *anterior* in duos alios abit, quorum inferior (Nro. 36) adhaesionem M. sterno-mastoidei ad claviculam transeuns, cutem claviculae extremitatem sternalem obtegentem, intrat; dum superior (Nro. 37) exhibitis ramulis cutaneis in locum colli lateralem et inferiorem anastomoticus fit; cum descendente ramulo (Nro. 23) a subcutaneo medio minori tertii cervicalium. *Externus* vero exhibitis anastomosis tribus, quarum infima (Nro. 38) ganglioli speciem efficit, cum nervo supraclaviculari intimo (Nro. 72), ramis primis *subcutaneis* in cutem, *claviculae* extremitatem sternalem obtegentem (Nro. 39), insequentibus vero ultimisque in manubrii sterni cutem delitescantibus (Nro. 40).

Unius *fere tantum* lineae distans a nunc dicto nervo, pergit a trunco *anastomosis* recurva, reflexaque, cum ramulo (Nro. 20) nervi cutanei medii superficialis minoris a tertio cervicalium; in loco, cui Nro. 32 appositus est, apprimè conspicienda.

## §. 4.

Ipse nunc *profundus colli medius* supra mediam fere M. sterno-mastoidei partem locatus, finditur in duos ramos: *adscendentem superiorem minorem*: et *descendentem inferiorem maiorem*.

Superior adscendens, *auriculae inferior* siue *auriculari-facialis* (Tab. nostr. Nro. 41) dici debet, tam a praecipuis ramis in auriculae inferiorem partem finitis, quam ab iis, qui simul in faciei cutem distribuuntur. Hi nunc dicti a ramo *interno inferiori* auricularis inferioris exsurgunt, uti Nro. 42 videre est et *anastomosis* cum nervo *subcutaneo colli superiori* anastomotico duri (Nro. 44) facta, ramis supra angulum maxillae inferioris, cum inter M. platysma-myoidei fibras et muscolum hunc ipsum pergunt, exhibitis, in cutem, tam genae ad huius usque partem mediam, quam anguli oris, ad hunc usque terminantur.

*Auricularium* vero *inferiorum* nervorum truncus (Nro. 43) recta via supra M. sterno-mastoideum surgit, venam iugularem externam legens, largitur ramulum

(Nro. 45) *anastomotico cutaneum mastoidei*, qui, anastomosi facta cum ramulo anastomotico adscendente e cutaneo medio superficiali paruo tertii ceruicalium (Nro. 19) cutaneus finitur in cutem prope processum mastoideum. Nervus *auricularis inferior* ipse sursum introrsumque, a musculo platysma-myoideo tectus, in decussim supra venam iugularem parotidem glandulam versus adscendit, intra huius glandulae inferiorem partem, hicce remotam, musculi digastrici maxillae inferioris ductum legens, delicatulam, constantem exhibet cum trunco nerui duri anastomosin (Nro. 46) in truncum nerui duri, postquam venam iugularem externam, vel simplicem, vel bifurcatam, uti in nostro subiecto, transgressa est, statim post ortum nerui digastrici terminatam.

Trans glandulam parotidem M. digastrici maxillae inferioris ventrem posteriorem, M. stylo-hyoideum, ramiisque inferiorem nerui duri; ultro pergens, in tres ramos, in regione marginis rami maxillae inferioris, diuiditur nervus *auricularis inferior*. Eorum *internus* (Nro. 47) praeter cutaneum paruum, alium exhibet, qui glandulam parotidem ipsam intrat: *medius* (48) *cutaneus faciei superior* dicendus, ramulis suis cutem inter et glandulam parotidem incedens, ad usque zygoma cuti faciei nervos dat: *superior* (Nro. 49) tandem auris lobulo duos ramos; cuti caeterum conchae eminentiam obtegenti; denique illi, quae cauitatem conchae obducit, nervos tribuit, per fissuram inter helices crus anterius et antitragum penetrantes.

#### §. 5.

Sequens e *cutaneo colli medio profundo* exoriens ramus *anastomoticus colli descendens* est. (Tab. nostr. Nro. 50). Non longe ab ortu in duos ramos abit, quorum inferior *anastomosis* cum ramo descendente duri anastomotico subcutaneo colli superiori simplex est, arcu facto in huius simplicem ramum descendentem, terminata (Nro. 53). Complicato magis modo superior et posterior ramus supra musculum sterno-mastoideum sursum incedit; factaque duorum pollicum via, in loco (Nro. 52) bipartitur ita, ut alter ipsius recurvus circa venam iugularem externam voluatur, et trans glandulam parotidem transversim supra nervum hypoglossum et M. digastricum maxillae inferioris et stylo-hyoideum anastomosi facta iungatur cum ramo a descendente duri; eodem in loco oblique adscendens, emittitur ramulus anastomoticus in posteriorem a nostro ramum, triangularem insulam efformans, unde adscendens simplex fit anastomosis profunde intra glandulam parotidem haerens, cum trunco nerui duri.

#### §. 6.

Exhibito hoc, in duos ramos, diametro aequales secedit, nervus *cutaneus colli medius*, quorum *superior* (Tab. nostr. Nro. 54) acuto angulo ab *inferiori* (Nro. 59) secedit. Superior, exhibitis ramis in cutem M. platysma-myoideum obtegentem, arcuatim adscendendo in cutem, laryngis regionem obtegentem, migrat, antequam in ramos secedit, triplici anastomosi insulas duas efformante (Nro. 55) cum ramo descendente duri. His ex opposita nerui inferiori parte descendit ramus *cutaneus superior*.



*superficialis colli anterior* (Nro. 56) huius regionis cuti ad usque extremitatem internam claviculae ramos tribuit; *subcutaneis laryngeis* (Nro. 57) ante pomum Adami emissis. Finem trunci ipsius facit *neruus subcutaneus menti* (Nro. 58) cuti tam inter laryngem et mentum, quam illi, quae platysma-myoideum supra glandulam submaxillarem et mentum ipsum obtegit, prospiciens. *Inferior* (Nro. 59) sursum adscendentem *maxillarem externum* (Nro. 60) emittit supra insulas (n. 55) dictas ad eam maxillae partem fertur, cui triangularis anguli oris et quadratus menti adhaeret et supra hos musculos in faciei cutem terminatur. Descendit ultimus, emittitque *cutaneos sublaryngeos* (Nro. 61) in cutem, quae asperam arteriam obtegit, sparsos; hi transuersi circa asperae arteriae faciem anteriorem voluuntur, dum descendendo ultimi furculi in cutem, M. sterno-mastoidei insertionem obtegentem, reflexo prius *musculari platysma-myoidei* furculo (Nro. 62) terminatur<sup>8)</sup>.

§. 7.

Descendendo pergunt reliqui a quarto cervicalium emanantes rami, fibrarumque omnein truncum constituentium dimidia portio (Tab. nostr. Nro. 63) partim *radicem nerui phrenici* (Nro. IV)<sup>9)</sup> partim *anastomosis cum Vto cervicalium* efficit (Nro. III). Late vero spargitur fibrarum externarum fasciculus, cum praeter adscendentem neruum (Nro. 31) cum descendente tertii cervicalium nexum *truncum subcutaneum cervicis posteriorem inferiorem* (Nro. 64) et *subcutaneorum supraclavicularem* truncum (Nro. 67) omittit.

F 2

Sub.

8) Ex cl. I. F. MECKEL saepius iam citata neruor. faciei descriptione, minus quidem, quam tabula adiecta ipsa, cum nostra conueniente, sequentia hic adduci et in comparisonem trahi merentur. *Cutaneus colli*, quem ille dicit, sub litt. E designatus, diuiditur reflexus circa marginem externum M. sterno-mastoidei in superiorem ramum siue *cutaneum colli medium* et *inferiorem cutaneum colli*, quorum nunc hic nunc ille maior est. Ex inferiori, qui saepe est ramus *quarti* cervicalium, saepius sub parte externa M. sterno-mastoidei descendit ramus paruus, sub vena iugulari externa et platysma-myoideo; (idem qui in tab. nostr. n. 35. indicatus est) deinde adscendit, et ramum emittit communicantem cum ramo superiori descendente cutanei colli medii; (num ille est, qui tab. nostr. n. 23. designatur?) Ablegat deinde neru. *subcutaneum colli inferior* ramum *subcutaneum laryngis* (Tab. nostr. n. 57.) Alii rami sub cute meatu finiuntur (Tab. nostr. n. 58); alii perforando fibras M. platysma-myo-

dei adscendunt sub cute angulum maxillae inferioris obtegente et communicant cum ramis cutaneis colli superioribus et ramo profundo nerui duri, (tab. nostr. n. 55.) *Colli cutaneus medius* siue superior ramus reflectitur sursum transuersali ductu ante M. sterno-mastoideum et primo emittit ramum paruum, qui cum subcutaneo inferiori colli communicat; deinde alium maiorem, qui iterum in duos dispescitur ramos, adscendentem unum, qui maximus est, et varias cum neruo duro facit anastomoses (tab. nostr. n. 92 etc.), et deinde ramis suis cutaneis finitur in superiori regione colli versus angulum maxillae inferioris, minor ramus perforando platysma-myoideum sub cute colli anteriore repandit ramos suos in dictum musculum et cutem. (Tab. nostr. n. 59. 61. 62.)

9) NEUBAUER I. c. Tab. I. n. 191. Duplicem radicem ex quarto V. Tab. III. fig. 1. n. 82. 85. Triplicem et quarto T. II. fig. 1. n. 49. 51 et 60.

*Subcutaneorum cervicis posteriorum* truncus (Nro. 64) radice a supraclavicularium trunco nacta pone nervulos ganglion subcutaneum constituentes ex eoque enascentes ante nervum WILLISII accessorium (Nro. V) in loco (Nro. 65) M. trapezii marginem anteriorem transit, et ad posteriora reflexus partim in cutem cervicis inferiorem, partim in eam, quae scapulae acromion spinamque obtegit, dispergitur, ita, ut ramos supra scapulae superficiem, descendendo pergentes ad cutaneos suprascapulares posteriores referre possis. Producitur e superiore huius parte *ramus muscularis profundus* (Nro. 66) profundissime inter levatorem anguli scapulae et trapezium masculum descendens et sub trapezio pone claviculae extremitatem humeralem absconditus unitur cum nervo WILLISII recurrente, superficiemque M. trapezii internam legens, huic una cum accessorio WILLISII ramos propinat, hic non cernendos.

## §. 8.

Truncus denique *nervorum supraclavicularium* (Tab. nostr. Nro. 67) descendit ad usque inferiorem lateris colli partem, ubi in quinque ramos supraclaviculares secedit. Horum posterior externus primus (Nro. 68) *subcutaneus humeri* siue *acromialis*, duos in ramos acuto angulo ab invicem recedentes diuiditur, quorum posterior longe supra extremitatem claviculae humeralem et acromion scapulae ipsum descendens tam pollice in cutem acromii scapulae, quam in eam descendit, quae rotundam humeri, a deltoideo musculo effectam superficiem, obducit. Secundus (Nro. 69) *subcutaneus humeri* siue *deltoidei*, priori crassior, supra mediam fere corporis claviculae partem descendit, longeque sub clavicula decurrendo, oram internam M. deltoidei legens ramis suis ad insertionem M. deltoidei usque sub cute, quae hunc musculum obducit, decurrendo ramis suis in hanc ipsam absumitur. Tertius (Nro. 70) *subcutaneus pectoris externus*, ante ventrem externum M. omo-hyoidei venamque subclaviam in duos ramos secedit; quorum *posterior* supra claviculam gressus in cutem M. pectoralis maioris perpendiculari fere ductu fertur, *anterior* vero antrorsum longiori tractu procedens in eam cutem finitur, quae M. pectoralis maioris portionem sternalem obducit. Quartus (Nro. 71) *subcutaneus pectoris internus*, externis furculis tribus circa claviculam reflectitur, ita, ut hic mox, sub margine ipsius inferiori reflexi profunde recondantur, et in superficiem externam M. subclavii pergant; reliqui cutanei pectoris cutem, M. pectoralis adhaesionem ad manubrium sterni, obtegentem, distribuuntur. Quintus, (Nro. 72) *intimus supraclavicularium*, ante venam iugularem transversim descendens, recipit anastomoses tres a cutaneo infimo (Nro. 35) e subcutaneo colli medio magno descendente, simulque cum illo largitur ramos, qui cutem interioris claviculae extremitatis, et superioris manubrii sterni partis, prospiciunt (Nro. 39. 40). Ultimus minimus ex hoc trunco proveniens ramulus (Nro. 73) ex ipsius parte posteriori emergit, ventremque posteriorem M. omo-hyoidei ex anteriori parte legens, pone claviculam, hanc inter et venam subclaviam descendit ramisque suis in M. subclaviū absumitur; emissio simul in arteriam subclaviā ramulo.



## CAPUT III.

## QUINTI CERVICALIUM PORTIO SUPERIOR.

Ex quinto cervicalium nervo (Tab. nostr. Nro. III) iam a descendente magno ramo a quarto cervicalium (Nro. 63) adaucto nascuntur in tabula conspiciendi rami quatuor, notatu digni. Tenuis est primus ad quartum cervicalium maiori forsan iure referendus, *muscularis trapezii* (Nro. 74) pone truncum subscapularium et extremum eius ramum ad huius musculi limbum procedens. Secundus, *muscularis maior* (Nro. 75) statim intra carnes M. scaleni medii recipitur, et per pollicis distantiam ab eis obiectus, emergit iterum ramisque suis in levatoris anguli scapulae ventrem pone M. omo-hyoideum absumitur. Eminentior trunci pars (Nro. 76) pone M. omo-hyoidei ventrem posteriorem decurrit, et ad plexus brachiales efficiendos axillam versus tendit; emissa prius altera *nerui phrenici radice* (Nro. 77).

## CAPUT IV.

## NERVI ACCESSORII WILLISII PORTIO IN CERVICE CONSPICIENDA. (Nro. V.)

Emergit hic nervus pone M. sterno-mastoideum ramis huic musculo plurimis exhibitis, retro marginem huius musculi externum, viamque ante externum nervorum cervicalium legens, oblique sub recurrentibus huius ramis, ad posteriora legit, descendendo ad usque internam M. trapezii superficiem, hic cernendus. Exhibet in hoc decursu ramos tres, quorum prior, *muscularis levatoris anguli scapulae* (Nro. 78) eo e loco accessorii exit, circa quem reflectuntur nervi occipitales a tertio cervicalium. E media et inferiori parte producuntur *musculares trapezii* duo (Nro. 79 et 80)<sup>10</sup>.

## CAPUT V.

## NERVI DURI PORTIO. (Nro. VI.)

Truncus nervi duri e foramine stylo-mastoideo egreditur. Primus hic egregie conspiciendus ipsius ramus, est *nervus occipitalis profundus* (Nro. 81). Pressim sub foramine stylo-mastoideo e trunco nervi duri exoritur, fibrisque sursum deorsumque tendentibus circa basin processus mastoidei, cuius densae cellulosae inhaeret, immediate locum insertionis M. sterno-mastoidei ad processum, et adhaesionis M. auris retrahentium occupans. Primus huius ramus *anastomotico-muscularis*, alio ramo circa meatum auditorium cartilagineum arcuatim flexo, unitur cum ramo auricularis medii (Nro. 14), alio vero a retrahentibus musculis auris obiecto ad M.

F 3

attol-

<sup>10</sup>) v. I. F. LOBSTEIN de nervo spinali ad par vagum accessorio. Argentorati 1760. c. tab. aen. in LUDWIG script. neu-

rolog. minor. T. II. pag. 219 et tab. 7. 8. SOEMMERING l. c. pag. 254.

attollentem auris (FF) migrat. Qui sequuntur rami musculares retrahentium auris musculorum (F) sunt. Fissus in duos ramos musculares (Nro. 83, 84) in M. occipitalem (litt. E. E) transverse ductu supra lineam semilunarem ossis occipitis superiorem pergens, terminatur. Opposita plane directione ex inferiore nervi duri superficie fertur *nervus digastricus* (Nro. 85) in ventrem posteriorem M. digastrici maxillae inferioris ramis suis distributus, alio perforante ramo anastomosin cum nervo vago efficiente, insignis. Exoritur parum remoto loco ex duro nostro, nervus *anastomotico-stylo-hyodeus* (Nro. 86). Prior denominatio ex eo pendet, quod vel ipse, vel ipsius quam maxime vicina duri nervi portio recipiat anastomosin: 1) a nervo auriculari inferiori quarti cervicalium (Nro. 46). 2) Ab anastomotico colli e cutaneo colli medio eius nervi cervicis (Nro. 52). 3) Cum ramo inferiori duri anastomotico longissimum tenuemque (Nro. 88). 4) Duplici a nervo molli intercostalis (Nro. 87) proveniente ramo coniungatur. Dum alterius denominationis ratio ab iis fibrillis repetenda sit, quibus in M. stylo-hyodei carnibus totus terminatur. Emissis dein radicibus rami superioris maioris nervi duri, retro glandulam parotidem adscendentibus, ramus eius inferior remota glandula parotide habetur (Nro. 89). Tres huius rami, in quos, dimidium adhuc pollicem ab angulo maxillae inferioris distans, diuiditur, ita se gerunt, ut superior *facialis duri inferior* (Nro. 90) supra M. masseterem (DD) a M. risorio Santorini obiectus in ramos diuidatur; medius, *marginalis duri* (Nro. 91) anastomosibus cum anastomotico duri et mediantibus his, cum subcutaneis colli a quarto cervicalium factis, pone M. platysma-myoideum abscondatur; infimus vero et ultimus ramus, *anastomoticus duri colli superior* (Nro. 92) fiat, innumeris iam supra descriptis anastomosibus cum subcutaneis colli a cervicalibus factis ramisque musculosis in M. platysma-myoideum terminetur <sup>11)</sup>).

## CAPUT VI.

## NERVUS HYPOGLOSSUS. (Nro. VII.)

Praeter truncum habetur portiuncula eius rami descendens mox a musculo sterno-mastoideo recta, cuius furculus muscularis in ventrem externum M. omo-hyodei pergens retro inferiorem M. sterno-mastoidei portionem emergens, apparet <sup>12)</sup>).

## CAPUT VII.

## NERVUS OCCIPITALIS MAGNUS E SECUNDO CERVICALIUM. (Nro. VIII.)

Profunde per fibras M. splenii capitis et trapezii extus emergit, ramisque tam ex interna parte occipitalibus anastomoticis, praesertim vero ex externa prodeuntibus cutaneis suboccipitalibus, occipitalibus supra protuberantiam occipitalem transversum in-

11) Cfr. Cl. I. F. MECKEL supra §. 16.  
not. e. citat. description. nervor. faciei, et  
SOEMMERING l. c. p. 228,

12) BOEHMER diss. supra citat. SOEM-  
MERING l. c. p. 259.



incedentibus, sursum et longe supra futuram lambdoideam assurgentibus ramis, ad synciput usque, cutaneus ubique finitur, numerumque neruorum huius regionis egregie complet<sup>13)</sup>).

TABULAE EXPLICATIO.

*Ossa et musculi.*

- A. A. Processus mastoideus cum linea semilunari ossis occipitis superiori, ipsi continua.
- B. B. Clavicula.
- C. C. Musculus sterno cleido-mastoideus.
- D. D. Musculus platysma - myoideus in risorium Santorini continuus.
- DD. Particula masseteris musculi.
- E. E. Musculus occipitalis.
- F. F. Retrahentes auris.
- FF. Particula leuatoris auris.
- G. Venter posterior musculi digastrici maxillae inferioris.
- H. Musculus stylo-hyoideus.
- I. I. Leuator anguli scapulae.
- K. Scalenus anterior.
- L. Venter posterior musculi omo-hyoidei.
- M. Ipsi tendens ante venam iugularem internam positus.
- N. Particula musculi trapezii.
- O. O. Pars musculi splenii capitis.
- P. P. Particula cutis humeri, pectoris, colli, faciei etc.
- Q. Pars cartilaginea auris.
- R. Meatus auditorius sursum cum auricula mediante filo distractus.
- S. Lobulus auris.
- T. Glandula parotis.

*Vasa venosa.*

- a. Truncus venae cauae superioris, in quem conueniunt.
- bbb. Vena iugularis interna.
- c. Vena subclauia. In hanc continua

- d. Vena iugularis externa, supra mastoideum musculus duplici ramo descendens.
- e. Vena thyreoidea inferior.
- f. Vena vertebralis accessoria.

*Nervi.*

- I. Nervus cervicalis tertius.
- II. Nervus cervicalis quartus.
- III. Nervus cervicalis quintus.
- IV. Nervus phrenicus.
- V. Nervus accessorius WILLISII.
- VI. Nervus durus.
- VII. Nervus hypoglossus.
- VIII. Nervus occipitalis maximus posterior a II<sup>do</sup> neruo cervicali.
  - 1. Radix prior ansae rami e neruo hypoglossus descendens (vulgo descendens noni dicti).
  - 2. Ramus muscularis in leuatoris anguli scapulae fasciculum.
  - 3-4. Rami in musculi sterno cleido-mastoidei mediam partem.
  - 5. Occipito-auricularis recurrens.
  - 6. Anastomotico auricularis s. auriculae medius.
  - 7. Ramus occipitalis nervi occipito auricularis s. occipitalis minor.
  - 8. Ramus auricularis superior.
  - 9. Ramus occipitalis anastomoticus cum magno occipitali e II<sup>do</sup> cervicalium.
  - 10. Ramus occipito syncipitalis cutaneus.
  - 11. Ramuli huius in leuatorem auris musculus.

12. Ra-

13) BANGIUS l. c. tab. fig. 1. n. 18. ASCH l. c. fig. 5. n. 77.

12. Ramuli in cutis auris cartilagineae superiorem partem, supra retrahentes auris musculos adscendentes.
13. Anastomosis cum duri nervi occipitali prima.
14. Eiusdem secunda anastomosis cum eodem nervo pone meatum auditorium; unde ramus in retrahentem auris musculosus.
15. Rami in cutem, mediam aurem cartilagineam obtegentem.
16. Anastomosis tertii cervicalium cum recurrente WILLISII brevis.
17. Altera longior.
18. Subcutaneus colli medius superficialis minor.
19. Cutaneo - anastomoticus adscendens, subcutaneus sterno-mastoidei, ex hoc ramo exortus.
20. Anastomoticus descendens, arcu facto in subcutaneum magnum a cervicalium IVto terminatus.
21. Adscendens maxillaris cutaneus externus faciei.
22. Descendens subcutaneus colli superficialis.
23. Huius anastomosis cum perforante inter venae iugularis externae ramos a cervicali IIIto.
24. Ramus cutaneus partis cervicalis M. trapezii.
25. 26. Anastomoses cum anastomotico-cutaneo communi a IVto cervicalium, ultimo gangliolum efformantes.
27. Fortissima huius nervi IIIto cervicalium cum descendente cervicalis IIto ramo anastomosis.
28. Radix altera nervi descendens noni a IIto cervicalium.
29. 30. Rami musculares e IVto cervicalium ad musculus angularem scapulae,
31. Anastomosis adscendens in nervi cervicalis IIIto descendente ramum pergens.
32. Subcutaneus colli medius magnus profundus.
33. Cutaneus cervicis, humeri, claviculae et colli communis.
34. Nervus anastomotico - cutaneus communis cum ramo 25 et 26 IIIto cervicalium nexus ad cutem vario tractu pergens sursum deorsumque.
35. Cutaneus colli inferior.
36. Eius ramus descendens cutaneus.
37. Eius ramus ascendens anastomoticus cum cutaneo colli medio superficiali.
38. Cutanei colli inferioris ramus infimus triplici anastomosi cum supraclaviculari interno iunctus.
39. Rami duo cutanei claviculares.
40. Ramus cutaneus sternalis.
41. Ramus superior cutanei colli medii - maioris s. auriculae inferior et cutaneus facialis: auriculari facialis,
42. Eius ramus internus: cutaneus faciei inferior.
43. Eius ramus externus: auricularium inferior truncus.
44. Nervus cutanei faciei inferioris anastomosis cum nervi duri ramo cutaneo colli superiori.
45. Anastomosis cum cutanei colli medii minoris a tertio cervicalium ramo adscendente.
46. Anastomosis cum trunco nervi duri.
47. Ramus anterior internus, parotidem intrans.
48. Ramus medius cutaneus faciei superior.
49. Rami auriculares inferiores ad lobum et auris cutem concham obducentem.

50. Ramus



50. Ramus cutaneus colli anastomoticus descendens.
51. Huius ramus superior anastomoticus cum duro ascendens.
52. Duplex anastomosis cum ramo duri descendente.
53. Alia anastomosis cum anastomotico duri ramo subcutaneo colli superiori.
54. Ramus superior subcutanei colli medii.
55. Triplex anastomosis cum anastomotico duri descendente, iusulas duas efficiens.
56. Cutaneus colli descendens s. superficialis anterior.
57. Cutaneus antilaryngeus colli.
58. Subcutaneus menti.
59. Ramus inferior s. descendens subcutanei medii.
60. Ramus cutaneus maxillaris externus.
61. Cutaneus sublaryngeus.
62. Musculo-cutaneus platysma-myoides.
63. Ramus descendens inferior IVti cervicalium, partim radicem primam nervi phrenici efficiens, partim anastomosi in Vtum cervicalium finitus.
64. Subcutaneus cervicis posterior inferior.
65. Ramus cutaneus cervicis.
66. Muscularis profundus.
67. Truncus nervorum supraclavicularem.
68. Ramus supraclavicularis exterior primus s. subcutaneus humeri s. acromialis.
69. Ramus supraclavicularis secundus s. subcutaneus deltoidei.
70. Ramus supraclavicularis tertius s. medius s. subcutaneus pectoris externus.
71. Ramus supraclavicularis quartus s. subcutaneus pectoris internus.
72. Ramus supraclavicularis quintus internus minor s. supraclavicularis intimus.
73. Ramulus muscularis profundus a trunco supraclavicularium.
74. Ramus a Vto cervicalium in musculus trapezium.
75. Ramus a Vto cervicalium in scalenum posticum et levatorem anguli scapulae.
76. Truncus Vti cervicalium ad plexum brachialem pergens.
77. Radix nervi phrenici a Vto cervicalium.
78. Nervus muscularis in levatorem anguli scapulae a recurrente WILLSII.
79. 80. Rami in trapezium et cutem hunc musculus obtegentem.
81. Nervus duri ramus occipitalis transversus, profundus.
82. Huius rami musculares in musculos aures retrahentes.
83. Ramus huius muscularis anterior in occipitalem musculus.
84. Ramus huius muscularis posterior in occipitalem musculus.
85. Nervus biuentris muscoli maxillae infer. a duro.
86. Nervus muscoli stylo-hyoidei.
87. Anastomoses cum nervo molli nervi intercostalis.
88. Rami musculares in stylo-hyoideum.
89. Ramus inferior nervi duri.
90. Ramus facialis inferior duri.
91. Ramus marginalis duri.
92. Duri ramus anastomoticus colli superior.



## VII.

HENRICI AUGUSTI WRISBERG  
OBSERVATIONES ANATOMICAE  
DE NERVIS VISCERUM ABDOMINALIUM.

PARTICULA PRIMA  
DE GANGLIO PLEXUQUE SEMILUNARI \*).

GOTTINGAE 1780.

## §. 1.

**I**n neurologia humani corporis, utilissima cognitu, et quoad praeparationem difficilissima anatomes parte, ad hunc usque diem non omnia exhausta esse, fere omnes cordati testantur anatomici, idque tanto magis dolendum est, quo maior, quoque clarius neurologiae influxus in omnes physiologicas aequae quam pathologicas functiones ubique inuenitur. Summam quidem deprehendimus diuersitatem, qua tam ratione numeri, quam respectu quantitatis, et modi distributionis natura partibus animati corporis nervos impertit. Ab organis enim sensorii ita dictis; seu potius ab instrumentis, externarum rerum impressiones nobiscum communicantibus incipiendo, quibus creator prae reliquis longe omnino maximam filamentorum sentientium copiam dedit, per musculos; et viscera fibris muscularibus praedita, progrediendo ad alia viscera, soli vel secretioni liquoris cuiusdam destinata, vel alii functioni praefixa, ad vasa, ad canales, ad membranas, ad integumenta interna, nam de cute hic non loquimur, ad tendines, aponeuroses, ad telam cellulosa et sic porro, semper nervorum numerus insigniter diminuitur, donec tandem in variis partibus eorum plenarius defectus extra omnem dubitationem positus est.

## §. 2.

Medico, de corporis humani diuerso sensibilitatis gradu iudicanti, primo loco diuersus adeo nervorum per omnes nobiliores partes distributorum numerus cognitus esse debet et proportio, si ex affectibus internis externisque, de vehementia et gradu, cum gratae tum ingratae perceptionis iudicium laturus est. Sequitur quidem dein nervorum conditio ipsa, tam ratione distributionis, expansionisque modi, quam respectu integumentorum nervis incumbentium crassitiei atque texturae, sub cuius

\*) His observationibus suas descriptiones et icones adiecit WALTERUM Berolinensem (Tabulae nervorum thoracis et abdo-

minis. Berolini 1783. Folio.) neminem lectorum fugit. L.



diverso habitu, doloris perceptio ab irruente peregrina causa, alia esse potest in parte quadam pluribus quidem nervis instructa, sed profundius sitis, quam in alia paucioribus praedita, sed facilioribus tactu. Occurrit tandem tertia, in augenda minuendave corporis sensatione, circumstantia, quae a commercio pendet, mediantibus nervis, inter dissita maxime corporis loca intercedente. Omnem sane fidem superant, quae stupenda et inaudita plane phaenomena in toto corpore hic nervuorum consensus iam exhibuit. In facie quidem, si ex laesa fronte oculus periculose saepe afficitur, ut visus debilitate, aut subita abolitione laboret; vel vice versa, si observatores fidem merentur, visus in amaurosi abolitio subito sanata sit, postquam casu fortuito nervi frontalis laesio contigit: aut ex dentis affectu uniuersum caput dolet, vel ex genarum, labiorum oris, palpebrarumque vulnere aures patiuntur, aut ex aurium laesione faciei muscoli in plerisque locis conuelluntur. Ex linguae adustione, aut aphthis illam copiose insidentibus, oculum, buccas, vocis respirationisque organa incredibilem in modum affecta vidi. Pulmonibus ulcere, scirrhisque affectis asperam arteriam, laryngem, linguam, faucesque pati, res notissima est; ventriculum vero ex eadem causa munere suo rite fungi non potuisse, mihi per certas nonnullas constat observationes. Ictus vehemens, regioni epigastricae inflicus, subito aphoniam produxit, frequenti balneorum usu, post V. hebdomades demum sanabilem. Mel, quo in enemate in delicatula quadam hysterica persona usus fueram, me quidem inscio ne nomen quidem mellis, multoque minus rem ipsam ferente, conuulsivos motus excitauit, cum aliquam intestinorum crassorum partem tantum clyisma penetrasset. Ex nephriticis doloribus nuper horrendae et incredibilis fere scenae, testis fui, doloribus, vagitu, anxietatibus, priapismo, quin ipsa inuoluntaria spermatis excretionem sese manifestantis, citoque disparentis, cum calculus ex uretere in vesicam delatus esset. Summum hypochondriacum in hominibus teneris affectum, ex infarctu in flexu iliaco, uberrimis nervis praedito, haerente, cui nimio enematum usu succurrere vulgo solent, saepe observaui. Vehementissimam sensus motusque per notabile tempus cessationem, cum subita asphyxia, pallore, artuum perfrigerio, et mortis instantis metu coniunctam vidi in hortulano, cui fodiendae terrae dedito, et ad anteriora flexo, petulans manus ictum scroto intulerat, quo fulmine citius in terram concidebat. Inde repetenda sunt, uti egregie Illustris CAMPERUS <sup>1)</sup> dixit, terribilia symptomata hysterica, ab acrimonia putrida primas vias occupante: extremitatum inferiorum conuulsiones in infantibus, quorum rectum intestinum ascaridibus plenum est: hinc epilepsiae alique spasmi, ex drasticorum purgantium vehementi effectu: eam ob causam gibbosis interdum urina supprimitur, mox sine voluntate prorumpit, aliusque illis inuitis exoneratur, quod hae partes ex male affecta medulla spinali suis nervis laborent: inde in retentione urinae voluntaria nimium protracta, borborygmi et colici dolores, qui urina reddita protinus cessant. Finem autem non inuenirem, si plura afferrem exempla, passim in clinicis frequentia, et cuilibet tironi notissima, nisi cane et angue instar librorum studium et lectionem negligat spernatque.

G 2

§. 3.

1) Demonstrat. anat. pathol. Lib. II. Amstelod. 1762. p. 8. §. 7.

## §. 3.

In uniuersum quidem neruorum systema, tam in locis, ex quibus nerui pro-  
ueniunt, ut encephalo et medulla spinali, quam in toto itinere quod absoluunt,  
nexum quendam et communicationem seruant; oculorum enim neruorum paria,  
cum inter se, tum mediante quinto pare cum primo, septimoque, multiplici ratione  
coniuncta sunt: Dura portio septimi, seu communicans faciei, per ramum suum in-  
feriorem seu descendente[m] cum octauo, nono, cervicalibus superioribus, et inter-  
costali; octauum, mediante intercostali, cum omnibus fere spinalibus, phrenico, et  
nonnullis cranii coniunctum: praecipuum autem totius systematis neruosi perficit  
nexum intercostalis, qui primos fere cranii neruos, cum ultimis in sacro osse exeun-  
tibus nequit, caput itaque, truncum, artusque in unum coniungit.

## §. 4.

Quamuis celebri illi neruorum anastomosi, ubi rami ex diuersis locis orti, vaso-  
rum instar in unum filum confluerent, quae nonnullis adeo placet, anatomicis ratio-  
nibus permotus, vix assentiri possim; cum in plerisque neruis ramorum diuisio, per-  
feci illa intermedia cellulosa, ad ortum nerui continuari queat, uti in diuicatione  
ischiadici magni nerui in peroneum et tibiale[m], in crurali, mediano, cubitali, aliis-  
que facilis observatio est: illa tamen neruorum loca, ubi frequenter ganglia filamen-  
tis intermixta sunt, a regula exceptionem faciunt, et luculenter declarant, unionem  
et miscelam quasi ibidem diuersarum neruis impressionum fieri, quare nullibi etiam  
consensus neruorum plura extant testimonia, quam in communicante faciei seu duro,  
pari quinto, neruo sympathico maximo, et praecipue in systemate viscerum abdomi-  
nalia[m].

## §. 5.

Visceribus vero abdominalibus, quorum late patens ambitus in infimo ventre  
comprehensus, et a diaphragmate, quod multiplici ratione suum in abdomen in-  
fluxum exserit, ad profundum peluis exitum, maximam sane cavitatum corporis  
animalis partium numerum continet, natura non ex unico tantum fonte neruos im-  
pertire poterat, sed ex primariis fere locis, ad meliorem perficiendum consensum in  
abdomen neruos ablegauit. Sunt enim *phrenicus*, *octauus*, et fere *omnes spinates*;  
si aliquot paria ceruicis, superiorumque dorsi excipere velis, et si furculos ad inter-  
costalem magnum missos simul consideres, ne hi quidem excipiendi sunt, qui ad for-  
mandos neruorum abdominalium inextricabiles fere plexus symbolam suam confe-  
runt. Medulla enim spinalis, licet ipsa immediate, quantum quidem ego scio, nulli  
abdominalium viscerum furculum mittit, sed omnia illa neruorum filamenta me-  
diantes *neruo sympathico maximo*, quem iniuste *intercostalem* plerique vocant, visce-  
ribus impertuntur, quodque iterum, experimentis confirmatus triplici modo fieri  
asserere possum. Ex media infimaque colli parte, ut et ex superiore thorace ad  
quintam sextamque costam usque, uti deinceps occasione itineris sympathici descri-  
beamus, tenuis quidam truncus in nonnullis cadaueribus formatur, quem, nisi aliis  
nomen displiceat, *neruum splanchnicum superiorem et minorem* appello, hic omnino,



si in quibusdam adest, primum ganglii plexusque semilunaris exortum sistit. Altera neruorum abdominalium genitrix est *Nervus splanchnicus inferior* et magnus, in omnibus praefens, qui non adeo commode *collateralem* nonnulli, alias *intercostalem anteriorem* appellarunt: siue simplex hic fuerit, siue quod saepe contingit, alium minorem et infimum splanchnicum proxime subsequente simul in ganglion sumat, vel illum ad renalem plexum mittit, semper origo plexus semilunaris maximam partem ex illo repetenda est: tertio tandem loco plures insignes fasciculi ex nervo sympathico per lumbos et os sacrum decurrente, plexui renali, mesenterico inferiori, hypogastrico, spermatico, vesicali, siue seorsum, quod consuevit in multis ratio est, vel nonnullis eorum in maiorem fasciculum coalitis admiscuntur.

## §. 6.

Facile quidem in mentem venire posset, nervorum tantae dignitatis, quorum usus tam multiplex, et connexionis ratio ineffabilis fere est, cognitionem perfectam nostris temporibus concinnare velle, quam antiquissimis scriptoribus et observatoribus in tanta descriptionum et iconum sarragine iam dudum exhaustam esse crederes, vel ignorantiam in iis, quae iam scripta prostant, redarguere, vel philautiam proprii laboris redolere. Ipsa vero scriptorum anatomicorum qui nullam picturam dederunt attenta perfectio, non excepto WINSLOWIO <sup>2)</sup>, BERGEN <sup>3)</sup>, WALTHERO Lipsiensii <sup>4)</sup>, GUNZIO <sup>5)</sup>, PEAGETO <sup>6)</sup>, HALLERO <sup>7)</sup>, LUDWIGIO <sup>8)</sup>, Ill. ISENFLAMM <sup>9)</sup>, MONRO <sup>10)</sup>, et iconum de his nervis abdominalibus exstantium cum natura comparatio, EUSTACHII <sup>11)</sup>, WILLISII <sup>12)</sup>, VIEUSSENII <sup>13)</sup>, pictoris PETRI BERRINETINI <sup>14)</sup>, Illustrisque SCHMIEDELI <sup>15)</sup>, DAGOTY <sup>16)</sup>, et aliquantisper CHESELDENII <sup>17)</sup>, me conuicerunt, multa in hac doctrina superesse vel addenda, vel melius ornanda. Ut pauca tantum nominem, quae non satis accurate proposita sunt, refero huc, inter alia phrenici nervi cum abdominalibus coniunctionem, filamentorum

G 3

ex

2) *Expos. Anat. T. III. p. 329. edit. Paris. 1732.*

3) *Diff. de Neruo intercost. in Haller. Coll. II. p. 871.*

4) *Progr. I. et II. de Paris interc. et vagi anat. ib. p. 909.*

5) *in Hipp. libr. de humorib. purg. Lips. 1745.*

6) *de Actione Musc. interc. et diaphragm. Paris. 1740.*

7) *Elem. Phys. Tom. IV. §. 45. et de Part. c. h. fabrica et funct. P. VIII. §. 45. p. 419.*

8) *Progr. de plexibus neruor. abdomin. Lips. 1772. (— hor. script. T. III.) et in eius Anweisung zur Erkenntnis der Th. quam edidit Weichardt. Warfov. 1778. p. 431.*

9) *Versuch über die Nerven. Erlangen 1774.*

10) *Anatomy of bones and nerves. Edimb. 1750.*

11) *Explicat. Tabular. ab ALBINO. Lugd. Bat. 1745. Tab. 18. 19.*

12) *Cerebri Anat. Genevae 1680. p. 166. Tab. 9.*

13) *Neurograph. uniuersal. Lugd. 1685. p. 188. Tab. 23.*

14) *Tabulae anatom. edit. a CAIET. PETRIOLI. Romae 1731. Tab. 5. 6. 7. 8. 9.*

15) *Diff. in qua quaedam de neruo intercost. notantur. Erlang. 1754.*

16) *Exposition anat. des organes des sens. Paris. 1775. Tab. VI. VII.*

17) *Anatomy of the human body. Lond. 1712. Tab. 29.*

ex sympathico praeter cognitum splanchnicum ad plexum semilunarem transmissio-  
nem, ipsiusque per pectus abdomenque decursum et in pelui finiendi rationem,  
octavi paris ab ortu per collum thoracemque descensum, et veram eiusdem cum  
plexu semilunari confluum: ganglii et plexus semilunaris situm, magnitudinem,  
figuram, fabricam, ramos minores subministratos in novos plexus formatos, neruo-  
rum ipsorum per hepar, renes et intestina iter atque decursum, plexus hypogastrici  
veram originem, et per viscera peluis distributionem. His in anatome subtiliore et  
difficiliore lacunis refarciendis, ultra XIII. annos occupatus fui; ne putetis, me temera-  
rio ausu ex unica observatione integra volumina conscribillare, ut saeculi nostri saepe  
genius est, micam galenamque publico, loco auri vendere velle. Quae propositu-  
rus sum, ex plus quam sexaginta cadaueribus humanis conquisita sunt, illoque studio,  
ardore, verique amore, et ea, tum in proprias meas, tum in aliorum observationes  
diffidentia, quam nostrum in fraudes proclive saeculum poscit, conscripta collecta-  
que sunt; ut certo asserere possim, ne unicam quidem occurrere descriptionis nostrae  
neruorum abdominis particulam, quae non quater vel quinquies visa, et cum aliis  
comparata sit. Falsa itaque plane non irrepsisse, cum summa animi hilaritate et  
fronte assero serena, metu vero afficior dum perpendo, me omnia forsitan non an-  
notasse, quae diues natura observatoribus ostendit. Tractationis meae de nervis  
viscerum abdominalium eam partem, quam nunc publice exhibeo in IV Sectiones di-  
vise, quarum Ima *neruum phrenicum* continet, 2da *par octavum*, 3tia *nerui sympa-*  
*thici maximi* decursum per thoracem, usque ad ganglia semilunaria, 4ta ortum, fa-  
bricam, situm, figuram, magnitudinem, varietatesque in *gangliis plexuque semilu-*  
*naribus* occurrentes ostendet.

## SECTIO I

### DE NERVO DIAPHRAGMATICO SEU PHRENICO.

#### §. 7.

Nunc tandem cum veritate asserere possum, quid de controuersa illa nervi  
phrenici ex nono pare cerebri origine tam saepe defensa, et denuo ab aliis impugnata  
sentiendum sit. Certissime non in omnibus cadaueribus origo huius nervi ultra quar-  
tum aut tertium cervicalem ascendit, est tamen varietas, quam in XXXVII. cadaueri-  
bus, in quibus ad hanc originem attentus fui, nunc quinquies vidi, in proportionem  
itaque uti 6 vel 7 fere ad 1. nervus phrenicus cum nono pare nervorum cranii per  
ramum descendente connexus est, qualem ortus nexusque rationem cum suis varie-  
tatibus viderim, describam, nam naturalem fabricam, ceu omnibus cognitam, omitto.

#### §. 8.

Nervi Phrenici per *duos ramos ex cervicalibus et uno ab intercostali ortum*, in  
tribus subiectis sequentem in modum vidi.

Tres



Tres erant binis exemplis in latere sinistro, unico in dextro, nec plures origines s. radices, diuersae magnitudinis. Ex quarto et quinto pare neruorum ceruicium et ex *intercostalis* ganglio ceruicali medio.

Maxima crassissimaque radix ex quarto, ex ipsius nerui, specum vertebrarum egressi, et extra musculos comparentis, trunco prodibat, longior autem et fortior secunda radice, recto itinere descendebat, arteriam subclauiam sui lateris inter et venam, et infra venam ad acutissimum angulum cum altera radice iungebatur.

Secunda radix ex quinto pare s. primo brachiali prodiens, pariter ex ipso trunco venit, summa in vicinia nerui subscapularis: oblique in thoracem abiit, venam subclauiam supergreditur, ita tamen ut ipsius venae tunicas perforet, medius inter illas haereret, et firmiter cum illa concreta esset, non mobilis est, sed attracto neruo tota vena simul mouebatur, cum venam aperirem, notabile tuberculum in interiore venae superficie in illo loco conspiciebatur, quo neruus per tunicas transibat. Immediate intra venam confluebat cum praecedenti radice, coniunctionis locum attingebat art. mammaria interna, per radices phrenici in thoracem descendens.

Tertia exilissima portio ex ganglio ceruicali medio accedebat, brevis, et tenuissima, inferebatur in primam radicem paullo super arteriam subclauiam, et nunc integer neruus phrenicus iter suum prosequabatur.

#### §. 9.

Quinques nunc, prouti in introitu dixi, simili fere semper modo furculum insignem ex ramo descendente noni paris, phrenico in thorace admisceri vidi, et hac ipsa hyeme in cadauere adulti satis manifeste. Facile vero sub praeparatione, uti b. HALLERUS <sup>1)</sup> iam monuit, laeditur, quare clauicula in situ et nexu relinquenda est, si ramum illo ex nono cum phrenico communicantem inuenire, et lustrare volumus. Conueniunt vero omnes V. observationes sine notabili varietate, nisi quod origo phrenici nerui mox 3. mox 4. mox 5. filamentis adscribenda sit, et furculus, qui ex nono eidem accessit, mox unico in specimine ex ipso trunco noni paris indiviso, mox ex ramo ab octauo ad nonum abeunte, quod in uno cadauere contigit, vel, quod in III exemplis animaduerti, ex ramo descendente solo, aut cum quodam ceruicali in arcum coniuncto, prouenerit: Multis varietatibus hic ramus descendens ludit, quem, cum in aduersariis meis non nisi unica vice deficientem animaduertierim, et ego aequae, quam ANDERSCH, et NEUBAUERUS inter constantiores paris noni ramos tuto retuli. Insignis hic ramus, ubi ex pari nono, arcuatim linguae sese appropinquanti prodit, directe ad latus internum venae iugularis internae descendit, et dum vena facialis a iugulari secedit, aliquot furculos in ossis hyoidis laryngisque musculos misit, dein recto itinere usque ad venam thyreoideam superiorem descendit, et eleganter circa ramum huius venae arcuatus versus posteriora reflectitur, et magno furculo, ex ceruicium secundo et tertio pari venienti, occurrit, ex quo accedente neruo, paullo ante eiusdem cum hoc ramo descendente confluxum, non  
paruum

1) de Part. fabrica et funct. P. V. p. 148.

paruum filamentum ad phrenicum, ex quarto cervicalium nervorum ortum, abierat: hanc in uno cadauere rationem obseruavi. Ex conuexa huius anssae parte tres rami versus inferiora descendebant, bini ad musculos laryngis et ossis hyoidis, unicus omnium longissimus sed tenuissimus quoque claviculae extremitati exteriori proximus, super vasa sub clavicula decurrentia incedit, et ad angulum acutum cum reliqua nervi phrenici ex cervicalibus et brachialibus orta portione confluit, ita quidem, ut duobus in cadaueribus vasa mammaria per illam coniunctionem transferantur.

§. 10.

In sinistro aequè quam in dextro latere, per exiguum interuallum, quod interceptum arteria subclauia, vena axillaris, ubi ex communi trunco venae subclauiae procedunt utraque iugularis, interna inquam et externa, descendit nervus phrenicus ex collo in thoracem, et pone latus sinistram arteriae mammariae internae sinistri lateris incedendo ad pericardium inclinat elegans furculus venosus ex vena subclauia sinistra ortus, in quem varii minores ramuli ex thymo confluunt, in toto per pericardium itinere usque ad diaphragma illum comitatur. Laxissima cellulosa nervum pericardio annectit, in tanta tamen observationum copia, ne minimum quidem filamentum videre potui, quod ex phrenico nervo in pericardium mitteretur. Sterno paullo propinquior quam in dextro latere, versus diaphragma cum vena eundem comitante properat, et in tres ramos anteriorem, medium, et posteriorem diuisus, carnem diaphragmatis eo in loco attingit, ubi arteria phrenica per septum transversum incedit. Omnes postquam ex trunco diuisi ad suam diaphragmatis partem peruenire, inter fasciculos diaphragmatis musculares sese abscondunt, et diaphragma quasi perforando in inferiore seu abdominali septi superficie denuo in conspectum prodeunt, et per eandem distribuuntur, quasi haec superficies nervis magis egeret quam superficies eiusdem superior vel thoracica. Nunc speciatim quilibet ramus sequenti ratione per septi carnes diuiditur.

*Anterior*, quem ex sua directione omnino anteriorem appellare possumus, reliquis aliquanto minor, statim ad eas diaphragmatis partes excurrit, quae sterno eiusdemque processui ensiformi costisque adhaerent, et paucillum interiora versus inclinat, cum simili ramo anteriore dextri lateris quasi coire vellet, hic nulli alii, praeter carnes diaphragmatis parti furculos nervosos impertit. Medius autem tendineae parti diaphragmatis commissus, phrenicae arteriae occurrit, et ex pluribus furculis in inferiore septi superficie distributis, tres distincte cum filamentis plexus phrenici ex abdominalibus confluunt.

In dextro latere nervi phrenici duobus ramis diaphragma petit, quorum alter anterior in musculari septi parte decurrens, et in plures furculos diuisus in inferiore diaphragmatis superficie finitur, sine ullo visibili cum nervis abdominalibus intercedente commercio; hic erat *maior*. *Minor* tendineam regionem legens, pariter ad inferiorem seu abdominalem superficiem descendens inter centrum tendineum et peritonaei productionem in varios ramos dehiscit, aliqui eorum parui



parui tendinibus septi intermifcentur, plurimi vero arteriam phrenicam attingentes cum V nervulis ex abdominis plexu coeliaco fimul cum arteria phrenica inferiore afcendentibus intermifcentur.

## SECTIO II.

### DE PARI OCTAVO QUOD VAGUM VULGO APPELLATUR.

#### §. 11.

Octauum par, eo fenfu quo a plerisque, qui ultra hunc vel illum autorem non fapiunt, accipitur, in tres diuerfos nervos diuidendum, et *Accefforium*, nec non *Gloffo-pharyngeum* ab octauo proprie difto feperandum efle, ad mentem meam dilucide expofuit Solertiff. SOEMMERING <sup>2)</sup> difcipulus olim nofter, nunc Caffellis Anat. Profeflor Celeb. In toto illo ab ortu per collum defcenfu pauca habeo, quae obferuatis aliorum Clariff. virorum notiffimis addere deberem, ANDERSCHII praecipue, faltem ad meum fcopum nunc non pertinentia. Varios autem furculos ex eodem cum filamentis ab intercoftali prouenientibus coalefcere, et in mediastino pofteriore defcendere, oefophago profpicere, et nervo fplanchnico noftro fuperiori admifceri, non adeo frequenter annotatum lego: Arrifit vero prae aliis in hoc nervo octauo occurrentibus varietatibus fecundi recurrentis mentionem facere, quem ter in homine obferuauī, cuius uberior descriptio alio calamo in lucem prodiffet, nifi infelix fatum ex meis difcipulis Eruditiff. THOMANNUM Vindobonensem, anatomicum fubtilem et folertem, ante aliquot menses praematura morte eripuiffet.

#### §. 12.

Cum enim, uti notiffimum eft, nervi recurrentis origo in quolibet latere ab eodem loco, in dextro nempe latere, ubi circa fubclauiam flectitur, altiore, in finifiro, ubi aortam defcendentem ambit, profundiore, repetenda fit, monendum eft, me nunquam in finifiro latere talem recurrentem minorem vidiffe, et de dextro latere folo obferuationes intelligendas efle.

Dato vero nervo recurrente dextri lateris, qui circa fubclauiam dextram ad collum reflectitur, octauum par aliquot lineas progreditur, dum fimul in eo itinere aliquot furculos ad plexum cardiacum mittit: Nunc vero nouum emittit ramum, non mediocris crassitie ad fuperiora retrocedentem, quem ideo *recurrentem minorem* appello: hic furculus perfecte ad modum maioris recurrentis inter afperam arteriam et oefophagum ad fuperiora progreditur, in minores fibrillas diuifus, quarum maxima paullo poft in recurrentem maiorem confluit, et infulam hoc modo format. Forfan  
hic

2) Lib. de bafi encephali et originibus 1778. p. 9. et 159. feq. — hor. fcript.  
neruorum cranio egredientium. Goetting. T. II.

hic recurrens minor in sinistro latere superfluous est, quod e profundiore loco ortus maior, munera minoris suppleat.

§. 13.

Decursus nervi vagi usque ad finem commode secundum latera describi poterit. Ergo primum de dextro. Dum integer nervi octavi truncus in dextro latere ad ultimam colli regionem descendit, in pectoris cauum ingressurus, in angulo latet, quem carotis dextra cum subclauia sua congenere fornat, et ex parte anteriore a vena iugulari comuni et subclauia eiusdem lateris tectus est.

In hoc triangulari interuallo, nervi truncus distincto fulco et hiatu in duas quasi portiones finditur, *recurrentem* nempe, et *continuationem trunci*. Hac ratione super arteria subclauia dextra incedendo thoracem intrat, et minor portio, interiora respiciens sub arteria subclauia reflexa versus superiora nunc nervum *recurrentem* constituit, *maior portio*, seu trunci continuatio, exteriora tenens, recto fere itinere in thoracem descendit. Statim post secessum recurrentis emittit vix dimidium pollicem progressus, notabiles furculos *pro recurrente minore*: truncus vero ipse pressius ad bronchum accedit, et antequam retro venam azygam, in cauam superiorem abeuntem incedat, et sub eadem abscondatur, plures emittit minores furculos IV. V. quin VI. in aliis cadaueribus. Omnes hi nervorum furculi versus interiora migrant, et inter corpora superiorum vertebrarum thoracis a quibus truncus octavi paris non multum distat, et inter asperam arteriam oesophagumque absconduntur, partim per asperam arteriam distributi sunt, partim per fibras musculares oesophagi finiuntur.

His furculis emissis truncus nervi inter bronchum dextrum et venae azygae truncum ad venam cauam inflexum ad pulmonem dextrum properat, et hoc in loco maximam patitur mutationem, pluresque in ramos diuisionem, ex qua quidem diuisione tam pulmonales nervorum plexus, quam oesophagei oriuntur.

Paullo supra venam azygam nervi truncus manifeste aliquantisper latefcit, quod latitudinis augmentum sub azyga crescit.

Datis dein numerosissimis ductu canalis bronchiorum per pulmonem diuisis ramis, qui plexum pulmonalem dextrum proprie formant, et proprio ganglio in multis instructi sunt, subito totus nervus super oesophagum in latum plexum oesophageum resoluitur: ex hoc plexu infinita filamenta oesophagum ipsum adeunt, dum vero directionem hic plexus mutet a dextris versus posteriora, sensim separati illi maiores fasciculi confluunt denuo in unum grandem nervum ad posteriorem marginem oesophagi in abdomen delabentem, non infrequens vero ex meis observationibus est, duos, duos maiores et tertium minorem furculum transiisse, et vel totos vel quoad maximam partem, postquam antea ad latus posterius cardiacae latum plexum gastricum posteriorem formauerint, V. VI. usque ad XIII. filamentis cum totidem ex semilunari plexu prouenientibus, in amicabilem unionem cum splanchnicis abiisse.

§. 14.

Decursus nervi octavi in sinistro latere, tantum in quibusdam momentis differt ab illo dextri lateris. Ablegatis pluribus in sinistro latere ad plexum cardiacum augendum



gendum furculis, qui circa carotidem sinistram multas parallelas strias albicantes, facile a flava arteriae tunica discernendas formant, semper ad latus sinistrum carotidis, inter eam et iugularem communem, versus thoracem descendit, arctius tamen semper cum carotide coniunctus manet, sub vena subclavia sinistra thoracem nunc intrat, et fere simili ut in dextro latere ratione in duas portiones diuisus, in angulo, carotidem sinistram inter et subclaviam arteriam descendit, in quo intervallo autem plures paruos nervulos super carotidem spargit, reliquis superius memoratis implicitos. Nunc sub vena intercostali prima, quae non in communem venae azygae truncum sanguinem suum mittit, sed peculiaris hemiazygae parvae instar in venam subclaviam sinistram immergitur, sub hac inquam vena intercostali lectus, super arteriam aortam descendantem incedit, et *nervum recurrentem* sinistri lateris versus superiora reflexum dimittit: inter has duas portiones eleganti spectaculo exigua arteria et venula ex intercostalibus decurrit, et nervum ipsum suis ramulis amplectitur.

Altera, ab ortu recurrentis remanens maior portio; seu truncus denuo in duos ramos diuaticatur, *minorem* anteriorem bronchi sinistri partem petentem, in plures minores furculos diuisum, qui per venas pulmonares et bronchum distribuuntur: *maioresque ipsum* in posteriore bronchiorum parte multiplici ratione diuisum, ut insignis grandisque plexus pulmonaris sinister et posterior inde ortus sit, copiosissimis furculis per pulmonem diuisus. Reliquum quod pulmones non acceperunt, tam arcte ad exteriorem pleurae superficiem in aliquot ramos diuisum incedit, ut difficile dictu sit, plane nihil nervaeorum furculorum pleurae impendi: propius tandem ad oesophagum accedunt nervi octavi continuationes, plexum *oesophageum* sinistri lateris, qui nunc sensim anterior fit, formantes, et cum aliis furculis superioribus, ex plexu pulmonari oesophago exhibitis communicantes. Tres primarii, nunc plexus oesophagei anterioris fasciculi in unum truncum coaliti, ad anteriorem oesophagi partem descendant, et in transitu per diaphragma etiam in hoc cadauere manifeste aliquot furculos septo remittunt transverso. Dum versus cardiam appropinquat, in latiore quandam fasciam expanditur, et iter suum ad oram curvaturae ventriculi minoris dirigit, et in plures ramos dehiscit, tum *plexum gastricum anteriorem* formantes in plano ventriculi anteriori, tum alios furculos in planum posterius mittit, cum octavo dextri lateris communicantes, tum alios ad pylorum usque ductos. Quantum ego quidem distinguere potui, nullam memorabilem communicationem, quae cum ramo alicuius magnitudinis perficeretur, vidi, inter octauum sinistri lateris nunc descriptum cum splanchnico, praeter illam, quam uterque vagus inter se ostendit.

### §. 15.

Ita res sese plerumque habet in naturali statu, ubi quilibet nervus vagus separatim ventriculum attingit. Rarior cum sit varietas, ut trunci ipsi confluerent, descriptionem huius aberrationis addam, ut pateat, paullo post naturam in eundem redire tramitem, quem semel deferuit, et priorem constantiam servare.

Postquam uterque nervus octavus, relictis pulmonibus, editisque nervis huic visceri, vel plexus bronchialibus, se super oesophagum coniecit, et plexus oeso-

phagaeos confuetos effecit: in distantia pollicis cum dimidio a loco, ubi gula per diaphragma in abdomen demergitur, in *unum truncum* confluunt dexter sinisterque nervus octavi paris s. vagus. Crassitiem insignem pennae coruinæ nunc obtinet, aliquot parvis filamentis infimæ oesophagi parti datis, in posteriore margine, cum oesophago ad  $\frac{2}{3}$  pollicis indiuisus in abdomen descendit, et supra diaphragma rursus in duos truncos dehiscit, *posteriorem*, qui sinistro lateris vago respondet, et *anterioriorem*, ad dextrum pertinentem. In hac directionis mutatione sola varietas a naturali statu mansit. *Posterior truncus*, sub illo ramo, quem arteria phrenica sinistra in cardiam mittit, latescere incipit. In transitu hoc per hiatus diaphragmatis manifeste ex posteriori trunco paris vagi tria filamenta in crus septi transversi sinistrum abire vidi. Nervi nunc posterioris integer truncus in posteriore cardiae plano in multos ramos, quorum nonnulli insignem latitudinem habent, dispergitur, et spatium ultra pollicem latum sub hac diuisione occupat. Praecipui illorum ramorum sunt sequentes: Tres rami aequalis magnitudinis cum duobus minoribus, aliquo facto arcu versus cardiam et vicinam plani posterioris ventriculi partem recuruantur: Duo magni latique fasciculi, mox in plures minores furculos diuisi, cum interspersis aliquot minoribus filamentis super omnem ambitum plani posterioris ventriculi dispergebantur, hi ergo cum praecedentibus formabant *nervos gastricos posteriores*: reliqui omnes, quorum V ramos maiores, latiusculos, et aliquot minores numeravi, ductu arteriae coronariae sinistrae, versus coeliacam migrabant, et forti plexu eandem ambientes, cum plexu splanchnico pluribus in locis coniungebantur.

*Anterior truncus*, seu dextri vagi continuatio, in anteriore cardiae superficie vel plano, eadem ratione uti posterior in notabilem expandebatur latitudinem, multiplices ramos spargentem, et simul finitum. Primi ex ordine sequentes rami, in hoc cadauere V fasciculos maiores minoresue componentes, recurvati versus dextrum latus, et membranae firmæ intexti, in qua rete quoddam formabant, versus lobum hepatis sinistrum mittebantur, et partim cum arteria hepatica sinistra, partim per sulcum portarum sinistrum, huius visceris partem minorem petebant: hi itaque rami formabant *plexum hepaticum sinistrum*, s. *minorem*, uti illum appellare soleo. Omentum paruum, s. Gastrohepaticum, quod illius membranae continuatio est, aliquot paruos furculos nanciscebatur, et plexui maiori admiscebat. Omnes reliqui rami per totum planum anterius ventriculi dispergebantur, curvaturam minorem sequebantur ad pylorum usque, omento paruo et hepatis dextro lobo furculos exhibebant, unoque verbo *plexum gastricum anteriorem* perficiebant.



## SECTIO III.

## DE NERVO SYMPATHICO MAXIMO, PRAECIPUE DE EIUS PER CAVUM PECTORIS DESCENSU, ET SPLANCHNICIS AB ILLO ORTIS.

## §. 16.

Nervi intercostalis, seu sympathici maximi ortum et ex capite prouentum, per omnem ceruicis collique regionem decursum, memorabilem in diuersa ganglia et plexus mutationem, crassitiei et magnitudinis augmentum et imminutionem, cum octauo, nono, phrenico, omnibusque ceruicalibus connexionem, filamentorum multiplicium ad caput, ductu vasorum, sub nomine *nervorum mollium*, ad cor aliasque thoracis partes, sub *cardiacorum* appellatione ablegationem, silentio nunc praeterco, nec amplius disquiro, an hic nervus maiori iure cerebralibus, quam spinalibus annumerandus sit: Pro nostro scopo sufficere potest, veritati insistere, qua constat, ex omnibus fere nervorum medullae spinalis paribus, filamentum quoddam crassius tenuiusue vicissim emitti, ex quibus quolibet in latere oritur longus, totidemque gangliis instructus nervus, quot filamenta confluxere. Hic vero truncus, quem vulgo *intercostalem*, et *sympathicum maximum* appellant, dum per collum, pectus, abdomen et peluim decurrit, in summa colli regione cum crassiusculo quodam nervo unitur, ex cranio, ubi ex confluxu aliquot furculorum rami secundi quinti, et sexti paris, sub nomine *originis primae* enatus est, per canalem caroticum ossis petrosi descendente, et in infima peluis regione denuo, duobus, tribus, pluribusue filamentis, uti varietates ostendunt, cum variis nervis, sub nomine *finis nervi intercostalis*, connectitur. Hunc sane nervum pro primario fonte et principe omnium nervorum, qui visceribus infimi ventris inferuiunt, considerare possumus.

## §. 17.

Omnis fere antiquitas iam cognovit, ex nervo intercostali, per thoracis cauum decurrente, celebrem nervum prouenire, quem, eleganti et aptissima denominatione *Splanchnicum* recentiores appellarunt. Nullibi vero, LUDWIGIO <sup>1)</sup> excepto, mentionem factam lego altioris fontis, ex quo abdominis viscera nervos nanciscerentur. In VIII cadaueribus, sollicitè disquisitis, has altiores ganglii semilunaris radices vidi, nec dubito, quin in pluribus adfuerint, quae non pari solertia perlustravi, fateri vero simul debeo, me in variis frustra easdem quaesivisse, quare inter constantiores corporis humani nervos, nisi plures succurrant observationes, hunc *nervum splanchnicum superiorem*, uti illum appello, nondum referam. Conveniunt vero pleraeque observationes, paucissimis minutis exceptis, in illa descriptione, quam de hoc nervo concinnaturus sum. Ex plexu illo cardiaco, quem tam truncus intercostalis ipse,

H 3

quam

<sup>1)</sup> Progr. cit. p. 11. 12. Diuersa enim a nostro nervo sunt, quae erudite proposuit Ill. SCHMIEDEL Diff. cit. p. 19.

quam filamenta ex ganglio cervicali secundo prouenientia formant, tres, quatuorue furculi in unum mediocrem, aut duos confluebant nervos, uno, alteroque ramulo ex recurrente, quin ex ipso octauo auctos. Cum oesophago, sed eodem paullo antea, thoracem ingrediebantur, et nouo filamentum ex cervicali infimo augebantur; elatiorem corporum vertebrarum partem tenent, in sinistro latere aortae, in dextro venae azygae vicini, saepe iisdem tecti per thoracem descendunt, cum accedentibus, numeri et loci inconstantis, ex intercostali nouis filamentis in plexum tenerum interdum abeunt, ex quo oesophago saepe ramulum impertitum vidi. Bene iam annotavit LUDWIGIUS, post sextam arteriam intercostalem nihil omnino ab intercostali nervo huic accedere: Accuratius dicere possum, nil amplius ramorum superiori huic splanchnico ab intercostali impertiri, cum prima iam radix ad formandum maiorem splanchnicum data fuerit. Ratione finis et insertionis parui nostri splanchnici nervi admodum variantem naturam vidi, ut nihil certi et constantis huc usque statui possit. In alio enim subiecto in unum filamentum ex utroque latere confluebant, quod in ipso thorace in nervum octauum posteriorem inferebatur: In alio uterque seorsim cum aorta in abdomen descendebat, et propius ad se inuicem accedentes in plexum semilunarem supra arteriam coeliacam finiebantur: In tertio cadauere, in dextro latere una cum nervo splanchnico maiore abdomen intrabat, et ganglio iminiscebatur, in sinistro latere per propriam in septo transverso fissuram exhibat, et plexum semilunarem petebat: In quarto et quinto casu, dexter in ganglion semilunare dextri lateris, sinister cum octauo in plexum gastricum posteriorem abiit: In tribus aliis rem ita vidi, uti LUDWIGIUS <sup>2)</sup> descripsit. Licet in omnibus dictis exemplis, hi nervi summam teneritudinem habuerint, facili tamen negotio, si caute pleuram remouebam, decursum illorum et finem lustrare potui, cum vero non in omnibus cadaueribus inueniantur, ratio forsan inde patet, cur deficiente hoc cum nervis cardiacis commercio, cor non in omnibus hominibus ab affectis infimi ventris visceribus aequali modo patiatur.

## §. 18.

Delapsus itaque ex ceruice, ante et post subclauiam, uno pluribusue filamentis in thoracem *nervus sympathicus maximus*, receptoque ramo accessorio ex primo pare nervorum pectoralium, vel dorsali, in insigne *ganglion* intumescit, pectoris seu *thoracicum primum* dictum, locatum pone ortum musculi longissimi colli, supra tuberculum primae costae: tres plerumque emittit, saltem in hoc cadauere emisit ramos, a) *primum*, illumque supremum, et inter omnes maximum per scalenum proxime situm diuisum: b) *secundum* illumque dextrum primam costam supergredientem, denuo in duos minores furculos diuisum, quorum alter in musculum intercostalem primum abiit, alter vero cum nervo intercostali secundi interualli ansam constituit: et c) *tertium* sinistrum oblique corpora vertebrarum supergredientem, duobusque ramis per oesophagum et arcum arteriae aortae distributum. Accessoria ex medulla

2) loc. cit.



dulla spinali subministrata radix crassa in posteriorem ganglii partem consumitur. Truncus nervi sympathici in ipso loco, ubi, tuberculum costae transit aliquot minores furculos longo colli musculo exhibet.

Nunc denuo in novum intumescit *ganglion thoracicum secundum*, primo paullo minus, licet accessoria radix ex nervo dorsali secundo satis grandis sit: exiguos tantum furculos in musculum intercostalem mittit.

Descendit dein truncus sympathici nervi super tuberculum tertiae costae, et paulum oblique versus corpora vertebrarum dirigitur, cum accessoria ex tertio dorsali nervo radice, oblique eidem inserta, *tertium thoracis ganglion* format, ex quo in pluribus cadaueribus varios ramos prodire vidi: a) Minor quidam furculus ad acutissimum angulum ex trunco ortus, qui oblique directione vertebrarum corpora supergressus, in plures minores ramulos dividebatur, partim oesophago implantatos, partim cum ramis inferioribus ex eodem trunco intercostalis provenientibus, et insignem aliquem plexum formantibus, ex quo, uti mox dicetur, alii novi nervi oriuntur: b) Trunculus quidam praecedenti ramo paullo maior, ex latere dextro ad angulum acutum oritur, qui oblique in nervum dorsalem tertium post breve iter inferitur: c) et d) Duo maiores rami in latere sinistro oriuntur, ad acutos pariter angulos orti, parallelo itinere cum ramo insigni venae azygae versus pulmones propagantur, et cum ramo (a) descripto, elegantem plexum formant, cui plexui alii furculi paullo inferius ex trunco sympathici orti intermischentur: Idem hic plexus tandem varios ramos ad diuersas partes mittit, multiplici anastomosi cum furculis octavi paris conspirantes<sup>3)</sup>, quorum praecipuos tantum indicabimus; 1) Magnus ramus, trunci nomine prae reliquis dignus, super oesophagum incedit, cui multa parua filamenta impertit, et paullo post cum furculis a plexibus pulmonalibus ex octavo confluit, iunctim migrans cum vena azyga: videtur mihi uti pulmonibus ita etiam pericardio exigua filamenta dedisse: 2) Plures minores furculi versus arteriam aortam descendentem propagantur, tunicas illius legentes, et cum ipso ductu thoracico descendentes: 3) Versus dextrum latus ex eodem plexu aliquot parvi rami musculis intercostalibus inmiscuntur.

Brevissimum est intervallum inter ganglion tertium, et proximum *thoracicum quartum*, in quod truncus sympathicus perpendiculariter descendit, assumto ibidem suo accessorio ramo ex nervo dorsali quarti intervalli in latum ganglion intumescit, ex quo, uti in plerisque antecedentibus gangliis dictum est, plures proveniunt furculi, qui in dextro latere, seu ad exteriora; in musculos intercostales, in sinistro autem cum venis intercostalibus versus oesophagum et arteriam aortam migrant.

Eodem modo sese habet truncus nervi sympathici seu intercostalis in quinto costarum intervallo, et formato ibidem *ganglio quinto*.

§. 19.

3) Dubium quod b. HALLERUS de Part. s. h. fabr. et funct. T. VIII. p. 417. denuo movit, se nullum alicuius momenti trun-

cum vidisse, qui ad nervum octavi paris accederet, neminem arcere debet in hac coniunctiones solertius inquirendi.

## §. 19.

Super costam sextam in intervallo quintae atque sextae costae, nervus intercostalis seu Sympathicus magnus novam assumere faciem videtur. Siquidem ab illo *ganglio thoracico sexto*, prout iam numeravimus, *prima radix* celeberrimi *Nervi splanchnici maioris* oritur. Ganglion eundem in modum prouti reliqua formatur, similesque fere ramos emittit, inter quos ille primarius censendus est, qui nervo splanchnico primam dat originem.

Hoc modo descendit nervus Sympathicus maximus, ut super sequentes costas, septimam, octavam, nonam, decimamque, et in intervallis, iisdem respondentibus, continuum cohaerentemque truncum constituat, in quolibet intervallo ganglia formet, *septimum, octavum, nonum, decimumque*, et ex iisdem gangliis, quod tamen in nonnullis cadaueribus exceptionem admittit, totidem radices ad nervum splanchnicum mittat, quarum radicum ultima in pluribus meis exemplis fuit, quae ex intervallo decimo, inter decimam et undecimam costam prodit.

In dicto hoc intervallo nervus intercostalis seu Sympathicus finem obtinere quasi videtur, siquidem nulla trunci continuatio, prouti alias consueverat, super capitulum costae undecimae pergit ad duodecimam per intervallum dictis costis intercedens, sed directionem suam ita mutat, ut in corpore vertebrae undecimae infima radix nervi splanchnici quodammodo latefeat, et cum insigni ramo ex nervo spinali et intercostali, inter costam undecimam et duodecimam decurrente et proveniente, qui, ut reliquae radices nervi splanchnici, oblique ex dextro spinæ dorsii latere versus sinistrum incedit, confluat, et nunc novum quasi truncum nervi intercostalis constituat. Bene iam HALLERUS \*) observavit, minime infrequens esse, ut nervus intercostalis infra sextam costam nullus superesset, sed inter consuetam fabricam haec aberratio minime referenda est.

Initium nunc novi huius trunci intercostalis ex ganglio undecimo, sequentes emittit ramos: a) Breuissimam continuationem infimae radices nervi splanchnici: b) Duos exiguos ramos ad ductum thoracicum, cisternam chyli, et crura diaphragmatis: c) Aliquot filamenta ad musculos intercostales: d) Celebrem quandam rammum magnum robustumque et longum, qui crura diaphragmatis supergreditur, et elegantissimo plexui et ganglio renali admiscetur; hic saepe sub nomine nervi *Splanchnici minoris* occurrit, solet interdum ganglio semilunari inferi, plerumque autem ad renale pertinere; e) Continuationem trunci ipsam.

Pergit truncus intercostalis, directione sua a sinistris versus dextra sumpta, et latum quandam fasciculum format cum notabili radice accessoria, a nervo thoracico seu dorsali undecimo, super ultimam costam accedente: Proveniunt nunc duo filamenta ad plexum renalem missa, et rursus continuatio trunci intercostalis ipsa, quae sub arcuata septi transversae rima e pectoris cauo in infimum ventrem emergit, et, cum ex abdominali nervi sympathici trunco ad ganglion et plexum semilunarem nihil amplius mittatur, huius ulterior descriptio et adumbratio ad praesentem tractationem non pertinet.

## §. 20.



## §. 20.

Primarius itaque nervorum fons, quibus multa infimi ventris viscera fouentur et sustentantur, est Nervus intercostalis s. sympathicus magnus, qui editis quibusdam, incerti ordinis, loci, et numeri furculis, in unum nervum unitis, *Semilunarem plexum* et *Ganglion* in abdomine formant: Mentionem fecerunt illius nervi observatores, et summi nominis viri <sup>5)</sup> eundem delinearunt, sine addito proprio nomine. *Nervum Intercostalem anteriorem* dixit Illustris vir et magnus incisor SCHMIEDELIUS <sup>6)</sup>, *Collateralem* etiam nuncupavit LUDWIGIUS <sup>7)</sup> longe post mortem Celebrerrimus. Nescio vero ob quam causam mihi praecipue placuerit Nomen *Splanchnici*, quo iam pridem insigniuit HALLERUS <sup>8)</sup> hunc nervum.

## §. 21.

Nervorum splanchnicorum maiorum in quolibet latere semper unus, multiplici varietate, bene ab HALLERO <sup>9)</sup> annotata, productus. Describam rationem, qualem in plurimis cadaveribus conspirare vidi. Oritur integer Splanchnici nervi truncus ex plurimis filamentis, quorum numerum si minimus fuerit, non infra III. et si maximus non ultra VIII vidi: altissima radix prodit ex ganglio nervi intercostalis thoracico sexto, ultima seu infima ex undecimo, reliquae autem radices ex gangliis et plerumque nervi-trunci intervallis intermediis, accedebant itaque radices ex septimo, haec omnium erat brevissima, ex octavo, praecedenti iam longior, ex nono ganglio, cui ex eodem sequente intervallo admiscebatur tenue filamentum, ex intervallo inter nonum et decimum ganglion, omnium longissima radix ex decimo, et brevior de novo ex undecimo. Omnium harum radicum crassities varia, decurrunt pone pleuram, cui arctissime annectuntur, nullumque visibilem furculum in eandem ablegantes, confluent deinde acutissimis angulis, et insignem truncum splanchnicum notabilis crassitiei constituunt. Ab exteriori thoracis latere propius ad se invicem accedunt, corpora vertebrarum petentes, et sub arcuata septi transversa rima, inter appendices diaphragmatis pro iisdem transmittendis parata, ex pectoris cauo in abdomen descendunt, transitum in ganglia semilunaria paraturi.

## SECTIO IV.

## DE GANGLIO PLEXUQUE SEMILUNARI IPSO.

## §. 22.

Antiqua iam est, saltem non in nostrum saeculum pertinet, prima ganglii huius notitia, cuius primam, aliquantisper naturae consentaneam descriptionem VIEUSSENIO

5) EUSTACHIUS Tab. XVIII. fig. 2. v.  
VIEUSSENS Tab. XXIII. 55. WILLISIUS  
Tab. XI. G. H. CHESELDEN Tab. XXIX. 10.  
BERRETINI Tab. XI. o. DAGOTY Tab.  
VI. IOH. B. BIANCHI hist. hep. Tab. IV. a.

6) Dissert. eleg. saepe cit. p. 17.

7) Progr. cit. p. 9.

8) Elem. Physiol. T. IV. p. 260.

9) loc. cit.

SENIO debemus. Miror autem, ne unicam quidem, in tot annorum decursu, tolerabilem maximi et celeberrimi ganglii, quod alii, nec inepte, *Cerebrum abdominale* dixerunt, extare figuram, nam ipsius VIEUSSENII <sup>1)</sup>, ceu optima icon, rem minime exprimit, et qualem structuram Cel. DAGOTY <sup>2)</sup> pinxit, talem ego in nullo cadauere inueni, licet innumerabiles fere natura varietates in his plexibus admittat. Plures observationes inter se contuli, et in enarrandis iis, quae de ortu, fabrica, situ, figura et magnitudine ganglii plexusque semilunaris retexi, ita versatus sum, ut varietates in aliquot descriptiones constantioris structurae congererem, illisque deinceps corollaria addiderim.

## §. 23.

## PRIMA OBSERVATIONUM CLASSIS.

*Plexus semilunaris et ganglii in X. cadaveribus visi.*

Trunci neruorum splanchnicorum delapsi ex thorace in abdomen, et relictis arcibus septi transversi, sub quibus descenderant,  $2\frac{3}{4}$  poll. paruos a se inuicem distabant, antequam quilibet in suum ganglion abiturus erat.

Dexter ante suum in ganglion ingressum in duos dehiscere ramos, *minorem* paullo, qui reflexus versus exteriora, nullo habito commercio cum ganglio et plexu semilunari, versus capsulam suprarenalem tendebat, et in intervallo, illam capsulam inter et plexum semilunarem, in varios ramos diuidebatur, quorum alii in illo manebant intervallo membranaceo, alii glandulam petebant, alii versus inferiora plexui renali immiscebantur. *Maior* ramus, i. e. *ipse truncus* statim latefcit, versus interiora ad arteriam aortam directus, ut occurreret alteri sinistri lateris pariter in ganglion et plexum abituro. In verum autem ganglion nunc mutatur latum et largum potius, quam crassum: pollicem enim fere integrum longum erat, et si locum illum, ubi in noua abire filamenta, cum ganglio alterius lateris connexa, rite dimetiri volumus, ultra  $\frac{3}{4}$  poll. latum fuit figurae fere rhomboideae, duos angulos superiora et inferiora versus, reliquos ad exteriora et interiora dirigentis: Magnum autem aliquod filamentum ex hoc trunco, statim ab ortu ganglii, in aliis enim id filamentum ante ganglii ortum abire notavi, versus arteriam renalem et retro illam descendebat, quod nactis dein ex plexu renali aliis filamentis mediocris molis remotissimam originem memorabilis et grandis plexus hypogastrici in dextro latere constituebat.

Ipsam hoc descriptae figurae et magnitudinis ganglion nullis foveis, fissurisque interruptum erat: ex marginibus vero eiusdem multa exibant neruea filamenta, crassiora alia, alia tenuiora, quorum deinceps, cognita prius uniuersi plexus et ganglii figura, situ, et habitu, mentionem faciemus. Ex margine interiore huius ganglii dextri VII. prodibant neruorum fasciculi satis grandes, diuersae tamen magnitudinis, ut aliqui  $\frac{1}{4}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{2}{3}$  lineae latitudinem haberent; paullo ulterius ante aortam arteriam progressi quilibet diuidebatur in duos tresue minores fasciculos; denuo rursus diuersimode

1) Lib. cit. Tab. XXIII. 57.

2) Lib. cit. Planch. VI. d. d.



simode unitos, ut nova ganglia minoris molis conficerent. Numeravi in hoc cada- vere tria eiusmodi parva ganglia, ex quibus deinceps novi nervorum fasciculi pro- veniebant, numero vix determinandi, qui ante aortam in intervallo arteriae coeliacae, mesentericae superioris et renalium, cum multis filamentis et fasciculis nerveis ex ganglio sinistri lateris coibant, integrum semilunarem plexum formaturi.

Sinister nervus splanchnicus aequalis fere magnitudinis in ipso per diaphragma- tis crura transitu, aliquot filamenta emittebat in plexum coeuntia, quae cruribus dia- phragmatis, chyli cisternae, arteriae aortae tunicis, ramulis venae azygae proximis manifestissimos suppeditabant furculos in subtilissima retia abeuntes: sub diaphrag- mate dein in abdomine emergens statim latefcebat, et in elegantissimum ganglion, quo nitidius in toto corpore cerni sane nullum potest abiit. Formabat enim dimi- dium orbiculum vel solem quasi, cuius rectus margo exteriora versus dirigebatur, eleganter connexus, semicirculi instar versus aortam, interiora ergo, vel versus al- terum dextri lateris ganglion. Unicui constans in semicirculum formatum erat ganglion, cuius superius cornu ingrediens nervus splanchnicus sinister formabat, in- ferius tria magna filamenta ex trunco intercostali seorsim accedentia, ita tamen ut a cornu superiore versus inferius gangliiformis intumescencia, tanquam chorda duceretur, et hoc modo semicirculus clauderetur, relicto ad superiorem locum amplo hiatu, per quem in uno cadauere ex arteria aorta ad sinistri renis superiorem marginem longa arteria transibat in rene finita. Longitudinem habebat  $1\frac{1}{4}$  poll. et a chorda gangliiformi ad summam convexitatem  $\frac{3}{4}$  poll. latum fuit, crassius paulo quam dex- trum. Octo nitidissimis fasciculis diversae magnitudinis, quorum alii ultra lineam lati sunt, cum ganglio dextro eiusque fasciculis et gangliis cohaerebat, et hoc modo integrum plexum semilunarem formabat. Fasciculi dicti in satis aequali a se inui- cem distantia ex ganglio oriebantur tanquam radii ex centro, dum paullulum a ganglio recesserant, plerique in tenerrima nervorum fila diuidebantur, plexui tandem admixta. Ex anteriore tandem ganglii plano prodire vidi illa filamenta communi- cantia, quae ganglion semilunare cum octavo pare coniungunt.

## §. 24.

## SECUNDA CLASSIS OBSERVATIONUM.

*Plexus semilunaris et ganglii in VII Cadaveribus observati.*

Aequali in distantia, uti in aliis cadaveribus vidi, transibant nervi splanchnici foramina septi, in abdomine nunc comparentes, nempe  $2\frac{1}{2}$  poll. parisi. In sinistro latere, dextro splanchnico aliquanto maior et latior, iam in ipso thorace, aut in li- mine hiatus diaphragmatici, nervus splanchnicus in duas portiones diuidebatur; *mi- norem* magis exterius descendentem, in transitu per diaphragma aliquot tenera fila- menta appendicibus septi exhibebat, cum ulterius ad latus aortae descenderet, magnum filamentum ganglio semilunari exhibuit, aliud simile plexui renali dedit, et finem ipsum maxima huius rami portio in summa origine radices *plexus hypo- gastrici* obtinebat. *Maior* ramus versus interiora magis incurvatus, et latior factus

in ganglion mutatur. Ganglion hoc non tantae amplitudinis erat uti in alijs, sed crassius et figurae magis irregularis, difficilis autem explicationis. Magni ex hoc ganglio fasciculi interiora versus diriguntur, ut altero ganglio occurrant, supra coeliacam, inter illam et mesentericam, mesentericam inter et renales, et multis furculis ex altero ganglio orientibus in plexum semilunarem mutantur. Ab exteriori ganglii margine multi furculi in plexum renalem abeunt, et insignes furculi iuncti ad formandam radicem nervi hypogastrici concurrunt. *Dexter splanchnicus* iam in abdomen delapsus, in similes duos ramos imparis magnitudinis diuidebatur, quorum *minor* tum plexui renali, tum radici plexus hypogastrici prospiciebat. *Maior* ramus, s. truncus splanchnicus ipse statim in ganglion intumescit crassiusculum et eleganter versus exteriora incuruatum, ex cuius conuexitate multa filamenta tam ad capsulam, quam ad plexum renalem mittebantur, magnus autem fasciculus, pro plexus hypogastrici origine formanda descendit. Ex concauo autem margine nouem fasciculi diuersae magnitudinis ad constituendum plexum semilunarem versus interiora ducuntur, tribus minoribus gangliis his fasciculis intermixtis.

## §. 25.

## TERTIA CLASSIS OBSERVATIONUM.

*De differenti fabrica ganglii semilun. ex VI cadaueribus.*

Ingressus neruorum splanchnicorum uti in omnibus alijs fuit. In sinistro latere ante vasa capsularia tres rami splanchnici in tres intumescencias mutantur, ex plexu gastrico posteriore aliquot furculi accedentes in similes nodos abeunt, ex inferiore ganglii parte sex filamenta ex totidem nodulis ad plexum renalem abeunt, et ex dextro latere quinque fasciculi ex ganglio semilunari accedebant, et hoc modo magnum pollice fere longum et latum ganglion formant, exacte solis figuram cum suis radiis repraesentans. In dextro latere nervus splanchnicus in unicum regulare longumque ganglion abit figurae et magnitudinis fere ganglii cervicalis primi in collo. Ex hoc VIII fasciculi prodibant, quorum V versus sinistrum latus mihi coniunctionem cum altero ganglio formant.

## §. 26.

## QUARTA VARIETATUM GANGLII CLASSIS

*in IV cadaueribus visa.*


In sinistro latere crassior fere erat splanchnicus nervus quam in dextro, et in quatuor statim diuidebatur ramos, primus, ad exteriora reflexus, retro capsulam renalem in plexum abibat, tres alii in totidem intumescencias mutabantur, paullo post in unum magnum crassiusculum ganglion confluebant, longitudinaliter ab origine arteriae coeliacae aliquot lineas ultra renalem sinistram extensum, ex quo deinceps varii furculi ad diuersos plexus, fortissimi vero fasciculi versus dextrum latus, ad concursum cum altera ganglii parte formandum, ducebantur supra coeliacam, inter illam



illam et mesentericam superiorem, et maximi infra mesentericam. In dextro latere nervus splanchnicus statim in verum mutabatur rete nervosum inextricabili et vix enarrabili modo, in hoc rete XI. ganglia minora numerari poterant, in latum campum expansa, ut ipse plexus renalis cum suis gangliis tanquam pars huius magni plexus censendus sit. Multis tandem uti antea dixi fasciculis cum sinistro unitur. Aliae varietates occurrunt mox in unico cadauere, mox in duobus a me visae, quas vero nunc lubenter omitto, cum praecipuarum iam mentionem fecerim.

## §. 27.

Enascebatur ex hac unione fasciculorum diuersa inter utrumque ganglion mediorum nitidissimus Plexus, insignem circumferentiam et amplitudinem constituens, qui ob gangliiformem figuram, aut plexui similem structuram *ganglion* vel *plexus semilunaris*, *ganglion magnum abdominis*, vel etiam ob multiplicem in varia viscerum abdominalium negotia influxum, uti supra iam dixi, *Cerebrum abdominale* appellatus est. Situm semper est in omnibus hominibus ante arteriam aortam, ut peritonaeum eidem anterieus praetensum sit. Ambitum suum inter superiorem limitem arteriae coeliacae et inferiorem arteriarum renalium marginem extendit. Uterque nervus splanchnicus, cum non una eademque ratione in plexum abeat, in aliis multiplices plexus in intervallis, quae arteria coeliaca, mesaraica superior et renales, inter se relinquunt, ex uno ganglio in alterum abeunt, interdum etiam, sed quod rarissimum est, latum quoddam ganglion dicto in loco format, quod totidem foraminulis enarratas arterias transmittit.



## VIII.

GEORGIUS CHRISTIANUS FROTSCHER  
DE  
MEDULLA SPINALI EIUSQUE NERVIS.

ERLANGAE 1788.

## PRAEFATIO.

Quamvis omnes medicinae partes et principales et miniftrae <sup>1)</sup>, quas huius nobilioris artis studiosus rite addiscendas sibi sumere debeat, ita sint comparatae, ut non cultoribus suis solum summam adferant voluptatem summumque oblectamentum; sed morbis laborantibus etiam propter sanitatem amissam vel restitutam vel adhuc restituendam summum solatium; tamen nullus medicorum hacce felicitate frui nec animum aegrotorum erigere potest afflictum, nisi firmissimum, cui aedificium suum superstruere valeat, iecerit fundamentum. Quod ut ponatur et medicus aegrotorum votis satisfactorius metam attingat sibi propositam, pernecessarium est, ut praecipue ad anatomiae studium, quia totius medicinae basin constituit, rite excolendum animum intendat. Medicinam, quae corporis humani valetudinem curat, ait VESALIUS <sup>2)</sup>, nulla quidem re felicius promoueri, quam perfecta partium, quae illud constituunt, cognitione, certissimum habetur. Quare et prima totius disciplinae huius pars censetur anatomicae. Huius itaque principii imbutus non solum substantiae et structurae partium perspiciendae aptum se videt; sed etiam connexioni earumque situi naturali cognoscendo par est <sup>3)</sup> quid? quod? non potest, quin machinam physico-hydraulicam admiretur et Deum ter optimum maximum summum artificem adoret. Compages enim artium uno in homine est, cedunt automata, horologia et humanum quidquid unquam excudit ingenium, unus homo, si gloriatur artifex, artificii ruborem incutiet. In hoc singulae actiones iusto ordine, tempore ac dimensione nullo instrumenti incommodo, absoluuntur, ita ut ex anatomie omne hominum genus, et si ignoret, qualem habeat Deum, habendum colendumque tamen sciat <sup>4)</sup>.

Anato-

1) Perilluſtr. DELII, praeceptoris mei ad cineres usque pie colendi, synopsis introduct. in med. uniuers. eiusque histor. literar. Erlangae.

2) Opera omnia anatomica et chirurgica

cura HERMANNI BOERHAVII et ALBINI. Lugduni Batavorum 1725.

3) HEISTERI compend. anatom. §. I.

4) BIDLOO anatomia humani corporis. Amstelodam.



Anatomia quoque rite exulta, nos aptos reddit, principiis physiologiae seu anatomiae applicatae, quae in eo consistit, ut corporis humani functiones, quibus perficiendis partes idoneae sunt, nos doceat<sup>5)</sup> probe addiscendis. Cum autem certum sit, rectum esse mensuram obliqui, nobis principiis et anatomicis et physiologicis factis suffultis, haud difficilis erit, si morbus quidam nostrum inuadat corpus, conclusio a statu naturali ad praeternaturalem seu a statu sano ad morbosum, praesertim quum semiotices principia nobis succurrant, quibus mediantibus laesionem praecipuam determinare seu morbum definire nobis est datum<sup>6)</sup>, unde usus ex anatomiae studio in pathologiam<sup>7)</sup> redundans optime intelligi queat. Intellecta hac ratione morborum genesi, nunquam non therapiae generalis principiis reliquisque, medicinae partibus rite instructi, nos pares sentimus, indicationibus aptis formandis, indicatis indicanti accommodatis eligendis morbisque tandem corpus infestantibus tollendis<sup>8)</sup>. Quaecumque ita sint, omne hucusque tempus in anatomiae studio excolendo consumpsi, eo consilio, ut fundamentum ponerem, quo omnes reliquae medicinae partes, quas quoque coniunctim cum his omni cum cura addiscere conatus sum, niti possent. Cum autem nunc in eo sim constitutus, ut specimen inaugurale mihi sit exhibendum, non incongruum esse putavi, si commentationem de medulla spinali eiusque nervis exhiberem. Equidem praeter alios Viros celebres, Cl. HUBER<sup>9)</sup> iam hac in re desudavit; interim tamen spero, fore, ut elaboratio mea non prorsus sit superflua, praesertim quum originem et distributionem nervorum operose et pluries a me in corporibus adultorum et infantum evolutam, simul respiciendo pathologicas observationes quoque intexuerim iconesque omni cura ac diligentia a Cel. LOSCHGIO Professore Medicinae Extraordinario et Theatri Anatomici Erlangenensis Professore dexterimo, fautore meo aestumatissimo eleganter depictas adiecerim. Rem itaque meam ita pertractandam curabo, ut primum loquar de partibus pinguedinosae medullae spinalis faciem posteriorem obtegentibus, deinde proferam, quae de medullae spinalis membranis dicenda sunt, tandem dicam, quae de medulla spinali ipsa sunt observanda, denique mentionem faciam de nervis spinalibus eorumque origine, situ, directione, transitu, progressu ac distributione. Figurae, quas aeri incidendas curavi, omnes iam exstantes, quas quidem mihi videre hucusque contigit, praestantissime antecedere mihi videntur. Verum an iudicium meum hac de re latum rei ipsi respondeat, vel minus, modeste Eruditi Lectoris iudicio relinquo. VESALII figura<sup>10)</sup> olim quidem in usum vocari poterat; nunc autem, cum meliores nobis sint ad manus.

5) Ill. BLUMENBACHII institut. physiol. §. 1.

6) Cel. GRUNERI semiotice physiolog. et patholog. complexa general. Halae Magdeburgicae 1785.

7) GAUBII institut. patholog. med. Edit. AKERMANN.

8) VÖGELS Handbuch der praktischen Arzneiwissenschaft, zum Gebrauch für an-

gehende Aerzte. BURSERII de KANILFELD institutiones medicinae practicae. Vol. I. Pars I. Lipsiae.

9) HUBERI programma de medulla spinali. Goetting. nec non Comment. de medulla spinali, speciatim de nervis ab ea prouenientibus. Goetting.

10) Libr. cit. p. 372.

mus icones, ulteriori attentione non digna est. EUSTACHII icon <sup>11)</sup> ita est comparata, ut hodierno adhuc die nostram utique mereatur aestimationem. BIDLOO <sup>12)</sup> figuram laude nostra non plane indignam nobiscum communicavit; interim tamen doleo, quod non solum haecce figura; sed etiam omnes reliquae a situ partium naturali maxime recedant. VERHEYNIUS <sup>13)</sup>, cuius figura ex WILLISIO <sup>14)</sup> desumpta est, rem plane non exprimit. VIEUSSENII icones <sup>15)</sup>, id quod Ill. HALLERUS <sup>16)</sup> iam adnotavit, naturae magis sunt accommodatae omnibusque iam enarratis praefereandae. RIDLEYI delineatio <sup>17)</sup>, quae initium ad dorsum usque exprimit, cum icone BIDLOO conuenire videtur, sed nihil distincti repraesentat. THOMAE BARTHOLINI figura <sup>18)</sup> adeo rudis est, ut vix recensione sit digna. Cl. HUBERI figurae <sup>19)</sup>, quas HALLERUS <sup>20)</sup> et MAYERUS <sup>21)</sup> denuo aeri incidendas curarunt, omnibus hucusque recensitis palmanum quidem praecripiunt, naturam tamen exacte non exprimunt ideoque non superfluum esse duxi, si meas, quas nunc iudicio lectorum relinquo, adderem icones <sup>22)</sup>. Sed haec haecenus! Reliquum quod est, nihil magis in votis habeo, nisi ut lector beneuolus mihi fauceat laborumque meorum primitias fronte serena suscipiat. Scripsi Erlangae d. XXVII. Iunii MDCCCXXXVIII.

## SECTIO I.

# DE MEMBRANIS MEDULLAM SPINALEM INVOLVENTIBUS.

## §. I.

Remotis vertebrarum spinæ dorsii annulis mox in conspectum venit materia quaedam in adultis alba et vel minus vel magis spissa atque pinguedinosa; in neonatis autem et infantibus, quorum medullam spinalem ob laborem minus difficilem, saepius omni cura et attentione euolui, gelatinosa et vel magis vel minus flaua et fubrubra. Unde hocce phaenomenon eueniat, facile est intellectu, si exhalationem et resorptionem partium fluidarum respiciamus. Haecce materies, cuius iam VIEUS-

SENIUS

11) EUSTACHII Tabulae anatom. Romae. Tab. XVII. Fig. II.

12) l. c. Tab. X. Fig. I.

13) VERHEYNI anatom. corpor. hum. Louan. Tab. XIX. Fig. 1. 3. 5.

14) WILLISII anatom. cerebr. Tab. XII.

15) VIEUSSENII neurographia uniuersalis. Tab. XX. Fig. I. II. III.

16) HALLERI icon. anatom. fasc. I.

17) RIDLEYI anatom. cerebr. Fig. I.

18) Anatom. renouat. Libell. tert. Cap. III.

19) l. c. Figur. I. II. III.

20) HALLERI icon. anatom. Fasc. I. Fig. I. II. III.

21) MAYERI *Anatomisch - physiologische Abhandlung vom Gehirn, Rückenmark und Ursprung der Nerven.* Fig. I. II. III.

22) Tab. II. Fig. I. II. III. — De medulla spinali infantis eiusque termino pone vertebrae dorsales et costas ultimas, quae obseruavi, retuli in Iconibus anatomicis. Lips. 1789. Fol. editis, in quibus de thoracis et abdominis visceribus a tergo consideratis plura proposui, L.



SENIUS <sup>1)</sup>, BIDLOO <sup>2)</sup>, BLASIUS <sup>3)</sup>, WINSLOW <sup>4)</sup>, HALLER <sup>5)</sup>, HUBER <sup>6)</sup>, alii-que mentionem faciunt, tantum superficiem medullae spinalis posteriorem obtegunt; anterior autem huius materiei plane expers inuenitur et paruulis fibris, telam cellulosa eamque veram constituentibus <sup>7)</sup> apparatusi ligamentoso WEITBRECHTII, corpora vertebrarum ceruicalium superstrato <sup>8)</sup> adnectitur. Usus huius substantiae dubius adhuc est; interim tamen in eo consistere mihi videtur, ut partibus in mollitie sua naturali conservandis nec non medullae spinali, ne inter motum vertebrarum dorsaliu laedatur, defendendae, inseruiat. Silentio quoque non est praetereundum, me in cadauere viri sexagenarii, hancce massam modo hic modo illic ita inspissatam inuenisse, ut consistentiae esset cretae, adeo, ut facile in puluerem redigi posset, id quod iam aliis, ut obseruarent, contigit. Sed redeo ad membranas, ipsam medullam spinalem involuentes, quarum

## §. II.

Prima dura meninx <sup>9)</sup>, secunda tunica arachnoidea et tandem tertia pia meninx appellatur. Dura meninx medullae spinalis a dura meninge cerebrum inuolvente producta et ab occipitis osse ad medium usque os sacrum continuata <sup>10)</sup> est membrana validissima cerebri inuolucro firmitate atque densitate non cedens idque potius superans <sup>11)</sup>, albida, vasculosa et fibris in longitudinem excurrentibus congesta nervisque ut tunica cerebrum inuestiens destituta <sup>12)</sup>. Inuoluit totam medullam spinalem eiusque sic dictam caudam equinam <sup>13)</sup>; interim tamen a medulla omnium remotissima est <sup>14)</sup> nec ossibus tam arcte adhaeret <sup>15)</sup> ut dura meninx cerebrum inuolvens. Includit arachnoideam, quae etiam ad inum os sacrum descendit et ultimo filamentis pluribus ad os sacrum annexis in conum abit gracilem <sup>16)</sup> ita ut sac-  
cum

1) Vid. l. c. p. 269. 270.

2) Vid. l. c. Tab. 10. Fig. 7.

3) Vid. Comment. de medulla spinali. Edit. Amstelod. p. 22. 23.

4) Vid. WINSLOW Traité des Nerfs. n. 122.

5) Vid. Element. physiolog. Tom. IV. Libr. X. Sect. IV. §. 1.

6) Vid. Programma de medulla spinali p. 23. Commentat. de medulla spinali, speciatim de nervis ab ea prouenientibus cum adiunctis Iconibus. p. 59. §. XXVI.

7) Vid. Ill. de HALLER. l. c. Tom. IV. Libr. X. Sect. IV. §. 1. HUBER loc. cit. p. 7.

8) Vid. WEITBRECHTII Syndesmologia.

9) Vid. VIEUSSEN. l. c. Tab. XX. Fig. 1. HUBER l. c. Fig. 1.

10) Vid. Ill. de HALLER. icon. anatom. Fasc. 1. Fig. 1. HUBER loc. cit. Fig. 1. VIEUSSEN. l. c. Tab. XX. Fig. 1. ASCH. de primo pare nervorum medullae spinalis. Goetting. §. XXVI. (— hor. script. I.) Cl. PFEFFINGER de structura nervorum. Sect. 1. p. 2. (— hor. script. I.)

11) Ill. de HALLER l. c. Tom. IV. Lib. X. Sect. IV. §. 1. MAYER l. c. p. 23. cui autem tenuior videbatur.

12) Vid. PFEFFINGER l. c. p. 2.

13) Vid. VIEUSSEN. l. c. Tab. XX. Fig. 1. HUBER l. c. Fig. 1.

14) Vid. ASCH. loc. cit. HUBER. l. c. VIEUSSEN. l. c. HALLER. l. c.

15) Vid. MAYER l. c.

16) Vid. ASCH. l. c. HALLER l. c. HUBER l. c. Fig. 1.

cum fere repraesentet <sup>17)</sup>. Fibras carnosas, de quibus VIEUSSENIUS <sup>18)</sup>, HUBER <sup>19)</sup> et HALLER <sup>20)</sup> mentionem faciunt, detegere non potui, quamvis hisce detegendis omnem navarem operam. Diuiditur in superficiem externam et internam. Externa aspera atque hispida est; interna autem laevis semperque madida inuenitur, propter humores, quos vasa exhalantia exsudent <sup>21)</sup>. Varia gaudet diametro vel maiori vel minori specui vertebrarum respondente. Diameter sic se habet: A primo pari nervorum cervicalium usque ad par septimum una eademque est; a pari septimo autem usque ad par primum nervorum dorsaliū decrescit. In hac diametro subsistit usque ad par octavum, ubi denuo increfcere incipit et sensim sensimque maior fit usque ad par undecimum, summam nunc acquirit amplitudinem usque ad par secundum nervorum lumbarium excurrentem. Iam iterum decrescit et intra partem ossis sacri inferiorem tandem in coecum abit finem <sup>22)</sup>. Omnes diametri et specus vertebrarum ipsius et medullae spinalis nec non eius tunicarum quadam inter se gaudent proportionem, quam sapientissimum numen eo consilio, ut saltem mihi videtur, constituit, ne medulla spinalis variis motibus, quibus ope spinae dorſi producendis pares sumus, laederetur. Interſtitia, quae inter fistulam sacram MORGAGNII et medullae spinalis tunicas, nec non inter membranas et medullam spinalem ipsam inveniuntur, in statu hominis viuo et naturali partim materia perspirabili, partim materia oleosa, pinguedinosa atque gelatinosa, de qua iam supra (§. I.) mentionem feci, implentur.

### §. III.

Haecce spatia in cadauere maiori gaudent diametro, quam in homine viuo, utrum autem in illo substantia medullaris texturae sit minus solidioris, quam in hoc, ut Ill. de HALLER <sup>23)</sup> assumit, nec ne, in dubio adhuc relinquo. An durae meningi medullae spinalis, pulsus adscribi queat, dubito, quamvis Ill. de HALLER <sup>24)</sup> in primis autem VIEUSSENIUS <sup>25)</sup> hancce sententiam affirmare videantur. Interim tamen propria VIEUSSENIUS verba in medium proferre liceat. Ait enim vir Celeberrimus: Quae cum ita sint, nullus est dubitandi locus, quin secundum <sup>26)</sup> praedictae medullae spinalis inuolucrum intra vertebrarum specum aliquatenus pulset; pulsat enim crassa meninx intra caluariam, ubi scilicet ipsa calvariae vel minime vel laxe tantum alligata est, quatenus permultis irrigatur arteriarum propaginibus, quae ipsam in desinenti systoles et diastoles motu concutiant, ex quo fit, ut praedictum inuolucrum intra

17) Vid. HALLER. icon. anatom. fasc. I. HUBER. loc. cit. Fig. 1. VIEUSSEN. l. c. Tab. XX. Fig. 1.

18) Vid. l. c. p. 270.

19) Vid. l. c. p. 6.

20) Vid. Icon. anatom. Fasc. I. Elem. physiolog. Tom. IV. Sect. IV. Libr. X. Sed hic harum existentiam plane rursus negat.

21) Vid. MAYER l. c. p. 23.

22) Vid. VIEUSSEN. loc. cit. Tab. XX. Fig. 1. HUBER. l. c. Fig. 1.

23) Vid. l. c. Tom. IV. Libr. X. Sect. IV. §. 1.

24) Vid. l. c.

25) Vid. l. c. p. 271. 272.

26) VIEUSSENIUS quatuor assumit involucra, commune, proprium primum, proprium secundum et proprium tertium.



intra vertebrarum specum indefinenter quoque moveri coniciamus, cum illud, quemadmodum ut crassa meninx innumeris irrigetur arteriis, quarum indefinenti systoles et diastoles motu necessario concutitur, cum nihil impediat et s. p. Rationes, quas VIEUSSENIUS ad sententiam suam confirmandam profert, omnes in eo conueniunt, ut primum analogiae, quae inter duram meningem cerebri et medullae spinalis inuenitur, rationem habeat, deinde motum pulsatorium arteriis proprium et durae meningis adhaesionein vel maiorem vel minorem respiciat; sed quilibet vel me non monente facile perspiciet, haecce argumenta nullius esse momenti. Analogia enim saepissime nos fallit et posito, huic argumento inesse aliquid veri, tamen semper erit quaestio, an minimis arteriis pulsus adscribi queat. Sed restat adhuc, ut consideremus, quomodo superficies externa durae meningis medullae spinalis specui vertebrarum affigatur. Huic fini consequendo inferuiunt 1. annulus quidam tendineus, qui intra foramen magnum ossis occipitis inuenitur <sup>27)</sup>. 2. Ligamenta quaedam parua et valde densa <sup>28)</sup> quibus mediantibus extremitas medullae spinalis inferior intra cauum ossis sacri superficiei posteriori ossis coccygis affigitur <sup>29)</sup>. 3. Ganglia, quae nervi spinales mox post transitum per duram meningem intra foramina intervertebralia formant <sup>30)</sup>. 4. Tela quaedam cellulosa, qua superficies anterior durae meningis cum corporibus vertebrarum coniungitur <sup>31)</sup>. 5. Sinus, qui intra ligamenta externa vertebrarum et duram meningem medullae spinalis obseruantur et a WILLISIO <sup>32)</sup>, BLASIO <sup>33)</sup>, VIEUSSENIO <sup>34)</sup>, VERHEYNIO <sup>35)</sup>, HALLERO <sup>36)</sup> aliisque describuntur.

#### §. IV.

Altera, quae sequitur membrana, tunica dicitur arachnoides <sup>37)</sup> et est membrana distinctissima inter piam et duram meningem sita, pellucens, sanguinis expers et ad imum usque os sacrum, ubi nervos contegit <sup>38)</sup> et flatu per vulnusculum intra tunicam infictum impulso facillime eleuatur, constanter producta est. In superiori cerebri parte cum pia matre et cerebro stricte connectitur, non conspicienda, nisi flatu; in inferiori autem praesertim circa cerebellum, medullam oblongatam et spinalem laxa circumdat, ita ut ibidem facile et abunde conspici facileque demonstrari queat. Unum continuum inuolucrum pellucidum format, tenue quidem, firnum tamen, vasisque apparentibus undique destitutum, quamuis RUYSCHIIUS <sup>39)</sup> vascula, quae

K 2

BLASIUS

27) Vid. MAYER l. c. p. 23. VIEUSSEN. l. c. p. 270.

28) Vid. MAYER. l. c. HUBER l. c. Tab. I. Fig. 1. VIEUSSEN. l. c. Tab. XX. Fig. 1.

29) Vid. MAYER l. c.

30) Vid. MAYER l. c. HUBER l. c.

31) Vid. VIEUSSEN. l. c.

32) Vid. anatom. cerebr. Tab. XIII. Fig. 4. 5.

33) Vid. l. c. p. 32.

34) Vid. VIEUSSEN. l. c. Tab. XVIII. Fig. 1.

35) Vid. l. c. Tab. XIX. Fig. 4. 5.

36) Vid. Element. physiolog. Tom. IV. Libr. X. Sect. V. §. 36.

37) Ex ἀράχνη, aranea et εἶδος forma.

38) Vid. Cel. ASCH. l. c. §. XXIV.

39) Vid. RUYSCHII epistola nona p. 8.

BLASIUS <sup>40)</sup> quoque confirmare videtur, detexerit. Color atque pelluciditas, propter quam hocce nomine a doctissimo BLASIO aliisque salutabatur cum arachnoidea cerebrum inuolvente optime conuenit, et ut dura meninx medullae spinalis saccum cylindricum format, qui cum superficie durae meningis interna in primis superius in collo et ad latera circa ligamentum denticulatum plurimorum filamentorum instar, telae cellulosae ope, arctissime coniungitur <sup>41)</sup>. Fuerunt, qui existentiam huius membranae negare auderent et laminam piaë matris esse affirmarent, praecipue PICCOLI-HOMINUS <sup>42)</sup>, WILLISIUS <sup>43)</sup>, VIEUSSENIUS <sup>44)</sup>, WINSLOVIUS <sup>45)</sup>, KOWPER <sup>46)</sup> RIDLEY <sup>47)</sup> aliique, quos Cel. PEEFFINGER <sup>48)</sup> recenset, huic sententiae addicti fuerunt; sed Ill. de HALLER <sup>49)</sup>, CASSEBOHM <sup>50)</sup>, BLASIUS <sup>51)</sup>, SANTORINUS <sup>52)</sup> contrarium probare annisi sunt. Est itaque tunica arachnoidea proprium cerebri et medullae spinalis inuolucrum, quod productiones suas circa nervos fundet intra cranii atque vertebrarum specum et crassam imitatur meningem, cunctos enim nervorum fasciculos colligit nec singulis nervorum funiculis vaginam impertit, quod solae piaë meningi competit <sup>53)</sup>. Sed tantum intra caua tunica arachnoidea nervis exhibet vaginas, quae fasciculos laxè circumdant; extra autem cranii specusque vertebrarum caua, foraminibus superatis, nihil praeterquam filamentosum textum de eadem superesse obseruare poteris <sup>54)</sup>.

## §. V.

Ligamentum denticulatum, quod valde conspicuum, tenue, fortissimum tamen, pellucidum, tendineum omnibusque vasis destitutum <sup>55)</sup> inuenitur, oritur in cauo cranii paullo supra arteriam vertebralem sub nervi noni exitu et sub specie, ut Cel. GÜNTHERI <sup>56)</sup> verbis utar, fili crassioris vel vasis vacui, in margine medullae spinalis utroque, inter nervorum radices anteriores et posteriores adeoque supra piaam meningem, intra arachnoideam, ad tertiam usque lumbarem vertebrae descendens, inter singula nervorum egredientium interualla tenui apice durae matri affigitur, latiori vero parte cum pia matre paruorum filorum ope cohaeret, unde processus hi seu serratae partes suam trahunt originem. Horum processuum, qui per triangularia nervorum interstitia exeunt, plerumque sunt triginta <sup>57)</sup>, interdum autem pauciores,

40) Vid. I. c. p. 21.

41) Vid. MAYER I. c. p. 24. ASCH. I. c. §. XXV.

42) Vid. Praelectiones anatomicae. Romae.

43) Vid. Cerebr. anatom. Cap. VII.

44) I. c. p. 275.

45) Vid. Traité de la Tête §. 51.

46) Vid. Anatom. corp. hum. explicat. Tab. 5 Fig. 2.

47) Vid. Anatom. cerebr. I. c.

48) Vid. I. c. sect. prim. p. 7. sqq.

49) Vid. Elem. physiolog. p. 169. sqq.

50) Vid. method. secund. p. 640. §. 7.

51) Vid. I. c.

52) Vid. Observat. anatom. p. 53. §. V.

53) Vid. Cel. PEEFFINGER. I. c. p. 9. §. VI.

54) Vid. PEEFFINGER I. c. p. 10. §. VI.

55) Vid. Ill. de HALLER. I. c. Tom. IV. Libr. X. Sect. III. §. 5.

56) Vid. Celeb. GÜNTHERI Cerebri et nervorum distributionis expositio. Duisburgi 1786. p. 31.

57) Vid. MAYER I. c. p. 24. Tab. IX. Fig. 11.



ciores, interdum plures inveniuntur, prout medulla spinalis vel altius descendit vel citius definit vel plures dentes inter interstitia nervorum inveniuntur<sup>58)</sup>. Dentes superiores breves sunt, medii longiores, inferiores autem longissimi<sup>59)</sup>. Cel. GÜNTHER contendit<sup>60)</sup>, ligamentum denticulatum immerito ad tunicam arachnoideam referri et si non pro propria ab involucri ceteris distinguenda parte habendum esset, potius tamen ad piam quam ad arachnoideam membranam pertinere. Rationes, quas proferat ad sententiam suam confirmandam in eo consistunt, quod 1) ligamentum ab arachnoidea plane sit separatum, quod tamen aliter se habere apparet, 2) ligamentum denticulatum, non ut arachnoidea ad finem specus vertebrarum, sed tantum ad interstitium secundae et tertiae vertebrae lumborum descendat, sed observationes circa hanc rem factae, quoque contrarium probant<sup>61)</sup>, 3) quod structura et crassitie ab arachnoidea plane differat. Structura una eademque est, sed inter crassitiem ligamenti denticulati et tunicae arachnoideae differentia quaedam intercedit, at unde hocce phaenomenon eueniat, facile est intellectu ideoque refutationi huius sententiae non amplius immoror. Breuissimis tantum adhuc commemorandum est, ligamentum denticulatum, cuius situs est perpendicularis, magis cum instrumento serrato quam cum dentibus animalibus convenire<sup>62)</sup>. Sed subsisto hic, praesertim quum HUBER<sup>63)</sup>, ASCH<sup>64)</sup>, HALLER<sup>65)</sup> et MAYER<sup>66)</sup> V. Cl. hanc membranam optime descripserint, meque potius nunc ad descriptionem piae meningis conuerto.

## §. VI.

Est igitur pia meninx seu pia mater membrana albicans sed vasculis superficiem posteriorem imprimis occupantibus pulcherrimumque spectaculum exhibentibus, exornata. Haecce vascula adeo numerosa sunt, ut rete mire intricatum, de quo ALBINUS<sup>67)</sup> iam mentionem fecit, formet, quorum autem ulteriori descriptioni immorari nequeo, cum tota res huc non pertineat et Cel. MAYER hac de re iam fusius egerit<sup>68)</sup>. Interim tamen notialgiae, quae saepius observatur praecipue in morbis malignis, et quae ab his vasis pendere videtur, vel unico verbo mentionem faciam, praesertim quum nondum extra omnem dubitationis aleam sit positum, utrum inflammatio venosa, quam Ill. WALTHER clandestinam nuncupat, in causa sit, an dissolutio sanguinis putrida et virium vitalium defectus, ut Cel. LUDWIGIUS assumit<sup>69)</sup>, an, ut QUAEANAUS<sup>70)</sup> sibi persuadet, contractio vasorum spastica. Sectiones

K 3

nes

58) Vid. Tab. nostr. II. Fig. 1.

59) Vid. HUBER l. c. Fig. 11.

60) Vid. l. c. p. 31. 32.

61) Vid. MAYER l. c. p. 24.

62) MAYER l. c. p. 24.

63) Vid. HUBER l. c. p. 5. §. IV. Programm. de medulla spinali §. 9.

64) Vid. l. c. p. 32. §. XXV.

65) Vid. l. c. Lib. X. Sect. III. §. 15.

66) Vid. l. c. p. 23 et 24.

67) Vid. annotat. academ. Lib. 1. Cap. XII. Fig. 1. 2. 3.

68) Vid. *anatomische Beschreibung der Blutgefäße des menschlichen Körpers*. Tab. V. Fig. 1. IV.69) Vid. *adversar. medic. pract.* Vol. I. Pars I. artic. VII. p. 178 sqq.70) Vid. *Traité de fievres*. Tom. II. Chap. VII. art. II. p. 444. 445. sqq.

nes quidem anatomicae inflammationem venosam euincere videntur, nam non solum venae superficiem medullae spinalis posteriorem obrepentes, sanguine valde turgidae inveniuntur, sed etiam intestina tenuia, mesenterium, pulmones, hepares et cerebrum venis sanguine repletis exterius quasi picta et conspersa observantur, vera tamen inflammatio nunquam adest, sed saltem repletio vasorum venosorum seu minimarum venarum pendent a dissolutione sanguinis et defectu virium vitalium, interdum quoque a spastica vasorum contractione. Huic sententiae fauent sequentes rationes, quas vir Ill. BURSERIUS de KANILFELD <sup>71)</sup> in medium protulit: 1) laxitas et dilatio venarum se exonerare impotentium, 2) sanguis in iis fluidus, resolutus, nullo modo aut certe tardissime concreescens, 3) tempus, quo huiusmodi venosae congestiones contingunt, nimirum in summo malignitatis et putredinis gradu et paullo ante mortem, 4) pulsus parvus et debilis in hisce morbis deprehensus, 5) dolor sine ullo alio inflammationis signo, 6) demum noxa a sanguinis missione; sequuntur enim plerumque deliria, convulsiones, sopor et dissolutio sanguinis augetur viresque magis prosteruntur. Sed redeo ad tunicam nostram tenuem, quae, quavis sit tenuis, tamen satis firmam atque validam habet cohaesionem, ita ut coarctationi substantiae medullaris optime inferuire queat. Etenim non solum totam medullam spinalem arctissime circumdat, sed etiam in sulcum eius, qui in superficie anteriori inuenitur, altius sese immittit <sup>72)</sup> vasaque quibus est ornata substantiae corticali subministrat <sup>73)</sup>. Terminum suum habet in conico medullae spinalis fine et quamvis anteriorem medullae spinalis partem seu sic dictam caudam equinam non comitetur <sup>74)</sup>, tamen omnibus et singulis nervorum fasciculis impertit vaginas <sup>75)</sup>, quod negotium tunicae arachnoideae, ut supra (§. IV.) commemoravi, non competit. Quandoque, ait Cel. Pfeffinger <sup>76)</sup> satis distinctum ad interiora nervi plura septula demittit et quamlibet medullarem fibrillam proprio continet canaliculo. Saepissime contingit, ut pia meninx nervos ambiens in telam cellulosa transeat, sed id tunc demum fieri videtur, si dura meninx eam deserit et vices periostei seu pericranii in se suscipit. Sed descriptioni meae finem impono et lectores ad VIENSSENIUM <sup>77)</sup>, HALLERUM <sup>78)</sup>, HUBERUM <sup>79)</sup>, ASCHIUM <sup>80)</sup>, MAYERUM <sup>81)</sup>, PFEFFINGERUM <sup>82)</sup> aliosque incisores clarissimos remitto, sufficiat enim ea tantum dixisse, quae fini meo proxime responderent.

## SECTIO

71) Institut. medicinae pract. Vol. I. Pars I. p. 40. Lipsiae 1787.

72) HUBER l. c. p. 4. §. 4.

73) MAYER l. c. p. 24.

74) HALLERI comment. in Boerhaavi praelectiones. Vol. II. p. 525. Not. e. MAYER l. c. p. 24.

75) PFEFFINGER l. c. MAYER l. c.

76) l. c. §. IV. p. 7.

77) l. c. p. 258. Cap. I.

78) Icon. anatom. fasc. I. Elem. physiol. Tom. IV. Libr. X. Sect. IV. §. I. sqq.

79) Programma de medulla spinali. Goettingae nec non commentat. de medulla spinali cet. Goettingae.

80) l. c. p. 32. sqq.

81) l. c. p. 23. 24.

82) l. c. p. 5. 6. §. III. 4.



SECTIO II.

DE CEREBRO, CEREBELLO, MEDULLA OB-  
LONGATA ET SPINALI.

§. VII.

Praemissis tunicarum medullam spinalem inuoluentium descriptionibus, necessarium nunc est, ut quoque reliquas cum medulla spinali arcte coniunctas partes ad-  
grediar pertractandas. Haud igitur incongruum erit, breuissimis, quomodo cere-  
brum diuidatur, recensere, praesertim quum nexus partium hic sit respiciendus.  
Cerebrum itaque constat ex quatuor partibus 1) ex cerebro, 2) ex cerebello, 3) ex  
medulla oblongata et tandem 4) ex medulla spinali 1). Omnibus hisce partibus tri-  
plex competit substantia a) medullaris seu alba, b) corticalis seu cineritia, c) substan-  
tia subalbidi coloris quam primo Cel. SOEMMERINGIUS 2) detexit, deinde quoque  
GENNARI 3) vidit et Cel. BLUMENBACHUS 4) auctoritate horum virorum commo-  
tus assumsit. Hae substantiae, ratione situs inter se differunt, ita ut medullaris in ce-  
rebro interius, corticalis exterius sita sit; in medulla spinali autem, ut infra demon-  
strabo, medullaris locum exteriorem, corticalis interiorem occupet; substantia deni-  
que subalbidi coloris in cerebello, cerebro, medulla oblongata, medulla spinali prae-  
cipue circa arborem vitae et in lobis cerebri posterioribus locum habeat 5). Sed  
omissis reliquis momentis quamuis notatu dignissimis, huc autem non pertinentibus,  
ad medullam oblongatam, cui medulla spinalis suam debet originem, me accingam  
eiusque descriptionem paucis repetere necessarium iudico. Cum autem Celeb.  
MAYER 6) iam descriptionem medullae oblongatae anatomicam omnibus fere nu-  
meris absolutam exhibuerit; huncce virum sequar reliquaue notatu digna addam.

§. VIII.

Medulla oblongata igitur 7) est substantia conflata ex coniunctione substantiae  
medullaris cerebri et cerebelli, sita pone sellam turcicam in fossa medullae oblon-  
gatae 8) et nouem paribus neruorum e cranio egredientibus et reliquis corpus per-  
reptantibus nervis originem praebens. Sub iudice lis quidem per longum temporis  
spatium erat, vtrum ex sola medulla oblongata, an quoque ex cerebro et cerebello  
nerui originem traherent suam, prout scilicet variae cerebri et cerebelli partes ad ori-  
ginem ipsius medullae oblongatae referrentur; nunc tamen omnes, saltem plurimi  
anato-

1) MAYER l. c. p. 4.

6) MAYER l. c. p. 20.

2) Dissert. de basi encephali. p. 63. —  
hor. script. II.

7) MAYER l. c. Tab. VIII. F. VIEUS-  
SEN. l. c. Tab. IV. V. EUSTACHII tab.  
XVIII. Fig. I. III. IV. V. HUBER. l. c.  
Fig. II. VESAL. loc. cit. Fig. IX. X. libr.  
VII. BIDLOO l. c. Tab. IX. Fig. 1. Tab.  
X. Fig. I. ASCH. l. c. Tab. I. Fig. II.

3) Libr. de peculiari structura cerebri  
p. 26.

4) Instit. physiol. p. 162. §. 199.

8) Cel. MAYER Beschreibung des ganzen  
menschlichen Körpers. Tom. I. p. 299.

5) Cel. Arnemanns Versuche über das  
Gehirn und Rückenmark. Goettingen 1887.  
p. 106. Soemmering l. c. p. 162. §. 199.

anatomicorum in eo conuenire videntur, ut medullae oblongatae nec non protuberantiae annulari originem neruorum adscribant. Sunt, qui (et praecipue Cei. MAYER<sup>9)</sup>, protuberantiam annularem a medulla oblongata separent, utrum autem haecce distinctio rei naturae sit accommodata nec ne, in dubio relinquo. Sed haec in transitu! Longitudo medullae oblongatae in variis subiectis varia, plerumque aequat pollicem seu unciam; latitudo autem, cuius diuersitas quoque est summa, saepissime pollicem dimidium sensim sensimque decreascentem. Diuidi potest 1) in superficiem inferiorem seu anteriorem, 2) in superiorem seu posteriorem, 3) in marginem dextrum, 4) in marginem sinistrum, 5) in extremitatem superiorem et 6) inferiorem, cuius finis plerumque ibi desinitur, ubi medulla oblongata in spinalem transit. Superficies inferior est conuexa et variis eminentis partim marginem dextrum partim sinistrum occupantibus praedita. Eminentiae diuiduntur in externas, medias et internas, quae sunt vel anteriores vel posteriores. Externae nuncupantur corpora relliformia<sup>10)</sup> medullae oblongatae, mediae corpora oliuaria<sup>11)</sup>, internae anteriores corpora pyramidalia anteriora<sup>12)</sup>; internae posteriores autem corpora pyramidalia posteriora<sup>13)</sup>. Sed notandum hic venit, WINSLOVIUM<sup>14)</sup> eminentias modo recensitas diuersis salutasse nominibus easque, quae VIEUSSENIO dicuntur oliuares nuncupasse pyramidales et vice versa. Superficies superior est concaua et cum parte inferiori cerebelli unita, constituit ventriculum cerebri quartum; qui versus extremitatem superiorem valvula cerebri magna<sup>15)</sup> obtegatur, versus inferiorem autem in saccum, quem tunica arachnoidea medullae spinalis format, finitur. Ventriculus cerebri quartus<sup>16)</sup> per aquaeductum Syluii<sup>17)</sup> cum ventriculo cerebri tertio<sup>18)</sup> coniungitur atque in partem superiorem, medium et inferiorem diuiditur. In parte inferiori inuenitur sulcus profundus, calamus scriptorius dictus<sup>19)</sup> in ventriculum ARANTII<sup>20)</sup> abiens. Inuestitur quoque pia meninge et versus partem superiorem plurimis vasculis, plexum choroideum HALLERI quantum constituentibus, exornatur.

### §. IX.

Praelibatis praelibandis ad ipsius medullae spinalis descriptionem nunc progredior. Medulla spinalis itaque seu cerebrum oblongatum HIPPOCRATIS<sup>21)</sup> et GALENI<sup>22)</sup> est corpus ex medulla oblongata productum<sup>23)</sup>, quod post transitum per magnum

9) l. c. p. 20. sqq.

10) MAYER l. c. Tab. VIII.

11) HUBER l. c. Fig. II. MAYER l. c. Fig. II. VIEUSSEN. l. c. Tab. IV. V. XIV. XV.

12) VIEUSSEN. l. c. Tab. IV. V. XIV. XV. MAYER l. c. Tab. VIII. oo.

13) MAYER l. c. Tab. VIII. qq.

14) Traité de la Tête §. 121. 122.

15) MAYER l. c. Tab. VIII. g. g.

16) MAYER l. c. Tab. VII. l.

17) MAYER l. c. Tab. V. r.

18) MAYER l. c. Tab. V. q.

19) MAYER l. c. Tab. VII. p.

20) MAYER l. c. Tab. VII. q.

21) libr. de carnibus Sect. III.

22) de usu partium libr. XII. Cap. XV.

23) Illustr. HALLERI icon. anatom. fasc. I.



magnum ossis occipitis foramen <sup>24)</sup> annulos vertebrales vel fistulam sacram MORGAGNII ingreditur <sup>25)</sup> et in plures fasciculos nerveos fissum, omnibus partibus adiacentibus et subiacentibus prospicit. Substantia alba seu medullaris exterius sita est; corticalis autem seu cineritia locum interiore occupat <sup>26)</sup>, substantia demum subalbidi coloris modo hic modo illic conspicitur. Diameter medullae spinalis diametro, quam fistula sacra MORGAGNII constituit, longe minor est, eo fortasse consilio, ne medulla spinalis inter varias vertebrarum dorsali flexiones praecipue ad trunci erectionem, flexionem et rotationem spectantes <sup>27)</sup> laedatur morbisque facile exinde oriundis infestetur, morbi enim plerumque consistunt in compressione medullae spinalis a vi externa, aut etiam a causa interna, unde symptomata periculosissima e. g. paralytis, paraplegia, stupor, convulsiones, putredo et tandem mors consequuntur <sup>28)</sup>. Spina bifida incompleta, completa enim raro invenitur, qua infantes, hydrocephalo interno plerumque laborantes, corripiuntur, hic quoque, quamvis MURRAY <sup>29)</sup>, LE CAT <sup>30)</sup>, BERNSTEIN <sup>31)</sup> alique hac de re iam mentionem fecerint, silentio non est praetereunda. Consistit autem in tumore exiguo, molli atque concolore supra vertebrae lumborum locum suum plerumque <sup>32)</sup> occupante ac dehiscens eorum processibus sensim crescente. Malo huic, quod plerumque mors comitatur, fluidum aquosum ex cerebro huc delatum, suam dat originem; sed caveas, ne tumorem aperiendo morbum tollere cogites, ut plurimum enim infantes propter collapsum cerebri et exinde oriundam compressionem subinde pereunt. Utrum medulla spinalis nervus sit adnumeranda an proprium cerebrum longum constituat, dubium adhuc esse videtur, quamvis sint, qui modo hanc modo illam assument atque defendant sententiam. Litem inter viros eruditione summa conspicuos ortam componere quidem non audeo; interim tamen non possum, quin medullam spinalem cum Cel. MAYERO <sup>33)</sup> et ARNEMANNO <sup>34)</sup> pro summo corporis humani nervo habeam.

## §. X.

Medulla haec spinalis a magno ossis occipitis foramine usque ad secundam lumborum vertebrae, ubi in conicam terminatur figuram, tendit. Pars eius superior et

24) Cel. BLUMENBACHII *Geschichte und Beschreibung der Knochen des menschlichen Körpers.* pag. 279. §. 222.

25) MAYER l. c. p. 25.

26) Cel. BLUMENBACHII *instit. physiol.* p. 162.

27) Cel. MAYERI *Beschreibung des ganzen menschlichen Körpers.* Tom. I. p. 114.

28) Ill. ISENFLAMMII praeceptoris mei nunquam non pie colendi *Versuche einiger praktischen Anmerkungen über die Nerven.* Erlangen 1774. §. 35.

29) Programm. *Spinae bifidae ex mala* Ludwig script. neur. min. T. IV.

offium conformatione initia. Goettingae 1779. 4.

30) *Traité du fluide des Nerfs.* Berlin 1765. 8. p. 52. sqq. Tab. III.

31) *Praktisches Handbuch für Wundärzte nach alphabetischer Ordnung.* T. II. p. 341.

32) Fit enim interdum, sed admodum raro, ut quoque spina bifida vel cervicalis vel dorsalis vel sacralis obseruetur. BERNSTEIN l. c.

33) MAYER l. c. p. 22.

34) *Versuche über die Reproduktion der Nerven.* Göttingen.

et inferior latior est et planior, pars media autem angustior et fere cylindrica. Corpusculum conicum, in quod corpus finitur, versus finem valde est acutum et plerumque unum <sup>35)</sup> vel duo <sup>36)</sup> habet corpuscula rotunda. Ligamentum <sup>37)</sup> ex infimo piaë matris apice productum per mediam caudam equinam excurrit, ubi per infimum duræ matris apicem elabitur et neruum imparem mentitur, tandem vero in osse coccygis dispersum definit. Diuiditur plerumque medulla spinalis in corpus et caudam equinam, quam diuisionem autem, cum tota medulla spinalis sit congeries funiculorum nerueorum seu cauda equina, assumere nequeo. Qua de causa totam medullam spinalem tanquam corpus considero eamque diuido 1) in corpus seu partem mediam, 2) in extremitatem superiorem et inferiorem seu conicam, 3) in superficiem anteriorem et posteriorem, 4) in superficiem lateralem dextram et sinistram. Superficies et anterior et posterior magis latiores et planiores sunt, laterales autem magis conuexae. Superficies dextra cum sinistra conuenit, utrisque enim ligamentum denticulatum adhaeret; superficies anterior autem a posteriori ratione fissuræ, quæ illi inest, differt. Hanc fissuram <sup>38)</sup>, quæ medullam spinalem aliqua ex parte in duas partes diuidit, ingreditur productio quædam piaë matris; sed medullam non intimius penetrat, quam ad eius portionem cineream usque quandoque vero non tam alte fila immittit <sup>39)</sup>. Superficiebus tandem et anteriori et posteriori, quæ una cum superficiebus lateralibus arcte inter se connexis, crenas et anteriores et posteriores dextras et sinistras constituunt, sulci quasi, quos arteriæ spinales ducunt, impressi sunt <sup>40)</sup>. Hisce momentis addi quoque adhuc potest vis reproductoria, quæ medullæ spinali inest, et quam Cel. ARNEMANN satis superque comprobauit <sup>41)</sup>. Sed hæc hæcenus! Transeamus nunc ad originem neruorum spinalium.

### SECTIO III.

## DE NERVIS SPINALIBUS.

### §. XI.

Hi nerui in eo conueniunt, quod omnes ex protuberantia annulari, uti nerui cerebrales, suam trahant originem. Sententiam meam quidem argumentis, quæ anatomia nituntur, suffulcire vel ad oculum, ut aiunt, demonstrare nequeo, substantia enim ita est comparata, ut nulla admittat instrumenta, interim tamen ratiocinia et experientia rem nostram optime probare videntur. Quis enim est, qui non experientia edoctus sciat, sibi, si pollex pedis acu tangatur, cum instrumento acuto vulnus esse inflictum? Numne autem determinare posset, quæ corporis pars esset vulnerata

35) MAYER l. c. Tab. IX. Fig. II.

36) Tab. nostr. I. Fig. 1.

37) HUBER l. c. Fig. II. Tab. nostr. I. Fig. 1.

38) HUBER. l. c. p. 5.

39) ibid. p. 5.

40) MAYERI *anatomische Beschreibung der Blutgefäße des menschlichen Körpers.* Tab. V. Fig. 1.

41) ARNEMANN *Versuche über das Gehirn und Rückenmark.* Tab. VI.



nerata, nisi filamenta neruea a parte vulnerata ad protuberantiam annularem usque sese extenderent ibique sensationis sedem constituerent? Ergo problema inueni, ut saltem mihi videtur, quandam prae se fert probabilitatem! Nonne quoque hac ratione Opisthotonus, cuius in Nouis Actis Tom. I. p. 16. naturae curiosorum mentio fit, explicari posset? Sed redeo ad nervos spinales, quorum numerus ad paria triginta sese extendit, ita ut cuilibet superficiei et dextrae et sinistrae nervi adscribantur triginta. Nomen suum debent partim numero seu ordini, quo se sequuntur, partim vertebrae, quas intercurreunt. Hac ex causa diuiduntur 1) in nervos cervicales seu colli, 2) in nervos dorsales seu thoracis, 3) in nervos lumbares, 4) in nervos sacrales. Nervorum cervicalium octo paria existunt, nervorum dorsalium duodecim numerantur, nervorum lumbarium quinque paria observantur, et tandem nervorum sacralium quoque quinque paria inveniuntur 1). Illustris de HALLER 2) undecim nervorum dorsalium paria tantum assumit, sex autem paria nervorum lumbarium, propterea quod par duodecimum nervorum dorsalium ratione structurae, progressus et distributionis magis cum nervis lumbareis, quam cum dorsalibus convenire videtur; utrum vero sententia viri summa quidem eruditione conspicui omnique observantia dignissimi fundata sit nec ne, non definio, nec definire audeo. Quamvis autem numerus nervorum spinalium certus atque destinatus esse videtur, tamen magna olim exorta fuit atque discrepantia inter scriptores anatomicos et veteres et recentiores de paribus nervorum dorsalium; WILLISIIUS enim par primum nervorum cervicalium nervis adscripsit cerebralibus et tantum viginti novem paria nervorum spinalium numeravit; sed ad hanc litem dirimendam optimum fuerit, disquirere, quomodo nervi cerebrales differant a spinalibus, ut exinde eluceat, quid sit constituendum. Cum autem HUBER 3) nec non ill. de ASCH 4) differentias nervos cerebrales inter et spinales intercedentes, optime constituerint, hac re supersedeo meque potius ad reliquam nervorum spinalium tractationem conuerto.

## §. XII.

Priusquam autem nervos spinales in specie tractandos mihi sumo, quaedam proprietates, omnibus nervis spinalibus competentes, praemittam, est necesse. Oriuntur itaque duplici radice, anteriori ex medullae spinalis superficie anteriori, posteriori ex medullae facie posteriori. Radix utraque plurimis gaudet filamentis in funiculos collectis; fasciculi per ligamentum denticulatum a se invicem separati et tunicis suis cincti, mox convergentes in foraminibus durae matris iunguntur, dein gangliiformem assumunt intumescuntiam, ita tamen, ut radices posteriores proprie tantum ganglia forment; anteriores vero gangliis absque ulla adinixione adhaereant; intra ganglion autem anteriores et posteriores coniunguntur, ita ut vel in truncum coeant verum vel plurimis filamentis tantum cohaereant 5). Radices nervorum cer-

L 2

vicalium

1) ibid.

2) l. c.

3) HUBER l. c. p. 8. §. VI.

4) ASCH. l. c. p. 37. §. XXVIII.

5) GÜNTHERI cerebri et nervorum distributionis expositio. Duisburgi 1786. p. 68.

vicalium breues sunt; radices nervorum dorsaliū autem eas cervicalium longitudine superant, radices tandem nervorum lumbarium longiores, sunt denique nervorum sacralium radices longissimae. Funiculi nervorum cervicalium recta via exeunt et angulum rectum constituunt; nervorum dorsaliū superiorum fasciculi iam a recta via deflectunt et deorsum vergunt; dorsales autem medii et inferiores nervi ad angulum acutum proxime accedunt; lumbares denique et sacrales summam patiuntur deflexionem, angulumque acutissimum constituunt. Radices nervorum cervicalium transversae sunt, reliquorum autem nervorum radices obliquae. Ganglia nervorum spinalium valde inter se differunt ratione magnitudinis. Ganglia a primo usque ad par octavum cervicale crescunt; dorsalia rursus decrescunt; lumbaria ad primum sacrale usque iterum crescunt, reliqua autem graciliora evadunt. Ganglia omnium nervorum spinalium ramos dimittunt duos, anteriorem, qui in quibusdam fit superior et nervum intercostalem magnum adgreditur, posteriorem, in quibusdam inferiorem, qui plerumque cum nervis colli, dorsi et lumborum coit.

### §. XIII.

#### A) *Nervi cervicales.*

Par primum nervorum cervicalium seu par decimum nervorum cerebri WILLISII, conflatur ex filamentis et anterioribus et posterioribus dextris et sinistris. Filamenta anteriora mox sub pari nono nervorum cerebri seu hypoglossō et supra iuxtaque par secundum nervorum spinalium ex medullae spinalis corpore exeunt atque extrorsum vergunt, ita tamen, ut filamenta semper arcte sibi sint apposita. Numerus eorum admodum varius est; interdum duo, tria, plerumque tamen quatuor, saepe quoque quinque <sup>6)</sup> inveniuntur, non raro septem <sup>7)</sup> adsunt. Cum posterioribus, summis et maximis varietatibus obnoxiiis, res non sic se habet. Plerumque duo vel tria vel quatuor, vel, quod autem rarissime fit, quinque observantur filamenta ex medulla spinali inter par hypoglossum et par secundum cervicale emergentia atque ad foramen suum intervertebrale excurrentia. Priusquam autem foramina sua destinata transeunt vario modo se habent, de quo autem infra ad descriptionem nervi accessorii loquar. Filamenta anteriora et posteriora radiatim convergunt et quidem anteriora descendunt; posteriora autem adscendunt <sup>8)</sup>, ita ut extrorsum vergendo ante ingressum in foramen intervertebrale se attingant atque tunicis medullam spinalem involventibus inuestita, ganglion illud <sup>9)</sup>, intra sulcum primae vertebrae <sup>10)</sup> et basin ossis occipitis <sup>11)</sup> situm, forment. Interdum, praecipue autem in corporibus iunioribus deesse videtur, reuera autem nunquam deest, sed si deesse videatur, intumescencia

6) HUBER l. c.

7) ASCH l. c.

8) ASCH l. c.

9) VIEUSSEN. l. c. Tab. XX. a. BANG nervor. cervical. anatome. Hauniae. Fig. I. N. 1. (— hor. script. neur. I.) ASCH l. c.

10) VESALIUS l. c. Libr. IV. Cap. XII. p. 534. sqq. INGRASSIAS in commentariis in GALENI librum de ossibus. Edit. Panormi 1603. fol. Cap. VII. Commentat. III. et V. p. 165. 167. 169. ASCH l. c.

11) HUBER l. c.



intumescencia gangliiformis valde tenuis tantum atque non satis conspicua inuenitur <sup>12)</sup>. Post intumescenciam ibi factam gangliiformem nervi truncus statim post egressum ex foramine suo intervertebrali in duos ramos anteriorem et posteriorem dispescitur <sup>13)</sup>. Ramus anterior minor est posteriori et, ut verbis Cel. ASCHII utar, transversim versus anteriora in propria scinita ossi insculpta prorepat in latere interiore arteriae, inter hanc et vertebra, iuxta lateralem vertebrae processum paulum descendendo <sup>14)</sup>; posterior autem anteriori maior spatium triangulare transit a musculo obliquo superiori, obliquo inferiori rectoque maiori formatum et posteriora versus paululum sursum ascendit <sup>15)</sup>. Ramus anterior varios dimittit furculos, musculo recto colli laterali <sup>16)</sup>, recto minori antico et recto maiori antico <sup>17)</sup>, denique ganglio cervicali superiori seu magno <sup>18)</sup> prospicientes parque hypoglossum adaugentes: ramus quoque posterior in varios secedit ramos, musculum cervicis obliquum inferiorem, ramum posteriorem paris secundi nervorum spinalium <sup>19)</sup>, rectum maiorem et minorem posticum <sup>20)</sup>, musculum denique complexum <sup>21)</sup> obliquum superiorem, colli rectum lateralem et obliquum superiorem <sup>22)</sup> petentes.

#### §. XIV.

Par secundum componitur ex filamentis et anterioribus et posterioribus, dextris et sinistris. Numerus eorum in eo consistit, ut funiculus anterior nervi dextri novem gaudeat filamentis; posterior autem octo: funiculus anterior nervi sinistri decem, posterior novem <sup>23)</sup>. Filamentum infimum lateris dextri et sinistri mox ad progressum in duos diuiditur ramulos <sup>24)</sup>, quorum alter filamenta paris secundi; alter autem funiculos tertii paris adgreditur <sup>25)</sup>. Filamenta haecce ad egressum suum e medulla spinali ita lateraliter sibi adposita sunt, ut lineam rectam fere constituent. Radiatim, quod lectores nostros semper meminisse volumus, convergendo truncum constituunt et arctissime inter se coniuncta tunicisque suis inuestita foramen suum intervertebrale petunt. Statim post ingressum truncus mutatur et intumescencia gangliiformis oritur <sup>26)</sup>, quae figuram rotundam, oblongiusculam refert et priori maior est <sup>27)</sup>.

L 3

Utrum

12) HUBER l. c. p. 26. §. XII.

13) ASCH l. c. p. 41. §. XXXI. Tab. III. Fig. III. γ. Fig. IV. α. Fig. V. π. BANG l. c. p. 5.

14) ASCH l. c. Tab. III. Fig. III. γ. s. Fig. IV. α. μ. Fig. V. π. ρ.

15) ASCH loc. cit. p. 41. fqq. Tab. III. Fig. III. γ. δ. Fig. IV. α. λ. Fig. V. π. ε.

16) ASCH l. c. Tab. III. Fig. III. ζ.

17) ibid. Tab. III. Fig. III. θ. α. λ. Fig. IV. ξ.

18) ibid. Tab. III. Fig. III. μ.

19) ibid. Tab. III. Fig. V. t. o. Fig. IV. XX.

20) ibid. Tab. III. Fig. V. φ. χ. ψ.

21) ibid. ω.

22) ibid. 123.

23) HUBER sex vel septem observavit filamenta.

24) Tab. nostra I. Fig. I.

25) WINSLOVII exposit. anatom. p. 179. num. 171. HUBER l. c. p. 44. §. XVII. HALLER elem. physiol. Tom. IV. Libr. X. Sect. VI. §. 35.

26) VIEUSSIEN l. c. Tab. XX. a. BANG l. c. Fig. I. N. II. HUBER loc. cit. Fig. I. N. 2.

27) HUBER l. c. p. 45. §. XVII.

Utrum nifus quidam formativus <sup>28)</sup> hic latens ganglia producat nec ne, in dubio relinquo. Ex ganglio nunc formato secedunt duo rami, quorum posterior anteriorem magnitudine seu crassitie antecedit. Utrique partibusadiacentibus prospeciunt. Rami anterioris ramulus adscendens <sup>29)</sup> coniungitur cum ramulo descendente primi cervicalis, dein cum ganglio nervi intercostalis cervicali magno <sup>30)</sup> et versus partem inferiorem circa sextam colli vertebrae cum pari nono et accessorio WILLISII; ramulus vero descendens cum anteriori tertii cervicalis <sup>31)</sup> et musculos rectos capitis et longum colli perreptat <sup>32)</sup>. Ramus posterior coit cum ramo posteriori primi paris cervicalis et ramo anteriori tertii cervicalis <sup>33)</sup>, unde ramus ad musculum splenium, complexum, trapezium <sup>34)</sup>, dein bientre cervicis perforato <sup>35)</sup> sub nomine occipitalis magni <sup>36)</sup> musculum occipitalem, galeam aponeuroticam capitis petit et cum tertio cervicali, nono, recurrente WILLISII et intercostali, portione dura et ramo paris quinti primo sese coniungit <sup>37)</sup>.

## §. XV.

Numerus filamentorum, ex quibus par tertium antrorsum et retrorsum componitur, in eo consilii, ut funiculus anterior nervi dextri ex octo constetur; posterior ex decem: funiculus autem anterior nervi sinistri ex septem; posterior vero ex octo <sup>38)</sup>. Filamentum infimum mox ad egressum ex medulla spinali in duo secedit filamenta valde exigua, quorum alterum cum filamentum primo seu supremo paris quarti coit; alterum autem una cum reliquis paris tertii filamentis duram transit meningem et suum petit foramen <sup>39)</sup>. Cum hic facile fieri queat, ut filamenta haecce cum iis nervo accessorio propriis confundantur, cum HUBERO <sup>40)</sup> in arte anatomica tyrones oro rogoque, ut huic rei animum probe intendant, ne sibi imponant. Caeterum filamenta modo supra commemorato truncum formant communem, qui, ut modo dixi, foramen suum petit intervertebrale, ubi in ganglion oblongiusculum degenerat <sup>41)</sup>. Rami, quos hocce dimittit ganglion diuiduntur in ramum anteriorem et posteriorem. Anterior varios exhibet ramulos. Primus <sup>42)</sup> cum nervo intercostali

28) III. BLUMENBACH *über den Bildungstrieb und das Zeugungsgeschäfte*. Göttingen 1781.

29) BANG l. c. Fig. I. Num. 13.

30) BANG l. c. Fig. I. α. WINSLOW *Exposit. anatomiq.* pag. 179. sqq. N. 171. 172.

31) BANG l. c. Fig. I. e.

32) GÜNTHERI cerebri et nervorum distributionis expositio. Duisburgi 1786. P. 70.

33) BANG l. c. Fig. I. Num. 17.

34) BANG l. c. Fig. I. Num. 20. GÜNTHER l. c. p. 70.

35) BANG l. c. Fig. I. 18. GÜNTHER l. c. p. 70.

36) BANG l. c. Fig. I. 18.

37) BANG l. c. Fig. I. 21. 26. GÜNTHER l. c. p. 70.

38) HUBER filamentorum posticorum plerumque novem vel decem, anticorum fere totidem; sed voluminis minoris observavit.

39) Tab. nostra I. Fig. I.

40) l. c. p. 46. §. XVIII.

41) VIEUSSEN. l. c. Tab. XXIV. l. a. BANG l. c. Fig. I. num. III. HUBER. l. c. Fig. I. num. 3.

42) BANG l. c. Fig. I. 22.



stali associatur <sup>43)</sup>, secundus <sup>44)</sup> mox infra <sup>45)</sup> rami anterioris secundi paris anastomosis cum ramulo descendente noni paris arcum constituit acutum, ex quo rami <sup>46)</sup> laryngem petentes oriuntur; tertius <sup>47)</sup> denique cum ramo quarti paris <sup>48)</sup> coniunctus in muscolum trapezium, splenium et complexum distribuitur. Ex hoc et ramulo, qui a secundi paris anteriori <sup>49)</sup> ortus huic additur, enascitur demum nervus occipitalis parvus <sup>50)</sup>, qui ramulo ab eiusdem huius paris <sup>51)</sup> ramo posteriori auctus, ramulum dimittit, qui deorsum vergendo <sup>52)</sup> cum nervo paris octavi accessorio <sup>53)</sup> nec non occipitali magno <sup>54)</sup> coit et ramulum <sup>55)</sup> cum paris quarti <sup>56)</sup> ramo anteriori communicantem dimittit. Praeter hasce ramificationes nervus quoque noster adhuc dividitur in nervum auricularem principalem <sup>57)</sup> et superficiale collis <sup>58)</sup>. Nervus auricularis principalis seu magnus posterior secedit in ramos duos anteriorem <sup>59)</sup> scilicet et posteriorem <sup>60)</sup>. Anterior mox rursus dehiscit in ramum anteriorem <sup>61)</sup>, medium <sup>62)</sup> et posteriorem <sup>63)</sup>. Ramus anterior dimittit primum furculum anastomoticum cum medio collis superficiali <sup>64)</sup>, deinde ramum <sup>65)</sup>, qui cum auriculari portionis durae nervi acustici anteriori coit, tunc furculum <sup>66)</sup>, qui helici auri eiusque cauo prospicit, denique filum <sup>67)</sup>, quod in partem helicis posteriorem distribuitur. Ramus medius partes auri proxime adjacentes perrepat; posterior autem cum auriculari portionis durae nervi auditorii posteriori communicat <sup>68)</sup>. Posterior ramus superiori, posterioribus et anteriori auriculae musculo prospicit. Nervus superficialis collis mox post ramuli ab anteriori auricularis principalis accessum in duos distribuitur ramos superiorem et inferiorem. Superior tres dimittit ramulos. Primus <sup>69)</sup> cum superiori collis superficiali, secundus autem cum superficiali infimo <sup>70)</sup> coit, tertius denique <sup>71)</sup> in glandulas et panniculum collis adiposum distribuitur. Ramus inferior <sup>72)</sup> nunc cum medio superficiali <sup>73)</sup> anastomosin init, nunc musculo platismamyoidi prospicit et ramulos <sup>74)</sup> integumenta subrepentes exhibet et superficiales <sup>75)</sup> et profundiores <sup>76)</sup>, qui musculo complexo, splenio, multifido et transversis vertebrarum musculis provident.

§. XVI.

Par quartum ratione filamentorum seriei eandem habet rationem cum prioribus; respectu autem numeri filamentorum inter se differt. Funiculus anterior nervi dextri octo gaudet filamentis; posterior decem; anterior sinistri septem; posterior novem. Crassities filamentorum iam aliqua ex parte decrescere incipit et Ganglion aliam

- |               |               |               |               |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 43) ibid. A.  | 44) ibid. 23. | 61) ibid. 32. | 62) ibid. 37. |
| 46) ibid. c.  | 46) ibid. 24. | 63) ibid. 38. | 64) ibid. 33. |
| 47) ibid. 25. | 48) ibid. h.  | 65) ibid. 34. | 66) ibid. 35. |
| 49) ibid. 15. | 50) ibid. 26. | 67) ibid. 36. | 68) ibid. E.  |
| 51) ibid. f.  | 52) ibid. 28. | 69) ibid. Z.  | 70) ibid. 45. |
| 53) ibid. E.  | 54) ibid. 30. | 71) ibid. 44. | 72) ibid. 45. |
| 55) ibid. 29. | 56) ibid. g.  | 73) ibid. 41. | 74) ibid. 46. |
| 57) ibid. 30. | 58) ibid. 40. | 75) ibid. 47. | 76) ibid. 48. |
| 59) ibid. 31. | 60) ibid. 38. |               |               |

aliam induit formam atque figuram scilicet rotundiores<sup>77)</sup>. Ramus anterior, quem Ganglion dimittit, mox postquam cum sympathico magno coniuit<sup>78)</sup> et anastomosin cum ramo tertii anteriori<sup>79)</sup> iniuit, nervum diaphragmaticum seu phrenicum<sup>80)</sup> producit, qui in septum transversum distributus cum sympathico magno plexibusque abdominalibus varias constituit communicationes. Nunc ramus paris nostri quarti anterior in ramulum posteriorem<sup>81)</sup>, medium<sup>82)</sup> et anteriorem<sup>83)</sup> secedit. Posterior denuo dehiscit in ramum supra<sup>84)</sup> et infra spinalem<sup>85)</sup>; medius fatiscit in plures ramulos<sup>86)</sup> partim humerum, partim superiores thoracis partes et claviculam adgredientes<sup>87)</sup>. Anterior exhibet ramulum clavicularem medium<sup>88)</sup>, anteriorem<sup>89)</sup> et anastomoticum<sup>90)</sup> cum ramo quinti paris anteriori<sup>91)</sup>. Ramus posterior paris quarti ramum emittit, qui post communicationem<sup>92)</sup> cum nervo tertii paris anteriori<sup>93)</sup> in ramum superficiale<sup>94)</sup> et profundum<sup>95)</sup> secedit.

## §. XVII.

Par quintum cum prioribus quoad ortum, egressum, directionem, modum conjunctionis filamentorum, transitum et denique gangliorum constructionem<sup>96)</sup> prorsus convenit, ratione filamentorum autem, quae funiculos nervorum constituunt, ab illis differt. Funiculus enim nervi dextri ex septem conflatur filamentis, posterior autem decem; anterior sinistri octo; posterior vero novem habet<sup>97)</sup>. Rami, quos Ganglion emittit, dividuntur in ramum anteriorem et posteriorem. Ramus anterior duo emittit filamenta, quorum alterum<sup>98)</sup> cum nervo intercostali, alterum<sup>99)</sup> autem cum ramo quarti paris<sup>100)</sup> anteriori coit. Rami truncus deinde ulterius progreditur et cum sexto et septimo pari nervorum cervicalium coniunctus, nervum thoracicum maiorem<sup>1)</sup> constituit atque musculo scaleno, rhomboideo et trapezio prospicit, nec non nouo a pari sexto ramulo auctus suprascapularem producit<sup>2)</sup>. Intrat quoque inferius ganglii cervicalis superioris tuber eiusque nec non nervi phrenici volumen auget<sup>3)</sup>. Eum in finem sub musculo intertransversario anteriori processibus transversis quartae quinaeque vertebrae interposito emergit et inter capitis muscu-

77) VIEUSSEN l. c. Tab. XXIV. a. HUBER l. c. Fig. 4. BANG l. c. Fig. 1. Num. IV.

78) NEUBAUER descriptio anatomica nervorum cardiacorum. Tab. II. Fig. 1. BANG l. c. Fig. 1. 49.

79) ibid. e.

80) VIEUSSEN l. c. Tab. XXIII. 58. 97. Tab. XXIV. VESAL. loc. cit. Tom. II. p. 373. Fig. III. l. n. n. EUSTACHIUS Tab. XVIII. Fig. II. BANG l. c. Fig. 1. 50. NEUBAUER l. c.

81) BANG l. c. Fig. 1. 51.

82) ibid. 54. 83) ibid. 57.

84) ibid. 52. 85) ibid. 53.

86) ibid. 55. 87) ibid. 56.

88) ibid. 58.

90) ibid. 60.

92) ibid. 61.

94) ibid. 62.

96) VIEUSSEN loc. cit. Tab. XXIV. a. HURER l. c. Fig. 1. 5. BANG l. c. Fig. 1. Num. V.

97) HUBER plerumque novem vel decem observavit.

98) BANG l. c. 64.

99) BANG l. c. Fig. 1. 65.

100) BANG l. c. Fig. 1. g.

1) ibid. 67.

2) ibid. 70.

3) NEUBAUER loc. cit. Tab. II. Fig. 1. Num. 59. 63.



musculum rectum internum maiorem et longum colli ad ganglion decurrit <sup>4)</sup>. Ramus posterior in duos secedit ramulos supra <sup>5)</sup> scilicet et inframultifidum <sup>6)</sup> spinæ et ganglio supra commemorato varios largitur furculos <sup>7)</sup>.

§. XVIII.

Par sextum easdem cum prioribus habet qualitates exceptis filamentis, quorum numerus in eo consistit, ut funiculus nervi dextri anterior ex tribus constet; posterior autem ex quatuor: anterior sinistri ex septem; posterior vero ex novem. Ganglion <sup>8)</sup>, quod locum suum inter vertebra quintam et sextam occupat, duos in ramos secedit, anteriorem scilicet et posteriorem <sup>9)</sup>. Anterior <sup>10)</sup> detrudit ramulum <sup>11)</sup>, qui post coniunctionem cum nervo intercostali <sup>12)</sup> ramum cum quinto et septimo pari coeuntem <sup>13)</sup> emittit et mammis, musculo pectorali maiori, subclavio et subscapulari prouidet <sup>14)</sup>. Praeter hosce ramos dimittit quoque furculum <sup>15)</sup>, qui cum septimi paris <sup>16)</sup> ramulo deorsum vergente coniunctus et ramo anastomotico quinti paris auctus, ramum exhibet <sup>17)</sup>, cum ramulo septimi paris coeuntem. Nervus thoracicus minor <sup>18)</sup>, qui exinde enascitur, integumenta communia perreptat et in musculum scalenum furculos distribuit <sup>19)</sup>. Ramus posterior ramulos spargit ad musculum sacro-lumbalem, semispinalem colli seu cervicis, multifidum spinæ, scalenum posticum et intertransversarium colli posteriorem migrantes.

§. XIX.

Par septimum, a prioribus plane non diversum, cuius funiculi nervi et anteriores et posteriores ex quatuor plerumque componuntur filamentis, post coniunctionem filamentorum et intumescuntiam in Ganglion <sup>20)</sup> in suos ramos secedit duos, superiorem nempe et inferiorem. Ramus superior, furculum <sup>21)</sup>, qui ganglion cervicale infimum rariori tamen in casu adgreditur <sup>22)</sup> emittit et ramulum <sup>23)</sup> nervo thoracico maiori constituendo inseruiem non solum exhibet; sed etiam cum pari sexto communicantes furculos diffundit <sup>24)</sup>. Ramus inferior ramulos spargit musculis pectoralibus et maiori et minori, serrato antico maiori et subscapulari prospicientes. Par octavum ratione filamentorum, quae funiculos et anteriores et posteriores componunt, cum pari septimo convenit. Ramus anterior, qui ex ganglio, quod

4) NEUBAUER loc. cit. Tab. II. Fig. 1. Num. 172.

5) BANG l. c. Fig. 1. 71.

6) ibid. 72.

7) NEUBAUER l. c. p. 61. §. XI.

8) VIEUSSEN l. c. Tab. XXIV. a. HUBER l. c. Fig. 1. 6. BANG loc. cit. Fig. 1. Num. VI.

9) GÜNTHER l. c. p. 52.

10) GÜNTHER l. c.

11) BANG loc. cit. 73.

12) BANG l. c. Fig. 1. A.

13) ibid. 74.

14) GÜNTHER l. c. 15) ibid. 75.

16) ibid. 84. 17) ibid. 76.

18) ibid. 77. 19) ibid. 79.

20) VIEUSSEN loc. cit. Tab. XXIV. a. HUBER l. c. 7. BANG l. c. Num. VII.

21) BANG l. c. β.

22) NEUBAUER l. c. p. 125.

23) BANG l. c. 81.

24) BANG l. c. Fig. 1. 82. 83. 84.

quod filamenta formant, oritur, mox post originem suam cum ganglio cervicali infimo communicationem init et novum detrudit furculum <sup>25)</sup>, qui ramum primi paris dorsalis anteriorem <sup>26)</sup> nec non par cervicale septimum petit; ramus autem posterior in musculos distribuitur profundos.

## §. XX.

B) *Nervi dorsales.*

Paris primi nervorum dorsaliū filamenta et antica et postica <sup>27)</sup> descendendo conuergunt neruique truncum constituunt, qui post transitum per vertebra primam et secundam thoracis, tunicis suis inuestitus, inter foramen intervertebrale intumescit et ganglion rotundum non adeo magnum insequentibus tamen dorsalibus paulo crassius format <sup>28)</sup>. Ganglion hocce, quale per omnes nervos dorsales quoque inuenitur, duos emittit ramos, anteriorem scilicet et posteriorem. Ex anteriori semper oritur primum ramus anastomoticus duplex cum nervo intercostali <sup>29)</sup>, deinde ramus costalis vel intercostalis proprius, qui ramum et musculos intercostales et telam cellulosa petentem dimittit <sup>30)</sup>; posterior autem furculos dat, qui non solum musculis dorsalibus et cuti prospiciunt, sed etiam cum pari nervorum cervicalium octavo nec non nervis axillaribus anastomosin ineunt <sup>31)</sup>. Quamvis autem quinti, sexti, septimi et octavi paris nervorum cervicis et paris primi nervorum dorsī eorumque distributionis aliqua ex parte iam mentionem fecerim, restat tamen, ut quoque reliquarum horum nervorum ramificationum, quarum ope *plexum brachialem* constituunt, memor sim. Nervi itaque huncce plexum modo commemoratum formantes sequenti ordine sese excipiunt. Par septimum, praecipue autem par quintum et sextum nervo musculo-cutaneo externo suam exhibent originem <sup>32)</sup>, qui exteriorem seu radialem totius brachii aequae quam manus regionem petit et perforato musculo coraco-brachiali tactisque musculis, bicipite, brachiali interno et supinatore longo, versus eutem partis brachii radialis decurrit et in dorso manus finitur <sup>33)</sup>. Par quintum, sextum et septimum, nec non par primum nervorum dorsaliū, nervum producunt medianum <sup>34)</sup>, qui ex ramo mere subcutaneo et ramo superficiali inediani conflatus, usque ad pronatorem teretem nulli obnoxius est ramificationi <sup>35)</sup>. Hic autem et quidem ante ingressum suum in plicam cubiti duos vel tres ramos dimittit constantes adeo, ut semper brachiali externo seu capiti tertio et infimo extensoris cubiti nec non pronatori tereti atque cuti prospiciant <sup>36)</sup>. Truncus, qui ulterius nunc progre-

25) BANG l. c. 87. 26) ibid. 88.

27) Filamentorum numerus plerumque in quinque vel sex consistit.

28) VIEUSSEN loc. cit. Tab. XXVII. d. HUBER loc. cit. r. c.

29) GÜNTHER Cerebri et nervorum distributionis expositio. Duisb. 1786. p. 80.

30) GÜNTHER l. c. p. 80.

31) GÜNTHER l. c.

32) KLINT commentatio anatomica de nervis brachii. Goetting. 1784. praefat. — hor. script. T. III.

33) KLINT l. c. pag. 5. sqq.

34) KLINT l. c. Praefat.

35) KLINT l. c. p. 12. sqq.

36) KLINT l. c.



progreſſitur, denuo ſecedit 1) in ramum minorem, 2) in ramum maiorem 3) ramulos plures valde exiguos et denique 4) in ramum interoſſeum<sup>37)</sup>. Continuatus, qui iam oculis noſtris perſpici poteſt mediani truncus, ſurculum minorem et maiorem ſeu ramum cutaneum longum MARTINI<sup>38)</sup> dimittit, qui poſterior etiam in tendinem flexoris radialis, ligamentum carpi et cutem diſtribuitur<sup>39)</sup>. Truncus tandem vel ſupra vel infra ligamentum carpi duos detrudit ramos, digitorum latera demum petentes.

### §. XXI.

Par quintum, ſextum, ſeptimum nec non octauum neruorum cervicalium ut et par primum neruorum dorfalium neruum radialem atque axillarem generant<sup>40)</sup>. Nerui radialis truncus varias ſubit diuiſiones. A natura enim mox diuiditur 1) in ramum primum ſeu ſubcutaneum internum<sup>41)</sup>, 2) in ramum ſecundum<sup>42)</sup> ſoli capiti longiori muſculi anconaei impertitum; 3) in ramum tertium<sup>43)</sup>, qui per anconaeum ſecundum diſtribuitur; 4) in ramum quartum<sup>44)</sup>, qui caput tricipitis ſecundum petit; 5) in ramum quintum<sup>45)</sup>, qui per duo inferiora tricipitis ſeu extenſoris cubiti capita diſtribuitur; 6) in ramum ſextum et ſeptimum ſeu ſubcutaneum externum ex radiali<sup>46)</sup>; 7) in ramum octauum<sup>47)</sup>, qui radiali interno impertitur et ſurculos ad ſupinatores migrantes ſpargit; 8) in ramum nonum ſuperficiale et decimum profundum<sup>48)</sup>; ſuperficialis ſecedit in ramum volarem<sup>49)</sup> et dorfalem<sup>50)</sup> et dorfaliſ iterum dehincit in ramos duos, multifidum<sup>51)</sup> ſcilicet et bifidum<sup>52)</sup>; profundus autem largitur neruum interoſſeum<sup>53)</sup> et ramum muſcularẽ<sup>54)</sup>, qui poſt diſtributionem multorum filamentorum ulnarem carpi partem demum petit. Axillaris ſeu articularis ſeu ramus radialis primarius ſtatim ab ortu primum ſurculum<sup>55)</sup> ad vaſa et glandulas dimittit axillares, mox ſecundum ramum maiorem<sup>56)</sup> emittit teretem minorem, maiorem et latiffimum dorfı perreptantem. Tandem truncus ipſe duos exhibet ramos. Minor ex ordine tertius ſeu cutaneus humeri externus<sup>57)</sup> per teretem minorem, deltoideum nec non per cutem diſtribuitur; maior autem muſculum deltoideum ingreditur ibique finitur<sup>58)</sup>.

### §. XXII.

Neruus cubitalis cum binis nervis muſculo-cutaneis internis, minori vel ulnari et maiori vel medio maxima ex parte componitur ex pari octauo neruorum cervicalium et primo neruorum dorfalium<sup>59)</sup>. Hunc inde formatum truncum nerueum

M 2

ingre-

- 37) KLINT l. c. Tab. adieſt. 16. 17. ſqq.  
38) Cel. MARTINUS de nervis corporis humani. Tom. II. p. 213.  
39) KLINT l. c.  
40) KLINT l. c. praefat. Tab. adieſt. 2. 3.  
41) ibidem. pag. 29. ſqq.  
42) ibid. l. c.  
43) ibid. l. c.  
44) ibid. l. c.

- 46) ibid. l. c.  
48) ibid. pag. 30. ſqq.  
49) ibid. l. c.  
51) ibid. l. c.  
53) ibid. l. c.  
55) ibid. l. c.  
57) ibid. l. c.  
59) ibid. l. c.

- 47) ibid. l. c.  
50) ibid. l. c.  
52) ibid. l. c.  
54) ibid. l. c.  
56) ibid. l. c.  
58) ibid. l. c.

ingreditur radix altera in plerisque cadaueribus, ut Cel. KLINT observauit, a septimo neruorum cervicalium pare, cuius maxima pars in medianum consumitur <sup>60</sup>). Nervi cubitalis truncus, cui neruus radialis constantem et satis insignem ramum largitur anastomoticum <sup>61</sup>), varias efficit ramificationes et quidem diuinit 1) ramum primum seu subcutaneum ex cubitali Ill. WRISBERGH <sup>62</sup>), 2) ramum secundum, qui carnes ulnaris flexoris seu interni transit <sup>63</sup>), et 3) ramum tertium, qui flexorem profundum adgreditur <sup>64</sup>), denique ramum quartum <sup>65</sup>) reliquis magnitudine non cedentem <sup>66</sup>). Circa iuncturam cubiti atque inanus truncus denuo abit in ramum dorsalem et volarem <sup>67</sup>) seu anteriorem et posteriorem. Ramus dorsalis tres emittit ramulos, minorem scilicet seu ramum carpeum <sup>68</sup>), maximum seu verum neruum dorsalem manus <sup>69</sup>), qui iterum in duos ramos fatiscit, quorum unusquisque in duos dispescitur ramulos digitum annularem et minimum seu auricularem petentes <sup>70</sup>) et denique ramum superioribus paulo minorem <sup>71</sup>). Ramus posterior seu volaris transit interdum in ramum sublimem <sup>72</sup>) et profundum <sup>73</sup>); cum autem haecce diuisio non constans sit, distributio in ramum muscularem et minimum, sextum neruum digitale, ramum cutaneum, ramum communicantem cum neruo digitali quarto et mediano, neruum digitale quintum et tandem ramum profundum proprie sic dictum, cuius descriptionem ingenuam Cel. KLINT nobis exhibuit <sup>74</sup>), erat proferenda atque asseruanda <sup>75</sup>). Nervi musculo-cutanei interni minoris vel ulnaris truncus <sup>76</sup>) dehiscit in ramum minorem seu posteriorem <sup>77</sup>), in ramum maiorem seu potius anteriorem <sup>78</sup>), quorum distributionem Cel. KLINT concinne descripsit <sup>79</sup>); truncus nervi musculo-cutanei interni maioris seu medii <sup>80</sup>) autem detrudit primum ramum subcutaneum primum <sup>81</sup>), deinde ramum mere quoque subcutaneum secundum <sup>82</sup>), tunc ramum tertium <sup>83</sup>) seu cutaneo-ulnarem WRISBERGH <sup>84</sup>) et denique quartum cutaneum palmare WRISBERGH <sup>85</sup>). Neruus cutaneo-ulnaris ramulum maiorem et minorem spargit, partim musculis prospicientes, partim cum neruis anastomoses ineuntes <sup>86</sup>); cutaneus palmaris autem ramum exhibet magis palmarem et ramum magis ulnarem, qui posterior iterum ramum priorem et posteriorem constituit <sup>87</sup>).

Sed

60) *ibid.* l. c.

61) KLINT l. c. p. 42. §. XXI.

62) KLINT l. c. p. 43.

63) KLINT loc. cit. p. 43.

64) KLINT l. c.

65) WINSLOW exposit. anatomiq. III. p. 278. §. 234. KLINT loc. cit. pag. 43. §. XXI.

66) KLINT l. c.

67) KLINT l. c. p. 44. §. XXII.

68) KLINT l. c. §. XXIII.

69) KLINT l. c. p. 45.

70) KLINT l. c. p. 45.

71) KLINT l. c. p. 45.

72) KLINT l. c. §. XXIV.

73) *ibid.* l. c.

74) KLINT l. c. §. XXV.

75) KLINT l. c. §. XXIV.

76) KLINT Tab. Num. 1. 8.

77) KLINT Tab. 9. 78) *ibid.* Num. 10.

79) KLINT l. c. §. XVIII. fqq.

80) KLINT Tab. 6. 20. 21. 22. 23. 24. 25. cet.

81) KLINT l. c. §. XXVII. Tab. lit. bb.

82) *ibid.* l. c. 83) *ibid.* l. c.84) *ibid.* l. c. 85) *ibid.* l. c. §. XXIX.

86) KLINT l. c. §. XXVIII. p. 54.

87) *ibid.* l. c. p. 56. §. XXX.



Sed haec haecenus! Redeamus potius in viam et reliqua nervorum dorsaliū paria consideremus.

§. XXIII.

Omnes reliqui nervi dorsales a pari secundo usque ad par duodecimum quamvis omnibus in rebus sibi sint simillimi; in eo tamen a superioribus differunt, quod prioribus simpliciōri gaudeant structura<sup>88)</sup>. Horum nervorum filamenta prioribus aliqua ex parte graciliora<sup>89)</sup>, quorum numerus in eo consistit, ut tria vel quatuor<sup>90)</sup> fasciculum seu chordulam constituent<sup>91)</sup>, ex protuberantia annulari suam trahunt originem et, dum descendendo ex superficiebus et anteriori et posteriori dextrorsum et sinistrorsum prodeunt, deorsum vergunt<sup>92)</sup>. Filamenta haecce, arcte inter se coniuncta<sup>93)</sup> semper ad exitum suum ex medulla spinali spatium vel maius vel minus inter filamenta superiora et inferiora relinquunt<sup>94)</sup> descendendoque extrorsum vergunt<sup>95)</sup> ita tamen, ut duram meningem modo altius modo interius subeundo,<sup>96)</sup> foramina sua intervertebralia petant, ibique ganglia superioribus tenuiora<sup>97)</sup> forment. Rami, quos edunt ganglia, in anteriores et posteriores diuiduntur omnesque quoad maximam partem unam eandemque subeunt distributionem<sup>98)</sup> et ratione structurae magnitudinisque<sup>99)</sup> sibi sunt simillimi; interim tamen nervi thoracem petentes minores sunt, cum rami ad tractum costarum excurrentes tenuioribus tantum musculis inferantur<sup>100)</sup>. Horum ramorum diuisio in eo consistit, ut ramuli surculos ad musculos intercostales, ferratos maiores et ferratos posticos superiores dimittant et cervicalibus descendētibz, triangulari sterni, mediastino anteriori et longissimo dorzi ramulos vel maiores vel minores exhibeant<sup>1)</sup> nec non integumentis infimam thoracis partem occupantibus et partibus abdominis continentibus prospiciant musculumque sacro-lumbarem perrepent<sup>2)</sup> ramulosque emittant, qui appendicibus diaphragmaticis, lumbaribus, quadrato lumborum et iliaco interno demum impenduntur<sup>3)</sup>.

M 3

§. XXIV.

88) HUBER l. c. p. 52. §. XXII. MAYER l. c. p. 31.

89) HUBER l. c. p. 52. §. XXII.

90) Cl. HUBER semper bina vel terna observavit.

91) HUBER l. c. 92) HUBER l. c.

93) HUBER l. c. Fig. II. Tab. nostr. I. Fig. I. VIEUSSEN. l. c. Tab. XX. Fig. II. EUSTACHI Tab. XVII.

94) Tab. nostr. I. Fig. I. HUBER l. c. Fig. II. VIEUSSEN. loc. cit. Tab. XX. Fig. II. EUSTACHI Tab. XVII. Fig. II.

95) Tab. nostr. I. Fig. I. HUBER l. c. Fig. II. VIEUSSEN. loc. cit. Tab. XX. Fig. II. BIDLOO l. c. Tab. X. Fig. I.

96) HUBER l. c. p. 52. §. XX.

97) VIEUSSEN. l. c. Tab. XXVII. d. d. d. d. cet. HUBER l. c. Fig. I. c. c. c. c. cet. Tab. nostr. I. Fig. II. G.

98) GÜNTHER l. c.

99) MAYER l. c. pag. 31.

100) LUDWIGII observationes nonnullae de plexibus nervorum abdominalium atque nervo intercostali duplici. Lipsiae 1772. — hor. script. neur. T. III.

1) GÜNTHER loc. cit. VIEUSSEN. l. c. Tab. XXVII. c. c. cet. f. f. cet.

2) VIEUSSEN. loc. cit. Tab. XXVII. g. g. cet. h. GÜNTHER loc. cit. SCHAAR-SCHMIDTS *neurologische Tabellen* p. 76. sqq.

3) GÜNTHER l. c.

## §. XXIV.

## C) Nervi lumbares.

Eadem, quae prioribus competit origo, quoque hisce, de quibus nunc nobis erit sermo, adscribi debet; Filamenta, ex quibus conflantur, admodum variant. Anticorum sunt vel duo, vel tria, vel quatuor; posteriorum autem vel tria, vel quatuor, vel quinque, vel sex <sup>4)</sup>. Interstitia, quae haecce filamenta in parte superiori et media medullae spinalis constituebant, hic evanescent et tam arcte sibi sunt adposita, ut alterum attingat alterum, praesertim circa superficiem medullae spinalis anteriorem <sup>5)</sup>, ubi in media corporis parte fere communicant <sup>6)</sup>. Cl. HUBERI figura secunda <sup>7)</sup>, quae faciem medullae spinalis posteriorem secundum figurarum, quam adiecit, explicationem, repraesentare debet, hocce exhibet phaenomenon; cum autem in facie posteriori nunquam <sup>8)</sup>, semper vero in facie anteriori id observare mihi contigerit, temperare vix mihi possum, quin credam, vel summam, de qua autem vir celeberrimus in explicatione tabulae nullam fecit mentionem, interdum locum habere variationem, vel pictorem inscio HUBERO anteriorem loco posterioris faciei depingendam curasse. Hac re igitur commotus hancce medullae spinalis partem a facie anteriori denuo depingendam atque cum lectoribus meis beneuolis communicandam putavi <sup>9)</sup>. Sed redeo ad nostra filamenta nervea, quae ad egressum suum ex medulla spinali descendendo angulum valde acutum <sup>10)</sup> constituunt atque post coniunctionem funiculorum et anteriorum et posteriorum inter se extrorsum vergendo duram meningem transeunt, foramina sua intervertebralia petentes. Simulac autem haecce attigerint, intra cava, quae vertebrae spinae dorsii constituunt, in ganglia sua prioribus paulo grandiora <sup>11)</sup> intumescunt variasque tunc patiuntur ramificationes, quae in genere in eo consistunt, ut nervi lumbares cum intercostali coniunctionem ineant et singuli cum superiori et inferiori communicent <sup>12)</sup>. Sed quilibet nervus ratione diuicationis suae seorsum nobis est considerandus. Trunci s itaque nervi lumbaris primi secedit in quatuor ramos, quorum primus seu spermaticus externus musculum psoam transit, vasorum spermaticorum tractum petit, vesicae urinae furculos largitur et tandem ante annulum abdominalem in duos abit ramos, inguinalem scilicet internum et externum seu cutaneum anteriorem femoris <sup>13)</sup>. Secundus ad iliacum internum et cutem anteriorem et inferiorem migrat abdominis <sup>14)</sup>; tertius inter musculum transversum et oblique adscendentem transit eiusque aponeurosin permeat et postquam varios dimisit furculos, in nervum abit ingui-

4) HUBER l. c. p. 53. sqq.

5) Tab. nostr. I. Fig. III. VIEUSSSEN l. c. Tab. XX. Fig. III.

6) Tab. nostr. I. Fig. III.

7) HUBER l. c.

8) VIEUSSSEN l. c. Tab. XX. Fig. II. Tab. XXI. a. a. a. EUSTACHI Tab. XVII. Fig. II. Tab. nostr. I. Fig. I.

9) Tab. nostra I. Fig. III.

10) HUBER l. c. MAYER l. c.

11) VIEUSSSEN l. c. Tab. XXVIII. aaaa. cet. HUBER l. c. Fig. I. cc. cet. Tab. nostr. I. Fig. II.

12) GÜNTHER l. c. p. 81.

13) GÜNTHER l. c. p. 81.

14) GÜNTHER l. c.



inguinalem <sup>15)</sup>; quartus denique capiti communi sacro-lumbaris et longissimi dorsi prospicit inque nates tandem distribuitur <sup>16)</sup>.

### §. XXV.

Nervus lumbaris secundus ramulos ad musculos abdominales, scrotum, cutis femoris anteriorem, musculum transversum et fasciam denique latam dimittit <sup>17)</sup>; tertius autem, quartus et quintus ramos musculis lumborum posterioribus prospicientes detrudunt <sup>18)</sup>. Praeter hasce, quas modo commemoravi ramificationes, par primum, secundum, tertium et quartum nervorum lumbarium quoque alias subit distributiones, nervo crurali <sup>19)</sup> constituendo inferuientes. Hicce nervus, quem Ill. de HALLER <sup>20)</sup> femoralem magnū seu anteriorem appellat, ex duobus componitur truncis maioribus, quorum alterum nervus lumbaris primus, qui cum secundo sub angulo acutissimo ramulo communicante sese coniungit atque ramum anteriorem seu minorem et anteriorem seu maiorem emittit, format <sup>21)</sup>; alterum autem nervus lumbaris quartus <sup>22)</sup> nec non furculus tertii <sup>23)</sup> interdum quoque quinti <sup>24)</sup> ut et cruralis accessorius <sup>25)</sup>, qui plerumque ex trunco lumbaris tertii oritur, constituit. Ante ingressum suum in femur ipsum duos plerumque spargit furculos musculum iliacum internum petentes, quorum superior ramulum exhibet <sup>26)</sup>; inferior autem musculum ipsum perreptat <sup>27)</sup>. Truncus, qui nunc ulterius progreditur et truncum continuatum constituit, abit 1) in nervum musculi sartorii breuem <sup>28)</sup> et longum <sup>29)</sup>, 2) cutaneum medium <sup>30)</sup> anteriorem <sup>31)</sup> et internum <sup>32)</sup>, 3) in nervum musculi liuidi seu pectinei <sup>33)</sup>, 4) in nervum recti femoris <sup>34)</sup>, 5) nervum breuem musculi crucei <sup>35)</sup> et vasti externi <sup>36)</sup>, 6) in nervum musculi vasti externi longum <sup>37)</sup>, 7) in nervum longum musculi crucei <sup>38)</sup>, 8) in nervum breuem musculi vasti interni <sup>39)</sup>, 9) in nervum musculi vasti interni longum <sup>40)</sup>, 10) in nervum saphenum <sup>41)</sup>, qui denuo in nouemdecim ramos <sup>42)</sup> secedit, quorum recensitioni autem immorari nequeo, sed lectores ad dissertationem ipsam exacte elaboratam remitto neque potius ad originem et distributionem nervi obturatorii conuerto. Hicce nervus <sup>43)</sup>, qui suam debet originem vel pari secundo, tertio et quarto vel primo ac secundo vel

tertio

15) GÜNTHER I. c.

16) *ibid.* I. c.

24) STYX I. c.

25) STYX I. c.

17) *ibid.* I. c.

18) *ibid.* I. c.

26) STYX I. c.

27) STYX I. c.

19) Cel. STYX descriptio anatomica nervi cruralis et obturatorii. Ienae 1784. Tab. I. I. I.

28) STYX Tab. I. No. 5.

29) Tab. I. No. 9.

30) *ibid.* 18.

31) *ibid.* 45.

32) *ibid.* 47.

33) *ibid.* 78.

34) *ibid.* 81.

35) *ibid.* 89.

36) *ibid.* 91.

37) *ibid.* 98.

38) *ibid.* 103.

39) *ibid.* 108.

40) *ibid.* 112.

41) *ibid.* 119.

42) *ibid.* 120. 125. 143. 146. 155. 156.

157. 158. 160. cet.

43) Cel. LOERDENS I. c. Tab. I. a.

20) De partibus corporum humanorum fabrica. Tom. VIII. p. 400.

21) Cl. STYX I. c. p. 7. sq. §. II.

22) STYX I. c. Cl. LOERDENS descriptio nervi ischiadici iconibus illustrata. Erlangae 1788. Tab. I. γ.

23) STYX loc. cit. LOERDENS loc. cit. Tab. I. α.

tertio ac quarto <sup>44)</sup>, ex duobus conflatur truncis, quorum primum seu maiorem pars secundi et tertii rami <sup>45)</sup> constituunt, secundum autem seu minorem ramus nervi lumbalis quarti <sup>46)</sup> format. Truncus inde formatus mox, postquam ramulos musculo obturatori interno et externo prospicientes, emisit, ad femur in ramum anteriorem <sup>47)</sup> et posteriorem, varios iterum furculos spargentes, distribuitur. Anterior plerumque 1) ramum ad musculum adductorem breuem ALBINI dimittit; sed Cel. STYX tres vidit ramulos scilicet ramum anteriorem <sup>48)</sup>, medium <sup>49)</sup> et interiorem <sup>50)</sup>. 2) Ramum exhibet ad musculum gracilem migrantem <sup>51)</sup>, 3) ramum, qui musculo adductori longo prouidet <sup>52)</sup>. Doleo, quod Cel. STYX huncce ramum non depingendum curauit. Sed hisce absolutis restat quoque, ut adhuc pauca quaedam de nervo cutaneo externo <sup>53)</sup> addam. Nervus hicce cutaneus praecipue lateri externo femoris prospicit inque varios dehiscit ramos, ut: 1) in primum seu anteriorem <sup>54)</sup>, qui tres exteriores <sup>55)</sup> et unum interiorem <sup>56)</sup> detrudit 2) in ramum secundum seu posteriorem, qui musculo gluteo maximo et vasto interno varios largitur furculos <sup>57)</sup>.

## §. XXVI.

D) *Nervi sacrales.*

Ex filamentis et anterioribus et posterioribus, quorum numerus plerumque in duobus vel tribus vel quatuor consistit, conflantur. Utraque et antica et postica post egressum ex crenis extremitatis medullae spinalis inferioris et introsusceptionem ligamenti denticulati, cuius dentes omnes reliquos longitudine longe hic antecedunt, sese coniungunt atque (deorsum vergendo) s. descendendo funiculos tortuosos sistunt, quod phaenomenon longitudo filamentorum nec non spatium haud paruum, quod ab exitu usque ad transitum per foramina intervertebralia emetiri debent, producere videtur. Viam quodsi superauerint extrorsum vergendo foramina petunt intervertebralia ibique in tumorem gangliiformem <sup>58)</sup> intumescunt. Rami, quos ganglia edunt in anteriores seu maiores et posteriores seu minores diuiduntur. Anteriores coniunctiones inter se, cum sympathico magno partibusque vicinis ineunt <sup>59)</sup>; posteriores autem inter se communicant atque musculis gluteis, sphincteri ani externo cutique prouident <sup>60)</sup>. Sed considerationi nervorum sacralium generali specialem quoque addamus est necesse, praecipue quoad eorum distributionem. Rami igitur et anteriores et posteriores nervi sacralis primi, omnes reliquos magnitudine superantis, ramulos cum quinto lumbari et secundo sacrali ut et intercostali coeuntes dimittit.

44) Cel. STYX l. c. p. 23. §. XVII.

45) IOERDENS l. c. Tab. I. β.

46) ibid. loc. c. δ.

47) STYX l. c. Tab. I. 183.

48) ibid. 184. 49) ibid. 185.

50) ibid. 186. 51) ibid. 187.

52) ibid. 194. 53) ibid. 199.

54) ibid. 201. 55) ibid. 202. 203. 204.

56) ibid. 205.

57) STYX l. c. p. 27. §. XXI.

58) VIEUSSEN l. c. Tab. XXVIII. a. a. a. cet. HUBER l. c. Fig. I. c. c. c. cet.

59) GÜNTHER l. c. p. 82.

60) GÜNTHER l. c. p. 82.



dimittit <sup>61)</sup>. Ramus anterior sacralis secundi coniungitur cum primo et tertio sacrali nec non intercostali; posterior autem congreditur cum ramo posteriori tertio sacrali et musculus gluteum maximum petit <sup>62)</sup>. Ramus anterior sacralis tertii ramum anteriorem secundi et quarti adgreditur, plexum hypogastricum format, et collo vesicae, vaginae aliisque partibus adiacentibus prospicit <sup>63)</sup>; ramus posterior vero pudenda, femorisque cutim perreptat et nervum scrotalem pudendalem per incisuram ischiadicam ad scrotum et perinaeum transeuntem, exhibet <sup>64)</sup>. Rami sacralis quarti cum tertio et interdum cum quinto et intercostali coeuntes ad plexum hypogastricum, collum vesicae, obturatorem internum et vaginam tendunt atque cum pari tertio constituent <sup>65)</sup>; 1) nervos haemorrhoidales musculus spinoso-coccygeum et ligamentum spinoso sacrum perforantes <sup>66)</sup>, 2) plexum hypogastricum, maximum, infimum, qui ramis nervi intercostalis hypogastricis auctus, in intestinum rectum, vaginam, uterum et vesicam distribuitur <sup>67)</sup>. Utrique cum secundo coniuncti producunt 3) plexum pudendum communem, qui sub ligamento sacro ischiadico e pelui egreditur atque 1) in dorsalem penis seu pudendum superiorem dispescitur, qui in viris ramos dat ad dorsum penis, ad glandem usque bulbumque urethrae et corpus cavernosum atque cutim penis; in foeminis autem ad clitoridem, constrictorem cunni, vulvam eiusque labia <sup>68)</sup>, 2) pudendum inferiorem, qui ramulos musculo ischio-coccygeo musculisque transversis et cuti perinaei nec non posterioribus et inferioribus genitalium partibus largitur <sup>69)</sup>. Nervus sacralis quintus denique quarto et intercostali adnectitur et cum hisce coniunctus plexum haemorrhoidalem adauget <sup>70)</sup>. Cognitio distributionis ramorum horum nervorum accurata explicationi morborum modo ex abusu veneris, modo ex masturbatione, modo ex aliis illicitis atque abominandis actionibus oriundis, optime inseruit. Sed recensio horum morborum, e. g. tabis dorsalis cet. supersedeo, partim quum TISSOT <sup>71)</sup>, BOERNER <sup>72)</sup>, GRUNER <sup>73)</sup>, VOGEL <sup>74)</sup>, SALZMANN <sup>75)</sup>, BALDINGER <sup>76)</sup>, CAMPE <sup>77)</sup>, ULRICH <sup>78)</sup>, ZIMMERMANN <sup>79)</sup>, aliique celeberrimi viri praeclarissimos hac de re conscripserint libros atque libellos, partim quum mihi in animo sit, signa horum morborum, inprimis autem onaniae peculiari quodam scripto exactius, quam hucusque factum esse sciam, enucleare

- 61) GÜNTHER l. c. p. 81.  
 62) ibid. l. c. 63) ibid. l. c.  
 64) ibid. l. c. 65) ibid. l. c.  
 66) ibid. l. c.  
 67) GÜNTHER l. c. p. 82.  
 68) ibid. l. c. 69) ibid. l. c.  
 70) ibid. loc. cit.  
 71) *Abhandlung über die Selbstbefleckung, aus dem Französischen übersetzt und mit Zusätzen von KÜRSTEN.*  
 72) *Praktisches Werk von der Onanie.* Leipzig 1776.  
 73) *Dissertat. inaugural. medica de ma-*  
*Ludwig script. neur. min. T. IV.*

masturbatione peste iuventutis longe perniciosissima.

74) *Unterricht für Eltern, Erzieher und Kinderaufseher.* Stendal 1785.

75) *Ueber die heimlichen Sünden der Jugend.* 1786.

76) *Magazin für Aerzte.* I. B. I. St. S. 62.

77) *Allgemeine Revision des gesammten Schul- und Erziehungswesens.* 6ter Theil.

78) *Pädagogisches Scherflein, nur aufgeklärten Eltern und Erziehern gewidmet.*

79) ZIMMERMANN über die Einsamkeit.

enucleare eaque cum publico aliquando communicare. Sed redeo ad nervos sacrales eorumque ulteriorem distributionis explicationem addo, quae

## §. XXVII.

in eo consistit, ut una cum ramo tertio anteriori et longiori quarti paris lumbaris <sup>80)</sup> et insigni paris lumbaris quinti trunco <sup>81)</sup> nervo ischiadico <sup>82)</sup> constituendo inferuiant. Ad nervos sacrales, qui ad huncce insignem truncum conformandum contribuunt, pertinent 1) par primum <sup>83)</sup> et secundum sacrale <sup>84)</sup>, 2) ramus et superior <sup>85)</sup> et inferior <sup>86)</sup> paris sacralis secundi, 3) saepius par sacrale tertium, quod cum ramo inferiori secundi paris sacralis truncum communem format et tunc nervi ischiadici truncum adgreditur, qui nunc varias subit distributiones, quas quidem, sed tantum generatim exhibebo. Dimittit itaque nervus ischiadicus nervum cutaneum posteriorem <sup>87)</sup>, nervum musculi glutei maximi <sup>88)</sup>, nervum musculorum et geminorum obturatorii interni <sup>89)</sup> truncum communem ventris maioris bicipitis et nervi cutanei interni superioris <sup>90)</sup>, nervum denique cutaneum internum et inferiorem <sup>91)</sup> nec non nervum cutaneum externum <sup>92)</sup>. Truncus nervi nostri, quem semper usque ad egressum ex incisura ischiadica findere poteram <sup>93)</sup>, nunc abit in nervum peroneum <sup>94)</sup> et tibieum <sup>95)</sup>. Nervus peroneus, quem Cel. SABATIER nervum ischiadicum popliteum externum appellat, tres ramos diffundit laterales internos 1) nervum scilicet adductoris femoris longi <sup>96)</sup>, 2) medium <sup>97)</sup>, 3) tertium vel communicantem peronei <sup>98)</sup>. Truncus peronei secedit in ramum profundum <sup>99)</sup> et unum <sup>100)</sup> vel duos ramos superficiales. Profundus dehiscit in ramulum externum, in ramulum lateralem internum secundum et externum, ramulum lateralem internum tertium, quartum et quintum, in ramulum externum vel profundum et internum vel superficiale <sup>1)</sup>, qui tandem in ramulum externum <sup>2)</sup> et internum <sup>3)</sup> abit. Ramulus internus, qui ramulus dorsalis pollicis externus evadit, maximus est; ramulus autem externus in ramulum dorsalem digiti secundi internum transit. Superficialis distribuitur in ramulum externum <sup>4)</sup> et internum <sup>5)</sup>. Ramulus internus fatiscit in ramulum minorem externum <sup>6)</sup> et internum <sup>7)</sup>, qui posterior ramulum metatarsicum internum

80) Celeb. TOERDENS loc. cit. Tab. I. No. 2.

81) ibid. l. c. Tab. I. 3.

82) ibid. l. c. Tab. I. N. 1.

83) ibid. Tab. I. No. 5.

84) ibid. Tab. I. No. 6.

85) ibid. Tab. I. No. 7.

86) ibid. Tab. I. No. 8.

87) ibid. Tab. I. II. No. 10.

88) ibid. Tab. II. 23.

89) ibid. Tab. II. 26.

90) ibid. Tab. II. 27.

91) ibid. Tab. II. 33.

92) ibid. Tab. II. 38.

93) Nervum hocce modo fissum tabulae affixi, ut melius conservarem.

94) Cel. TOERDENS l. c. Tab. I. II. 39.

95) ibid. Tab. II. 109.

96) ibid. Tab. II. 49.

97) ibid. Tab. II. 41.

98) ibid. Tab. II. 42.

99) ibid. Tab. I. 48.

100) ibid. Tab. II. 76.

1) ibid. Tab. I. 59. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67.

2) ibid. Tab. I. 72. 3) ibid. Tab. I. 68.

4) ibid. Tab. I. 102. 5) ibid. Tab. I. 95.

6) ibid. Tab. I. 95. 7) ibid. Tab. I. 83.



ternum et externum exhibet <sup>8)</sup>, qui internus tandem in ramulum dorsalem pollicis internum transit, ramulus autem minor externus in ramulos duos metatarsicos secedit, quorum internus <sup>9)</sup> breuior est, externus <sup>10)</sup> vero longior truncum communem dat pro ramulo dorsali digiti secundi externo <sup>11)</sup> et ramulo dorsali digiti tertii interno <sup>12)</sup>. Ramulus externus in ramulum metatarsicum internum <sup>13)</sup> et externum <sup>14)</sup> finditur. Internus abit in ramulum externum digiti tertii <sup>15)</sup> et internum digiti quarti dorsalem <sup>16)</sup>; externus autem in ramulum internum <sup>17)</sup> et externum <sup>18)</sup> diuiditur.

§. XXV. II.

Nervus tibicus seu ischiadicus popliteus internus <sup>19)</sup> diuiditur in ramum nervi tibici communicantem <sup>20)</sup>, in ramulum anastomoticum et breuem et inferiorem, quos autem non producit, sed tantum excipit, denique in ramulum supramalleolarem <sup>21)</sup>, qui finditur in ramulum anteriorem dorsalem <sup>22)</sup> et posteriorem magisque lateralem pedis <sup>23)</sup>. Interior et superius et inferius filamentum anastomoticum <sup>24)</sup> emittit; exterior autem in ramulum dorsalem digiti quinti externum <sup>25)</sup>, in nervum muscoli poplitei primum <sup>26)</sup> et secundum <sup>27)</sup>, in nervum flexoris pollicis proprii <sup>28)</sup> et denique in nervum plantarem internum <sup>29)</sup>, qui in ramum et externum <sup>30)</sup> et internum <sup>31)</sup> diuiditur, qui posterior ramulus plantaris internus pollicis euadit, transit; externus autem in duos ramulos, internum <sup>32)</sup> scilicet et externum <sup>33)</sup> fatiscit. Internus bifurcationem efficit, unde ramulus minor internus <sup>34)</sup> oritur, qui ramuli plantaris pollicis externi vicem subit, et externus <sup>35)</sup>, qui in ramulum plantarem digiti secundi internum abit; exterior autem in duos ramos internum <sup>36)</sup> et externum <sup>37)</sup>, transit, internus multos dimittit furculos partibus adiacentibus prospicientes: externus vero in ramulum minorem externum <sup>38)</sup> et internum <sup>39)</sup> secedit. Hi ramuli, et externus et internus, inter se coniuncti, truncum communem <sup>40)</sup> constituunt, qui in duos ramos, internum <sup>41)</sup> scilicet et externum <sup>42)</sup> distribuitur. Posterior fit plantaris digiti quarti internus; ramulus minor externus autem exhibet ramulum plantarem digiti quarti externum et ramulum plantarem digiti quinti internum. Porro nervus tibicus secedit in nervum plantarem externum <sup>43)</sup>, qui mox in principio in primum <sup>44)</sup>, secundum <sup>45)</sup> et tertium <sup>46)</sup> diffilit ramulum; deinde autem in ramum internum <sup>47)</sup> et externum <sup>48)</sup> transit. Internus exhibet ramulos, quorum alter ra-

N 2

mulus

8) *ibid.* 88. 89.

9) *ibid.* 98.

11) *ibid.* 100.

13) *ibid.* 103.

15) *ibid.* 104.

17) *ibid.* 107.

19) *ibid.* Tab. II. 109.

20) *ibid.* 110.

22) *ibid.* 121.

24) *ibid.* 126. 133.

26) *ibid.* 157.

10) *ibid.* 99.

12) *ibid.* 101.

14) *ibid.* 106.

16) *ibid.* 101.

18) *ibid.* 108.

21) *ibid.* 111.

23) *ibid.* 139.

25) *ibid.* 148.

27) *ibid.* 160.

28) *ibid.* 166.

30) *ibid.* 186.

32) *ibid.* 187.

34) *ibid.* 188.

36) *ibid.* 196.

38) *ibid.* 201.

40) *ibid.* 203.

42) *ibid.* 204.

44) *ibid.* 210.

46) *ibid.* 212.

48) *ibid.* 218.

29) *ibid.* 183.

31) *ibid.* 183. †

33) *ibid.* 189.

35) *ibid.* 193.

37) *ibid.* 200.

39) *ibid.* 202.

41) *ibid.* 205.

43) *ibid.* 183. ††

45) *ibid.* 211.

47) *ibid.* 213.

mulus eſt ſuperficialis <sup>49)</sup>, alter autem communicans <sup>50)</sup>; externus vero dat ramulum lateralem digitorum <sup>51)</sup>. Sed in hac deſcriptione, in qua praecipue exactiſſimam Cl. IOERDENS delineationem et explicationem ſecutus ſum, acquieſco \*). Reſtat nunc, ut quoque de morbis nervorum noſtrum occupantibus, praecipue autem de iſchiade nervoſa, quam Cl. DOMINICUS COTUNNIUS <sup>52)</sup> optime deſcripſit, mentionem faciam. Duas ſummas iſchiadis ſpecies conſtituit; alteram, ubi dolor praecipue circa coxam verſatur; alteram quae nervos coxam tranſeunt, obſidet. Priorem appellat iſchiadem arthriticam; poſteriorem autem nervoſam, quae duas ſiſtit ſpecies; alteram, quae totum nervi iſchiadici decurſum eiusque diſtributionem ſequitur; alteram, quae dolorem fixum in inguine oſtendit, qui per interiorem femoris ac ſurae partem propagatur. Primam nuncupat iſchiadem nervoſam poſticam; ſecundam autem iſchiadem nervoſam anticam. Iſchias nervoſa poſtica eſt vel continua vel intermittens. Continua, quae plerumque in principio morbi locum habet, adeſt, ſi per aliquot temporis ſpatium dies nocteſque iſchiadicus dolor ſine mora diſcruciat; intermittens autem, in quam continua ſenſim ſenſimque tranſit, obſervatur, ſi dolor ſaeppiſſime inducias dat ſtatique temporibus reuertitur et ſaevit. Utrique id conſtans eſt, ut vespertinis in horis dolor exacerbetur ipſaque iſchias intermittens acceſſus ſuos eo tempore ſortiri ſolet. Doloris tunc exacerbatio adeo inſignis eſt, ut aegroti propter vehementem dolorem crampi ſenſui proxime accedentem, lectum fugiant. Morbus diutine obtinens tandem producit ſemiparalyſin, nunquam autem perfectam. Ex ſede doloris nec non felici medendi methodo ſatis abunde elucet, iſchiadem nervoſam poſticam in iſchiadici nervi affectione conſiſtere. Dolorem nulla febris concomitatur et per longum temporis ſpatium ſine ullo periculo perferri poteſt. Id, quod doloris cauſſa exiſtit, eſt humor, qui vagina nervi cellulosa continetur et vel ex cauo cranii et medullae ſpinalis vel ex arteriis tunicarum nervorum propriis huc deriuatur. Humor itaque huc delatus dolorem producere poteſt vel quantitate vel qualitate; quantitate, ſi nervum comprimit; qualitate, ſi nervum irritat atque pungit. Cauſſae praedisponentes ſunt 1) laxitas et amplitudo tunicae externae huius nervi, 2) copia arteriarum exhalantium tunicamque hancce perreptantium. Dolor, quem quantitas materiae collectae producit, eſt obtuſus; is autem, quem qualitas ſeu acrimonia huius materiae generat, eſt fixus atque valde exacerbatus, unde quoque fit, ut ex irritatione et qui hanc ſequitur, affluxu humorum, intra tunicam et nervum ipſum hydrops oriatur, qui partim propter reſorptionem ex-

hala-

49) *ibid.* 214.50) *ibid.* 215.51) *ibid.* 222.

\*) Intereſt ad hunc locum nominare adhuc atque laudare viros tres, et quidem FOURCROY (in *La medecine eclairee par les ſciences phyſiques*. Tom. IV. p. 167. et 228.) Io. LEONH. FISCHERUM (*Deſcriptio anatom. nervorum lumbalium ſacralium et extremitatum inferior.* Lipſ.

1791. Fol.) et Io. AD. SCHMIDT (*Commentarius de nervis lumbalibus eorumque plexu anatomico pathologicus*. Vindobonae 1794. 4.) qui ſubtiliores nervorum dorfalium lumbalium atque ſacralium deſcriptores atque indagatores extiterunt. L.

52) *Commentat. de iſchiade nervoſa*. Vienn. 1770.



halationi non proportionatam, partim propter tenacitatem humoris auctam, partim propter corium, quod ex tenacitate humorum generatum, ostiola vasorum resorbentium occludit, quotidie magis magisque increfcit. Remedia diuretica fortasse in usum hic vocanda votis nostris nullo prorsus modo respondere possunt; sed hydrops auctus paralyfi et atrophiae occasionem praebet. Commode itaque tria constitui possunt huius morbi stadia; primum, ubi materia vel quantitate vel qualitate peccans infra neruum eiusque tunicam deponitur; secundum, ubi hydrops iam ortus est, tertium, ubi semiparalyfis locum habet.

## §. XXIX.

E) *Nervi recurrentes WILLISII. Nervi ad par octauum accessorii LOBSTEINII. Nervi intermediarii HUBERI.*

Cum iam descriptionem neruorum spinalium ad finem perduxerimus, restat quoque, ut de nervo ad par vagum accessorio quaedam proferamus. Equidem praecipuorum auctorum, qui de hocce nervo fecerunt verba, tractationem praemittere possem historicam; cum autem anatomicae artis peritissimus LOBSTEINIUS historiam huius nervi plane absolutam nobis exhibuerit, superfluum esse duxi, quaedam hic aderre, sed lectores ad huncce libellum doctissimum <sup>53)</sup> remitto et potius ad huius nervi descriptionem me conuerto. At praemoneam est necesse, me quoque hic nihil noui esse prolaturum, quum descriptiones, quas HUBER <sup>54)</sup> in primis autem LOBSTEIN V. Cl. <sup>55)</sup>, qui etiam optimam hunc neruum euoluendi methodum adiunxit, de hocce nervo tradiderunt, adeo sint absolutae, ut mihi iuueni vel nihil vel pauca tantum relinquantur, quae addere fortasse queam. Interim tamen spero, fore, ut in re anatomica tyronibus, quibus libellus meus sit conscriptus, non sit iniucundum, si descriptionem huius nervi praeunte LOBSTEINIO exhibeam, praesertim quum libellus supra citatus paucis sit ad manus. Nervus itaque accessorius ex medulla spinali provenit sub sexto pari neruorum cervicalium <sup>56)</sup> ubi tenuissimum filamentum exit, cuius trunculus sub pia meninge quidem prorepat, ita tamen, ut nudis oculis adhuc videri queat <sup>57)</sup>. Hocce filamentum intra piam meningem positum ad filamenta sexti paris postica recta adscendit et ibi piam matrem, cui suum debet velamentum, transit, unde quoque fit, ut oculis nostris optime conspici queat <sup>58)</sup>. Medullae spinali ad ortum suum proxime adiacet et inter filamenta eius postica et ligamentum denticulatum adscendit extrorsum vergendo <sup>59)</sup> ideoque HUBER recte dicit, neruum

N 3

acces-

53) b. LOBSTEINII differtat. de nervo spinali ad par vagum accessorio. Argentorati 1766. cum Figur. — hor. script. neur. T. II.

54) HUBER comment. citat. p. 10. fqq.

55) l. c. p. 26. fqq.

56) HUBER ortum huius nervi ad filamenta posteriora nervi septimi paris cer-

vicis describit; ego autem, si mihi non impono, primas huius nervi radículas ad paris tertii neruorum dorsalium filamenta postica provenire vidi.

57) LOBSTEIN l. c. Tab. II. Fig. I. lit. G. HUBER l. c. Fig. II.

58) HUBER l. c. p. 13.

59) LOBSTEIN l. c. Fig. I. HUBER l. c. Fig. II. ASCH l. c. Tab. I. Fig. I.

accessorium inter antica et postica nervorum filamenta non esse positum; sed filamenta postica inter et ligamentum denticulatum <sup>60</sup>). Inter adscendendum autem locum destinatum versus in interstitiis singulis filamentorum; posteriores nervorum cervicalium radices constituentium, radicula quaedam accedit, ita ut plerumque decem pro quovis nervo inveniuntur. Quatuor superiores intra calvariam posita ex medulla oblongata proveniunt <sup>61</sup>) interdum quoque tantum duo sed crassiora adsunt filamenta <sup>62</sup>); inferiores autem quinque medulla spinalis dimittit <sup>63</sup>).

### §. XXX.

Superiores plerumque duobus radicibus <sup>64</sup>) ex medulla oblongata provenientibus gaudent; inferiores autem plerumque simplici producuntur radice <sup>65</sup>) interdum quoque duplici <sup>66</sup>). Nunc truncus nervi nostri superiora petit, prius autem quam foramen occipitale magnum intrat et cum pari vago coit <sup>67</sup>) ad par nervorum cervicalium primum admodum varium naturae lusum; de quo iam HUBER <sup>68</sup>) et LOBSTEIN <sup>69</sup>) mentionem faciunt, experitur, qui in eo consistit, ut filamenta postica nervi cervicalis primi cum ipso nervo accessorio coeant <sup>70</sup>) ibique intumescantiam, quam HUBER gangliiformem nuncupat <sup>71</sup>), formant, quae unum <sup>72</sup>) vel duo <sup>73</sup>) vel quatuor vel quinque filamenta vices filamentorum nervi cervicalis primi in se suscipientia, emittit. An haecce intumescantia nomine Ganglii veri salutariter mereatur, in dubio relinquo; interim tamen ASCH <sup>74</sup>) et LOBSTEIN <sup>75</sup>), qui pluribus hac de re egerunt, contrarium confirmant et rationes, quas proferunt, utique applausu dignissimae sunt. Quamvis autem haecce communicatio filamentorum anticorum paris primi nervorum cervicalium cum nervo accessorio saepius observetur; tamen saepe quoque fit, ut HUBER recte monuit, ut nervus accessorius liber et absque ulla communicatione cum hisce filamentis superiora petat et communicationem cum pari vago ineat <sup>76</sup>), cum quo communem e cranio sortitur exitum. Interdum duram matrem separatim transiit <sup>77</sup>), saepius autem contingit, ut cum pari vago coniunctus progrediatur. Quod distributionem, quam nervus noster ad progressum suum subit, attinet,

60) LOBSTEIN l. c. p. 28. §. XXIV.

61) LOBSTEIN loc. cit. Fig. I. d. d. cet. HUBER l. c.

62) LOBSTEIN l. c. p. 28. §. XXV.

63) ibid. l. c. Fig. I. h. h. HUBER l. c. Fig. II. Tabula nostra l. Fig. I. ASCH. Tab. I. Fig. I. H.

64) LOBSTEIN loc. cit. Fig. I. d. d. d. d. HUBER l. c. Fig. II.

65) LOBSTEIN l. c. Fig. I. h. h. HUBER l. c. Fig. II. ASCH loc. cit. Tab. III. Fig. I. o. p. q. r. Fig. II. m. i. k. Tab. nostr. Fig. I.

66) LOBSTEIN l. c. Tab. III. Fig. I. a. Fig. II. n.

67) LOBSTEIN l. c. Tab. II. Fig. I. F. HUBER l. c. Fig. II. H.

68) l. c. p. 28. §. XXV.

69) l. c. p. 13. §. VIII.

70) VIEUSSEN loc. cit. Tab. XX. Fig. II.

71) HUBER l. c. p. 14. §. VIII.

72) LOBSTEIN l. c. HUBER l. c.

73) ibid. l. c.

74) pag. 40. §. XXIX. Not. 5.

75) pag. 29. §. XXV.

76) HUBER l. c. Fig. II. LOBSTEIN l. c. Tab. II. Fig. I.

77) HUBER l. c. Fig. II. I. I.



net, mox sub finem foraminis laceri ramum dimittit <sup>78)</sup>, qui cum filamento secundo seu superiori octavi paris <sup>79)</sup> semper post transitum per foramen suum in duos ramos <sup>80)</sup>, quos filamentum nostrum comitatur <sup>81)</sup> abeuntis, coit. Post coniunctionem cum filamento superiori paris vagi novus oritur furculus <sup>82)</sup>, qui cum tertio coniunctus ramum, qui nervo pharyngaeo <sup>83)</sup>, constituendo inferuit, largitur. Nervus hicce pharyngaeus variis morbis e. g. anginae paralyticae, vitiis loquelae et deglutitionis diuersis ansam praebens, non prius pharyngem petit, quam cum ramo, quem parua paris octavi portio exhibet, subiit coniunctionem <sup>84)</sup>. Viam suam nunc ulterius prosequitur, secedendo in ramum anteriorem <sup>85)</sup> et posteriorem, quem autem LOBSTEINIUS non delineavit. Anterior cum filamento ex coniunctione priorum filamentorum orto, coniungitur <sup>86)</sup> atque hoc, ut verbis LOBSTEINII utar, alterum iunctim ramum dicti pharyngaei formare iuvat <sup>87)</sup>. Hac facta anastomosi fit, ut cum ramo posteriori atque ramulo ex filo secundo pharyngaei enato in parte semper anteriori paris octavi descendat ibique inuolucro paris octavi inuestitus plurima emittat filamenta, cum paris vagi furculis anastomoses efficientia partim, partim novas formantia distributiones adeo varias, ut oculis, quamvis armatis detegi nequeant. Truncus nervi accessorii nunc ulterius progreditur, nullos autem dimittit furculos; sed omnibus destitutus furculis musculos proxime sibi adiacentes petit et splenio, trapezio nec non sternocleido-mastoideo prospicit, praecipue autem ultimo, ubi filamenta plurima cum nervorum ceruicalium ramis varias producant anastomoses e. g. cum ramo adscendente secundi paris ceruicalis <sup>88)</sup> et duobus filamentis a secundo <sup>89)</sup> atque tertio pari <sup>90)</sup> et denique trapezio omnes suos exhibet furculos, ita, ut nihil nudis oculis ultra detegi queat. Sed pedem hic figo, rogans, ut lectores mihi faueant laboribusque nostris iuuenilibus indulgeant.

78) LOBSTEIN l. c. Tab. II. Fig. II. 4.

79) ibid. Tab. II. c.

80) LOBSTEIN loc. cit.

81) ibid. Tab. II. Fig. II. 4. 5. 6.

82) ibid. Tab. II. Fig. II. 8.

83) ibid. Tab. II. Fig. II. 9.

84) ibid. Tab. II. Fig. II. 16.

85) LOBSTEIN l. c. Tab. II. Fig. II. 10.

86) ibid. 11.

87) ibid. 14.

88) ibid. 12. 13. 89) ibid. lit. s.

90) ibid. lit. e. p.

## EXPLICATIO ICONUM.

## Fig. I.

Figura prima, a facie posteriori spectata, medullam spinalem viri sexagenarii, intra fistulam Morgagnii sacram sitam et ab omnibus inuolucris, excepta pia meninge denudatam, in situ suo naturali exhibet ueruosque spinales, quoad exitum ex medulla spinali atque decursum filamentorum neruorum, ut et ligamentum denticulatum lateris et dextri et sinistri ostendit. Notandum quoque venit, quod adhuc videri queant, primum portio quaedam superficiei externae partis occipitalis, deinde omnes spinæ dorſi vertebrae, quarum annuli remoti sunt et demum os sacrum, instrumento ferrato perpendiculariter fissum.

- |  |   |
|--|---|
| A. Portio superficiei externae partis occipitalis.               | c. c. c. Ligamentum neruum impariementiens.   |
| B. Octo vertebrae ceruicales annulis suis destitutæ.             | d. d. d. d. d. Ligamentum denticulatum lateris et dextri et sinistri.                                   |
| C. Duodecim vertebrae dorſales annulis suis privatae.            | e. e. Nerui accessorii origo et lateris dextri et sinistri.   |
| D. Quinque vertebrae lumbares, quarum annuli quoque remoti sunt. | e. e. e. Trunci nerui accessorii continuatio lateris sinistri.  |
| E. Os sacrum instrumento ferrato perpendiculariter fissum.       | f. f. f. f. Filamenta neruea communicantia lateris et dextri et sinistri.                               |
| F. Extremitas medullae spinalis inferior.                        | g. g. g. Nerui accessorij radiculæ ex medulla spinali exeuntes lateris dextri.                          |
| G. Extremitas medullae spinalis superior.                        | h. Filamentum simplex ex medulla spinali proueniens atque cum filamentoparis tertii infimo communicans. |
| H. Corpus medullae spinalis.                                     | I - 30. Triginta neruorum vertebralium origo postica et decursus.                                       |
| I. I. I. I. Dura meninx discissa atque reflexa.                  | I - 8. Octo nerui ceruicales.   |
| K. Os coccygis.  | I - 12. Duodecim nerui dorſales.  |
| a. Conus, in quem extremitas medullae spinalis inferior abit.    | I - 5. Quinque nerui lumbares.  |
| b. Corpusculum rotundum accessorium.                             | I - 5. Quinque nerui sacrales.  |

## Fig. II.

Icon secunda exhibet primum superficiem sinistram medullae spinalis infantis ante duodecim septimanas in lucem editi, deinde exitum atque decursum omnium filamentorum et anticorum et posticorum neruorum spinalium lateris sinistri una cum gangliis neruorum huius lateris.

- |   |   |
|---|---|
| A. A. A. Superficies medullae spinalis sinistra inter filamenta et anteriora et posteriora neruorum spinalium huius lateris sita. | B. Filamentum nerueum communicans cum filamentoparis quinti inferiori et paris sexti superiori. |
|---|---|

C.C.C.




- |   |   |
|---|---|
| C. C. C. Funiculi nervorum spinalium anteriores lateris sinistri.     | G. Ligamentum, ex infimo piaë matris apice productum, nervumque imparem mentiens. |
| D. D. Funiculi nervorum spinalium posteriores lateris sinistri.       | H. Medulla spinalis horizontaliter discissa.                                      |
| E. Finis conicus, in quem extremitas inferior medullae spinalis abit. | 1-30. Nervi spinales lateris sinistri.  |
| F. Corpusculum rotundum accessorium.                                  | G. G. Gangliorum triginta paria nervorum spinalium lateris sinistri.              |

*Fig. III.*

Figura tertia sistit superficiem anteriorem extremitatis inferioris medullae spinalis, quam eo consilio depingendam curavi, ut diversitas, quae superficiem anteriorem inter et posteriorem huius partis intercedit, optime intelligi queat.

- |   |   |
|---|---|
| F. Superficies anterior extremitatis inferioris.                          | dd. Funiculi nervi abscissi.  |
| a. Corpus conicum, in quod extremitas inferior medullae spinalis finitur. | e. Medulla horizontaliter discissa.                                       |
| b. Corpusculum rotundum accessorium.                                      | 11-12. Par undecimum et duodecesimum nervorum dorsaliū lateris sinistri.  |
| c. Ligamentum, ex infimo piaë matris apice, productum.                    | 1-3. Par primum, secundum et tertium nervorum lumbarium lateris sinistri. |
|   | 19-23. Uti in icone prima.  |



## IX.

## IO. GOTTFRIED ZINN

EXPERIMENTA QUAEDAM  
CIRCA CORPUS CALLOSUM, CEREBELLUM,  
DURAM MENINGEM, IN VIVIS ANIMALI-  
BUS INSTITUTA.

G O T T I N G A E 1 7 4 9.

Cum mihi scribendum esset tempore a dissectionibus Anatomicis alieno, talem mihi visum fuit sumere materiam disputationi, quae per instituta in vivis animantibus experimenta usum quarundam C. H. partium attingeret. Taedio mihi enim fuit, ex pagina in paginam transcribere, et speciminis loco exhibere meram compilationem, undique ex varii generis libris conflata. Suadente ergo VENERANDO PRAECEPTORE, VIRO ILLUSTRIS DE HALLER, decreui experimenta quaedam carperè circa corpus callosum, cerebellum, et duram matrem: tum quod praecipua his partibus mihi esse videbatur dignitas, tum quod iudicia summorum nostri aevi virorum in quibusdam has ad partes pertinentibus differre inter se videbam. Hac occasione in aliis partibus quaedam simul observare contigit, ut in nervis diaphragmaticis, medulla cerebri, quae, dum phaenomena omnia attente considerabam, mihi occurrerunt. Commodum mihi visum fuit disputationem dispescere duas in partes, ut in altera agerem de corpore calloso, in altera de reliquis experimentis. Id demum ingenue profiteor, me ad capienda haec experimenta sine omni praeiudicata opinione accessisse, omniaque, quantum in me fuit, accuratissime notasse, quae, ut vidi, exhibeo.

## EXPERIMENTUM I.

Instrumentum *Trois quarts* dictum per canis, mediocris magnitudinis, anteriorem capitis partem, supra sinum longitudinalem, adactum, traieci per totam cerebri molem, ut in ossibus baseos cranii firmiter infixum haereret. Canis statim post ictum ita se habuit, quasi nihil mali sibi accidisset. Alacris, omnes sensit irrationes, capite erecto huc et illuc circumspiciens, saliva tamen ex ore effluxit. Aliquamdiu post incidit in soporem, et, vel levi irratione vel strepitu quodam excitatus, statim in somnum relapsus est, musculis lateris dextri paralyti correptis. Tali in statu hora undecima illum reliqui. Hora quarta reuersus eodem modo affectum deprehendi. Aliam symptomatum scenam videndi cupidus, instrumentum extraxi. Omnia statim mutata. Canis eiulavit, et vomuit. Musculi dextri lateris plane paraly-



paralytici, ut nec motus nec sensus superesset. Somnus multo profundior, et quamvis graui irritatione poterat excitari, excitatus tamen fuit stupidior, breui post somno iterum oppressus. Pulsus febrilis. Redii eodem die hora septima, omnia eodem in flatu deprehendi. Altero mane reuersus mortuum inueni. Cranio aperto, apparuit sinus longitudinalis pertusus. Vulnus, corpore calloso ab anteriori parte laeso, progrediebatur retrorsum et paulo sinistrorsum per ventriculum sinistrum et corpora striata sinistra ad basin cranii, cuius ossibus instrumentum erat infixum.

## EXPERIMENTUM II.

Idem instrumentum traieci per caput canis maioris, paulo posterius supra finum longitudinale, et in vulnere reliqui. Canis vulneratus erat alacris, qui audito latratu alterius canis vicini attenderet. Altero die hora prima pomeridiana reuersus, canem saluum vegetumque inueni, minime apoplecticum, et vidi, magnos illum edidisse motus, ut liberum se redderet. Cum esset dies solis, occidi canem vegetum, ne latratu vicinis molestiam faceretur. Cranio aperto apparuit, instrumentum penetrasse per medium corpus callosum, et thalamos neruorum opticorum, ubi in ventriculis anterioribus superioribus sese contingunt, pertudisse.

## EXPERIMENTUM III.

Ne apoplexia ob effusum ex sinu sanguinem experimentum turbaret, adeg i instrumentum in dextro capitis latere a dextris sinistrorsum. Canis vixit per XXII horas, semper vegetus, alacris, nulla in parte paralyticus, ultimis tantum horis prae aestu et dolore languidior. Cum facile viderem, canem per aliquot dies posse vivere, laqueo bestiam satis viuidam suffocaui. Instrumentum, discisso medio corpore calloso, ad latus sinistrum neruorum opticorum, in basi cranii sibi agglutinatorum, ossibus erat infixum. Vulnus corporis callosi *ILL. PRAESES* ipse inspicere libuit, ne experimento fides deesset.

## EXPERIMENTUM IV.

Eodem instrumento adacto, hora septima pomeridiana, per dextram capitis partem catuli iunioris a dextris sinistrorsum, animal statim ab ictu inflicto paulo attornitum, post aliquot tamen horas plane ad se rediit, ut per totam noctem vicini illius latratum audirent. Deprehendi altero mane canem altero quidem in latere paralyticum, multo tamen vegetiorem, quam fuerat die priori. Cum necessarium iter instaret, hora duodecima eodem die illum occidi, aperto utroque thorace satis magno vulnere, utroque in latere tres transuersos digitos lato, nihilominus tamen vixit per quadrantem horae. Aperto altero die cranio, vidi corpus callosum perforatum dextro in latere, una cum thalamo neruorum opticorum dextro.

## EXPERIMENTUM V.

Scire auidus, quid contingeret, corpore calloso duobus ictibus laeso, intrusi instrumentum tum a dextris sinistrorsum, tum a sinistris dextrorsum. Primo vulnere

infecto, canis vinculis liberatus ita libere incessit, ac si omnino illaesus fuisset. Nec altero ex ictu multo peius se habuit. Altero mane reuersus paulo languidiorem quidem inueni, sensu tamen motuque integris. Ut varia ratione doceret animal, adesti instrumentum inter primam vertebam et occiput in medullam spinalem, quo facto, sanguis summa quantitate prorupit. Vixit, licet languidissimus, nec tamen omni motu, nec omni sensu priuatus, per dimidiam horam. Aperto cranio, apparuit corpus callosum duobus ictibus pertusum, ut fere tota illius pars anterior plane esset discissa. Ictus a sinistris dextrorsum et paulo retrorsum vergens, per pedem hippocampi dextrum, alter a dextris sinistrorsum, per thalamum neruorum opticorum sinistrum basin cranii adiit. In tribus ventriculis anterioribus multus sanguis erat effusus. Vertebis remotis, inueni instrumentum per mediam medullam spinalem transisse.

### EXPERIMENTUM VI.

Canis ex effuso intra cerebrum sanguine apoplectici, viui, cranio ferra diuiso, cerebri lamellatim excidi, ad corpus callosum usque, corpus callosum discidi, ventriculos aperui. Animal medulla irritata eiulat, variosque motus edit, quietum antea, cum inter aperiendum dentibus ferrae disrumpetur dura mater. Medulla demum oblongata abscissa, totum cerebrum exemi, artus conuellebantur, motus cordis et respirationis integer perstabat. Toto denique, quam potui celerissime, euulso cerebello, motus cordis et profunda respiratio superfuit per aliquot minuta. Cerebello exempto, intrusi stilum in medullam spinalem, artus conuulsi sunt, et quo profundius adesti, eo magis posteriores partes conuelli vidi.

### EXPERIMENTUM VII.

Columba, cui cerebrum erat exemptum, integro tamen cerebello, pedibus insistere potuit, cibumque in os intrusum deglutit.

Notavi in omnibus his experimentis, quod canes, dum instrumentum per medullam cerebri adigebatur, signa summi doloris eiulatu et clamore ediderint.

## S C H O L I A.

### §. I.

Omnibus ex memoratis experimentis clare patet, corpus callosum posse perundi, discindi, sensu motuque integerrimis. Pernotus sum ad capienda haec experimenta sententia quorundam recentiorum, qui sedem animae constituunt in corpore calloso. Sedem autem animae vocant Auctores illam partem, ubi origo est omnium fibrarum neruearum motui inferuentium, finisque omnium sentientium. Illam quaerendam esse in cerebro, nemo fere hodie dubitat. Opinio enim ARISTOTELIS, et Auctoris <sup>1)</sup> libri de corde, qui inter opera Hippocratica refertur, iam du-

<sup>1)</sup> Edit. Foef. p. 269.



dum obsoleuit. Nec meliori fato usa est sententia recentiorum quorundam, PER-  
RAULTI <sup>2)</sup>, TABORI <sup>3)</sup>, STUARTI <sup>4)</sup>, qui, sensorium commune negantes, animam  
in proximo per omnes neruorum ramos, ubi illorum infima extremitas est, sentire  
putabant. Dolores enim post amputationem superflites, et interceptio omnis dolo-  
ris a neruo compresso facillime hanc sententiam refutarunt <sup>5)</sup>. Quenam autem sit  
cerebri pars, cui honor hic, quod sit domicilium animae, tribui debeat, omni tem-  
pore est pugnatum. Notissima est <sup>6)</sup> CARTESII sententia de glandula pineali. WIL-  
LISIUS <sup>7)</sup> sedem animae posuit in corporibus striatis, ita tamen, ut imaginationis se-  
dem in corpore calloso admitteret, et praeterea memoriae et sensus communis et in-  
stinctus naturalis et passionum animae peculiare faceret prouincias. VIEUSSENIUS <sup>8)</sup>  
primam sensationum impressionem credidit esse in corporibus striatis, sedem vero  
imaginationis, et sensus communis, et memoriae, constituit in centro ouali. FRID.  
HOFMANN <sup>9)</sup>, STEPHANUS BLANCAARD <sup>10)</sup>, SCHELHAMMERUS <sup>11)</sup> et alii sedem  
animae quaesierunt in medulla oblongata, qui posterior tamen iudicio distinctam  
sedem, nempe corpus callosum, tribuit. Alii collocarunt in septo lucido, alii in  
meningibus, ut anima ferē, quoties nouus extitit Auctor, toties domicilium mutare  
cogeretur.

## § II.

Accessit demum LANCISIUS <sup>12)</sup>, et monarchiam adscripsit corpori calloso, tum  
quod non gemina sit pars, mediumque in cerebro teneat locum (quae etiam fuit ra-  
tio, cur CARTESIUS glandulam pinealem elegerit), tum quod singularem et con-  
cinnam prae aliis partibus structuram in illo deprehendisse se putaret. Ne tamen  
fatum glandulae pinealis nimis durum videretur, umbram splendoris, quo a CAR-  
TESIO donata fuerat, illi reliquit, ut nempe ope geminorum processuum ad thalamos  
neruorum opticorum pertingentium, spiritibus in corpore calloso iam maturatis et  
perfectis, ac pro animae arbitrio ad motus membrorum organorumque determinatis,  
ipso in itinere momentum pulsionis ac nouam, ubi et quomodo opus sit, directionis  
energiam suppeditaret.

## §. III.

Sententia haec de corpore calloso tum ob nouitatem rei, tum ob auctorita-  
tem LANCISII plurimorum statim fuit excepta applausu, tum Itatorum, tum Trans-  
alpinorum. Inter ciues inprimis MAZINO <sup>13)</sup> ita arrisit haec opinio, ut ad illam

O 3

con-

- |  |  |
|--|--|
| 2) Du mouvement des yeux. p. 591.      | 9) Opp. Omn. Tom. I. Sect. III. §. 12.         |
| 592. du toucher. p. 530.               | p. 85. et Tom. III. Sect. I. c. 4. § 8. p. 46. |
| 3) Traët. III. c. 3.                   | 10) Instit. Med. p. 253.                       |
| 4) De motu musculari. c. V.            | 11) Analeët. Anat. physiol. Sect. XIII.        |
| 5) ILL. PRÆC. prim. lin. Phys. p. 195. | §. 25. 30.                                     |
| 6) De homine.                          | 12) De sede cogitantis animae.                 |
| 7) Anat. Cerebr. Cap. XIII. §. 8.      | 13) Institut. Physico-Medico-Mechan.           |
| 8) Neurogr. cap. 21. 22.               | Diff. XXI. p. 146. sq.                         |

confirmandam Mathesin adferre studeret. Supponit nempe, figuram corporis callosi efformatam esse instar pontis curuilinei. Pontem hunc curuilineum duos ostendere fibrarum ordines, quorum alter efformet longitudinem pontis per arcum dispositam, (qui arcus describere illi videtur portiones segmentorum sphaericorum,) alter vero ordo fibrarum componat latitudinem pontis, cuius adeo fibrae, quas rectilineas esse putat, et cum utroque hemisphaerio cerebri, et cum fibris circularibus corporis callosi, communionem habeant. Cum vero segmenta illa fibrarum circularium corporis callosi sint partes polygonorum infinitorum laterum, latera autem infinita possint ac debeant infinite moueri et oscillare, si excitentur, colligendum inde esse credit, minimas fibrillas componentes circularia segmenta corporis callosi, numero indeterminabiles, cum nihil aliud sint nisi infinita latera, posse infinite moueri ac oscillare, quoties sollicitatae fuerint ab opere infinitorum obiectorum, vel ab opere animae infinite agentis. Illos vero motus et oscillationes fingit esse phantasmata obiecta animae, unde perspicui posse putat, cur anima possit concipere et excitare, tam infinita, tam indeterminabilia phantasmata obiectorum tum possibilem, tum impossibilem. Totum tamen hoc aedificium, licet ingeniosissime constructum, nititur fundamentis coniecturalibus et imaginariis. Nisi enim concedatur, fibras longitudinem corporis callosi efformantes, esse dispositas per arcum, qui describat portiones segmentorum sphaericorum, et nisi concedatur, fibras corporis callosi posse oscillare, totum aedificium corruit.

## §. IV.

Diuerfa plane ratione usus est CL. GIGOT DE LA PEYRONIE <sup>14)</sup> primarius regis Galliae Chirurgus, ad confirmandam opinionem, corpus callosum esse sedem animae, plane persuasus, homines nunquam meris coniecturis, et mera auctoritate magni nominis virorum posse moueri. Argumentandi autem via, quam sibi elegit, haec est: Primum ipsi axioma est: si, omnibus partibus cerebri destructis, una tantum supersit, anima nihilominus superest, integris functionibus, necessario sequitur, solam illam partem superstitem esse sedem animae. Plurimis tunc allatis observationibus euincere conatur, praeter corpus callosum nullam fuisse cerebri partem, quae non destructa interdum fuerit obseruata sine ulla functionum mentis laesione et abolitione. Adfert igitur exempla, destructae ingentis partis corticis et medullae, destructorum corporum striatorum, thalamorum neruorum opticorum, glandulae pinealis, natium et testium, cerebelli, ubi tamen semper aegri integris animae functionibus usi sunt ad extremum usque halitum. Ut vero sententia haec de corpore calloso, eo firmiter redderetur, plurimas adducit obseruationes, ubi, corpore calloso aut presso, aut ad partem destructo, functiones animae turbatae, et tandem omnino abolitae, visae sunt. Omnibus ex his obseruationibus concludi posse putat, corpus callosum esse sedem functionum animae.

## §. V.

<sup>14)</sup> Memoir. de l'Academie des Sciences. 1741. p. 199. sq.



## §. V.

Num vero argumenta CL. DE LA PEYRONIE tanto robore pollent, ut sibi persuadent? Aduertamus ad allata exempla animum, omni praeiudicata opinione liberum, et videamus, an fundamento esse possint argumentis, quae illis superstruxit. In omnibus illis historiis corpus callosum fuit pressum a pure, sanguine, tumoribus, aut illi incumbentibus, aut in cavitate ventriculi contentis. Nulla tunc ratione habita partium cerebri corpori calloso subiectarum, euincere inde conatur CL. VIR, aegros male sese habuisse ex solo vitio corporis callosi. Cur autem corpora striata, principium nempe crurum cerebri, quae presso corpore calloso non possunt non una simul adfieri, plane negligit? Praeuidit hanc obiectionem CL. LA PEYRONIE, illamque sic diluere studet, pressionem corporum striatorum non multum hic valere, cum multa docuerint exempla<sup>15)</sup>, vitam fuisse superstitem, corporibus striatis plane destructis. Sed hac responsione obiectio non plane remoueri videtur. Si enim ex una alteraque observatione, ubi, vita superstiti, corpora striata destructa sunt inuenta, concludere statim liceret, nunquam illorum laesionem, aut pressionem, alicuius momenti esse faciendam, eodem et multo potiori iure de omni fere cerebri haemisphaerio possemus asserere, nulla illius pressione functiones C. H. posse turbari, quia maxima illius pars interdum destructa fuisse legatur, salua tamen vita per multos saepe dies, integrisque animae functionibus. Quid tamen frequentius contingit, quam apoplexia, aut saltem hemiplegia, ex pressione cerebri ab effuso sanguine, illiusque satis saepe exigua parte, inter cerebrum et ossa cranii contenta?

## §. VI.

Sed sumus faciles, concedamus, mala illa ex vitio solius corporis callosi fuisse nata. Num vero privilegium hoc soli corpori calloso competit? Nulla est facile cerebri pars, vel a corpore calloso remotissima, cuius vitium non aliquando aut vitam ipsam, aut integritatem functionum animae sustulerit, omnibus aliis illaesis. Ex innumeris observationibus paucas tantum feligam, earum imprimis partium ratione habita, quibus quodammodo male adfectis, via spirituum a corpore calloso ad partes non penitus intercipi poterat. Sic<sup>16)</sup> WEFERUS exemplum apoplexiae post duodecim horas lethalis affert ex FERNELIO de addit. rer. caus. ubi discisso capite neque ossis, neque meningum, neque substantiae cerebri quidquam fuit diffractum, sed sanguis tantum, duorum cochlearium mensura, ex disruptis interioribus oculi venis, in cerebri basi procubuit. Num hac sanguinis quantitate omne iter spirituum per crura cerebri in nervos intercludi poterat? TULPIUS<sup>17)</sup> itidem refert historiam viri ex apoplexia mortui, a fracto osse sphenideo, et sanguine in basin cranii collecto. Alia non pauca apoplexiae exempla ex effuso in basin cranii sanguine habet WEFERUS<sup>18)</sup>, BONETUS, alique. Vulnerabatur<sup>19)</sup> quidam baculo acuto in oculi sinistri orbita

15) Petit lettre à un Medecin I. obs. I. et observ. III. Memoir. A. R. S. p. 208. 209.

16) Tr. de apopl. p. 234.

17) Observ. Med. L. I. c. III. p. 7.

18) Tr. de apopl. Obs. III. p. 11.

19) RUYSCH. Observ. Anat. Chir. Centur. Obs. 54.

orbita superiori: illis, qui curationi praeerant, vulnus exigui momenti videbatur, breui tamen post obiit patiens. Huc quoque pertinent vulnera cerebelli, eaque satis parua interdum subito lethalia. Cerebellum enim laesum nihil peculiare obtinere, nec semper mortem adferre, inferius manifeste patebit. Sic catelli <sup>20)</sup> BOHNII, cultello in cerebellum adacto, statim post leuiore partium externarum conuulsiones expirarunt. RIDLEYUS <sup>21)</sup> vidit, vulnerato canis cerebello statim de vita fuisse actum. Idem refert VIEUSSENIUS <sup>22)</sup>. Ipsa quaedam historia a CL. DE LA PEYRONIE <sup>23)</sup> allata hic nobis succurrit puellae ex cephalaea mortuae, in qua, cranio aperto, praeter abscessum super nates et infundibulum nullum vitium fuit inuentum. Videmus ergo, ex funesto effectū partis alicuius cerebri non statim posse colligi, sedem animae ibi esse collocatam. Annon <sup>24)</sup> eadem lethalitas, aut maior, vulnere medullae spinalis? quae tamen non est animae sedes, cum ea compressa, deleta, diu homo superuiuat, integerrimis mentis functionibus.

## §. VII.

Sed multa praeter ea sunt alia, quae sententiae huic de corpore calloso, sede animae, ita aduersantur, ut hanc theoriam, si non plane euertant, dubiam tamen semper et suspectam reddere possint, vel si omnino nulla hanc circa rem capta fuissent experimenta. Quae autem contra illam possunt adduci, alia ex Anatomie tum humanae, tum comparatae, alia ex observationibus, captisque in viuīs animantibus experimentis, sunt desumpta. Sedem animae esse locum, ubi omnes totius corporis nerui conueniunt, nemo facile est, qui dubitat. Omnium autem neruorum stamina, idem in punctum posse conuenire, ipsa impenetrabilitas corporum impedit. In concesso ergo est, partem illam alicuius esse magnitudinis. Illam vero non adeo exiguam esse posse, inde conicio, quod omnes fibrillae nerueae per totum corpus dispersae, nulla excepta, ibi confluere debeant, quum unumquodque nerueum vasculum, ab omnibus aliis distinctum, currat a fine illius extremo ad usque primam in cerebro originem. Findi <sup>25)</sup> enim neruos, persuaderi nobis non patiuntur determinata vitia partium non omnium, sed singularum, a cerebri vitiis, aphoniae, surditates, mutitates, paralyfes imprimis singulorum musculorum. Coniungas nunc, quae so, molem medullae spinalis, omnesque neruos, qui per cranii foramina prodeunt, et consideres, an moles corporis callosi, cum collectione omnium illorum neruorum, ullo modo possit comparari. Video effugium quoddam, obiciunt forte, fibras in neruis esse tela cellulosa coniunctas, quae molem augeat. Sed fabrica medullae spinalis, et plerorumque neruorum in origine fabricae corporis callosi est finillima. Num autem omnes nerui conueniunt in corpore calloso? Videmus, illos diuersissimis

et

20) De renunc. vuln. p. 230.

21) Anat. Cerebr. cap. XVII. p. 167. Edit. Lugd. Bat.

22) Neurogr. univ. L. I. c. 20.

23) Mem. A. R. S. 1741. p. 205. n. f.

24) Ursit iam hoc argumentum VENER.

AC ILL. PRAEC. in prim. lin. Physiol. §. 82. p. 196.

25) Conf. III. PRAEC. Prim. lin. Phys. p. 192.



et a corpore calloso remotissimis locis medullae oblongatae produci. Sic oritur nervus patheticus a stria medullari coniungente pedunculos cerebelli retro testes. Quintus a pedunculis cerebelli eidentissime. Septimus parte molliori ex ipso ventriculo quarto, altera dura a parte cruris cerebelli proxima ponti. Octavus ab intervallo corporum oliarium et pyramidalium<sup>26)</sup>. Quis vero ullum horum nervorum deduceret a corpore calloso? Qua ratione corpus callosum cum nervis opticis conexum dici potest? Oriuntur illi maxima ex parte ex thalamis, et<sup>27)</sup> praeterea a natibus stria medullari transversum thalamis adiuncta? Albani vero membranam, qua superius nervi optici obducuntur, medullaribus fibris constantem, neque a superiori Centri Ovalis regione prodire, neque illuc conrendere ac terminari, contra VIEUSSENIUM iam affirmavit SANTORINUS<sup>28)</sup>. Neque ullo modo probabile est, nervos valde longe ab ea sede provenire, quam solertia Anatomicorum demonstravit. Quenam autem cogitari potest ratio, cur natura nervum mollem ex ventriculo quarto, quantum ex stria illa medullari retro testes etc. produxerit, si omnes nervi conveniant in corpore calloso? Cur fibrae ex corpore calloso, per tot ambages ad principium fere usque medullae spinalis, progressae, ibi demum reflexae, rursus ascendendo principium quinti et quarti constituerent? Nervus autem esse originem ibi, ubi arteriola definit, et fibra medullaris incipit, ILL. PRAEC.<sup>29)</sup> ita demonstrasse videtur, ut nullus plane dubitationis locus relinquatur.

#### §. VIII.

Alterum, quod opinionem hanc de corpore calloso infirmare potest, nobis suggerit argumentum Anatomia comparata. Valde enim est improbabile, sedem animae esse locatam in parte quadam, quae per unum alterumque tantum genus animalium regnat. Praeter hominem autem et bestias quadrupedes omnia animalia corpore calloso carent. WILLISIUS<sup>30)</sup> iam observavit, aves corpore calloso destitui, arbitratus illius vicem supplere duas eminentias orbiculares intus cavas ad utrumque latus medullae oblongatae sitas. PARISINI<sup>31)</sup> in dissectione struthionis inprimis attentione dignum hoc putarunt, nullum apparere in aibus corpus callosum, sed duo hemisphaeria cerebri, ubique inter se diuisa, iungi inuicem posteriori tantum cerebri parte, fibrillis quibusdam tenuissimis. Eandem fere fabricam reperiri in omnibus aibus. Piscium<sup>32)</sup> cerebrum maxima ex parte cum cerebro auium summam habet similitudinem, quorum etiam medullae oblongatae duae illae protuberantiae sunt adnatae, quibus praeterea minimum pro corporis mole est cerebrum. Amphibia inter et pisces hac in re summa intercedit affinitas. Insectis vero cerebrum ita paruum est, ut subinde<sup>33)</sup> quid sit cerebrum, possit ignorari, vel certe minutissima par-

26) Conf. ILL. PRAES. Prim. lin. Phys. §. 371. p. 187.

27) SANTORIN. Observ. Anat. cap. III. §. 14. p. 63.

28) Ibid. cap. III. §. 7. p. 56.

29) Prim. lin. Phys. §. 83. p. 196.

30) Anat. Cerebri. c. 5.

31) Mem. A. R. S. diss. des anim. T. I. p. 373.

32) WILLIS. ibid.

33) SWAMMERD. Bibl. nat. T. XV. f. b. T. XXII. f. b. T. XXIX. f. 7.

particula<sup>34)</sup>, ganglio medullae spinalis non maior, reperiatur. Multa tamen iis ex animalibus, quae destituuntur corpore calloso, sunt satis astuta, et pleraque quadrupeda sagacitate superant, apud exemplo, quae videntur Castorum industriam aut aequare aut vincere. Si quis autem vellet pro lubitu, uti fecit WILLISIUS<sup>35)</sup> aliam cerebri particulam eligere, cum illo non disputabimus. Nulla enim unquam observatione, nullo experimento, rem ita sese habere, declarare poterit, et eodem iure, quo unica ex imaginatione particulae illae sedem animae adscripsit, unusquisque illi honorem hunc poterit denegare.

#### §. IX.

Timidus tamen, etsi omnibus his munitus, accederem ad sententiam hanc de corpore calloso, sede animae, oppugnandam, quae tot tantisque Viris fuit probata, nisi observationes asferri possint, quibus conlinit, vitam et functiones animales superfuisset integras, corpore calloso presso aut alio modo laeso. Temerarium fortasse quibusdam videbitur, me, hominem iuuenem, promittere exempla corporis callosi vitii, sine abolitione et turbatione functionum animalium, cum CL. DE LA PEYRONIE<sup>36)</sup>, Vir tantae famae, assermet, se nunquam in ullo auctore legisse observationem laesi corporis callosi, ubi functiones animales non fuerint aut penitus abolitae, aut saltem magis vel minus turbatae. Nullus tamen, puto, facile mihi succensebit, qui consideret me nullam attulisse observationem, nisi ubi aut corporis callosi plana facta fuerit mentio, aut vitium ita se habuerit, ut corpus callosum communem ruinam effugere non potuerit. Fateor quidem, exempla corporis callosi, ex morbo male adfecti, sine ulla turbatione functionum animae, aut sensus abolitione, non tam frequenter inueniri. Nemini autem facile mirum hoc videbitur, qui non ignoret, vix unquam corpus callosum posse affici sine omni iniuria partium vicinarum et subiacentium. Huc accedit, quod diligentia observatorum hac in re nos deferat. Nimis pauci enim sunt WEPFERI, qui, quatenus singulae cerebri partes fuerint laesae, accurate nobis tradant.

#### §. X.

Non parum infirmari mihi videtur dignitas corporis callosi historiis illis hydrocephalorum, quibus cerebrum enormiter saepe fuit extensum. Eoque confidentius illis utor, quin in aegris LA PEYRONIANIS plerisque omnes funesti euentus leui tantum pressioni saepe fuerint tributi. Omnem fere fidem superat, quod narrat TULLIUS<sup>37)</sup> de puero quinquenni hydrocephalico, qui ad mortem usque gaudebat integris mentis muniis, cuius tamen cerebrum ab exuberante aqua ita fuerat distentum, ut, amissa figura globosa, in formam conuexi forniciis reductum, instar alicuius crassioris membranae adhaeresceret undique arcuatae ossium dissolutorum circumferentiae.

34) Ibid. T. XXVIII. f. 3. T. XXXIV. f. 7. T. XI. f. 9.  
35) loc. cit.

36) Memoires A. R. S. pag. 217. Ann. 1741.  
37) Obs. Med. L. I. c. 24.



rentiae. Confusa haec cerebri intricati congeries iam tunc, uti refert TULPIUS, fug-  
gessit multis inexpugnabile argumentum, aduersus distincta illa loca, quae nonnulli  
adsignant cuilibet animae facultati. Non multum absimilis est historia hydroce-  
phali, quem in bienni puella obseruauit VESALIUS <sup>38)</sup> Augustae Vindelicorum, quae  
ad mortem usque sensibus integris est usa. Aquae vis erat collecta in dextro sinistro-  
que cerebri ventriculo, quorum amplitudo ita increuerat, ut nouem fere aquae libras  
continuerint, cerebrum vero ita erat extensum, ut in capitis vertice membranae quasi  
modo esset tenue, et quodammodo continuum cum tenui sua membrana corpus, cum  
cerebellum interim, cerebrique basis uniuersa secundum naturam se haberent, nul-  
libi nisi in cerebri ventriculis aqua reperta. Confirmantur haec exemplo pueri bi-  
mulum hydrocephalici <sup>39)</sup>, qui semper alacris, nunquam vexatus stupore, dolore capi-  
tis, defectu appetentiae aut indigestione, nunquam aegrotauit, nisi paucis diebus ante  
mortem, cuius in unoquoque cerebri ventriculo laterali pinta aquae fuit reperta.  
Apud PARISINOS <sup>40)</sup> extat similis historia duorum puellorum, qui sine ulla conuul-  
sione aut defectu rationis exstincti sunt. Duo anteriores ventriculi et tertius erant  
una cavitates, quae continebat tres mensuras aquae, quas vocant chopines, substantia ce-  
rebri ad digiti minimi crassitiem redacta. Multo magis pugnat contra hanc senten-  
tiam, quod narrat DIEMERBROEKIUS <sup>41)</sup> de aegro, cuius in ventriculis cerebri ante-  
rioribus plus quam semilibra puris fuit inuenta, qui nihilominus sanae semper extitit  
mentis, motuque non fuit priuatus ad mortem usque. Fieri non potuit, quin his in  
casibus corporis callosi fabrica summe fuerit turbata, sine ulla tamen mentis turba-  
tione subsecuta.

#### §. XI.

Sed maius vero pondus additur iis, quae dicta sunt contra sententiam LANCI-  
SIANAM de corpore calloso, si afferri possint obseruationes, quibus constitit, vitam,  
et saepe sensum et motum per aliquos dies superfuisse, corpore calloso aut plane destru-  
cto, aut vehementissime tamen laeso. Motum certe cordis et respirationis integrum  
perstitisse, etsi corpus callosum una cum omni cerebro fuerit destructum, non adeo  
pauca docent exempla. Canis, cui VIEUSSENIUS <sup>42)</sup>, capite per superiora aperto,  
cerebrum totum ex caluaria exemerat, per sex horas respirauit. CHIRACUS <sup>43)</sup> euul-  
sit cani cerebrum, qui nihilominus per aliquod tempus vixisse legitur. Canem per  
horam vixisse, cerebro lamellatim excisso, testatur PERRAULTUS <sup>44)</sup>. Eadem fere  
experimenta repetiit KAUWIUS <sup>45)</sup>, qui canibus per foramen ope trepani factum  
scalpello utriusque hemisphaerii medullam diffregit. Omnes quidem muscoli his in  
canibus post alterum tertium quartumque horae minutum reddebantur paralytici,

P 2

cordis

38) De fabrica C. H. L. I. c. 5. p. 24.

39) Phil. Transact. n. 256.

40) Anc. Mem.

41) Anat. C. H. libr. III. c. X. p. 394.

42) Neurogr. libr. I. c. XX. p. 123.

43) Phil. Transact. n. 226. p. 461.

44) Mecanique des animaux. L. II. c. 7.

45) Vid. Impetum faciens Hipp. pag.

257. sq.

cordis tamen et respirationis actio pergebat, quas in cane ita relicto, post octauam horam superflite, languidas se comperisse affirmat.

## §. XII.

Cur autem immoremur huiusmodi obseruationibus, quae vitam tantum vegetabilem persitisse docent, cum interdum non solum sensus et motus, sed et ipsa vis cogitandi superstes fuisse legatur, corpore calloso vitato? Multum inprimis hic valet ad confirmanda, quae diximus contra dignitatem corporis callosi, historia feminae, quam nobis tradidit WEPFERUS <sup>46)</sup>, cuius capite aperto, corpora striata et portio corporis callosi exulcerata, inaequalia et quasi lacera apparuerunt, ex abscessu oui magnitudine in ventriculo dextro reperto. Illa tamen femina ad ultimum usque halitum accurate vidit et acute audiuit; delirauit quidem per quosdam dies, ante obitum tamen ad mentem rediit, hemiplectica quoad motum sinistro in latere, integro tamen sensu, tum in sinistra tum in dextra corporis parte, usa est ad vitae extremum. Similis extat historia apud MORGAGNIUM <sup>47)</sup>, inuenta inter schedas a VALSALVA relictas. Vir septuagenario maior, nullo morbo laborans, nisi quod per aliquot annos languidius incederet, in colloquiis tarde responderet, debiliusque admodum visu esset, subito apoplexia correptus intra paucas horas exanimatur. In ventriculis cerebri multus erat effusus sanguis. Sed vetustior causa, atque adeo locus, unde prodierat, in ipsa cerebri erat substantia, quae alte erosa ad extimam usque superficiem cerebri et praeterea in latum ad pugni dimidium inuenta fuit. Haec autem erosio thalamum praesertim nervi optici occupauerat eumque dextrum. Non video, quomodo corpus callosum, thalamo incumbens, communem ruinam potuerit effugere. Maximi hic quoque videntur esse momenti experimenta in canibus, licet alium ob finem, instituta, quibus animalibus totum exentum fuit hemisphaerium, corpore calloso per omnem longitudinem discisso, ut nempe inde pateret, utrum in sano latere, an in vulnerato muscoli redderentur paralytici. Experimentum tale legitur in Commentariis <sup>48)</sup> Academiae scientiarum Bononiensis, a CL. MOLINELLO institutum, qui, cum sinistram cranii partem viuenti cani aperuisset, resectumque cerebri lobum indidem penitus exemisset, adnotauit, sinistra in parte sensum et motum fuisse integrum, cum utrumque in dextro periisset. Auctores horum Commentariorum id ipsum confirmantes addunt, se scire, multos alios viros idem summis experimentum, eodem exitu. Sed iam ante MOLINELLUM PETITUS <sup>49)</sup> eundem effectum obseruauit, et, quod inprimis ad rem nostram facit, adfirmavit, experimentum nunquam successu carere, si corpora striata dissecantur, aut a cerebri hemisphaerio plane separentur. Qua ratione autem corpora striata possint a cerebri-hemisphaerio plane separari, intacto corpore calloso, omnino non video. Testatur praeterea, canem, cui dimidium cerebrum eximerat, non statim mortuum fuisse. Magnam meretur attentionem obseruatio CHIRACI <sup>50)</sup>. Exemit cani dimidium cerebri, non ideo

46) Tr. de apoplexia. hist. XIV. p. 397.  
401.

47) Epist. anat. XIII. §. 19.

48) Tom. I. p. 139.

49) Lettre à un medecin I. Obs. 2.

50) Phil. Transact. n. 226.



ideo non potuit animal artus movere et ambulare: totum euulfit cerebrum, sed sensus et respiratio integra superfuērunt. Cur bestia non statim mortua cadit, dum domicilium animae destruebatur? Omittō historias infantum sine cerebro natorum, etsi in quibusdam praeter cordis et respirationis actionem quarundam aliarum partium motus fuerit interdum deprehensus.

## §. XIII.

Haec fere sunt, quae adferre volui, ut experimentis meis eo facilius fides haberetur. Temerarium enim, et in homine inuene non facile condonandum, mihi visum est, sententiae, quae viris, fama et auctoritate pollentibus, fuit probata, experimenta quaedam opponere, et, ut sibi credatur, ab aliis exigere, nisi simul, tum veritatem Anatomicam illis respondere, tum observationes aliorum eundem effectum affirmare, demonstraret. Quenam igitur utilitas corporis callosi, striarumque in illo apparentium, esse videtur? Opinio certe veterum, illud impedire, ne pituita in ventriculos defluat, nunc plane obsoleuit. Verosimillimum est <sup>51)</sup>, principem illius usum esse, communicationem aliquam motuum forte et sensuum inter utrumque hemisphaerium facere. Et MORGAGNIUS <sup>52)</sup> arbitratur, decussationem illam fibrarum, cuius ope fieri videtur, ut dextro cerebri latere laeso, potius sinistri lateris nervi per totum corpus resoluantur, et contra, inprimis in corpore calloso esse quaerendam. Fibris enim illis medullaribus, quae in rima, inter corpora pyramidalia descendente, ab uno latere in alterum sunt ductae, parum tribuit, quae illi secundum accuratissimas observationes transversae potius <sup>53)</sup>, quam decussatae esse videntur, ut putet, pro quibusdam quasi canalibus, ut vocant, communicationis esse habendas, per quos aequalis utrinque fluidi copia conseruetur. Nec ad hanc explicationem faciunt fibrae, quae in utraque annularis protuberantiae crepidine, et praesertim in anteriore apparent, cum eae non ad cerebrum, sed ad cerebelli pedunculos attineant.

## §. XIV.

Progrediamur nunc ad explicationem aliorum phaenomenorum, quae mihi, dum experimenta caperem, notatu digna videbantur. Cum in omnibus meis experimentis non corpus callosum solum, sed praeter illud aliae quoque partes, inprimis vero semper medulla oblongata fuerint vulneratae, inde quoque colligi posse puto, vulnera huius partis, modo contingant sine magna effusione sanguinis, non tam subito esse lethalia, uti cum aliis FRID. HOFFMANNO <sup>54)</sup> inprimis visum fuit, qui sedem animae ibi collocatam esse arbitratus, vel minimam eius laesionem subitam mortem adferre adfirmat. PARISINI <sup>55)</sup> nonnulla habent exempla hominum, qui sanati fuerant, etsi medulla oblongata multum fuerit laesa globulo plumbeo, per superiorem

P 3

orbitam

51) ILL. PRAEC. Prim. lin. Physf. in Comm. Boerh. §. 269. n. d. pag. 524.  
§. 398. Prim. lin. Physf. §. 369. p. 186.

52) Epist. Anat. XIII. §. 20. 21.

54) Opp. omn. T. I. sect. III. §. 12. p. 85.

53) Consistentem habet ILL. PRAEC.

55) Acad. des Chirurg. p. 312. sq.

orbitam in cerebrum ingresso. Alias cerebri partes, quae meis in experimentis sunt simul vulneratae, ut corpora striata, thalamos nerv. opt. etc. haecenus omittere videtur. Observationes enim a CL. LA PEYRONIE <sup>56)</sup> collectae, tum PETITI <sup>57)</sup>, VALSALVAE <sup>58)</sup>, aliorumque experimenta satis manifesto docent, nec vitam nec functiones animales statim tolli, partibus illis destructis et laevis. Cum ergo ex his omnibus elucescat, nec ulli singulari in cerebro particulae monarchiam illam posse adscribi, nec maxima vulnera et abscessus late depasti lateralia cerebri hemisphaeria, dum sensus integer superstes fuit, credere sinant, animae sedem per omne cerebrum esse extensum; quid est cur dubitemus, sententiam sequi ILL. PRAECEPTORIS <sup>59)</sup>, ubique nempe esse animae sedem, ubi initium est nervi cuiuscunque, ut omnium nervorum iunctae primae origines efficiant verum sensorium commune?

## §. XV.

Mirum mihi videbatur, canes, quibus instrumento sinus longitudinalis erat peritusus, non statim ob sanguinem effusum ex apoplexia esse mortuos. Uterque enim per plures horas superuixit; alter per XII, alter per XVIII, et posterior quidem semper alacris et vegetus. Nec adeo multus in ventriculis sanguis erat effusus, grumus vero sanguinis vulnus ad basin cerebri usque replebat. Non video, quid apoplexiam vehementissimam impedire potuerit, praeter ipsum instrumentum cylindrica figura praeditum, quod in vulnere reliqueram. Dura enim mater circa acum triquetram sese constringens sanguinis effluxum sistere potuit. Rem autem reuera ita sese habere, inde colligi potest, quod alter canis, quam primum instrumentum fuerat extractum in profundissimum soporem inciderit, pauloque post interierit. Negari tamen non potest, canonem illum, de lethaliitate vulnere sinus longitudinalis, non tam late patere, ut non aliquam exceptionem patiatur. Non desunt enim exempla huiusmodi vulnere sanatorum, quale refert LA MOTTE <sup>60)</sup>, ubi, lata plaga per superiorem capitis partem inflicta, non solum sinus fuit apertus, sed et ipse cerebri cortex vulneratus. Multo magis hic potest ad persuadendum historia, quam refert MARCHETTUS <sup>61)</sup>, vulnere, quod dissecto sinu longitudinali ad corpus callosum usque penetrauerat, neque lethale fuerat, haemorrhagia fortissimis adstringentibus domita. SHARPIUS <sup>62)</sup> quoque testatur, bis se vidisse, huius partis vulnera necem non attulisse. Eadem observatio pulsationem sinuum ex parte quoque refutare videtur. Nisi enim aequabilis fuisset sanguinis in sinibus fluxus et si sanguis nunc maiori modo, modo minori impetu per sinus propelleretur, relictio instrumenti vix potuisset impedire, quin sanguis, super corpus callosum effusus, subitaneam apoplexiam produxisset, quae tamen altero in cane nunquam, in altero tum demum, postquam instru-

56) loc. cit.

57) loc. cit.

58) MORGAGN. Epist. Anat. XIII. §. 19.

59) Comm. Boerh. Vol. IV. §. 568. n. a.

Prim. lin. Phys. §. 82. 83. Eadem est sententia CEL. KAUFM. loc. cit. §. 344.

60) Traité de Chirurgie. Tom. II. Obs. 161. p. 343.

61) Obs. med. chir. 4.

62) Treatise of the operations of Surgery. p. 142.



instrumentum fuerat extractum, est secuta. De sensibilitate medullae cerebri et durae matris inferius agendi locus erit.

Transseamus nunc ad reliqua experimenta, circa cerebellum, duram matrem, nervosque diaphragmaticos instituta. Omnia simul afferam, cum interdum eodem in animale varia fuerint observata.

### EXPERIMENTUM I.

Per partem inferiorem lateralem dextram ossis occipitis, canis, mediocris magnitudinis, adest instrumentum *trois quarts* dictum, directione fere horizontali, eo usque, donec in os oppositum impingeret. Canis ab ictu statim paulum attonitus sensum tamen ad se rediit, magnosque edidit clamores. Factum hoc est vespere circa horam sextam. Cum altero die hora prima pomeridiana redirem, deprehendi canem vegetum, qui, ut a vicinis audivi, per omne tempus multum latraverat. Cum viderem, animal hoc ex vulnere non multum fuisse affectum, extraxi instrumentum peritidique os occipitis paulo superius in media illius parte. Vulnere hoc inflicto statim apoplexia corripiebatur. Altero die reuersus mortuum inueni. Cranio aperto et cerebro exento, vidi vulnus die hesterno illatum penetrasse inter tentorium et cerebellum ad basin cranii. Omnia erant plena sanguine coagulato, tum in basi cranii, tum inter tentorium et cerebellum, cum sinus quartus magno vulnere apertus esset. Vulnus vero primum illatum progrediebatur per ipsam mediam cerebelli substantiam ad latus oppositum. Facile patet, canem ex secundo vulnere apoplecticum periisse.

### EXPERIMENTUM II.

Instrumentum intrusi in mediam posteriorem partem ossis occipitis, ea directione, ut ictus antrorsum paulumque deorsum vergeret. Canis, etsi quodammodo stupefactus, nec motu tamen nec sensu carebat, ut irritatus eiularet. Altero die hora decima reuersus aequè viuidum deprehendi, ac priori die. Alio tunc vulnere perforavi cerebellum, instrumento adacto per ossis occipitis inferiorem lateralem partem, a sinistris dextrorsum, deorsum. Vespere hora sexta vitam adhuc trahebat, etsi languidissimam, omni sensu motuque priuatus, superssiste tantum leuissima cordis et respirationis actione. Quo viso, decreui experimenta capere circa nervos diaphragmaticos. Thorace aperto, omnia cadaueris instar frigebant, respiratio tamen et cordis motus pergebat. Nervo diaphragmatico digitis fortissime compresso, et supra compressionem irritato, diaphragma constringebatur, ligavi neruum, supra ligaturam irritavi, nulla autem inde secuta est diaphragmatis concussio. Infra ligaturam vero irritato nervo, diaphragma contrahebatur. Amputavi neruum, abscissam partem irritavi, subsecuta semper diaphragmatis contractione. Idem observavi altero in latere. Constringebatur diaphragma, siue neruum sursum, siue deorsum stringerem. Aperto cranio vidi, vulnus priori vice inflicto per medullas cerebelli substantiam in cerebrum usque penetrasse, alterum vero vulnus paulo inferius a latere per medullam cerebelli, transiens ventriculum quartum, ad latus capitis oppositum

fitum progressum esse. Venter quartus grumo sanguinis refertus, et medulla spinalis undique sanguine circumfusa fuit.

### EXPERIMENTUM III.

Eadem experimenta repeti in cane apoplectico, omnia phaenomena prioribus simillima. Quibus obseruatis, cor uno ictu excidi, quod in manu per quatuor minuta, quoties acie scalpelli fuerit irritatum, fortiter pulsabat. Proiectum in aquam frigidam palpitabat aliquoties, usque dum esset plane frigefactum.

### EXPERIMENTUM IV.

Ope trepani frusto orbiculari ex cranio capitis canis exciso, ablata muscoli temporalis parte, duram matrem nudatam pupugi, irritavi mucrone scalpelli, infudi solutionem Mercurii sublimati, sed animal nullum plane signum dedit doloris, omnis conuulsionis expertus. Cum hanc ob rem canem apoplecticum putarem, irritavi cutem pendulam, ille vero, optime se dolorem percipere, alto clamore testabatur. Motus durae matris motui arteriarum synchronus fuit, quarum in diastole attollebatur, in systole subsidebat. Discissa dura matre, discerpsi, pupugi, irritavi corticem, nullum doloris signum in animale adparuit. Intruso stilo ad medullam cerebri, canis eiulat, valde vero conuelli non vidi. Quo magis euident esset conuulsio, liberaui vinculis canem. Ambulat per cameram, sed quasi ebrius et stupidus. Iterum immisi stilum in medullam, alte clamat, sed non conuellitur, ambulare pergit. Paulo post per gyrum circumambulat per aliquot minuta, ut equi, qui molendinas mouent, saepe cadit, modo in hanc, modo in illam partem, erectus gyratim pergit ambulare. Post quaedam minuta uno ictu concidit in terram, totoque corpore conuellitur. Sublatus pedibus insistere non amplius potest. Tabulae imponitur, omne corpus flectitur in semicirculum, musculis ex parte opposita, nempe sinistra, resolutis, verberatus eiulat. Stilum traicio per cerebrum in cerebellum. Animal conuellitur toto corpore, inprimis autem opisthotono corripitur. Bis vel ter post aliquam quietem succutitur omni corpore, ut canes corpus succutere solent, qui in aquam inieci terram rursus attigerunt. Sensum languidior factus, nullis verberibus, nulla irritatione potest excitari, et breui post profundas respirationes moritur, conuulsionibus et spasmis paulo ante mortem cessantibus.

### EXPERIMENTUM V.

Ex canis iunioris cranio parte orbiculari trepano ablata, duram matrem, ut in priori experimento, scalpello irritavi et oleo vitrioli instillato, nulla plane deprehendi doloris signa, etsi oleum vitrioli proximas carnes, quas attingebat, depasceretur. Oleo vitrioli durae meningi innatante, canis alacris capite erecto huc et illuc circumspexit. Sanguis ex arteria magna durae matris discissa undatim profluens impedit, quo minus experimenta circa ipsam medullam, instillando oleum vitrioli, potuerim instituere. Adegi scalpellum in cerebri hemisphaerium dextrum, canis optinie sentiens conuulsus est. Intruso vero scalpello per cerebrum ad cerebellum usque, oriebantur



bantur omnibus in corporis partibus convulsiones horrendae, ut nulla pars quiesceret. Cerebro per utrumque hemisphaerium ad basin usque dissecto, et cerebello pene in pulsam rotato, cor per aliquot minuta magnis ictibus pulsabat. Per foramen cerebri magna quantitate propellebatur.

## S C H O L I A.

### §. I.

Ab eo inde tempore, quo WILLISIUS distinctas animalitatis et vitalitatis provincias primus proposuerat, dissensus semper fuit auctorum circa lethalem vitam et vulnerum cerebelli. WILLISIANAE sectae assidue, vitia et vulnera illa lethalia esse affirmantes, opinionem suam comprobare studebant observationibus quorundam, ut VIEUSSENI<sup>1)</sup>, DRELINCOURTH<sup>2)</sup>, PERRAULT<sup>3)</sup>, RIDLEY<sup>4)</sup>, BOHN<sup>5)</sup>, etc. quibus constitit, cerebello laeso, aut presso, statim fuisse actum de vita animalis. Alii ad refutandam hanc sententiam afferunt historias quasdam hominum et animalium, quibus cerebellum fuit vulneratum, insigniter pressum, aut plane destructum, vita satis diu superflite. Ne ergo hac in discrepantia auctorum, sola aliorum auctoritate nixus in alterutram transiisse sententiam viderer, optimum esse credidi, rem ad examen revocare, ipsisque oculis meis, quae doceant experimenta, intueri. Apparet autem ex iis experimentis, vitam superesse per multas horas, cerebello vehementer laeso. Alter enim canis, cui cerebellum erat pertusum satis magno instrumento, vixit alacris per XII horas, alter post duo inflicta vulnera per XXIV horas, etsi ultimis horis ob medullam spinalem sanguine oppressam languidissimus. In duobus aliis pergebat cordis et respirationis actio per horam fere, cerebello omni lacerato. Quae phaenomena dum attendo, et cum aliorum observationibus conféro, omnino me inde concludere posse videor, nervos organa involuntaria adeuntes non ex solo cerebello oriri. Collegi autem varias observationes cerebelli vulnerati, scirrhi, compressi, corrupti, ablati, integerrimis tamen plerumque vitalibus functionibus. Non immorabor historiis illis animalium, quorum cor pergit moveri per aliquot horas, detruncato capite, cuiusmodi sunt WEPFERI<sup>6)</sup>, BOYLAEI<sup>7)</sup>, BARTHOLINI<sup>8)</sup> aliorumque. Infinita enim exempla omnia in eo consentiunt, cor, etsi e corpore sit exemptum, vi quadam in se ipso recondita, motum continuare, interdum per horas usque, dum plane frigidum fuerit. Alia adsunt enim, quae multo plus exhibent. Attentione certe dignum est, quod narratur in *Philosophicis Transactionibus Anglicanis*<sup>9)</sup>, CHIRACUM nempe abstulisse cani cerebellum, qui nihilominus per XXIV horas vixit. Idem<sup>10)</sup> testatur, alium canem vixisse per horam, euulso cerebello, postquam, respiratione cessante, aer in pulmonem inflatus erat. PETITUS<sup>11)</sup>, parte cranii

1) Neurogr. univ. L. I. c. XX.

2) Canicid. III.

3) Mécanique des animaux. L. II. c. 7.

4) Anat. Cerebr. Cap. XVII. p. 167.

5) De Renunc. vuln. p. 230.

6) De cic. aquat. p. 90.

7) De utilit. Philos. exper. p. 114.

8) Epist. Cent. IV. ep. 92. p. 521.

9) n. 226.

10) Ibid.

11) Lettre II. à un Médecin.

cranii trepano ablata, immisso scalpello abscidit partem hemisphaerii sinistri cerebelli, canis, qui, tribus demum horis exactis, post operationem mortuus est. Idem experimentum repetitum fuit altero in cane, qui per sex dies tali in statu vixit, respiratione bona et sensu semper gaudens omnibus in corporis partibus. Affirmat IDEM VIR CL. in multis aliis canibus eadem se phaenomena vidisse. Excitatus fuit haec ad experimenta ab historia militis globulo plumbeo vulnerati, qui, traiectus per partem finistram cerebelli, penetrauit ad lobum posteriorem hemisphaerii sinistri cerebri. Mortuus est quadraginta tribus horis post acceptum vulnus. Respiratio per omne hoc tempus bona, pulsus non turbatus, sensibilitas toto in corpore superfuit. KAUWIVS <sup>12)</sup> immisso altius in medullam cerebelli scalpello, notauit, respirationem et cordis motum superfuisse post quartum quintumue minutum vario in diuersis canibus tempusculo. Idem <sup>13)</sup> adegit stilum per foramen magnum occipitis ea directione, ut transiens cerebellum medullam oblongatam laederet. Animal dimissum, haerente intus stilo salit per cameram cadens, subsultu erectum iterum decidens: aliud os <sup>14)</sup> clamantis instar aperit, effectum tamen non sonoro, aliud vero sonitum satis altum edidit. Os <sup>15)</sup>, pollicis longitudine et dimidii pollicis latitudine, figurae irregularis, inuenerunt PARISINI in cerebello epileptici. Nec plane defunt exempla cerebelli vulnerati, et, refragante licet opinione omnium fere Chirurgorum, feliciter sanati. Sic VESLINGIUS <sup>16)</sup>, cum subsisteret Cairi in Aegypto, sanauit senem Abyssinum, cui acinace iuxta lambdoideam futuram vulnus erat inflictum, quod, utramque meningem peruadens, cerebellum ad duorum digitorum latitudinem stringebat. Nullius mali symptomatis fit ibi mentio. His non dissimilia in grauissimo vulnere Patauii se deprehendisse testatur. Similem fere narrat <sup>17)</sup> PLATNERUS curationem factam a Chirurgo Argentoratensi LE MAIRE, in homine, cui non minima pars occipitis cum notabili portione corticis cerebelli fuit ense ablata. LA MOTTE <sup>18)</sup> refert, hominem conualuisse sine febre alioque malo signo, cuius os occipitis a lapidis ictu collisum defederat, et sanguis sub eo et sub dura matre ex ruptis arteriis effluerat. Cerebellum interdum morbis pene inutile redditum fuit, vita satis diu superflite. Legimus illud degenerasse in scirrhum, quale inuenerunt PARISINI <sup>19)</sup> in puero per duos annos ante mortem stupido. Omnibus functionibus animalibus turbatis, pulsus tamen erat regularis, etsi paruus, respiratio debilis et frequens. Dissecto capite apparuit cerebellum cum dimidia parte posteriore medullae oblongatae scirrhosum, in massam quandam albam, homogeam, concretum. Paucos demum ante annos obseruauit VEN. AC ILL. PRAEC. <sup>20)</sup> in puella sex fere annos nata, quae stipem ostiatum petere solebat, scirrhum enormem duarum utrinque unciarum diametro, in quem

tota

12) l. c. §. 326. 13) Ibid. §. 327.

14) Idem phaenomenon a me fuit obseruatum in cane, cui cerebrum erat lacertatum, stilo, uti hic contigit, intus haerente.

15) M. A. R. S. 1737. hist. 8.

16) Obs. Anat. et epist. posth. n. XIII. p. 84.

17) Instit. Chirurg. §. 547. p. 344.

18) Chirurg. Tom. II. p. 322.

19) Mem. A. R. S. 1705. n. 13. p. 56.

20) Phil. Transact. n. 474.



tota aut medullaris aut corticalis substantia cerebelli degenerauerat. HARDERUS <sup>21)</sup> reperit in cerebello puellae, per quosdam ante mortem dies summa cephalalgia vexatae, tres scirrhus, globulorum instar tangendos, quorum unus erat nucis myristicae magnitudine. Similem vidit morbum LANCISIUS <sup>22)</sup> in cerebello hominis, motibus convulsivis obnoxii. Apparuit nempe corpus quoddam durum, album, latum duos transversos digitos et longum tres, ex pluribus glandulis compactum, nonnullis convestitum membranis. In *Eph. Nat. Cur.* <sup>23)</sup> occurrit historia pueri hydrocephalici, cuius cerebellum repertum fuit induratum, cum dura matre et cranio cohaerens, nulla cavitata superflite. In eodem libro <sup>24)</sup> legitur alia observatio cerebelli putrefacti, corpusculis glandulosis scatentis. Aeger hic periit convulsus. CL. LA PEYRONIE <sup>25)</sup> describit tumorem durum in ventriculo quarto haerentem, oui gallinae magnitudine, occupantem locum cerebelli, quod in laminam tenacem, lineam crassam, reductum, tumorem inuoluebat. Aeger paucis ante mortem diebus convulsionibus correptus ad extremum usque halitum usus est functionibus animae integris, sensuque exquisito. Nec respiratio, nec cordis actio turbata fuisse legitur. BRISSEAU <sup>26)</sup> habet observationem tumoris duri, oui columbini magnitudine, siti in medio cerebello. Homo <sup>27)</sup> moritur peripneumonia, antea sinistro in latere paralyticus. Inter duram matrem cerebelli dextro in latere, et os occipitis, inventae sunt duae drachmae sanguinis iam putridi. Adolescens in capite percussus die post vulnus inflictum undecimo moritur <sup>28)</sup>. Resecto cranio inflammatae apparuere meninges, et cerebellum corruptum. Nunquam febricitavit, nunquam deliravit, nisi paucis horis ante mortem. In cerebello hominis phrenitide et convulsionibus subito mortui repertus fuit abscessus, scatens humore pallide flavo <sup>29)</sup>. Huc quoque pertinent historiae <sup>30)</sup> infantum, qui per aliquot dies vixerunt, etsi cerebrum et cerebellum plane defuerit. Adde his aues, resecto capite incedentes, narrante ENTIO <sup>31)</sup>, SAARIO, ALBINO <sup>32)</sup>, KAUWIO <sup>33)</sup>. Animalia imperfectiora plane omitto, de quibus multo magis mirabilia narrantur. Excusabunt, spero, lectores hanc compilationem non vanae ostentationis gratia, sed eo inprimis animo factam, ut manifesto pateret, vulnera et vitia cerebelli non solum non esse lethalia, sed etiam ne turbari quidem motus organorum vitalium, etsi viscus illud plane sit destructum. Haec fuit causa, cur in allatis observationibus inprimis attenderim ad motum cordis et respirationis. Non adeo mirum

Q 2

tamen

21) Apian. Obs. p. 238.

22) De noxiis paludum effluv. Libr. II. epid. III. c. VI. p. 218.

23) Dec. III. An. IV. p. 148.

24) Dec. II. A. IX. p. 429.

25) Mem. A. R. S. 1741. p. 208.

26) Obs. III. p. 27.

27) MORG. Epist. Anat. XIII. §. 23.

28) BONET. sepulcret. Anat. Libr. IV. Sect. XII. p. 561.

29) Ibid. L. I. sect. XIII. obs. XI. p. 324.

30) Vid. huiusmodi exempla in Misc. Cur. An. 3. p. 120. Misc. Med. Phys. Gall. An. 3. p. 54. Eph. Nat. Cur. Dec. I. An. III. Observ. 179. p. 207. Phil. Transact. n. 226.

31) Op. omn. p. 553.

32) Eadem sine dubio cum Albiniana est historia, quam refert Auctor libri: *l'homme machine*, p. 73.

33) Libro saepius citato. §. 331.

tamen hoc nobis videbitur, si consulamus Anatomen, quae docet, maximos <sup>34)</sup> et plurimos, cordis, et organorum respirationi inferuentium, nervos provenire a medulla spinali, quibuscum si conferantur rami intercostalis et octavi paris, ad organa vitalia tendentes, videbimus, affirmari posse, maximam partem liquidi nervosi vitalis venire ex medulla, parvam ex cerebro et cerebello. Confirmatur haec sententia funesto euentu vulnerum medullae spinalis.

## §. II.

Si allatas cerebelli laesi observationes attendamus, non solum inde patet, vitalitatis sedem non esse quaerendam in cerebello, sed confirmari quoque videtur sententia eorum <sup>35)</sup>, qui in ipsius medullaribus cerebri substantiae vasculis anastomosis agnoscunt. Nisi enim ad huiusmodi inosculationem confugiamus, non video, qua ratione possit explicari, quod illae partes, quarum nervi ex ipsis pedunculis cerebelli prodeunt, ex destructione tamen huius visceris nullo modo fuerint male affectae. Nec sufficere videtur responsio, omnes nervos habere fibras et a cerebro et a cerebello. Et si enim inde sequatur, partes illas non plane posse priuari omni affluxu liquidi nervei, fieri tamen non posset, quin illarum actio multum turbaretur, destructis omnibus fibris ex cerebello venientibus, nisi fibrae eiusdem nervi in ipsa cerebri medulla anastomosis haberent cum aliis fibris nerveis, cuius ope defectus liquidi nervei ex cerebello venientis posset compensari. Evidentissime hoc in prius apparet in nervo quinto. Oritur ille ex pedunculis cerebelli, nec olfactum tamen, nec gustum, nec ullam partem aliam, ad quam huius nervi rami tendunt, in illis hominibus, qui cerebello scirrhus laborabant, vitiatam fuisse legimus: id quod tamen necessario fieri debuisset, nisi lateralia adessent vascula communicantia, per quae fibrae, quae prius vehabant liquidum in cerebello secretum, nunc spiritus ex promptuario cerebri possent recipere. Nec repugnat haec sententia rectitudini illi fibrarum, cuius supra mentio fuit facta. Possunt enim fibrae ab origine ad finem usque indivisae decurrere, et nihilominus per canales laterales inter se communicare.

## §. III.

Pauca sunt adiicienda circa experimenta in nervis diaphragmaticis capta. Apparuit nempe, si nervi, tum ligati, tum abscissi, irritentur infra ligaturam et infra amputationem, diaphragma manifestissime constringi. Observatum id iam video a SWAMMERDAMIO <sup>36)</sup>, ranae musculus cum nervo excisus, si nervus pungatur, conuelli et fines adducere. Affirmat PETITUS <sup>37)</sup>, diaphragma contrahi, si nervus diaphragmaticus abscissus irritetur. Simile cepit experimentum I. B. DU HAMEL <sup>38)</sup>, pungendo nervum abscissum ranae. Nervus in moribundis canibus irritato, musculos vidit

34) Conf. III. PRAEC. Prim. lin. Physf. §. 94.

35) KAUWIVS in primis, placere sibi hanc sententiam, testatur in libro saepius citato. §. 323. Nec ab illa esse alienum

IH. MORGAGNIUM, patet ex epist. XIII. §. 21.

36) Bibl. nat. p. 839.

37) Lettre à un medecin II. p. 21.

38) Hist. A. R. S. 1700. obs. 12.



vidit conuelli<sup>39)</sup> STENONIS F. Ex his colligi posse videtur, quod iam tunc suspicatus est CL. DU HAMEL, ipsis nervis, etsi omne cum cerebro commercium sit interceptum, inesse irritabilitatem, siue vim illam excitandi motus, si irritatio quaedam accesserit. Est haec vis illa, quam insitam esse inuenerunt summi nostro aevo viri<sup>40)</sup>, non solum omnibus fere partibus corporis animalium, sed et vegetabilibus quibusdam, qua tamen in irritabilitate summum discrimen, quod intercederet inter animalia et vegetabilia, ad nostra usque tempora est quaesitum. Et certe, si aliquid in toto medicinae ambitu meretur attentionem, hoc ipsum est. Ubi sunt limites, si irritabilitas auferatur, qui ponantur inter regnum animale et vegetabile, ne utriusque fines extremi inter se confluant, cum alterum distinctionis signum, a propagatione specierum petatum, a polypis iam fuerit sublatum? Multum autem inprimis facit vis illa ad explicationem quorundam, quae in C. H. contingunt, phaenomenorum<sup>41)</sup>. Ad discere enim inde quodammodo possumus, qua ratione motus quidam fieri possint in corpore nostro, non solum, quando anima imperium non exercet, sed tum etiam, quando mutatio nervi ad sensorium commune usque non perfertur. Quando haec minutius meditor, et simul considero historias illas animalium, quae cerebro aut absente, aut destructo, aut una cum capite abscisso per aliquod tempus respirasse leguntur, dubitatio mihi venit in mentem, annon perpetua alternatio respirationis inter motus, qui sine animae imperio ex sola irritatione nervorum fiunt, referri mereatur<sup>42)</sup>. Huc accedit, quod foetus in lucem nunc editi, non ineptius organis, respirationi inferuentibus, utantur, quam adulti, qui exempla viderunt. Quis autem docuit foetum recens natum respirare, quum omnes ideae adueniant per sensus, nemine fere a LOCKIO dissentiente? Inprimis multum hic valent observationes illae, quibus docemur, respirationem non solum continuari in summe apoplecticis, sed etiam, postquam per sat longum tempus fuerat intercepta, posse restitui ex sola irritatione nervorum nasalium in suffocatis aut aqua submersis, quibus cor iam desit pulsare. Omni tempore medici sese torserunt, qua ratione tot muscoli possint agere sine animae imperio, in quos tamen anima, quoties velit, imperium possit exercere. Actum agerem, si varias illas opiniones circa causam alternae illius perennitatis hic vellem enumerare. Conferantur hac de re in primis ILL. PRAECEPTORIS *Commentarii Boerhauiani*<sup>43)</sup>, qui non solum omnes theorias attulit, sed etiam, quam infirmis nitantur fundamentis, optime demonstravit. Si ulla tamen explicatio, quae aliquam huic phaenomeno possit lucem accendere, sperari debeat a stimulo certe illa petenda esse videtur. Ut res fiat clarior, exemplo illam illustrabimus. Videmus in sternutatione irritato nervulo quodam secundi rami quinti paris, irritationem statim propagari per omnes intercostalis trunci ramos (qui nervus maxima ex parte ex eo-

Q 3

dem

39) Myol. spec. p. 78. ed. Bat.

40) Vid. Differt. de irritabilitate, quae prodit nuper Lugduni Bat. Conf. praeter ea III. PRAES. Comment. Boerh. Vol. IV. §. DC. n. a. p. 586.

41) Conf. hic inprimis diff. cit. de irritabilitate.

42) Innui idem iam videtur cit. diff.

43) Vol. V. P. I. §. DCXIX. n. c.

dem secundo ramo quinti paris oritur)<sup>44)</sup>, et musculos respirationis post magnam inspirationem ad fortissimam expirationem conuelli, nervis eorum in consensum tractis, qui cum intercostali communicant. Nec adeo multum me terret obiectio illa, sternutationem esse morbum, esse motum conuulsiuum, respirationem vero esse motum sanum, naturalem. Sufficit demonstrasse, neruulo uno irritato, musculos multos, a neruo irritato remotos, in motum trahi posse. Simile quid fieri videtur in actione respirationis. Certum est, et post inspirationem et post expirationem, sanguinem difficilius per pulmonem circumagi, anxietatem quandam oriri, vasa magna sanguine stagnante distendi, adeoque illorum nervos, ut et pulmonis et cordis, non satis facile sese euacuantis, moleste affici. Num adeo absorta est opinio, horum neruorum irritationem ope intercostalis transire in nervos musculorum respirationis, unde perennis illorum motus oriatur? Actio autem horum musculorum in respiratione eo minor est actione eorundem musculorum in sternutatione, quo minor est irritatio illa neruorum pulmonalium et cardiacorum, (quae in homine sano et bene respirante ne quidem sentitur,) irritatione maxima neruorum nasalium in sternutatione. Non quidem ignoro, plurimos nervos pulmonum oriri ex pare octauo. Sed praeter<sup>45)</sup> neruulos a plexibus cardiacis cum magnis vasis accedentes, par octauum et intercostale vario modo inter se communicant. Multa quidem hic restant obscura, nec spes est, problema hoc unquam ita solui posse, ut non semper quaedam adsint, in quibus medicorum ingenia possint sese exercere. Notandum hic praeterea esse putavi, me non satis esse persuasum de veritate illius hypotheseos, omnem consensum fieri, unice intermedio sensorio communi<sup>46)</sup>. Nequeo enim hac cum sententia conciliare obseruationes illas infantum sine cerebro viuientium, nec video, quem in finem natura tot fecerit anastomoses neruorum, illisque<sup>47)</sup> interdum canales per durissima ossa formauerit, si nervi nusquam directe inter se consentiant.

#### §. IV.

Adgredior nunc quaestionem illam de sensibilitate durae matris, qua in re ab omnibus fere Anatomicis mihi est dissentendum. Omnes enim fere ad nostra usque tempora pro indubitato habent, duram matrem sensu praeditam esse satis exquisito. Perducti hoc ad credendum fuisse videntur, alii, qui spiritus nerveos statuunt, quod sibi persuadent, illam membranam, quae contineat sensilissimam neruorum medullarem substantiam, non posse non accuratissime sentire, alii vero, quod duram matrem

44) Debemus hoc inuentum nobilissimum industriae CL. MECKELII, qui in dissert. sua utilissima, de quinto pare nervorum cerebri §. LXV. (hor. sc. I. p. 185.) hanc veram intercostalis originem non solum accuratissime descripsit, sed etiam addita elegantissima figura ob oculos nobis posuit.

45) ILL. PRAES. Prim. lin. Physiolog. §. CCLXXIII.

46) Quae sententia inprimis arridet Cel. KAUWIO. Vid. libr. saepius citat. §. 197. 198.

47) e. g. canalis nervi Vidiani per apophysin pterygoideam, fissura aquaeductus Fallopii in canaliculum continuata via chordae tympani per os petrosum. Conf. Cl. MECKELII dissert. cit. §. LXIII. LXIV. C. n. m.



ire originem omnium toto in corpore membranarum esse putent, quas omnes summe sensiles sibi fingunt permoti exemplo perioestii. Quid? quod BAGLIVIVS <sup>48)</sup>, et alii, imprimis ex Stahlianæ sectæ, solum systema membranarum sentire affirmant, exclusa medulla. Ut vero sententiæ illi, duram matrem summe esse sensilem, robur addatur, afferunt experimenta PACCHIONII <sup>49)</sup>, et BAGLIVII <sup>50)</sup>, qui tradunt, canes dura matre acu aut spiritu quodam acri irritata, eiulasse, vehementer sese distorsisse, motibusque convulsivis fuisse correptos. Nervos, qui irritationem ad sensorium commune perferrent, primum neglexerunt, arbitrati duram meningem nervis non indigere, quæ illis ipsis vim sentiendi suggereret, et mirum est, quomodo PACCHIONIVS <sup>51)</sup>, qui postea cohortem nervorum obtrudere nobis voluit, sese torqueat, ut demonstret, improbable esse, nervos in duram matrem abire. Postquam autem ad illos indagandos accesserunt, nervi duræ meningis ubique occurrebant. Sic VIEUSSENIUS <sup>52)</sup> et WINSLOWIVS <sup>53)</sup> furculos nerveos deducunt a pari quinto, excurrentes ab hoc nervo, dum per sinum cavernosum, ut illi putant, transit. RIDLEYUS <sup>54)</sup> tribuit duræ matri nervos, ab anteriori ramo quinti paris ortos. Nervulum ex dura portione septimi ortum per fissuram aquaeductus FALLOPII in cranium retrogradi, et plurimis furculis partim in duram matrem, partim in nervum quintum diffundi, credit VALSALVA <sup>55)</sup>. Nec ab hac sententiâ prorsus est alienus ILL. MORGAGNIUS <sup>56)</sup>. Sed iam ante VALSALVAM idem docuit VIEUSSENIUS <sup>57)</sup>. SIMONCELLIVS <sup>58)</sup> fingit, nervum mollem ex labyrintho in cerebrum et duram matrem redire, illasque in partes pluribus furculis disseminari. Alias minutissimas nervi auditorii propagines ab interiori ossis petrosi facie in duram matrem pergentes habet PACCHIONIVS <sup>59)</sup>. Idem <sup>60)</sup> memorat filamenta nervea ex medulla oblongata in duram matrem dispersa, quæ frequenter se videri testatur ILL. PRAEC. <sup>61)</sup>. Ab octavo pari quidam dicti sunt D. LIEUTAUD <sup>62)</sup>. Ab accessorio deducit quosdam CEL. SENAC <sup>63)</sup>. Alios habet PACCHIONIVS in ipso libro extricatu difficillimos. Quibus rationibus permoti Celeberrimi in arte medica Viri <sup>64)</sup> eo usque sunt progressi, ut ipsi medullæ cerebri sensum denegantes omnes dolores capitis solis in integumentis quaerendos esse putarent. Sed videamus, an omnia hæc nunc a nobis allata tanti sint roboris, ut nihil contra illa possit responderi. Etsi omnes fere Anatomici nobis refragentur, LA MOTTE <sup>65)</sup> ta-

men

48) Opp. omn. specim. de fibra motrice  
l. 1. c. V. Coroll. IV. p. 287.

49) Opusc. Anat. de dura Meninge cap. V.

50) l. c. p. 277. 51) l. c. p. 50.

52) Neurogr. uniuers. p. 170. depingit  
illos Tab. 22. lit. a. 2.

53) Expos. Anat. Tom. III. p. 147. n. 29.

54) Anat. Cer. p. 6.

55) Tr. de aure humana cap. III. §. X.

56) Epist. Anat. XII. §. 31. 35.

57) l. c. l. III. c. III. p. 176.

58) Conf. ILL. HEISTER. Comp. Anat.  
p. 62.

59) loc. cit. pag. 148.

60) Ibid.

61) Comm. Boerh. Vol. II. §. CCCI. n. a.

62) p. 388.

63) Comm. Comp. Anat. ILL. HEIST.  
p. 612.

64) GALEN. de locis affectis Lib. III.  
cap. 13. Ed. Charter. Tom. VII. p. 448.  
DURET. in Coac. Praenot. Hipp. p. 87.  
WEPFER. de affect. cap. obs. LX. p. 174.  
Nec displicet hæc sententiâ ILL. SWIETEN-  
NIO. Comm. aph. 267. p. 435. 436.

65) Chirurg. Tom. I. p. 56.

men in sententiam nostram inclinât, cuius iudicium non dubitem, centenis aliis anteferre. Illum enim summi Medici hanc inprimis ob causam magni faciunt, quod nunquam a verò ad praeconceptam hypothefin detorqueri se patiatur, omniaque, quae illi obseruata fuerunt proficua vel noxia, candide enarret, ut nec errores dissimulet. Alii autem, si forte in rem praeiudicatae opinioni refragantem incidant, illam negligunt, fallacia quadam se decipi suspicantes, nec adserta observationibus superstruunt, quae verissime tamen concludendo inde elici queunt. Accidisse illud inprimis hac in re videmus. Plurimae sane docent obseruationes <sup>66)</sup> ossicula et squamas ossis diuulsas duram matrem perforasse, lacerasse, nec aegrum de dolore fuisse questum. Sit instar omnium experimentum PETITI <sup>67)</sup>, qui cani malleo cranium ita diffregit, ut plurimae festucae durae matri paululum inflammatae infixae haerent. Animal per octo dies semper bene sese habuit, nisi quod ex latere opposito paralyticum appareret, quietum iacuit, auide, quaecunque offerebantur, comedit, nec eiulauit, nisi per paucas horas ante mortem. Cur animal nullum plane edit signum doloris, si dura mater tam exquisitè sensilis est? Quam atrox est dolor, quando festucae cuti aut periostio infixae haerent? Quid vero dicemus de experimentis BAGLII et PACCHIONI? Quaedam certe in illis sunt phaenomena, quae cum aliorum obseruatis adeo plane non possunt conciliari, ut multum de robore argumentorum, quae illis inniuntur, decedat. Cum enim illi, irritata dura matre, canem statim conuelli affirmant, mirum sane est, quod nec RIDLEYUS <sup>68)</sup>, nec DRELINCOURTIUS <sup>69)</sup> nec AMSTELAEDAMENSES <sup>70)</sup>, nec KAUWIUS <sup>71)</sup>, nec PETITUS <sup>72)</sup>, nec alii ulla conuulsionis signa, laesa dura matre, comprehendere potuerint. ANTON DE HEYDE <sup>73)</sup> affert obseruationem durae meningis in cane vulneratae, et sine grauib. symptomatibus curatae. RIDLEYUS quidem et KAUWIUS canem signa doloris dedisse perhibent. Illius tamen verba „*canis perforationem acute persentiscere videbatur*“ satis demonstrant, illum dubium incertumque fluctuare. Nimis autem facile huiusmodi experimenta possunt turbari, ut nunquam plane persuasi esse possimus, utrum canis ab irritata dura matre, an ab alia parte laesa, ut cute, pericranio, dolorem percipiat, cum e contrario obseruatio vix fallere posse videatur, qua constitit, canem alacrem, qui leuem tantum puncturam cutis acute se sentire testatus est, irritata dura matre acu et oleo vitrioli, nullum doloris indicium exhibuisse. Argumenta vero, quae a neruis durae matris desumuntur, tam infirmis et vacillantibus nituntur fundamentis, ut illis sane moueri non deceat. Illi enim nerui ita sunt incerti, ut Auctores nullibi minus inter se consentiant. Neruos a quinto pari nec ILL. PRAES. <sup>74)</sup> nec CL. MECKELIUS <sup>75)</sup> inuenire potuerunt, licet uterque omni studio in illos inquisuerit. Sic quoque de neruo illo, quem VALSALVA per fissuram aquae-

66) Quales vide apud TULPIUM. lib. I. cap. I. III. Mem. de l'Acad. de Chir. p. 316. 317. 320. obs. VII. 327. obs. XI.

67) loc. cit. p. 10.

68) Phil. Transact. n. 287.

69) Canicid. V.

70) Colleg. priv. I. 44.

71) l. cit. §. 325.

72) l. c. p. 10.

73) Obs. med. XIX.

74) Comm. Boerh. Vol. II. §. CCLXXX.

n. a.

75) Diff. cit. §. XXXIII.



acquaeductus FALLOPII in cranium regredi putavit, accuratissimis observationibus CL. MECKELII <sup>76)</sup> meliora fuimus edocti. Ille enim neque ex duro oritur, neque plurimis furculis in duram matrem diffunditur, sed ex nervo Vidiano, in cranium regresso, ortus, sub ramo tertio quinti paris, et sub dura matre extrorsum, sursum et retrorsum tendit, et per dictam fissuram nervum durum septimi paris adit. SIMONCELLIUM nihil aliud vidisse nisi eundem nervum, de quo modo diximus, et reliqua ex ingenio fuisse addita, ILL. PRAEC. iam docuit <sup>77)</sup> idque tum ex PACCHIONI ad FANTONUM epistola <sup>78)</sup>, tum ex VALSALVAE posthumis <sup>79)</sup> satis superque apparet. Nervi ex octavo pare Dm. LIEUTAUD, neque ILL. PRAEC. neque ILL. WINSLOWIO neque ulli alteri Anatomico unquam visi sunt, ut de eorum veritate merito dubitare liceat. Surculi ex accessorio in duram matrem abeuntes oculis suorum aevi nostri Anatomicorum, MORGAGNI, SANTORINI, WINSLOWII, ILL. PRAESIDIS vix subtrahere sese potuissent, apud quos tamen omnes de illis altum est silentium. ILL. HUBERUS <sup>80)</sup> quidem mentionem facit quorundam filamentorum ab accessorio in duram matrem discedentium. Ita tamen de illis loquitur, ut facile pateat, se non plane de veritate huius rei esse persuasum, cum aperte fateatur, se tantum credere, illa in dura matre infumi. Filamenta ex medulla oblongata in duram matrem abire, nemo vidit. Reliqua huc pertinentia, ut in ipso PACCHIONI libro sunt obscurissima, ita nullius plane Anatomici testimonio possunt confirmari. Quae cum ita sint, aut ego plurimum fallor, aut valde improbabile videtur, duram matrem esse tam exquisitae sensibilem, sine ullo nervo certe visibili, cuius rei nullum in C. H. habemus exemplum. Qui autem affirmant, duram matrem non posse non acute sentire, quod substantiam cerebri medullarem contineat, cogitent, quaeſo, nullibi duram matrem immediate medullam cerebri contingere, sed ubique fere, iis certe in locis, ubi experimenta capiuntur, et dolores percipiuntur, corticem esse interpositum. Quis autem cortici tribueret sensum, qui meris constat vasculis, et, dum in fungum excrescit, sine dolore abscindi, immo medicamentis rodentibus potest auferri. Nec minus ignavum est argumentum, quod petitur a coniunctione durae matris cum omnibus corporis nostri membranis. Etsi enim negandum non sit, periosteum esse illius propagines, minime tamen idem potest affirmari de reliquis membranis, et summi aevi nostri viri monent <sup>81)</sup>, non esse omnem membranam productae durae et piaae matris per nervos adlatae pro involucri, expansionem, sed singularem organicam ex fibris intertextis constare membranam peritonaei, pleurae, pericardii, cutis aliarumque partium, in quibus omnibus ordinantur nervi, diversimode pro sensu et motu vario, nudati tamen ab involucri suis, priusquam officio fungatur, qui cum inprimis maximo numero abeant in periosteum, non mirum est, exquisitam illorum esse sensibilitatem

76) ibid. §. LXIV.

80) Tr. de medulla spinali §. IX. p. 17.

77) Comm. Boerh. Vol. IV. §. DLXIV.

18. not. 9.

n. 2.

78) Op. p. 147.

81) Vid. KAUWII Tr. de perspirabilitate Hipp. cap. XXVIII.

79) Tr. de aure hum. p. 133.

tatem. Sed si concederemus, omnes corporis membranas a dura meninge oriri, cuius magni erit aduersarii usus, cum argumentis recentiorum, in primis BOERHAVII<sup>82)</sup> et ILL. PRAESIDIS<sup>83)</sup> plane fuerit euictum, sensationem non fieri ope membranarum, sed spirituum nerueorum. Nonne autem dolores capitis phreniticorum satis aperte sensibilitatem durae matris demonstrant, cuius inflammationem Celeberimi in arte Medica Viri<sup>84)</sup> causam proximam phrenitidis verae constituunt. Fateor, me hac obiectione non moueri, ut sententiam meam deferam. Nondum enim plane sum persuasus de veritate illius asserti, semper hunc morbum ab inflammatione meningum produci, secutus hac in re viros summos, WILLISIUM<sup>85)</sup> et BONETUM<sup>86)</sup> quorum uterque affirmat, se saepius vidisse in dissectione cadaverum meningis inflammatas, nec aegros phrenesi, sed affectu quodam soporoso periisse. Praeterea habentur apud BONETUM<sup>87)</sup> plurima exempla phrenitidis sine ulla meningum inflammatione. Corticem autem hoc in morbo esse inflammatum, nemo facile negabit, et ipsa BOERHAVII obseruatione<sup>88)</sup> rem ita sese habere constitit. Cum vero ille sit medullae cerebri sensibilissimae continuus, fieri non potest, quin vasculis illius sanguine inflammato distentis medulla ipsa sensibilissima male afficiatur.

## §. V.

Hic autem obiici mihi posse video, fummos esse viros, qui dubitent, an plane possit adfirmari, ipsam cerebri medullam dolere. Praeter illos, quos supra iam nominauimus, inuenio ROUHAULTIUM<sup>89)</sup>, MAURITIUM HOFMANNUM<sup>90)</sup>, aliosque, qui eadem sint in opinione, et ipse ILL. SWIETENIUS<sup>91)</sup> tradit, quam primum laesa fuerit medulla, tunc statim conuulsionibus omnia sic turbari, ut, an simul dolor adsit, non possit determinari. Qua inprimis ratione sum permotus, ut in omnibus meis experimentis accurate attenderem, an canes, dum instrumentum per medullam cerebri traiciatur, doloris indicium exhibeant. Omnes autem, quotquot vulneraui canes, laesa medulla maximum se dolorem percipere, misero eiulatu sunt testati. Et video idem fuisse obseruatum, tum in RIDLEYI<sup>92)</sup>, tum in KAUWII<sup>93)</sup> experimentis. Ille enim aperte docuit, canem, specillo profundius adacto, sensus dolorifici indicia maxima dedisse, et hic affirmat, in omnibus suis canicidiis eiulatum fuisse deprehensum. Num autem adfertur illud, omnem laesionem medullae statim subsequi conuulsionem, experientia satis confirmatur. Si conferantur illa, quae apud BONETUM<sup>94)</sup> alios-

82) Instit. Med. §. 284. 285.

83) Comm. Vol. II. §. 284. n. h.

84) e. g. BOERH. in aphor. 776. illius Commentator III. VAN SWIETEN. Tom. II. p. 605.

85) De anima brutorum. P. II. cap. X. p. 429.

86) Sepulchret. Anat. lib. I. sect. VII. obs. I. p. 187.

87) Observ. VII. XIII. XIV. XV. XVI. Additam. obs.

88) ILL. van SWIETEN Comm. §. 775. p. 604.

89) De la tête. p. 60.

90) Idea Machinae hum. p. 232.

91) Comm. aph. 267. Tom. I. p. 435.

92) Phil. Transact. n. 287.

93) Impet. fac. Hipp. §. 327.

94) Sepulchr. Anat. Lib. I. Sect. I. Obs. 47. 48. 50. 53. 56. 61. 63. etc. Memoir. Acad. Chir. p. 324. 325. Mem. A. S. R. 1741. p. 202. n. c. f. p. 206. etc.



aliosque observatores habentur, plurimis exemplis constabit, abscessus fuisse deprehensos in ipsa substantia medullosa cerebri post diuturnum capitis dolorem mortuorum, qui tamen nunquam per omnem morbi decursum convulsionibus correptos fuisse leguntur. Non solum autem illud contigit in vitiis cerebri chronicis, sed plurimae etiam exstant historiae laesionum medullae subitarum sine ulla subsequuta convulsione<sup>95</sup>). Sed illa sententia medullam cerebri non dolere, aduersari videtur omni Anatomicorum de nervis doctrinae. Omnes nunc fere in eo consentiunt, (si morosiores quosdam excipias, qui, coeco hypothesium amore ducti, nunquam opinionem, quam semel sunt amplexi, deferent,) nervos esse continuos medullae, illamque solam esse medullam, quae sentiat. Videmus praeterea variis in locis cerebri tractus medullares diversissimas<sup>96</sup>), qui nervis adeo sunt similes, ut facile adpareat, solam vaginam membranceam iis deesse. Medulla reliqua, ubi nullae striae adparent, a lacertis illis fibrarum collectarum in fasciculos nulla ratione differt, omni habitu simillima. Num autem medulla cerebri, quanprimum in nervos fuerit continuata, aliam naturam induit, ut eadem fibrae alio in loco sensu gauderent, in altero vero illa vi sentiendi plane destitutae? Nec illa obiectio ullius momenti est, functiones animae turbatum iri, si in ipso illius palatio, ubi menti ideae repraesentantur, sensatio fieret. Hoc enim tunc demum esset metuendum, si sedes animae per omnem cerebri medullam esset extensa. Aliter autem sese rem habere, animamque tantum habitare in iunctis omnium nervorum primis originibus, supra iam demonstratum esse videtur.

## §. VI.

Verum ut ab isto diuerticulo in viam redeamus: Etsi argumenta contra sensilitatem durae matris allata sufficere posse videantur, illis tamen multum accedet roboris, si consideretur dura meninx tanquam cellulosa fabrica densa, compacta, constans fibrillis arctissime stipatis, quantumcunque firma et solida videatur, quae tela cellulosa per omnem corporis ambitum sensus est expers, nisi nervi per eam decurrant. Multa autem sunt, quae illud suadeant. Constat experimentis, duram matrem brevi maceratione in flocculentum omnino cellulosumque habitum, aequae ac alias membranas, abire<sup>97</sup>). Nec refutare possunt hanc sententiam fibrae illae durae meningis. Nam regularitatem illam et pulchritudinem, quam descripsit, et figuris PACCHIONUS exhibuit, nec ILL. PRAESES<sup>98</sup>), nec alii recentiores Anatomici<sup>99</sup>) videre potuerunt. Confusae sunt, varie intricatae, per omnem duram matrem sine ullo ordine sparsae. Nec facile video, qua ulla ratione ab aliis membranis, ut peritoneo, pleura, pericardio differat, adeo ut non dubitem, duram matrem eadem fortasse ratione fuisse formatam, ut illae factae fuisse videntur. Valde enim probabile est, in tenero foetu ambiisse cerebri meram glutinosam, sensim cellulosam factam substantiam; partem internam

R 2

perpe-

95) Cf. Mem. Acad. Chir. p. 314. 315.  
316) PETIT Lettres à un médecin. WEPFER de apopl. p. 225. hist. XII. p. 365.

96) Cf. ILL. PRAES. Comment. Boerh. Vol. II. §. CCLXX. n. h.

97) Vid. CL. SCHÖNINGER, amici mei dilectissimi, Diss. Inaug. de telae cellulosae in fabrica C. H. dignitate. §. LXVI.

98) l. c. Vol. II. §. CCCIV. n. d.

99) e. g. WINSLOW. l. c. T. IV. §. 48.

perpetua pulsatione arteriarum corticis, et pressione cerebri in membranam compactam, leuem, compressam fuisse, remanente textu exteriori spongioso, aspero, ut exterior lamina peritonaei apparet, cuius cellulosae fabricae ope reuera in tenero foetu, priusquam ossa generata fuerint, cum pericranio cohaeret. Paulatim ossa inter membranas pronascuntur, quibus aspera illa exterior lamina innumeris fibris et vasis tota dura membrana firmissime adhaeret, ut omnino sine maxima vi non possit separari. Sensim tamen in adultis cohaesio illa minor fit, et spongiosa illa exterior lamina fit densior, laeuior, archisque slipatur, cum in dies plurima vasa, quae durae matri cum ossibus erant communia, occaecentur, et maxima pars fibrillarum cellulosarum, quibus illa ossibus adnectebatur, perpetua pulsatione arteriarum durae matris contra resistentia ossa, deteratur, ita tamen, ut quibusdam in locis per totam vitam tenacissime crânio adglutinetur. Ipsa figurâ irregularis sinuum, et trabeculae illae transuersae, certissimae fabricae cellulosae reliquiae, sententiam hanc de generatione durae matris comprobare videntur. Quae omnia circa duram matrem a me animaduersa si quis attendat, utcumque de argumentis meis existimabit, res tamen ipsa fortassis quibusdam non indigna videbitur, quae accuratiori examini subiiciatur, cuiusque in naturam repetitis experimentis longius inquiratur.


#### §. VII.

Explicanda restant quaedam phaenomena, quae hisce in experimentis nobis occurrerunt. Notavi, alterum canem, cuius duram matrem irritavi, intruso aliquoties in dextrum cerebri hemisphaerium stilo, per gyrum circumambulasse, quem quidem ita confecit, ut a dextris sinistrorsum tenderet. Facile huius rei ratio reddi potest ex veritate illa Anatomica, laeso alterutro hemisphaerio, musculos lateris oppositi paralyticos fieri. Cum enim hanc ob causam musculi pedum lateris sinistri, nimis essent debiles, quam ut satis commode illis uti et insistere posset, fieri non potuit, quin, quum recta procedere vellet, illi singulis passibus sinistrorsum deflecterentur. Secretione spirituum in dextro hemisphaerio sensim magis magisque turbata, illorumque influxu in nervos musculorum sinistri lateris intercepto, omnes musculi lateris oppositi plena paralyti correpti fuerunt, ut, sublato antagonismo, ob tractionem musculorum dextri lateris corpus in arcum flecteretur.

#### §. VIII.

Pauca adhuc, priusquam huic specimini finis imponatur, verba adiciam de quibusdam observationibus, quae mihi, experimenta memorata instituenti, hisce in canibus sese obtulerunt, etsi ad propositum nostrum non pertineant. Omnibus illis canicidiis didici, quod iam annoravit KAUWUS, canes mordacissimos, laesos, fieri metuculosos, ut ab illis, vulnere inflicto, nullum plane periculum sit metuendum. Cuius rei cum prioribus in experimentis non habere rationem, neque canes ad puncturam partium, statim, solutis vinculis, dimitterem, accidit non semel, ut nec convulsiones, nec alia phaenomena, satis euidencia apparerent. Quodam in cane inveni aneurisma intestini cuiusdam tenuis, cuius quoque lien tumoribus scirrhis tot is obfessus erat.





X.

PETRI CASTELL

EXPERIMENTA QUIBUS VARIAS CORPORIS  
HUMANI PARTES SENTIENDI FACULTATE  
CARERE CONSTITIT.

GOTTINGAE 1753.

---

PROOEMIUM.

Quum consituisssem, pro impetranda legitime medicinam, quam adhuc discere studui, profitendi exercendique facultate conscribere dissertationem ac specimen publicum edere; primum elegeram argumentum de Venarum Valvulis, quas nouo studio perquirere satis opera dignum videbatur. Hoc animo complures venas in ipsis corporibus humanis peruestigauī, copiam cadauerum faciente instructissimo Gotingensi theatro, valvulasque indagauī, quarum etiam sedes et loca annotauī, descriptaque seruo: adeoque brachii venas magnamque Saphenam cum valvulis suis appositis delineandas curauī. Sed, quanquam Perillustri theatri anatomici Praefectus, Generosissimus Dominus DE HALLER, mihi corpora et partes, quantum per muneris et reliquorum theatri laborum rationes fieri potuit, liberalissime indulserit, eique ego pro hoc pariter ac ceteris plurimis sui fauoris documentis & benefactis magnas debeam gratias publiceque agam; tamen haud sufficere visae sunt eae, quas interim colligere licuit, obseruationes ad plenam perfectamve, qualem meditabar, valvularum venosarum historiam condendam, praesertim quum, ut in anatomicis operibus fieri solet, nonnunquam corpora membraue, propter aduersam aëris temperiem, corrumpereutur, ut iis ad propositum meum uti non possem, aliaque saepius inciderent inquisitionum mearum impedimenta. Quum igitur viderem, alteram adhuc hiemem, qua tempestate anatome celebrari corporaque afferri solent, expectandam fore, quo coeptum opus ex sententia perficerem: mihi vero tamdiu in dulci Georgia Augusta commorari non liceret; aliam tractationis materiem circumspicere coactus sum.

Quod consilium quum agitem, deque ea re Perillustrem Praeceptorem, Magnum HALLERUM conuenirem, ut ex eius potissimum arbitrio nouum exercitationis argumentum iterum constitueretur, Generosissimus Vir mihi experimenta proposuit instituenda, quae certas corporis partes, quibus vulgo eximia sentiendi facultas adscribitur, sensu plane carere confirmarent: eamque rem hoc magis disputatione dignam iudicauit, quod adhuc sint, qui CL. D. ZIMMERMANNI de insensibilitate ten-

dinum assertis in Diss. sua inaugurali de *Irritabilitate*, Gottingae MDCCLI, propositis, fidem adhibere nolint.

Equidem haud dubitavi consilium sequi Optimi mei Praeceptoris: itaque eius ductu, praesidio, suppetiisque non modo in iis partibus, in quas Cl. D. ZIMMERMANNUS inquisiuit, noua pluraque cepi experimenra, sed in aliis similiter explorandis, quas nedum memini ab ullo hac sine experimentis esse sollicitatas, operam et studium collocaui. Neque tantum in experimentorum effectibus obseruandis occupatus fui, aut in iis acquieui, sed quoad temporis praestitutus terminus et virium imbecillitas permiserunt, propositam doctrinam connexa ratione explicare atque asserere conatus sum. Etsi vero potissimum animantia bruta ad obseruationes faciendas adhibuerim; tamen, ubicunque vel a viris fide dignis accepi, vel ipsemet animaduerti, ea, quae in animalibus acciderunt, pariter in hominibus euenisse, haec, sicut deprehensa sunt, subieci.

Facile credo fore plurimos, quibus sententia nostra difficillime ad assentiendum videatur, et qui fortassis meam eleuent operam, quod iuuenis vetustam doctrinam conuellere allaborauerim. Et sane fateor, quum primum ad hanc materiem aggrederer, animoque obseruaretur, quot et quanti viri contrariam opinionem secuti sint ac propugnauerint, quorum auctoritas relinquenda confutandaque foret, me paene a scribendo deterritum fuisse, ac nimis audax inceptum putasse, si ego tanquam puer viris aduersari, velut Troilus Achilli, vellem. At quum simul mecum reputarem, opus suscipi et ab aliorum sententia discedi hortatore et approbatore Summo Viro, qui ipse antea receptam vulgo doctrinam secutus, nunc experimentorum vi ac veritate victus, mentem mutauerit; additus iterum est animus, ut aliena a vulgaribus placitis proponere non amplius vererer. Quapropter etiam spero atque confido, aequos rerum iudices, si perpenderint, me experimentis rite accurateque captis, praesertim quum Suauissimus atque Humanissimus Praeceptor plurima eorum ipse instituerit, deinum in nouam concessisse sententiam, mihi veniam daturus, quod oculorum potius et sensuum testimonio credam, quam iis, quae vel ab auctoritate aliorum vel ab antiquitate fidem inuenerunt, vel a solo mentis ratiocinio robur acceperunt. Quis enim est, qui nesciat, insignes saepenumero viros grauissimis erroribus implicitos fuisse, erroremque semel susceptum longa deinde saeculorum serie propagatum, et semper magis confirmatum, tandem difficillime iterum eradicari potuisse? Denique optabile modo foret, ut quilibet, inprimisque ii, qui rem in dubium vocant, vel ipsi experimenta instituere, vel aliorum experimentis interesse, haud grauarentur: tum nullus dubito, modo recte omnia acta sint, quin plane, sicut nos, rem se habere deprehensuri, et suum nobis assensum haud abnegaturi sint.

Vt vero propius ad tractationem ipsam accedam, materiam in sex capita diuidam, quo ordinatius singula tradi et sub conspectum collocari possint et in la quidem Sectione exponam, quae circa *Tendines* obseruaui et commentatus sum: in IIa similiter agam de *Ligamentis*: in IIIa de *Periosteō Pericranioque*: in IVa de *Pia Matre*: in Va de *Pleura*: in VIa et ultima de *Peritoneo*. In singulis capitibus eum tractationis



tionis ordinem seruabo, ut thesi primum proposita, statim subiungam facta experimenta obseruationesque, et tum demum uberiorem inde doctrinam eliciam atque deducam. Faxit Deus feliciter!

## SECTIO I. DE TENDINIBUS.

### PROPOSITIO.

§. I. Tendines omni plane sensu carent: et vulnera ipsorum nec periculosa, nec lethalia sunt.

### EXPERIMENTUM I.

§. II. Canis stantis, quem aliquis amicorum capite prehensum tenebat palpabatque, per cutem, ab exteriore latere dextri pedis, tendinem Achillis lanceola pupugimus. Nihil fere animaduertit canis; nullam enim vocem emisit: sed potius ad allicientem processit, eique cauda alludens hilarem prodidit animum. Idem aequo commodo incesso gauisus est ac antea: neque prius lambit vulnus, quam illud spiritu vini, quo sanguis sisteretur, ex dissecta Saphena minore profluens, tinxeramus. Postea vero vulnus omnino contempsit, et alacer obambulauit, et quum panis porrigeretur, et auide deuorauit, et vegetus circumcurrit. Exacto horae spatio eiusdem canis in sinistro pede tendinem magnum, siue Achillis, ab interiore latere bis eadem lanceola iterum pupugimus, eodem ut antea seruato modo, nisi quod nulla vena pertusa fuit. Nihil plus animaduertit: et quum allecto frustum panis paullo altius offerretur, in posteriores pedes se erexit, et constitit panem captaturus. Deinde per tres adhuc integras horas eum comem obseruauimus, neque deprehendere potuimus ullum vulnorum factorum sensum percepisse: nam nunquam ea lambendo contigit, quum tamen aures ipsis vulneratis pedibus saepius scaberet. Denique ipsum per plures dies continuos nobiscum in conclau retinuimus, quo toto interuallo bene se habuit, nec conuulsionibus, nec aliis symptomatibus conflictatus est.

### EXPERIMENTUM II.

§. III. Canem praecedente haud multo minorem, mensae impositum, cute tantum in ceruice leuiter apprehensum teneri curauimus, tumque per cutem, a latere interno, chordam magnam dextri pedis scalpello anatomico pupugimus. Qui, quum caput libere mouere posset, hoc eo ipso momento, quo punctio fiebat, circumuertit ad locum inflicti vulneris, non alio gestu, quam si muscam pungentem abigere vellet: quum vero deinde libere dimissus esset, laesam partem plane negligenter habuit, et alacriter hilariterque ad eos progressus est, qui ipsum allicerent. Dehinc in ventrem procumbere coegimus, et dum ab uno amicorum in hoc situ tenebatur, ab altero autem pes posterior sinister extendebatur, nos ab interiore pedis latere minutum cuti foramen infliximus, tendinenique magnum in paruo spatio denudauimus.

Quae

Quae dum agebantur, leuiter quiritabat canis, atque e manibus comprehendendum se eripere nitebatur. Igitur praestolati sumus, donec ad quietem rediisset, quo facto scalpellum per nudum tendinem usque ad medium circiter adegimus. Nihil eius percepit: permanlit enim quietus, neque pedem retrahere tantillum conatus est, quemadmodum in incisione cutis fecerat. Sic illum in terra positum dimisimus: ille vero statim discurrit laetus et alacer, vulneraque accepta nec quicquam curauit. Quando frustum panis eminus ostendebatur, sustulit se arrectum, pedibusque extremis ingrediens eum secutus est, qui cum porrecto pane paullulum retrocesserat. Quotiescunque postea ipse hunc canem vidi, semper eum alacrem vegetumque reperi, curstantem, ac nullius unquam incommodi participem.

### EXPERIMENTUM III.

§. IV. Haedum accipimus, et in eodem situ, quo canem in priori experimento secundo, composuimus: tum in alterius pedis interiore parte, dissecta cute, exiguum magnae chordae spatium denudauimus. Dum hoc fiebat, balauit animal. Deinde scalpellum in tendinem intrusimus: tum vero ne mutiuit quidem, neque ullum sensus aut doloris signum edidit: et quum mox in solo collocatus esset, aequè commode incessit parilesque saltus peregit ac antea. Neque ullis posthac conuulsionibus aliisue malis conflictatus est.

### EXPERIMENTUM IV.

§. V. Canem, quem ad primum experimentum adhibueramus, et in quo nullum aduersae valetudinis vestigium deprehendebatur, post interuallum duorum dierum in assere resupinatum, ore constricto, ne mordere posset, collocauimus, pedesque eius extensos eidem, cui impositus erat, asseri firmiter alligauimus. Tum extensorem alterius tibiae parum denudauimus; quod canem perturbauit, gemitusque expressit. Postquam vero caput ei permulsum est, iterum tranquillus fuit, neque amplius gemit. Deinde extensorem tendinem scalpello primum irritauimus, seu vellicauimus: nihil animaduertit. Mox eodem scalpello tendinem compunximus: nihilo magis commotus est. Simulac vero vossella cutem apprehensam leuiter modo vellucaueramus, coepit lamentari seque iactare. Similiter sese gessit, quum extensorem alterius tibiae repetito statim experimento sollicitaremus. Tandem vinculis solutus, perinde commode gressus fecit, ac si nihil ipsi accidisset, hilaris fuit, vulnerumque plane oblitus, ea lambere omisit: contra subinde iisdem pedibus sine sensu molestiae corpus scalpsit. At si loca vulnerata contrectarentur, eo caput conuertit, vulneraque lingua terfit.

### EXPERIMENTUM V.

§. VI. Canem, quem pridie ad experimentum secundum instituendum adhibueramus, quique admodum laetus ac vegetus erat, eodem, ac in proxime praegresso experimento dictum est, modo ligauimus. Quo facto, paruum foramen cuti pedis alterius infliximus, quo extensor tibiae aliquantum denudaretur. Hoc se percipere, iacta-



iactatione ululatuque significauit. Denudata parua tendinis portione, et animali tranquillitati reddito, scalpellum profunde in extensorem demissimus: ne minimum quidem doloris percepit; nam plane quietus resedit. Quam primum vero cutis alterius pedis incidebatur, ad denudandum similiter extensorem, eiulare coepit. Quod quum facere desisset, hunc tendinem scalpello laceffiuius, adeoque compunximus: iacuit immotus, nihil actorum percipiens. At quum vossella cutem apprehenderemus comprimereisque, coepit iterum quietem amittere et eiulare. Deinde eum vinculis solutis dimissimus: circumcursauit, quasi escam quaerens, quia, quum in theatro anatomico versaremur, sine dubio carniū odorem percipiebat. Simulac vero vocabatur, venit, et, ostenso cibo sursumque sublato, arrectus extremisque pedibus innixus processit.

### EXPERIMENTUM VI.

§. VII. Haedum, similiter ac canes praecedentes, apte alligauimus, excepto quod os liberum reliquimus, quandoquidem hoc pecus non mordet, atque sensum doloris optime balatu manifestat. Huic quoque cutem dissecuimus, et extensorem unius tibiae ex aliqua parte denudauimus: quod sentiens, balauit. Tum scalpellum intrusimus in dictum tendinem, ibi per aliquot momenta reliquimus, iterumque extraximus: nihil horum omnium animaduertit, siquidem nullam vocem emisit. At quum cutis paucillum modo vossella vellicaretur, extemplo vociferatus est. Similiter se gessit, quum statim post in extensore alterius tibiae idem experimentum repeteremus. Vinculis liberatum animal incessu ut antea valuit, subinde solitos saltus peregit, lac potauit, perpetuae alacritate gauisum est.

### EXPERIMENTUM VII.

§. VIII. Catellum dorso incumbentem manibusque comprehensum ita collocauimus, ut os et caput libere mouere posset. Tum incisa cute extensorem tibiae una cum ligamento denudauimus: exclamauit ille, magnamque inquietudinem testatus est. Expectauimus, donec palpo permulsus tranquillitatem recepisset: quod ubi factum erat, ligamento tantisper quidem intentato relicto, tendinem aliquoties scalpello compunximus: ille vero omnis sensus expers fuit. Ast incisione cutis tantum leuiter producta, confestim eiulauit.

### EXPERIMENTUM VIII.

§. IX. In Cane, quem ad explorandum pleurae sensum destinaueramus, antequam hoc fieret, postquam in apto situ collocatus constrictusque erat, extensorem tibiae more consueto denudauimus. Quum cutis incideretur, haud parum anxius fuit canis, adnitenis sese in libertatem vindicare, gemitusque ciens, quia propter obstrictum os altum eiulatum edere non poterat. Post aliquod temporis interuallum tandem sedatus fuit tumultus, iterumque conqueuit: tum longam acum sarcinariam (*eine Packnadel*) in extensorem tendinem ab inferiore parte sursum versus intrusimus, ferme ultra pollicis spatium, eamque aliquamdiu in vulnere relictam, iterum aliquoties paucillum retraximus, totiesque denuo intrusimus, postremo totam extraximus.

*Ludwig script. neur. min. T. IV.*

S

Tamen

Tamen ista omnia ne minimum quidem affecerunt canem: tenuit enim tranquillitatem. Tum vero secta paullum iterum cute, continuo dolorem iactatione gemituque declarauit.

### EXPERIMENTUM IX.

§. X. Canem, quem ad primum et quartum experimentum adhibueramus, binis post ultimum exactis diebus, in ventrem procumbentem, ore constricto, quatuor pedibus distentis alligauimus. Tunc a posteriore parte cutem dextri pedis incidimus ad retegendum aliquatenus tendinem Achillis: quod se sentire, inquietudine demonstrauit. Composito ad quietem cani, hunc tendinem ad medium fere dissecuimus: inter haec quum nihil plane se commoueret, satis apparuit, nullum inde dolorem ad eum peruenire: et quum vinculis solutus liber dimitteretur, pristinam alacritatem prae se tulit, proiectum panem e vestigio deuorauit, et una omnibus quatuor institit pedibus: quodsi progrediretur, laeso pariter innitebatur pedi, quam alteri ex posterioribus, eodem aures scalpebat, ac per scalas sursum deorsumque sine dolore aut molestia gradiebatur. Neque aliter vulnera lambit, quam quum ea contrectarentur ostenderenturque. Si cubaret atque alliceretur, sine mora surrexit et ad illum, qui vocabat, progressus est. In uniuersum a spasminis conuulsionibusque immunis fuit.

### SCHOLION I.

§. XI. Quum in hoc exemplo chordam magnam ad medium usque dissecauerimus, animaduertimus aliquam tendinis portionem se retrahere, alia adhuc restante, quae pariter iam quadamtenus incisa erat. Mirabamur, quid esset; opinati, in hoc animalium genere, haud secus ac in homine, chordam magnam unico tantum constare tendine. Quapropter consilium cepimus in praesenti cane primo quoque tempore explorandi, unde hoc phaenomenon accideret. Praeterlapsis ergo tribus diebus iugulauimus canem, qui toto hoc intervallo perpetuo sanus vegetusque degerat, ne minimum quidem incommodum expertus.

### OBSERVATIO I.

§. XII. Inuenimus in cane tendines Gemelli et Solei non, sicut in homine, coniungi unumque constituere tendinem, sed unumquemque separatim ossi calcaneo affigi. Nimirum tendo Gemelli recta descendit inseriturque ossi calcis. Tendo Solei statim ab ortu suo se flectit ad interiorum pedis partem, ibique sub Gemelli tendine emergit, cum eodem ultra dimidium linea fere recta decurrit, postea sursum ascendit, supergreditur tendinem Gemelli, latefcit, amplectitur Gemelli tendinem, et extremo suo latiore affigitur superiori et posteriori, suae exteriori, parti ossis calcanei. His tendinibus sese adiungunt alii bini, a musculis femoris originem ducentes: unus ab exteriori pedis latere procedit, alter ab interiori. Utrque paullo gracilior est. Ut primum tendines praedictos attingunt, concurrunt, coniunguntur, firmiter plerumque inuicem cohaerent, et fere non nisi unicum efficiunt tendinem. Tali modo sub tendine Solei, quo loco se coniunxerunt, paullo tamen magis ipso tendine versus interius pedis latus, descendunt, inferius a Solei tendinis latiore extremo, similiter ac tendo Gemelli, circumdantur,



dantur, et ossi calcis in pedis interiore latere inseruntur. Omnes hi tendines tenui quidem, sed firma tunica, quae ipsorum vagina est, simul includuntur: praetera quoque inter se inuicem ope fortis cellulosae membranae connexi sunt; ut adeo si ab exteriori facie considerantur, omnino speciem unius tantummodo tendinis praebeant, omniumque actio fere non alia quam simultanea esse possit.

## SCHOLION II.

§. XIII. A quibus nominatim musculis femoris isti tendines originem ducant, operae pretium haud credidi inquirere, siquidem hoc ad propositum meum plane nihil contulisset. In uniuersum enim plus asferre nolui, quam quod explicationi nonnullarum observationum inseruire possit. Alias quoque annotare debuissim, tendinem Solei, postquam ad os calcaneum adhaesit, iterum crassescere, frangi, atque ad digitos pedis abire.

## OBSERVATIO II.

§. XIV. Quandoquidem incisio facta erat a postica parte paulloque magis versus internum latus, Solei tendo erat, quem dissectueramus, quique se retraxerat: tendines vero musculorum femoris et Gemelli leuiter laesi erant. Superior pars tendinis Solei ab inferiore circiter transversum digitum distabat, et sub tunica, quae omnes tendines involuit, se abdiderat: illa enim ab inferiore huius extremo haud multo plus distabat, quam dissecta cutis exterior hiabat, cui etiam per intermediam multam cellularem substantiam adhaerebat. Inferior pars huius tendinis, ut mihi quidem visum fuit, longe minus se retraxerat quam superior: etenim eius extremum nihil fere quidquam a tunica contegebatur, pariterque paullulum modo sub exteriori cute absconditum latebat. Adhaec bina anteriora extrema dissecti tendinis aliquanto crassiora erant magisque prominebant, quam reliquae tendinis partes: inferioris tamen partis extremum anterior non omnino crassitiem ac prominentiam extremi finis anterioris partis superioris aequabat.

## EXPERIMENTUM X.

§. XV. Canem, quem ad secundum et quintum experimentum adhibueramus, quique integerrima valetudine fruebatur, die post experimentum quintum sequente, tali modo ligauimus, ac in cane experimenti noni feceramus. Huic similiter cutem a postica parte versus internum latus incidimus, tendinemque Solei parumper denudauimus. Commouit se canis et irrequietus factus est. Expectauimus, donec requievisset: quo facto tendinem Solei totum transversum praecedimus; cuius superior pars retrahebatur: canis autem quietem inconcussus seruabat. Vinculis eum liberauimus, et ipse laetus et alacer discurrit, quum alliceretur, in altum se erexit, pedibusque posterioribus ingressus est.

## EXPERIMENTUM XI.

§. XVI. Alii cani, quem ut praecedentes alligaueramus, Gemelli tendinem, a postica parte versus exteriora parum denudatum, ultra dimidium recidimus. Nihil sensit; et solutus aequae bene pedi innixus est ac antea, neque conuulsionibus aut

spasmodis agitatus. Quo apparet, an posterioribus pedibus arrectus ingrederetur, frustum carnis olfaciendum datum est, et deinde in altum sublatum: extemplo se arrexerit, pedibusque posterioribus innixus, porrigentem et parumper recedentem secutus est. Salarum gradus sursum deorsumque perambulauit, ab editioribus locis saltu se deiecit, et valde laetum atque alacrem egit. Postridie similiter in altero pede tendinem Solei ab interiore latere ultra dimidium abscidimus. Inde non magis laesus est, quam prius, cursitauit, scalas aequae commode ac antea scandit, et similiter allectus, posterioribus pedibus incessit, nullis spasmodis aut conuulsionibus vexatus.

### SCHOLION III.

§. XVII. *Hos duos canes reseruauimus ad experiendum, an et qua ratione disscissi tendines iterum coalescerent. Cutis intra quatuor hebdomades integre coiuerat, iis vero locis, ubi minor incisio facta erat, adhuc citius. Priorem canem post sex hebdomades, posteriorem post triginta et quinque dies a captis experimentis necauimus; tumque sequentia inuenimus.*

### OBSERVATIO III.

§. XVIII. *Antequam in priore cane tendinem Achillis inuestigarem, eo loco ubi sectio facta erat et pili necdum repullulauerant, digitis tendinem comprehendimus: in quo duo minuta tubercula tetigimus, circiter transversum digitum minorem a se invicem remota; ceterum superius tuberculum maius fuit inferiori. Deinde totum tendinem reteximus. Tunica, quae tendines omnes coniunctim includit, et quam in Observatione prima, seu §. XII, commemoravi, perfecte coaluerat: et, si tubercula modo dicta abfuisent, tendinem sanum quilibet putasset. Aperuimus tunicam inter bina tubercula, illamque separauimus, firmissime tuberculis adhaerebat. In extremo superioris partis resecti tendinis Solei, ubi tuberculum occurrebat, fibrae magis a se invicem distabant, neque ita arte sibi accumbebant, quam in reliquo tendine: nimirum hoc tendinis extremum speciem praebebat, quasi tumefactum aut inflatum esset. Compressum et parumper attractum, paulum liquidum profudit, adeoque aliquantum gracilesce et elongari visum est. In extremo huius tendinis inferiore, ubi tuberculum minutius erat, quam in superiore, et fibrae, quantum equidem visu cognoscere poteram, valde parum magis a se invicem remotae erant, quam per reliquum tendinis tractum observabatur. Dum extremum suum inferiorem perinde, ut superiorem, comprimebam, simulque attrahebam, fere omnino non animaduertere poteram eundem elongari; aliquid tamen humidi promentore mihi videbatur. Praeterea neque in extensoribus tibiæ huius canis, neque in tendinibus Achillis, ullum amplius deprehendi vestigium puncturarum, ab acubus inflatarum, sicut in secundo et quinto experimento perscripsi.*

### OBSERVATIO IV.

§. XIX. *Dignum quoque animaduersione est, in illo cane, quem in scholio primo, seu §. XI, me iniulasse dixi, nihil amplius puncturarum in tendinibus factarum, quemadmodum in experimento primo et quarto, seu §. II et V, exposui, me deprehendere*



*hendere potuisse: excepta tamen ista punctura, qua venam simul perruperam in experimento primo. Hic scilicet multum inueni cruoris extra vasa effusi, inter cellulosa substantiam ac tendinem: adeoque nonnihil eius in rimam puncturae penetrauerat, quod paruum rubicundam in tendine lineam efformabat.*

## OBSERVATIO V.

§. XX. *Praeparatis in altero cane tendinibus Achillis utriusque pedis, in tendinum uno ad internum, in altero ad externum pedis latus, valde minutum tuberculum obseruabam. Haec tubercula tenui membrana vestita erant, eaque membrana ita fortiter illis adhaerebat, ut inde omnino separari non posset. Verisimile est, hanc membranam fuisse partem vaginae, quae singularem quemque tendinem includebat. Igitur aliquoties tantum leues scalpello incisuras secundum tendinis longitudinem faciebam, quo species obiecta est quasi verarum fibrarum nouiter enatorum, quae tamen flauescebant, et, si luci obuerterentur, paulum pellucebant. Quodsi tendines luci obuerterentur, videri poterat, quousque in singulis scalpellum adactum esset. Solei tendo fere totus abscissus fuerat: nam paucae tantum albae fibrae inferius conspuebantur, deinde opparebant aliae substantiae, quae eo longiores fiebant, quo magis incisura ad superiora procedebat, quoniam supremas fibrae dissectae quam maxime se retraxerant, subsequenter semper, prouti succedebant, minus minusque retractis. Supremas tamen non ultra crassitudinem cornui calami, quali ad delineandum utimur, a se inuicem remotae fuerunt. Tendo Gemelli non ita profunde intus fuerat: ceterum eadem, quae de Solei tendine retuli, in hoc pariter obseruebantur: Quo magis vero minuta ista tubercula scalpello secundum directionem longitudinis caedebam, eo minora reddi videbantur, ita ut tandem ferme nihil ipsorum animaduerti posset. Illud, quo tendines iterum coaluerant, naturam glutinis habebat, et, si rei quam simillimae comparandum est, speciem referebat calli, quo confracta ossa iterum coniungi solent; nisi quod in tendinibus mollior erat, quam in ossibus.*

## EXPERIMENTUM XII.

§. XXI. *In haedo, similiter ac proxime praegressi bini canes, alligato, ore tamen libero, quo sensum doloris balatu testari posset, in uno pede tendinem Solei, in altero illum Gemelli, ad dimidium usque discidimus. Nihil sensit: attamen, quum tendines denudarentur, itaque quum, sectis tendinibus, cutis vossella vellicaretur, balauit. Inde dimissum animal in alterum diem abire iussimus, quo die pleuram in eo explorare suscepimus: interea temporis nullis spasmodis aut conuulsionibus tentatus fuit, sed admodum vegetus, posterioribusque pedibus sicut antea innixus, subinde pro more consueto huius generis animantium saltus fecit.*

## SCHOLION IV.

§. XXII. *Quum postea tendines sectos recognoscerem, nihil reperi, quod hic annotari adhuc dignum foret.*

## EXPERIMENTUM XIII.

§. XXIII. Canem eodem ac praecedentes postremos canes modo alligauimus, chordaque magna digitis comprehensa, et scalpello proxime sub ea chorda traiecto, eandem integram praecidimus. Vinculis remotis quum in solo statuissemus canem, ingressus est, et laeso pedi pariter inniti conatus: sed pes haud satis firmitate valuit; in hoc enim brutorum genere, dum stant aut pedes promouent, chorda magna longiori ipsorum tarso in erecto situ tenendo inferuire debet. Humi stratus si vocaretur, statim accurrit, semper etiam laeso insistere pedi conatus: adeo parum sensit, pedem vulnere debilitatum esse, quum tamen alioquin canes solis tribus pedibus haud dubitanter uti soleant, si tantillum aegritudinis in uno pede perceperint. Retinuimus nobiscum hunc canem per integrum dimidium diem, quo toto tempore perpetuo vegetus et alacris fuit, cibos auide vorauit, nec quicquam malorum symptomatum in eo deprehendi potuit.

## SCHOLION V.

§. XXIV. In hoc experimento tendinem Achillis non tibiam versus, sed cultro ex industria ab ea auerso discidimus, quia alias neruum sub tendine decurrentem facile ferire potuissimus.

## EXPERIMENTUM XIV.

§. XXV. Postridie huius experimenti eundem canem, saluum vegetumque, eodem modo ligauimus, et in altero pede tendinem magnum fere totum nudauimus: quod quum fieret, satis inquiete se gessit. Expectauimus donec pacatus esset, tunc tendinem acie a tibia auersa medium discidimus: quo facto superior tendinis pars circiter transuersi digiti spatium, nulla tamen vi, sed lente, se sursum retraxit; aliam partem inferiorem retractam fuisse, equidem nullatenus animaduertere potui. Deinde tam superiorem quam inferiorem tendinis disseci partem incisionibus vexaui, aliquas etiam particulas supra infraque abscidi: quorum omnium nihilo plus doloris percepit, quam senserat quum medium tendinem praeciderem. Sed quum scalpello per cutem adacto musculosas carnes compungerem, tum vero confestim perturbatus, coepit eiulare. Postremo canem interfeci.

## SCHOLION VI.

§. XXVI. Praeter haec, dum in ligamentis experimenta caperemus, aliquoties occasione ferente. oleo vitrioli, lapide infernali, acu, scalpello, extensores tibiae non tantum titillauimus, sed etiam compunximus, cecidimus, dimidios integrosque discidimus: sed nec catelli, nec maiores canes, neque haedi ullum inde dolorem perceperunt. Ut primum vero cutem horum animalium caedebamus, comprimendoue vellicabamus, aut musculosam partem, vel incisam tantummodo cutem ab interiore facie, lapide infernali vel oleo vitrioli titillabamus: statim certis declarabant signis earum rerum sensum ad se pertinere.

SCHO-



## SCHOLION VII.

§. XXVII. Tot igitur institutis experimentis, quum satis abundeque confirmatum esset, tendines in brutis sensu destitui, eosque sine periculo pungi vexariue posse; in hominibus quoque visum est, quoad liceret, explorare, an pariter se res haberet, ac de brutis animantibus consliterat. Quapropter haud veriti sumus, in vulneribus humanis sponte oblati rem experiri: et quaecunque reperta sunt, fideliter enarrabo, haud dubitans fore, ut iis nostra sententia adhuc magis corroboretur.

## EXPERIMENTUM XV.

§. XXVIII. Accidit, ut studiosus literarum cutem unius ex digitis unco laceraret, ita ut flexores tendines nudi apparerent. Usus est hac occasione Celeberrimus Praeceptor, Perillustriſ DN. de HALLER, cui merito summos deferimus honores, et quum satis persuasum haberet, contrectationem tendinum nihil periculi asferre, unum istorum tendinum vossella arripuit atque compressit, insciente quidem nec aduertente aegrotō. Interea vultum eiusdem diligenter obseruabat Ill. HALLERUS, num forte signum aliquod ingrati sensus ostenderet, sicut procul dubio factum esset, si ille dolorem aliquem percepisset: sed nihil plane mutatus est vultus. Testis adfuit expertus chirurgus, BORNEMANNUS, conscius eorum quae agebantur, idemque propterea diligenter etiam vultum aegroti intuitus est, num aliquod indicium doloris proderet: sed nec ille quicquam mutationis deprehendere potuit. Hic quoque postea saepius in renouanda vincitura idem experimentum repetiit, eundemque semper effectum expertus est.

## EXPERIMENTUM XVI.

§. XXIX. Ancilla, quae graue onus una cum aliis portabat, his remittentibus ab illapso pondere vehementem in pollice contusionem acceperat. Vocatus BORNEMANNUS, cuius in superiore experimento mentionem feci, inter curandum aliquoties occasione usus est absentiam sensus in tendinibus magis magisque comprobandi. Igitur primo flexorem longum instrumento parum acuto vellicauit: neque interrogauit ancillam, an doleret, sed tantum indicia vultus attendit, in quibus nihil animaduertit, quod dolorem significaret. Quum vero iterum experimentum tentare vellet, dixit ei: se in osse aliquid operaturum esse, hoc tamen plerumque non dolere; sed eius loco tendinem adhuc vagina sua tectum ferramento acuto vellicauit. Tum quaeſiuit, num doleret? negauit illa. Deinde vaginam tendinis discidit, quum, vtique propter suppurationem, incidere necesse esset. Iam nudum tendinem acuta spathula, qua ad unguenta et emplastra inducenda utebatur, titillauit, adeoque pupugit aliquantum et fissuras inter eius fibras excitauit. Interrogauit denuo aegrotam, num doleret? iterum illa negauit. Pariter vossella tendines aliquoties compressit: ancilla vero nihil eius percepit.

## EXPERIMENTUM XVII.

§. XXX. In lapicidina huius urbis operarius quidam a lapidibus ruentibus tantam accipit in pede laesionem et contusionem, ut astragalus adeo, seu talus, plane extra locum suum proturbatus, malleolo tantum adhaereret interno. Chirurgus BORNE-MANNUS, postridiè, cum aliis arcessitus, explorato vulnere, ferram, qua pedem amputaret, interuallo duorum transuerforum digitorum supra malleolum admouit. In quo opere dum, quoad fieri poterat, caueret, ne carnosus partibus nimis appropinquaret; factum est, ut tendinem achillis fere ad dimidium transversum digitum ferra discinderet, priusquam hoc animadverteret: at aeger nihil eius perceperat; et neque hoc, neque reliquis diebus, spasms aut convulsionibus conflictatus est. Erant in aegro nudati quoque tendines Peronaei longi pariter ac brevis: quare hos etiam acumine spatulae, ad emplastra inducenda adhiberi solitae, compunxit chirurgus, praesente Illustri atque Generosissimo Dn. de HALLER et binis adhuc aliis viris in dignitate constitutis, quibus ego me adiunxeram. Dum haec fiebant, in vultu aegri nulla signa apparuerunt, quibus dolorem proderet: quum tamen an doleret ex eo quaereremus, placido vultu affirmabat. At quum nunc linteum ad contegendum pedem leniter tantum iniiceretur, idque partes carnosae a cute nudatas contingeret, statim exclamavit, quod nequaquam fecerat, quum tendines pungerentur. Adeoque credibile est, aut metu amputationis, quae tunc parabatur, perturbatum hominem ad quaestionem, num dolorem ex compunctione tendinum sentiret? affirmando respondisse: observavi enim, eodem, quo haec fiebant tempore, eum ad duas contrarias quaestiones propositas pariter affirmando respondisse; namque unus ipsum interrogabat, an pulvinar altius attolli iuberet? alter autem quaerebat, an potius illud, sicut positum erat, retinere vellet? utrumque affirmabat. Aut fieri potuit, ut, quia tendines ab adhaesione liberi solutique erant ac commovebantur, ambientes vulnerataeque partes, ipsaque cutis, ad quas illa commotio peruenit, aliquem perceperint dolorem.

## SCHOLION VIII.

§. XXXI. In aponeurosisbus haud opus esse putavi capere experimenta, quia partim nihil aliud, nisi tendinum ipsorum productiones sunt, partim eiusmodi nonnulla experimenta et asserta iam a Cl. D. ZIMMERMANNO in allegata Dissert. §. XV et XVI. proposita sunt. Quum tamen inter experimenta in peritoneo et ligamentis facta subinde nactus sum occasionem aponeuroses quoque scalpello et butyro antimonii stimulandi; modo tantum hic admonendum duxi, eas me in his experimentis sensu vacuasprehendisse.

## CONSECTARIA.

## §. XXXII.

Itaque vidimus tendines in omnibus experimentis sensu et dolore fuisse destitutos, siue puncti, siue vellicati, siue compressi, siue secti, siue ad partem aliquam discissi, siue



siue integre praecisi, siue parte aliqua truncati alioque modo quocunque vexati fuerint: non minus autem in vagina tendinum, quam in ipsis tendinibus eandem insensibilitatem deprehensam fuisse, siquidem et in tendinibus vagina sua adhuc tactis et in vagina separatim experimenta facta sunt, ut praecipue ex §. X. collato cum §. XII itemque ex §. XXIX. manifestum est. Neque solum in animantibus brutis varii generis et aetatis ea phaenomena comparuerunt, sed plane similiter etiam in hominibus eueniunt. Nam quod fortassis obiici posset, aegrotum §. XXX. propositum affirmasse, se dolorem ex compunctione tendinis percepisse; hoc illum falso pronuntiasse, partim iam in eodem §o maxime probabile factum est, partim constanti omnium reliquorum experimentorum testimonio consensuque confirmatur, partim denique ex eo conficitur, quod idem aeger paullo ante multo maiorem laesionem, nimirum achillei tendinis ictu ferrae reciprocantis factam lacerationem, non senserat. In aponeurosis pariter se rem habere ac in ipsis tendinibus, §. XXXI. demonstratum est. Ceterum hic praemonendum duco, me loqui proprie de iis tendinibus, qui in extremis musculorum exoriuntur; non de fibris tendineis, quae musculorum carni intertextae sunt: quanquam ad has quoque ea, quae dico, suo modo applicari possint.

#### §. XXXIII.

Deinde cognouimus, licet tendines quoquo modo vexati essent, modo non integre praecisi fuerint, tamen id non impediuisse, quo minus artus motum et actionem suam, quatenus a tendinibus administrantur, perinde ut in perfecta sanitate retinerent: sicut inprimis §. II. III. IV. V. VI. VII. X. XV. XVI. XXI. docent. Porro retractae sunt tendinum fibrae, necdum praecisis integre tendinibus: vid. §. XX. collato §. XI. et XIV; quod etiam comprobari videtur enatis istis tuberculis, quae §. XX. descripta sunt, et procul dubio iis in locis, ubi fibrae praecisae fuerant, succreuerant, sicut in §. XVIII. accidit. Etsi vero sic retractis pluribus fibris reliquae a pondere appenso magis tensae sunt; tamen nunquam obseruatum est, spasmos aut conuulsiones inde ortas fuisse: velut nominatim dictum est §. X. XVI. XXI. XXX.

#### §. XXXIV.

Sed neque aliis ullis aegritudinibus propter tendinum laesionem quamcunque animalia aut homines affectos fuisse, tota series experimentorum ostendit. Nam licet integre abscissi fuerint tendines, tamen nulla alia mala consecuta sunt, quam functionis, quae tendinum propria fuerat, intermissio, quemadmodum in §. XXIII. et XXV. expositum est: et dum coalescerent dissecta quiete omnia peracta sunt: et post sanationem vel nulla praegressarum laesionum vestigia remanserunt, vel tantum leuiora in propriis vulneratorum tendinum locis; vid. §. XVIII. XIX. XX.

#### §. XXXV.

Tandem manifestis exemplis edocti sumus; discissas tendinum fibras, eosdemque integre praecisos, iterum proprio succo, seu glutine interposito, coire coniungere: nec leuis adfuit suspicio, ipsas tendineas fibras fuisse renatas, ut legenti

§. XVIII. XIX. XX. perspicuum erit. Quid enim aliud indicarunt innata tubercula, nisi succum tendinis ibi collectum restagnasse? et quid aliud fuit humor ille, quem ex praecisis tendinum capitibus exprimere licuit? Denique ipsum molle gluten in locis coalitis, oculis conspectum manibusque tractatum, hanc rem satis comprobât.

#### §. XXXVI.

Haec igitur, quae hactenus deducta sunt, liquido demonstrant, verissimum esse, quod initio posui, scilicet tendines omni sensu, multoque magis dolore vacuos esse, vulnera vero ipsorum vel quascunque laesiones nihil plane periculi, nulla vel leuiora symptomata, nedum graua, spasmos, conuulsiones, similiaque inferre, et omnium minime mortem inducere. Neque rationum fulcimentis destituta est haec sententia. Nam ut a verisimili ordiar, quum tendines plerique omnino in exteriori corpore et circa membrorum iuncturas locati sint, proptereaque plurimis externarum rerum afflictionibus, ictibus, pressionibus, similibusque pateant; eos oportuit ita fabricatos esse, ut iniuriis istis sine molestia ferendis apti essent, neque doloris sensus inde creatus valetudinem perturbaret, et, si forte grauius afflicti, vexati, vulnerati forent, facilem curationem reciperent. Quod eo magis necessarium fuit, quia trahendis mouendisue partibus dicati, huic muneri minus idonei futuri erant, si tractionis sensum perciperent: et quia plerumque ossibus affixi, ab eorum duritie variis in motibus frictionibusque necessario laederentur, si sentirent.

#### §. XXXVII.

Praeterea textura tendinum compacta firmaque perceptioni exercendae repugnare videtur, quandoquidem ad sensum producendum mollities quaedam requiritur. Quo vero clarius textura tendinis intelligatur, eius compositionem breuiter explicemus. Fit tendo, ut ex perfectissimo grauissimoque Anatomico, Viro Illustri, BERNH. SIEGER. ALBINO, Praeceptore meo obseruantissime colendo, coram in praelectionibus physiologicis audiui, ex fibris musculorum carnis, per harum continuationem: quod ut ostenderet Vir candidissimus, nitidum exhibuit praeparatum, in quo continuatio istarum fibrarum tendinearum ex musculo tam clare demonstraretur, ut dubitationi nullus relinqueretur locus. Quamquam autem ex carne musculosa producantur tendinis fibrae, has tamen, docuit, propter contractionem densitatem fieri multo duriores, tenaciores, robustiores, laeues, albescentes, splendentes, adeoque in peculiarem fere abire substantiam <sup>1)</sup>. Consentunt cum hac doctrina Vir Illustris atque Generosissimus DE HALLER <sup>2)</sup>, Praeceptor aequae meae summe venerandus, Magnus BOERHAAVIUS <sup>3)</sup>, PETRUS LAUREMBERGIUS <sup>4)</sup>, IOAN-

NES

1) Conferatur CELEBERRIMI VIRI Hist. Musculor. Hom. Leid. Batav. 1734. p. 7. 18. et 57.

2) In Prim. Lineis Physiol. Gottingae 1747. §. 404.

3) In Instit. Med. §. 399. Conf. eiusdem Praelect. eod. §. cum Commentariis Illustris DE HALLER.

4) In Procestris anatomicis. Hamburg. 1619. 4.



nes BOHNIVS <sup>5)</sup>, et alii apud ANDR. OTTOMAR. GOELICKIUM <sup>6)</sup> excitati auctores.

### §. XXXVIII.

Canaliculis etiam, seu vasculis, instructum esse tendinem, partim humor ex diffectis fibris promanans, partim regeneratio amissorum, quae sine vasis aduehentibus concipi nequit, argumento sunt, (vid. supra §. XVIII. XIX. XX.) partim iniectionibus praeparationibusque suis felicissimis ob oculos posuerunt ac descripserunt Celeberrimus RUYSCHIVS et in aeternum Venerandus ALBINUS, ceu videri potest apud ipsos praestantissimos viros <sup>7)</sup>, tum apud IOANN. GEORG. KISNERUM <sup>8)</sup>, HERM. BOERHAAVIUM <sup>9)</sup>; Perillustrem de HALLER <sup>10)</sup>; adde, quod Vir generosissimus ipse quosdam pulchre praeparatos tendines adeuntes arterias nobis in praelectionibus suis demonstrauerit. At neruum in tendines ingredi, nemo unquam vidit, ut testatur MELCHIOR SEBIZIVS <sup>11)</sup>, pluresque alii apud GOELICKIUM <sup>12)</sup>: et quanquam e musculis nascantur tendines, ad musculos autem plures accedant nerui; hi tamen omnes in musculi carnem distribuuntur, et ibidem euanescent, neque ad tendines pertingunt. Haec est meorum ad cineres usque colendorum Praeceptorum doctrina, quam accuratis saepeque iteratis observationibus suis comprobata fouent, uti et doctissima eorum scripta legenti patebit <sup>13)</sup>.

### §. XXXIX.

Iam quum, quantum adhuc cognitum est, nusquam sentiendi facultas existat, nisi a neruorum extremis <sup>14)</sup>: in tendinum autem contextu nulli nerui dispergantur; sequitur, ut neque sentiendi virtute tendines praediti sint. Sunt quidem magni viri, interque hos praecipui CLAUD. GALENUS <sup>15)</sup>, HERMANNUSQUE BOERHAAVIUS <sup>16)</sup>,

T 2

qui

5) In Circulo anatomico-physiologico. Lipsiae 1710. 4. Progymnasmatum XXIX. p. 393. seq.

6) In Diff. de Tendinis Structura et Usu. Francof. cis Viadrum 1734. p. 12. seqq.

7) RUYSCH. in Thesaur. et Aduers. anat. Magn. ALBIN. in hist. muscul. hom. p. 11.

8) In Diff. de Laesione tendinum. Lugd. Batav. 1699. §. X. et adiecta tabula, figura 2.

9) In Praelection. ad inst. med. §. 399. Vol. III. p. m. 375.

10) Ad Boerhaav. loco proxime allegato.

11) In Exercitationibus medicis p. 142. Edit. Argent. 1672. ANT. LEEUWENHOEKIVS quidem videre sibi visus est nervulos in tendinum inuolucris, sed non in ipsis tendinibus: vid. Cl. ZIMMERMANNI

diff. alleg. §. XII; ubi inuenies, quam parum inde concludi possit.

12) In cit. diff. §. XXV.

13) Celeb. ALBIN. hist. muscul. homin. p. 12. Generosiss. v. HALLER prim. lin. physiol. §. 405. et Comment. in Boerhaav. Praelect. Vol. III. p. 352. not. a.

14) Vid. BOERHAAVIUM inst. med. §. 566. cum Commentariis: vel Perill. de HALLER prim. lin. physiol. §. 381. coll. §. 377.

15) De motu muscul. Lib. I. Cap. 2. de Usu partium Lib. I. Cap. 17. et Lib. XII. Cap. 3. et alibi. Hunc deinde plurimi secuti sunt, ut moris erat. Vid. GOELICKE in diff. cit. §. VII. Itemque KISNER. c. L. §. IX.

16) In praelect. ad inst. med. §. 399. p. m. 374. et 376. Vol. III.

qui tendines ex ipsis nervis oriri propugnant: verum hi solo mentis ratiocinio merisque coniecturis ducti, nullis certis experimentis aut observationibus instructi, eam opinionem conceperunt: vel quum sibi persuaderent, tendines sensus et doloris esse capaces, necessario quoque concluderunt, eos ex nervis esse constructos. Sed quum utrumque argumentandi genus lubrico et fallaci innitatur fundamento, et assertum illud ab experientia refutetur; nemo nos, puto, reprehendet, quod ab auctoritate tantorum virorum discedimus. An forte ex nervorum inuolucris orti sunt tendines? Non repugnat experimentis; inuolucra enim, siue ea sint dura aut pia meninx, siue tela cellulosa, facultate sentiendi carent <sup>17)</sup>. An autem haec opinio nullis contradicat observationibus anatomicis? hic neque affirmare neque negare volo; nimis enim longus forem, si accurate fabricam musculi carnearumque fibrarum inuestigare et exinde veritatem aut falsitatem huius coniecturae determinare vellem.

## §. XL.

Veritati auctoritas semper est postponenda. Igitur illis veterum potius adstipulamur, contra quos GALENUS disputat, et qui iam istis temporibus, nescio utrum experimentis aut observationibus, an rationum momentis permoti, tendines sentire negarunt <sup>18)</sup>. Sed quanquam verum docuerint, sic ut nunc nobis per ipsam naturae explorationem constitit, et veritas in suam sedem postliminio reuocata est, tamen haec doctrina propter admirabilem GALENI auctoritatem breui neglecta, quum posteriores medici cum GALENO errare malient, quam redintegrato studio rem ipsam inquirere, nunquam in conspectum redire potuit: adeo ut pro indubitato axioma habitum sit, tendines maxime post nervos exquisito sensu praeditos esse; et GOELICKIUS <sup>19)</sup> inprimis, *illos admodum sensibile, sese in eorum gratiam asserere, testetur, qui nescio quam insensibilitatem tendini vindicare haud erubescunt.*

## §. XLI.

Huius autem opinionis affectae et defensores hoc potissimum utuntur argumento, quia persuasum habent, tendines punctos, sectos, nec integre praecisos, ruptos, laceratos, vexatos, et quocunque modo vulneratos aut laesos eadem sequi symptomata, quae nervos ita affectos sequi solent: nimirum exquisitissimos dolores, aestus, inquietudines, spasmos convulsionesue, deliria, febres, inflammationes, gangraenam, pluraque alia saeva et horrenda, et ipsam adeo saepe mortem. Talia enarrant KISNERUS <sup>20)</sup>,  
GUIL.

17) De cellulosa membrana vid. Clar. ZIMMERMANNUS in Diss. de Irritabilitate. §. III. et XXXV. pag. 36. de dura matre IDEM eod. loc. §. V, itemque Celeb. ZINNIVS in Diss. quae sistit experimenta quaedam circa corpus callosum, cerebellum, duram meningem, in vivis animalibus instituta, Göttingae 1749. pag. 30. seq. et

pag. 43. seqq. (— hor. script. T. IV.) De pia matre Sect. IV. huius dissertationis.

18) Apud GOELICKIUM de tendinis structura et usu. §. VI.

19) Cit. loc. §. XIV. add. altera eiusdem Diss. de tendinum affectibus, Francof. ad Viadr. 1734. §. XII. p. 18.

20) Loc. cit. §. XXII. seqq.



**GUIL. COWPERUS** <sup>21)</sup>, **Magh. BOERHAAVIUS** <sup>22)</sup>, **Ill. HEISTERUS** <sup>23)</sup>, **IAC. CRESCENTIVS GARENGEOT** <sup>24)</sup>, **GOELICKIUS** <sup>25)</sup>, **IOANN. ZACHAR. PLATNERUS** <sup>26)</sup>, et complures alii ab his excitati, verbo, fere omnes ad unum, qui vel in univcrsum de chirurgia, vel de hac sigillatim laesionum parte, vel de venae sectionis administratione commentati sunt.

§. XLII.

Contra tamen aliqui nonnunquam exsisterunt testes veritatis, qui re diligentius peruestigata, vulnera tendinum haud tantis tanque multis malis ingenerandis patere monuerunt, sed fere periculo grauibuscue noxis vacare. In his sunt **LEONHARDUS BOTALLUS** <sup>27)</sup>, **IOH. DANIEL SCHLICHTINGIUS** <sup>28)</sup>, **IOH. GEORG. ZIMMERMANNUS** <sup>29)</sup>. Adeoque ipsi aliquando ii, qui gravitatem horum vulnerum mirifice au-

T 3

gent,

21) In Transact. philosoph. Num. 252. et in Actis Erud. Lips. latinis, anno 1700. mens. Ian. p. 23. seqq.

22) In Aphorismis practicis §. 162. seqq. et §. 183. seqq. in quos conf. Comment. Perill. GER. VAN SWEITEN.

23) In Institut. chirurg. Capp. de Vulneribus, de Laesione Nervi aut tendinis in venae sectione, de futura tendinum.

24) In Chirurgia practica s. de operationibus chirurgicis. Part. III. cap. 7.

25) In diss. de tendinum affectibus, per totam.

26) In Institution. Chirurg. §. 377. edit. germ.

27) Commemorat **GOELICKIUS**, in diss. de tendinum affectibus §. XII. p. 18., **BOTALLUM** a **IOHANN. VAN HORNE** recte, ut ille sibi persuadet, notari, quod tendinem quoquo modo violatum minus noxae minusque periculi sibi coniunctum habere contendit.

28) In Ephemerid. Naturae Curiosorum Vol. VI. p. 109. seqq. In Observ. XXIV, cui Titulus: Tendo ex parte discissas, nullius mali symptomatis causa, Cl. Vir verba sequentia facit, quae hac sine hic appono, ut unusquisque videat, quantum valeant experimenta et animus attentus in observando casus nos erroribus exsoluendo. Posteaquam, *inquit*, diu nimis vulgi errore immerfus fueram, tendinem, aut nervum, quoad dimidiam fui partem discissum, disruptumve, ingentium symptomatum, phlegmones praefertim, abscessus, gangrae-

nae, etc. causam et originem esse. Ecce! casu obuenit quidam, cui tendines carpi, una cum arteria radiaea, pulsus ubi exploramus, quoad magnam partem, erant hostili cultro rescissi, ut insigniter hiarent. Chirurgus linteo carpto terebinthinae spiritu madido vulnus opplet, arctasque circumdat fascias, neque nisi post quintum diem easdem soluit, quando carne recenti vulnus iam erat omnino repletum, inducta demum intra tres hebdomadas arida cicatrice, nullo interea animaduerso eiusmodi pravo symptomate. Plures consimiles eiusmodi historias a chirurgis sibi communicatas esse, etiam memorat. Ut autem exactius adhuc veritatem istam experirer, *pergit*, canes iterum in subsidium sumsi, quorum tendines plus minusve incisione laesi, ut interdum vix amplius cohaerent, vulnere terebinthina pura, aut vini spiritu, aut nullo pharmaco deligato, observato interrim nullo symptomate, quod ullo modo confectarium eiusmodi mali ominis praebere valeret. Add. **EIUSD.** Traumatologia nouantiqua, Amstel. 1748. 4.

29) Hic Vir praestantissimus praesente Perillustri nostro Praeceptore, Magno **HALLEO**, eiusque consilio, ut ego, tendinem Achillis variis in animalibus irritavit butyro antimonii, oleo vitrioli, scalpello, punxit, per mediam longitudinem secavit, nulla autem convulsio, nullus clamor, ne minimum quidem doloris signum apparuit. Vid. **EIUS** Dissert. inaug. de Irritabilitate, §. XII. seqq.

gent, testimonium veniori sententiae inuiti imprudentesque perhibuerunt. Sic Per-illustris SWIETENIUS, qui pro recepta stat doctrina, tamen exemplum affert hominis, cui per saltationem chorda magna utriusque pedis disrupta fuit, quique *nec rupturæ momento, nec toto curæ decursu ullum dolorem sensit* <sup>30)</sup>. Et illum, cuius casum abruptae magnae chordae refert IOH. ADAMUS KULMUS <sup>31)</sup>, dum vixit, Praeceptor meus suauissimus, laeso adhuc pedi inuiti potuisse, idque etiam postea inter curandum sine molestia repetiisse, subindeque curru vectum esse, obseruat. Similiter PR-TRUS PAULLUS MOLINELLIUS <sup>32)</sup>, exposuit casum iuuenis, cui chorda magna gra- uissime ex vulnere laesa fuerat, qui tamen adeo parum mali sensit, ut illud diebus ali- quot plane contemserit. Quin crediderim, omnes eos, qui futuram tendinum cal- culo suo approbarunt, quorum magnus numerus apud Illustr. HEISTERUM <sup>33)</sup>, GOELICKIUM <sup>34)</sup>, aliosque recensetur, tacite confessos esse, tendines tuto pungi secariue posse: nam nisi hoc sine noxa fieri liceret, neque acubus traiectis eos consuere licitum foret. Quod etiam metuentes quidam ex illis, qui vulgarem sententiam tuiti sunt, a tendinis futura abstinere iusserunt <sup>35)</sup>.

## §. XLIII.

Quare, quum alii laesis tendinibus grauiam mala imputent, alii tendines infontes iudicent; horum nos potius accedere sententiae, persuadent experimenta et obserua- tiones, quae ipsi diligentissime fecimus, et hactenus accurate enarrauimus. Quaeret autem aliquis, idque non immerito, quid causae fuisse suspicari possimus, cur in eam de funestis tendinum affectibus opinionem descenderint praestantes viri? Qua de re ut meas coniecturas proferam, equidem arbitror, primum a perperam intellectis anti- quissimorum medicorum verbis in errorem fuisse inductos. Nam constat neruorum appellatione comprehensos a veteribus fuisse tum veros neruos, tum etiam tendines et ligamenta: quemadmodum ostendit ANURIUS FOESIUS <sup>36)</sup>, et vel illud indicat, quod spasmus, qui musculorum et tendinum affectus est, Latinis dicitur *neruorum distentio* <sup>37)</sup>. Quum igitur in probatis auctoribus legeretur, neruis laesis symptomata superius enarrata consequi; haec ab iis, qui naturam ipsam consulere interimise- runt, promiscue de tendinibus ligamentisque pariter ac neruis intellecta, et inuicem permutata, omnibusque in uniuersum attributa esse reor, quae singulis separatim conueniebant.

## §. XLIV.

30) In Comment. ad Boerhaavii aphor. de cognosc. et curand. morbis p. 241.

31) In Disp. de tendine Achillis dis- rupto, et arteriis in osseam substantiam degeneratis, Gedani 1730. Cap. I. §. 1. et 2.

32) In Commentariis de Bononien- si Scientiarum et Artium Instituto atque Aca- demia, Tom. II. Part. I. pag. 193. add. ib. pag. 196.

33) In Instit. Chirurg. Cap. de Sutura tendinis Achillis.

34) In Diss. de Tendinum affectibus §. XVI. seqq.

35) Vid. Celeb. HEISTER et GOELICKE II. cc.

36) In Oeconomia Hippocratis, voce Νεύρον.

37) Vid. CORN. CELSUS passim.



## §. XLIV.

Deinde notum est, iisdem locis, ubi tendines et ligamenta exstant, plurimos quoque nervos partesque nervis contextas occurrere, et plerumque simul cum istis laedi, atque si tendo trahatur, etiam connexos nervos trahi conuelli. Hinc quum nervi minus, quam tendines, conspicui sint, et vel attentos fallant oculos, nec quondam tanto studio indagati cognitique fuerint, ac quidem nunc solent, factum arbitror, ut tendinibus ac ligamentis, quae nimirum magis in oculos incurrebant, ea adscriberentur, quae nervis potius attribui debebant. Quo accedit, quod saepissime fortassis et a plurimis, quoties in vulneribus atrocissima symptomata acciderent, non ea, ac ad certum cognoscendum et statuendum sufficeret, accuratissime studioque exploratum fuerit, unde proprie mala ista originem fumerent? sed perfunctorie illis eam causam assignauerint, quae manibus oculisque magis exposita esset, aut de qua certe opinionem ante conceperint, et auctoritatem aliorum secuti essent.

## §. XLV.

Ita, verbi causa, tumores et inflammationes, quae tendinibus laesis accidunt, videntur rectius vicinis nervis eorumque irritabili naturae originem debere: hanc enim irritabilem indolem, unam ex primariis inflammationum causis ingeniose proposuit Coniunctissimus, Verissimus, rarissimique exempli Amicus, GEORG. ERNEST. REMUS in specimine inaugurali nuperrime edito *de Experimentis quibusdam circa circulationem sanguinis institutis* <sup>38)</sup>. Si post venaesectionem nascitur gangraena, hanc a sanguine inter fascias aponeuroticas effuso, non a puncto tendine, pulchre vereque, nisi me omnia fallunt, repetit Cl. D. ZIMMERMANNUS <sup>39)</sup>. Quo autem vehementius saepiusque ille, cui vena pertusa, post peractam venaesectionem statim membrum movet, eo maior quantitas sanguinis effluit, altiusque adigitur; et quo plus pinguedinis offendit effusus, eo citius putrescit. Si post similem sanguinis missionem sequitur perpetuus tenuis liquoris effluxus, cuius exemplum memini post sectam in brachio basilicam evenisse; vasi lymphatico vulnus illatum est <sup>40)</sup>. Denique nervi, lymphae ductus, et eiusmodi subtiles partes in habitu corporis adeo multiplicibus varietatibus ludunt, ut saepe numero aliquid in uno humano corpore laedatur, quod in altero vel deest, vel alio loco positum est. His adde, ad vulnorum gravitatem etiam corruptam humorum indolem plus minusue pro gradu acrimoniae conferre posse.

## §. XLVI.

Quamvis igitur tendinum per se vulnera haud ita metuenda sint, et nullum post se periculum trahant, tamen propterea non erunt nimis negligenter habenda. Licet enim tendines ipsi insontes sint, facilemque sanationem admittant, nihilominus aliae partes, inprimis nervosae, connexae vel vicinae, atque una laesae esse poterunt, quae  
maiores

38) §. XXV. p. 52. seqq.

39) In Diss. inaug. §. XIV.

40) Conf. HENRICI BASII *Erläuterter*  
Nuck, Hall. 1728. 3.

maiores curam requirunt. Unde eiusmodi quoque laesiones tractantur ac fouentur remediis, quae neruis amicae sunt, quo omnis noxa caueatur, quae a neruorum vicinitate timeri posset.

#### §. XLVII.

Vidimus antea, (§. XXXV.) tendines in animantibus brutis, siue ex parte aliqua dissecti siue in totum praecisi fuerint, propria virtute iterum coalescere et consolidari. Idem in hominibus compluribus felicissimo euentu tentauit paullo ante laudatus MOLINELLIUS <sup>41)</sup>, ostenditque in vulnerato Achillis tendine non adeo necessariam esse futuram, ut plerique sibi persuadent. Atque hinc sane magnum ad aegros, qui ex hoc tendine diuiso laborant, commodum redundat. Nam, quum ita natura magnae chordae consuluit, ut partes eius, si casu sectae fuerint, glutinari sine ulla artificiosa iunctione per se possint, neque eas suere oportebit, et ipsa erit extensio pedis, quo fines secti tendinis coeant et se mutuo contingant. quod a nonnullis apprimè necessarium habetur, minus curanda. Eadem de reliquis quoque tendinibus valere, facile perspicitur.

#### §. XLVIII.

Obseruatum etiam est §. XI. XIV. XV. XX. XXV. dissectas tendinum fibras fuisse retractas, siue omnino praeciderentur tendines, siue tantum aliqua de parte. Quod videtur ansam dare dubitandi de veritate receptae doctrinae, qua statuitur, tendines neutiquam contractionis esse participes, sed tantummodo carnem musculorum; ut inter alios tradunt IOH. GOTTSCHEDIUS <sup>42)</sup> et Celeberrimus I. FR. WINTERUS <sup>43)</sup>. Neque obici poterit, a carne musculorum fibras illas tendinum sursum tractas fuisse: nam neque carnem sede sua aliquantulum excessisse animaduersum fuit; et magna licet fibrarum parte integra, etiam solae paucae dissectae retrahebantur: et inferius dissecti magnam partem tendinis extremum quoque parum sub cute se recondiderat, ut in §. XIV. annotatum est, quamuis cum carne haud cohaereat.

### SECTIO II.

## DE LIGAMENTIS.

### PROPOSITIO.

§. XLIX. Ligamenta sensu destituta sunt: neque ex eorum laesionibus alia mala proueniunt, quam quae ad propriam ipsorum texturam et usum pertinent.

#### EXPE-

<sup>41)</sup> L. c. pag. 189. usque ad 196.

<sup>42)</sup> De motu musculorum, Cap. 2. §. 1. in Illust. de HALLER Collectione Diss. anat. tom. Vol. III. p. 371.

<sup>43)</sup> De motu musculorum §. XVI. in GENEROSISS. VIRI Coll. Vol. III. p. 445.



## EXPERIMENTUM I.

§. I. Canem obligato ore, resupinatum, pedibus comprehensum tenuimus, et cute ab interno latere cruris, iuxta genu, incisa, ligamentum eius loci capsulare aliqua ex parte nudauimus. Dum haec agebantur, canis vehementer perturbatus quiritabat, ac pedem fortiter retrahendo, magna vi se in libertatem vindicare nitebatur. Neque ad perfectam quietem posthac reduci se passus est. Intliximus paruum foramen in capsula articulationis: quod non videbatur sentire, non enim inquietior factus est, quam fuerat. Tum frustulo ligni, quod oleo vitrioli tinctum erat, per factum foramen traiecto ligamenta tetigimus: sed, quum foramen minutum esset, bacillus haud satis acutus et gracilis, at gutta olei vitrioli grandior. denique canis non ita, ac decebat, quietus; haud potuimus cauere, ne paulum olei dissectam cutem contingeret. Quo canis denuo in vehementes agitationes concitatus; crus validius concussit, eoque etiam oleum ex capsula iterum excussit, ut illud finitimas partes adureret. Ita accidit, ut irritato conatu haud ex sententia perspicere possemus, utrum ligamenta sensum habuerint necne. Interim ea quae sequuntur obseruare nobis licuit.

## OBSERVATIO.

§. II. Quum canem liberum dimitteremus, tribus pedibus ingressus est, et admodum tristis ante ianuam oclusam procubuit, quasi fugam meditans. Proiecta esca, noluit surgere ad illam capiendam: quum autem postea ipsi aquam bibendam ante os offerrem, et panem propius apponerem, edit bibitque. Deinde, quia Illustri Viro, Venerando nostro MODERATORI, haud verisimile videbatur factum vulnus, propter effluentem synoviam, sanationi fore accommodatum, ideoque canem paucis post diebus ad aliud experimentum adhibere cogitabamus; eum in conclauis, ubi plures canes custodiebantur, intuli. Posthac, dum in aliis canibus ligamenta exploraremus, quae experimenta mox enarraturus sum, vulnus prioris canis omnino negleximus, haud credentes illud bene consolidatum iri, praesertim quum neque sanari vehementer vellemus. Veruntamen sexto post die, quum ad aliud in eo cane experimentum instituentium nos acciugeremus, animaduertimus escaram vulnere superinductam, et animal saluum vegetumque discursare, nulla in pede restante infirmitate. Quamobrem, quo vulnus ad perfectam perueniret sanationem, et ut tunc sanationis modum cognoscendi daretur facultas, ipsum dimisimus. Dehinc perpetuo eum obseruauimus, qui semper alacris vegetusque erat, discurrebat, laesoque crure tam comode utebatur, ac si nulum in eo vulnus accepiisset, adeoque, si imitaretur, posterioribus pedibus incedebat.

## SCHOLION.

§. III. Quum in eo res esset, venit verus canis dominus sua repetiturus: nam, ut postea audiuimus, puer, a quo canem pretio soluto comparaueramus, eum etiam suffuratus erat. Quare quum dominus mancipium suum ita carum haberet, ut pro pecunia nobis illud relinquere nollet; ei canem reddidimus. Itaque non potuimus examinare, quomodo ligamentum persanatum fuerit. Reliqua animantia, in quibus ligamenta tali modo explorata fuerunt, statim postea a memet ipso aut aliis, eius generis

neris experimentis subiecta sunt, in quibus vitam amiserunt, ut alicuius ligamenti curationem cognoscendi nulla copia fuerit. Quod nec in alio cane expectare, per tempus aliasque res circumstantes mihi licuit.

## EXPERIMENTUM II.

§. LIII. Catellum eodem modo, ac priorem canem, apprehensum tenuimus: non tamen ei os obstrinximus, siquidem per aetatem nondum acriter mordere valebat. Huic pariter ab interno cruris latere iuxta genu, incisa cute, ligamentum capsulare reteximus, sed latius quam in priore experimento, foramen quoque in capsula maius infliximus. Dum cutis secabatur ac diuelleretur, vehementer clauitabat, seque iactabat: contra dum capsulam perforabamus, conquiescebat. Tunc accepto bacillo peracuto ac pertenui, oleo vitrioli ligamenta interius adussimus. Nihil sensit: restabat enim quietus. Posthac dissectam cutem attigimus: confestim iterum lamentari seque iactitare coepit.

## EXPERIMENTUM III.

§. LIV. Similiter se gerebat alius catellus, quum ei haec ligamenta eodem modo titillaremus. Quo vero maiorem hiatum nancisceremur, antea tendinem extensorem tibiae praecidimus: cuius pariter nihil senserat; quum tamen eiularet, quamprimum vossella cutem apprehensam vellicaremus.

## EXPERIMENTUM IV.

§. LV. Haedum resupinatum, pedibus protensis alligauimus ad angulos tabulae, in qua resupinaueramus. Tum diuisa cute, reteximus ligamenta ab interiore parte cruris. Perpetim balauit, seque eripere luctatus est. Deinde ligamenta exterius lapide infernali lacessiuius: extensorem tibiae praecidimus, unaque capsulam aperuimus: tum etiam interius ligamenta lapide infernali stimulauius. Nullam vocem emisit, et in tranquillitate sua perstitit. Ast, quum cutem rescissam eodem lapide arroderemus, continuo iterum balauit.

## EXPERIMENTUM V.

§. LVI. Idem experimentum, quod in haedo lapide infernali feceramus, in catulo redintegrauimus. Qui nihilo magis percepit quam haedus, quum exterius pariter atque interius ligamenta corroderentur. Ast aequae acuto, quin ferine adhuc acutiore sensu quam haedus valebat, quum cutis incideretur, quo ad ligamenta pervenire possemus, et quum incisa cutis lapide infernali tangeretur.

## EXPERIMENTUM VI.

§. LVII. Canem ore constricto alligauimus, sicut haedum. Tum pariter ei iuxta genu, in cruris interno latere, dissecta cute, ligamentum capsulare reteximus. Quiritabat canis, et vehementer angebatur. Expectauimus, dum sedaretur tumultus, tunc capsulam perforauimus, extensorem tibiae rescisso, quo maior hiatus fieri posset: deinde acu longa farcinaria ligamenta compunximus. Nullus inde sensus ad eum per-



peruenit: seruauit enim quietem. Postea ligamentum laterale, externum aliquoties compunximus: adhuc tranquillitatem seruauit. Tandem per illud ligamentum acu traiecta, cutem pupugimus: continuo sensit, attraxit pedem, et irrequietus factus est.

### EXPERIMENTUM VII.

§. LVIII. In haedo similiter ut in cane, ligamenta acu longa sarcinaria compunximus: cuius pariter nihil sensit. Ut primum vero, traiecto ligamento, cutem tetigimus, continuo balauit, et dolorem suum testatus est.

### EXPERIMENTUM VIII.

§. LIX. Hoc experimentum cum longa acu denuo repetiuius in alio cane vetulo, nec non in alio haedo, iterumque in catulo: sed nihil unquam doloris cuncta haec animalia perceperunt, quando ligamenta acu stimulabamus. Simulac vero per traiectum ligamentum cutem feriremus, continuo solitis signis dolorem declararunt.

### CONSECTARIA.

#### §. LX.

Ex praemissis igitur experimentis et obseruationibus euidenter apparet, omnem sentiendi facultatem a ligamentis abesse. Neque tantum de ipsis ligamentis hoc indicium ferri debet, sed idem quoque valet de velamentis eadem ambientibus, seu de membrana ipsorum propria, quae peculiari nomine peridesmium<sup>1)</sup> appellatur. Hac enim in nostris experimentis certe inuestita fuere ligamenta, quum ita, ut in naturali statu sunt, conseruata fuerint, nec quicquam ab iis ablatum sit. Quum tamen haec nihilo magis sensum aliquem prodiderint, etsi peridesmium una laesum fuit; satis liquet, neque hoc sentiendi virtute praeditum esse. Id quod eo manifestius est, quo certius peridesmium prae ipsa ligamentorum substantia vellicatum fuisse oportet. Quum enim peridesmium exterius situm sit, totumque sub se ligamentum inuoluat; necessum est, ut hoc primum et potissimum tactum atque irritatum sit. Denique haec membrana, quum de celluloso genere sit, non magis quam reliquae telae cellulosae sentit.

#### §. LXI.

Ligamentis nullum inesse sensum, olim GALENUS pluribus locis tradidit<sup>2)</sup>, ab his imprimis ducens argumentum, quo tendines haud ita exquisite sentire ac nervos, adstrueret. Namque, ex eius sententia, quum tendines partim ex ligamentis partim ex nervis compositi sint, quatenus de nervosa natura participant, ad sentiendum nati sunt, quatenus autem ligamentorum indolem adsciuerunt, sensu vacui sunt, quandoquidem ipsa quoque ligamenta sensu careant. Quam argumentationem etsi nostri

V. 2

non

1) Vid. WINSLOWIUS in Exposition anatomique, Traité des os frais, §. 59.

2) Ut, de Motu musculor. Libr. I. c. 2. de Usu partium, Libr. I. cap. 17. de Me-

thodo medendi, Libr. VI. cap. 4. de Compos. medicam. secundum genera, Libr. III. cap. 2.

non facimus, et de tendinibus antea satis superque probauimus, eos omni sentiendi facultate cassos esse; hoc nihilo tamen minus inde colligitur, GALENUM a nostris partibus flare. Neque post eum memini quemquam anatomicorum, antiquiorum aut recentiorum, ligamentis per se sensum attribuisse.

## §. LXII.

Contra de superinducta iis membrana, seu peridesmio, communis esse videtur opinio, illam sensum habere. Quod primo propterea concedendum esse volunt, quia peridesmium ad membranas refertur et ex earum ordine est: membranas enim sentire credunt<sup>3)</sup>. Deinde propius adhuc argumentum inde ducitur, quoniam sub periostei classe comprehenditur quoque peridesmium: quum igitur periosteum ex hypothesi exquisitissimo sensu gaudeat, necessario sequi videtur, ut etiam peridesmio eadem adfit potestas<sup>4)</sup>. Verum enim vero, ut taceam, a periosteo aliusue membranis haud certo ad peridesmium concludi posse; quum statim post demonstraturi simus, periosteum aliasue similes membranas, ipsas pariter sensu destitutas esse, tota haec argumentatio per se corrui.

## §. LXIII.

Ceterum, sicut de tendinibus ostendi §. XXXVI, sensus dotem iis propterea minus conuenire, quia variis tractionibus, compressionibus, ictibus, frictionibus, similibusue molestiis perpetuo obnoxii sunt, qui, si sentiendi virtute instructi essent, perpetuos dolores crearent: ita de ligamentis adhuc magis affirmare licet, iis sentiendi facultatem maxime incommodam fore. Quum enim pleraque omnia sita sint in articulis, vel inter ossa, vel in musculorum tendinumue itineribus; his partibus commotis, ut perpetuo sit, non possent non ligamenta dolorem percipere, si sensu praedita essent. Quod ut caueret natura, sapienter illis hanc virtutem negauit.

## §. LXIV.

Nihilo tamen minus ex ea doctrina, qua peridesmium sentiendi facultatis particeps habitum fuit, nata videtur opinio, quae ad omnes fere praxeos medicinalis magistros peruasit, scilicet dolores arthriticos podagricosue sedem suam, praeter alias partes, etiam in ligamentis habere. Nolo longus esse in recensendis auctorum nominibus: unum instar omnium excitabo, Magnum BOERHAAVIUM, qui in aureis suis *Aphorismis de cognoscendis et curandis morbis*<sup>5)</sup>, huic quoque sententiae suffragatur. Nemo mihi vitio vertat, quod proueritam huius Summi Viri auctoritatem deferam, quasi laudibus eius aliquid detractum velim. BOERHAAVIUS satis apud omnes eruditos et bonos laudatus est, longeque magis veris superat meritis, quam ut levis error, a quo humana natura parum cauit, commissus, eius gloriae detrimentum aliquod afferre possit: ego vero propter eximiam Viri sapientiam, solidum ingenii iudiciiue robur, singularem in tradendis rebus medicis candorem, nobilem in omni vita magnitudinem

3) Vid. THOM. BARTHOLINI Anat. re-nouata, Libello IV. cap. 3. add. ib. L. I. c. 4. et L. III. c. 2.

4) Vid. WINSLOW. alleg. I. §. 59. 60.  
5) §. 1259.



tudinem animi, sinceram in Deum pietatem, ceterasque praeclarissimas virtutes, tantam eius concepi venerationem, ut ab eo vituperando quam alienissimus remotissimusque sim. Quod autem hunc potissimum auctorem nominavi, eo factum est, quod appareat, si tantus Vir illum errorem haud effugerit, multo magis de aliis idem suspicandum esse.

## §. LXV.

Potius in eo Virum perspicacissimum sequor, quod causam proximam articuli morbi scribit <sup>6)</sup> esse vitiatam indolem minimorum adeoque nervosorum vasculorum: quam sententiam eo, quo pollet, cultissimae eruditionis apparatu mirifice ornauit, et rationibus aliorumque suffragiis confirmavit Vir Magnificus et Illustris, GEORG. GOTTLÖB. RICHTERUS, Praeceptor meus summo honoris cultu prosequendus, in Prolusione de *Materia et Sede Podagrae* <sup>7)</sup>. Eo autem redit haec doctrina, veram in minimis nervosorum inuolucrorum vasculis inflammationem exsistere, quae totam diri morbi tragoediam ludat: id quod etiam primum symptoma, dolor, significare videtur, siquidem omnis talis sensus a nervis pendet, ut superius docui. Quodsi irritabilem nervosorum partium indolem ad inflammationis generationem declarandam applicemus, novam inde lucem accipit haec contemplatio, quemadmodum latius explicavit Illustris SEGNERUS <sup>8)</sup>, Praeceptor aequae meus maximopere colendus: itemque suavisissimus Commilito, Doctissimus D. REMUS <sup>9)</sup>, cuius memoria et ob mentis virtutisque praestantiam semper mihi erit iucundissima.

## §. LXVI.

Porro, quum ligamenta, propter defectum sensus, affectionem arthriticam concipere nequeant, et alibi sedes mali quaerenda sit: nullus occurrit locus, nisi cutis nervosus contextus. Namque proxime sub cute ligamenta cingunt articulos, aliusque penetrare prohibent morbum, quum ipsa sensu vacua sint. Ast cutem in hoc morborum genere inflammata et affectam esse, oculis manibusque patet, docent tumores, collecta in superficie materies calcarea, nodi, tophi, cet. Praeterea vidimus in omnibus experimentis cutem tenerrimo sensu donatam esse. Et docet anatomie, per eam innumerabiles nervorum propagines dispergi, suis extremis ibi desinere, et sic verum tactus organon efformare. Quamobrem cutis proprius locus est, in quo facitiam suam exercet arthritis: et articulares omnes morbi in cuticularium morborum numero habendi sunt.

## §. LXVII.

Ex iis, quae circa vulnera ligamentorum in experimento primo facta, contigisse observatum est §. L. LI., haud dubie licet colligere, eadem, quantum ad ipsa per se ligamenta pertinet, nulla symptomata post se trahere, quae alicuius sint momenti,

V 3

per-

6) Alleg. loc. §. 1262.

7) Qua ad Disp. inaugur. IOACH. FÜRSENII de Podagra retropulsa inuitavit d. 12. Sept. 1741.

8) In Diss. inaug. de Paraphrenitide, sub eius praesidio habita a JOSEPHO ANTONIO LINPRUNER, 1747. §. X. seqq.

9) In diss. inaug. supra laudata, p. 52-54.

perfacilisque esse sanationis, et hanc nequaquam eo perturbari vel impediri, quod humor articularis, seu synovia, effluit.

### §. LXVIII.

Quae quum ita sint, nullum metum incutere debent laesiones ligamentorum, nisi quatenus functionem articuli vel partium, quibus destinati sunt, suspendunt ac peruertunt: ut, si ligamenti capsularibus articularibusue discissis nexus firmitasque membrorum tollitur: si disruptis annularibus muscoli aut tendines ex situ suo excidunt, etc. Haec autem et similia quum ad proprium fibrarum in ligamenti contextum et ad usum, quem reliquis partibus praestant, pertineant; sequitur, ut eatenus tantum a ligamentorum laesionibus mala timenda sint, sicut in propositione (§. XLIX.) affirmavi.

## SECTIO III.

### DE PERICRANIO ET PERIOSTEO.

#### PROPOSITIO.

§. LXIX. Pericranium pariter ac periosteum omnis sentiendi facultatis expertia sunt.

#### SCHOLION I.

§. LXX. *Has duas membranas una opera tractare constitui, quoniam unius eiusdemque sunt indolis et usus, nec nisi loco differunt: nam pericranium idem est in ossibus capitis, quod periosteum est in reliquis.* Vid. WINSLOW. *Exposit. anatom. traité des os frais*, §. 361.

#### EXPERIMENTUM I.

§. LXXI. In haedo, qui in mensa apte collocatus erat, manibusque comprehensus tenebatur, bonam partem pericranii reteximus atque nudauimus. Crebro balavit, quam diu haec apparabantur: idemque fecit, quoties cruorem spongia detergebamus. Nudata omnino parte pericranii, hoc lacefliuimus scalpello, et decussatim per longitudinem et transuersè secuimus. Heic non mutiuit haedus, nec se commovit: sine dubio, quia nihil doluit. Inquinabat autem adhuc pericranium sanguis perpetuo promanans: qui dum abstergebatur spongia, continuo iterum balabat; neque enim hoc fieri poterat, quin cutis incisâ simul tangeretur. Non minus confestim indoluit animal, quamprimum hanc cutem arreptam vossella compressa paullulum modo vellicaremus.

#### EXPERIMENTUM II.

§. LXXII. Idem experimentum eodem modo in catulo renouauimus, qui plane similiter ac haedus se gessit.

EXPE-



### EXPERIMENTUM III.

§. LXXIII. Eandem rem in uno adhuc catulo binisque haedis denuo tentandi occasionem arripuimus, quum experimenta in pia matre caperemus. Semper idem consecutum est, et minime doluerunt animalia, siue pungeretur pericranium, siue secaretur, siue adeo de cranio abraderetur.

### EXPERIMENTUM IV.

§. LXXIV. In haedo, post denudatam integre partem pericranii, hoc butyro antimonii tetigimus. Haud sensit. At, dum praeparatio facta erat, balauerat: idemque continuo occoepit, quando cutis incisa butyro praedicto contingebatur, aut vossella vellicabatur.

### EXPERIMENTUM V.

§. LXXV. Fuit nuper miles, cui ab altero per imprudentiam quaedam minuta grana fusi plumbi (*Schrot*) in frontem, supra supercilia, ab interuallo paullo longiore, sclopeto incussa fuerant. In hoc, quum aliquot grana ex frontali musculo excidenda essent, ansam cepit Magnus noster Praeceptor, Perillustis *de HALLER*, specillo irritandi pericranium. Sed nullus inde sensus ad aegrum peruenit.

### EXPERIMENTUM VI.

§. LXXVI. In cane, ab interiore tibiae latere, bonam partem periostei nudaui-  
mus, tum illud scalpello compunximus cecidimusque secundum longitudinem et trans-  
uersim, ita ut ictus ad os usque pertingerent. In quo non mutiuit canis, neque pe-  
dem attraxit: quod tamen fecerat, unaque eiulauerat, quum cute dissecta periosteum  
nudaretur: idemque repetiit, quum postea cutis incisio longius produceretur.

### EXPERIMENTUM VII.

§. LXXVII. Iisdem tentaminibus quoque subieci alterum canem, duos catulos  
totidemque haedos: ab omnibus et singulis ne minimum quidem signum doloris aut  
sensus editum fuit, quum periosteum pungeretur vel caederetur. Sed si tantillum  
cutis incideretur, continuo haedi balauerunt, canes autem ulularunt.

### EXPERIMENTUM VIII.

§. LXXVIII. In cane et haedo periosteum tibiae stimulauius spiritu nitri fu-  
mante: nullus inde sensus in his animalibus excitatus est. Contra, spiritu ad internam su-  
perficiem separatae cutis admoto, statim dolorem inde natum solitis signis declararunt.

### EXPERIMENTUM IX.

§. LXXIX. Lapide etiam infernali periosteum arrosimus in catulo et haedo: ni-  
hil eius senserunt.

## SCHOLION II.

§. LXXX. Hoc loco praeterire nefas duco experimentum a Nobilissimo WALSTORFFIO, Amico meo in paucis charo, qui breui nobis perdoctam Dissertationem de experimentis quibusdam circa cerebrum, cerebellum et duram matrem institutis publice proponet, narratum. Nam etsi non a memet ipso captum sit, tamen dignissimum relatu est, quia partim in homine tentatum, partim quam diligentissime peractum est. Est autem sequens:

## EXPERIMENTUM X.

§. LXXXI. Erat mulier, cui pedem amputare oportebat, quia pes infimus inferiusque tibiae extremum carie peresa erant. Opus executus est vir artis suae peritissimus, SCHLÖTGIUS, pedestris legionis Blockianae chirurgus primarius, WALSTORFFII nostri Affinis. Notat Clarissimus WALSTORFFIUS animi fortitudinem mulieris, quae et ipsa ultro amputationem poposcerat: cupidus ergo in periosteo periclitandum reuera sensu careat, dixit mulieri, sese admoniturum esse ipsam, ubi in operatione ad os peruentum fuerit, ut tum attenderet, an dolorem sentiret necne. Respondit mulier: se probe scire, tum ingentem sibi dolorem futurum esse; nam, ut ab aliis acceperit, maximum in amputatione membri dolorem tum perferentem, quando tenuis quaedam membrana ab osse deraderetur. Quum ille contrarium ipsi persuadere contenderet, pollicita est, se fore attento ad eam rem animo. Igitur dum cutis cum subiecta carne reseicaretur sursumque retraheretur, oculis irretortis operationem adspexit, licet adstantes hoc ei dissuaderent: interim tamen prae dolore vehementer clamitavit. Ubi vero iam tempus instabat, quo periosteum abradendum erat; admonuit ipsam Cl. WALSTORFFIUS, nunc attenderet. Obsecuta est: at nequaquam clamavit. Interrogata ab illo, num dolorem sentisceret? negavit. Postquam curatio maximam partem absoluta erat, Amicus noster suauissimus iterum ei quod factum erat, in memoriam reuocavit, interrogauitque, an tum, quum ipsam admonuisset, et periosteum abrasum fuisset, nullum perceperit dolorem? Respondit, se ne minimum quidem doloris expertam fuisse.

## CONSECTARIA.

## §. LXXXII.

Ita contra nostram et omnium scriptorum expectationem hisce oculis vidimus, membranam ossa proxime inuestientem sensu minime donatam esse: neque hoc tantummodo in brutis animantibus cognitum fuit, sed in humanis corporibus pariter verum esse conslitit gemino experimento V. et X. Quid autem magis aduersatur receptae per uniuersum orbem medicum doctrinae, quam has membranas sentiendi facultate destitutas esse? Quis fuit medicorum, aut chirurgorum, aut anatomicorum ante nostra tempora, qui periosteo pericranioque praecipuum quendam in sentiendo dolendoque gradum non tribueret, et illi uni in plurimis profundiorum dolorum generibus causam, siue sedem, cruciatus adscriberet? Neque necessarium est, et nimis



nimis longum foret, testes producere, quum omnes sint: itaque triumviros tantummodo praestantiores auctores excitabo, FRID. HOFFMANNUM <sup>1)</sup>, IOH. ZACHARIAM PLATNERUM <sup>2)</sup>, IAC. BENIGNUM WINSLOWIUM <sup>3)</sup>.

§. LXXXIII.

Clariss. ZIMMERMANNUS <sup>4)</sup> dubitat quidem, utrum perioslea sensu praedita sint necne: pronior tamen ad negandum videtur. Sed de pericranio affert experimentum, ubi illud in cane oleo vitrioli tactum fuit, unde canis vehementissime clamavit. Addit, *pericranium nervis plenissimum esse, hinc non mirum, adeo acute sentire.* Verum enim vero, sicut a communi nostro Magno Praeceptore, Perill. DE HALLER, didici, nulli existunt in pericranio nervi, quemadmodum nec in reliquo periosleo: sed super utramque membranam, praesertim sub cute cranii, permulti decurrunt nervi ex cuticularium genere, aliis in locis plures, in aliis pauciores, qui si minus perfecte remouentur, facile membranae os obtegenti adscribi possunt, et sensus, aut dolor, a nervorum istorum tactu proveniens, tanquam ex subiecta membrana productus videri. Quamobrem suspicari liceat, ab his nervis haud satis separatis fuisse factum, ut pericranio culpa cutis tribueretur.

§. LXXXIV.

Quodsi in hoc negotio fallacia causae adhuc commissae est; unde tum dolorem illum dirum et velut osteocopum ducere convenit, quem persentiscit tibia, si ab anteriore parte, ubi parum tegumentorum os subiectum operit, contra duram rem offenderit? Respondit Grauissimus Perfectissimusque Anatomicus, Illustris DE HALLER, quum hanc ei quaestionem proponerem: cellulosa pariter ac cutem multis instructam esse nervis, a crurali anteriori propagatis, et a posteriori sede cruris ad anteriorem circa anteriorem acutumque marginem tibiae conflexis; quum igitur haec cutis et cellulosa asperum os arcte vestiat, in offensione duriori collisos contra ossa nervos dolorem sentire. Pari ratione ad alios similes casus respondendum erit.

§. LXXXV.

Erunt fortassis qui a dura matre argumentum repetant, quo probent periosleis sentiendi facultatem utique competere et tribui oportere. Dicent enim, duram meningem per se suaque natura sensus participem esse, quia membranarum nobilissima sit et cerebrum, sensuum officinam, includat atque contineat; tunc etiam pluribus nervis instrui, qui ipsi virtutem sentiendi largiantur. Iam vero satis constare, perioslea cuncta externa durae matris esse propagines <sup>5)</sup>: quare, quin simili quoque sentiendi

1) In Medicina systematica, Tom. III. Sect. I. cap. IV. §. 20. 21. et Tom. IV. Part. II. Sect. II. cap. I. VIII. IX. X. XI. passim.

2) In Instit. Chirurg. §. 1070. seqq. edit. germ. Conf. Illustr. HEISTER. in Chirurg. Cap. de Paronychia.

3) In Exposit. anatom. traité des os frais, §. 60.

4) In diss. saepius laudata, §. VIII. p. 9.

5) Vid. Perill. HALLERI Comment. in Praelection. Boerhaav. Vol. II. §. 304. et Vol. III. §. 306; itemque EIUSDEM Prim. lin. physiol. §. 341.

tiendi virtute imbuta sint, dubitandum non esse. Cui obiectioni ut occurram, primum animaduerto, ipsam duram meningem recentissimis experimentis et obseruationibus deprehensam fuisse sensus expertem, quemadmodum LAMOTTIUS<sup>6)</sup>, IOAN. GOTTFR. ZINNIUS<sup>7)</sup>, IO. GEORG. ZIMMERMANNUS<sup>8)</sup> ostenderunt: quam sententiam rationibus quoque validissimis iidem egregii viri confirmarunt, inprimisque Doctiss. ZINNIUS<sup>9)</sup>, et nunc percipimus experimentis Parisiis apud chirurgum suis factis confirmari. Idem etiam Cl. ZINNIUS demonstrat, quam parum praesidii pro durae matris sensu sit in ea opinione, quae membranas pro veris sentiendi instrumentis habet: pariterque in eo, quod cerebrum comprehendit haec meninx: nervos autem durae matri tributos ita incertos esse monet, ut nihil inde concludi possit. Deinde, si vel maxime nervi durae meningi intexti forent, tamen non sequitur, ut iidem ad periostea quoque pertingant: quum contrarium potius credibile sit. Dura meninx ergo sensui periosteorum patrocinari nequit, oculisque nostris, qui sensu vacua viderunt, potiori iure assentiendum erit.

#### SECTIO IV.

### DE P I A M A T R E.

#### PROPOSITIO.

§. LXXXVI. Pia mater nullo sensu gaudet, nec dolori concipiendo patet.

#### EXPERIMENTUM I.

§. LXXXVII. In haedo cranium perforavit Illustr. HALLERUS, et remota dura meninge, piaque resecta, hanc bacillo, qui butyro antimonii tinctus erat, tetigit. Is locus rugosus factus est, et album contraxit colorem: sed nullus inde doloris sensus ad animal penetrauit. Contra, quamprimum nares digitis compressis velliarentur ab adstantibus, e vestigio clamores susculit: idemque fecit, quum cutis capitis incisio paullo magis produceretur. Antea quoque balatus toties ediderat, quoties spongia tergebatur sanguis, qui in perforatione cranii promanauerat: nam cutis difflissa semper una tangebatur. Postremo alium paruum bacillum per cerebrum transadegimus versus oblongatam medullam: quo vehementissimas incidit in convulsiones.

#### EXPERIMENTUM II.

§. LXXXVIII. Idem periclitati sumus in alio haedo et in duobus catulis, semper experti piam matrem sensu destitutam esse: nam quum eam butyro antimonii corroderemus, nullam vocem ediderunt animalia. Ast ubi dissectam cutem butyro dicto

6) In *Traité complet de Chirurgie*, Tom. I. p. m. 48.

7) In *Diff. inaug.* quae sistit experimenta quaedam circa corpus callosum, cerebel-

lum, duram meningem, in vivis animalibus instituta. Gott. 749. p. 30. seq.

8) In cit. *Diff.* §. V.

9) Loc. cit. pag. 43. seqq.



dicto leuiter tantum attingebamus, aut vossella vellicabamus; continuo balauit haedus, vel eiulauerunt catuli.

## CONSECTARIA.

### §. LXXXIX.

Igitur iam certius nobis de sensus in pia meninge absentia constat experimentis, quae necdum a quodam instituta crediderim. Quamobrem in doloribus capitis et in irritationibus nervosi generis quibuscumque, siue per idiopathiam accidunt, siue per sympathiam, ut in phrenitide, paraphrenitide, deliriis febrium, hungarica febre, cet. perperam accusatur insons pia mater, quod aliquae vel adeo primariae eius in his partes sunt: quemadmodum faciunt FRANC. IOEL<sup>1)</sup>, LAURENTIUS BELLINUS<sup>2)</sup>, MICH. ETTMÜLLERUS<sup>3)</sup>, GEORG. ERNESTUS STAHLIUS<sup>4)</sup>, HERM. BOERHAAVIUS<sup>5)</sup>, quin tota practicum cohors, communem opinionem secuta. Plerumque vero utraque meninx simul accusari solet: sed quum nec duram matrem sensus aut doloris participem esse §. LXXXV. demonstratum sit, nec piam in proximis experimentis; in aliis nervosis partibus sedes istorum dolorum atque irritationum quaerenda erit: quas partes tamen hic exponere nihil attinet<sup>6)</sup>.

### §. XC.

Consentit vero nobiscum meritissimus de omni re medicinali Vir, FRIEDERICUS HOFFMANNUS<sup>7)</sup>, qui pariter *piam matrem, eiusque externam membranam arachnoideam, minime molestae sensationis sedem constituere iudicat, his usus argumentis, quod caveant fibris tensilibus nervosis elasticis, atque etiam veruulorum ramulis, ibi non conspiciendis. Quod etiam celeberrimorum Anatomicorum descriptionibus congruum est: nam et Illustr. HEISTERUS<sup>8)</sup> diserte negat, nervos, huius membranae substantiam intrantes, ullos observatos esse: nec WINSLOWIUS<sup>9)</sup> ullam eorum facit mentionem. Et quid hic nervis aut sensu opus est, quum ordinandis tantum vasis destinata sit pia mater<sup>10)</sup>? Itaque etiam a priori, ut dicitur, demonstratum est, ab hac membrana sensum irritationis et doloris abesse.*

## X 2

## SECTIO

1) In Practica, Libr. I. Sect. I. et II. Operum Tomo II.

2) De morbis capitis, titulo Phrenitis, praefertim pag. 489. edit. Lips. 1685. 4. cum libb. de Urinis et Pulsibus, etc.

3) In Prax. Libr. I. Sect. XVIII. Cap. I. Artic. XIV. et alibi.

4) In Praxi Stahlina a IOH. STORCHIO edita, Sect. IV. §. 20. p. m. 1411.

5) In Aphorism. de cognoscendis et cur. morbis, §. 776.

6) Videri autem potest Cel. ZINNIUS in saepius laudata dissertatione, pag. 50, ubi

demonstrat, symptomata phreniticorum non ab inflammatione durae matris provenire, sed potius ab inflammatione corticis, qui sensilissimae medullae cerebri continuus est.

7) In Medic. System. Tom. IV. Part. II. Sect. II. Cap. I. §. 4.

8) In Compend. anatom. de Pia Matre.

9) Exposit. anatom. tr. de la tête, §. 49. seqq.

10) Vid. Perillustr. HALLERUS ad Boerhaavii praelect. Vol. II. §. 236. pag. 371. not. b.

SECTIO V.  
D E P L E U R A.

PROPOSITIO.

§. XCI. Membrana pleurae sensu caret; vel, quo modestius loquar, non tanta sentiendi facultate pollet, ac pars musculosa et cutis exterior.

SCHOLION I.

§. XCII. *Thesin hanc propterea aliquanto remissius affirmavi, quia in reliquis, praeter haedos, animantibus experimenta, propter magnam denudandae pleurae difficultatem, haud satis perfecte successerunt, nec spem nostram impleverunt.*

EXPERIMENTUM I.

§. XCIII. In catulo, quem firmiter comprehensum teneri iussimus, detecto in dextra pectoris parte loco, qui quam minimum carnis palpandum dabat, cutem discidimus, et inter binas costas, quam cautissime fieri poterat, quod erat musculosi remouimus: quae dum fiebant, catulus vehementer ululauit, seque exsoluere connixus est. Minuta tandem pleurae particula ab omnibus carneis fibris repurgata atque resecta, id quod non nisi admodum operose fieri poterat, quia locus, ob respirationis motum, tunc multo, quam ubi animal quiete se gerit, intensiorem, perpetuo concutiebatur, illam bacillo, quem spiritu nitri fumante tinxeramus, tetigimus. Eo ipso, quo pleura adurebatur, momento tranquillum fuit animal: sed quia locus iusto angustior erat, et nos non satis caute agebamus, forte accidit, ut inter respirandum pars musculosa spiritu contingeretur; quo facto, confectum iterum vehementer vociferari coepit. Quum deinde contenderemus, amplius pleurae spatium nudare, factum est ob ingentem catuli inquietudinem, dum amicorum aliquis brutum paullo laxius cohibebat, ut nos scalpello pleuram perforaremus.

EXPERIMENTUM II.

§. XCIV. Canem, ore constricto, resupinatum, quatuor pedibus firmiter alligauit, et manu ventrem premens, operam dedi aliquo modo impedire, ne pectus ita valide reciprocante motu ageretur. Designato pariter in dextra parte pectoris loco, quo costae propius tangebantur, paruum pleurae spatium ab omnibus musculosis fibris, maxima cum cautione, ipse nudauit Perillustis Dn. DE HALLER. Interea canis vehementer quiritabat, et magnopere nitebatur, quo se solueret. Post moram interpositam, donec animal tranquillum factum esset, pleuram scalpello laceffiuit: quod dum fiebat, nullam vocem edidit canis, et tranquillior fuit quam antea. Erat autem hoc nudatum pleurae spatium nimis angustum, quam ut butyro antimonii posset aduri, siquidem in agitatione loci facilis fuisset butyri ad musculosas partes aberratio. Quamobrem pleuram amplius retegere coepit Summe Venerandus PRAECEPTOR: sed animal ingentem passum est inquietudinem, et effecit, ut apice scalpelli foramen in pleura intingeretur. Tum thoracem aperuimus, et butyro antimonii faciem inter-

nam



nam pleurae, nec non mediaſtinum ſtimulauiſmus: ſed non animaduertiſmus, canem eius rei aliquem ſenſum habuiſſe. Quamprimum vero neruum aliquem voſſella apprehendebamus, continuo ſe commouere coepit.

### EXPERIMENTUM III.

§. XCV. Idem in pleura tentare, denuo in alio cane inſtituiſmus: ſed quum pleuram nudare laboraremus, iamque paruum eius ſpatium ferme nudaſſemus, canis adeo ferociter ſe iactitauit, ut, quantumuis magna adhibita diligentia, cauere non poſſemus, quin apice ſcalpelli pleuram perforaremus. Statim aperuiſmus thoracem, et butyro antimonii pleuram ab interiore facie, itemque mediaſtinum laceſſiuiſmus: id canis non viſus eſt ſentire. Apprehendimus autem ſimiliter voſſella neruum quandam: tum vehementer exagitatus eſt.

### SCHOLION II.

§. XCVI. *Quoniam haedi pacatioris placidiorisue naturae ſunt quam canes, ſpem concepinus, eos his tentaminibus optiores fore. Quum igitur hos adhiberemus, feliciore euentu ſequentia cepimus experimenta.*

### EXPERIMENTUM IV.

§. XCVII. Haedo ſimiliter, ac in canibus obſeruatum erat, apte collocato, pedibusque eius quatuor eodem modo alligatis, manu in ventre poſita praepedientes, ne in ſpiritu ducendo thoracem nimis exagitaret, pariter in dextro latere pectoris, ubi minimum carnis reperiabatur, cutem incidimus, quidquid muſculoſi erat quam cau- tiſſime ſeparauimus, cruoremque ſpongia probe deterſimus. Quae dum fiebant, animal acriter balauit, non tamen adeo valide, ac canes, contendit ſeſe liberare: neque reſpiratione concitata tantum inſuperanti obiecit noſtro labori. Bona pleurae parte ab omnibus carnis fibris nudata, haedoque non amplius clamante, quod aeque nos nunc non ſecaremus; hanc partem pleurae, per quam pulmonum actio conſpici poterat, laceſſiuiſmus ſcalpello, lapide infernali, guttulaque butyri antimonii, ſemper locum mutando, ſiquidem ſpatium ſatis patebat. Dum haec fiebant, animal nihil omnino clamoris edidit. Tunc cutem parumper incidimus, tanquam ſpatium dilataturi: continuo iterum balauit. Ex quo vero non amplius ſcindebamus, denuo quietem egit. At quum aliquid muſculoſi butyro antimonii tangereſmus, clamorem iterum fuſtulit. Poſthaec de-induſtria ſatis amplo foramine pleuram pertudiſmus: quo facto, quia vociferari non poterat, tamen propter irrumpentem aërem angoreſque creantem, vehementeſe ſeſe iactitauit.

### EXPERIMENTUM V.

§. XCVIII. Eandem rem praeterea in duobus aliis haedis pari modo periclitati ſumus: per omnia vero ſimilem priori effectum res habuit.

## CONSECTARIA.

## §. XCIX.

Consentiunt ergo nostra experimenta, quae fere omnia Perillustis Moderator noster pro sua humanitate suauitateque, ob difficilem praeparationem et magnam, qua opus fuit, cautionem, ipse instituire non grauatus est, cum illo Cl. D. ZIMMERMANNI<sup>1)</sup>. Posset quidem opponi, quum dolor, quem animalia, dum ad retegendam pleuram excarnificantur, perferunt, maximus acutissimusque sit; fieri potuisse, ut propterea minorem dolorem, qui ab irritatione pleurae producebatur, non animaduuerint, neque aliquo signo prodiderint: siquidem alias quoque maior dolor minorem obscurare solet. Verum, quum in nonnullis istorum animalium, praesertim in haedis, sat manifeste cognitum fuerit, eos et dum tentaretur pleura, si quid musculosi tactum erat, statim iterum dolorem suum significasse, (Experim. I. II.) et postquam in pleurae irritatione praegressa nullam vocem emisissent animalia, nihilominus succedentem quantumvis leuem cutis incisionem, vel nervi compressionem, probe animaduertisse, (Exper. III. IV. V.) non est putandum, quamvis minorem dolorem obscuratum fuisse, sed nullum exstitisse apparet, qui nullo signo animaduversus fuerit.

## §. C.

Hoc etiam suffragatur nostrae doctrinae, quod officio aut scopo pleurae minus conueniens esse videtur, ut sentiendi vi polleat. Etenim ad hunc solum usum pleura constructa est, ut partes thorace contentas obtegat inuoluatque, tunicam iisdem extimam largiatur, easdem a mutuo conflictu prohibeat, et locis quasque suis adstringat, denique costis quasi periosteum internum praebeat. Quas ad res, tantum abest, ut sensu opus sit, ut is potius contrarius sit: longe aliter quam in aliis operimentis, exempli causa in membrana oris et alimentarii canalıs, similibusque.

## §. CI.

At contra hanc nostram sententiam vehementer pugnat, quod plurimos pleurae nervos intextos esse volunt: in quibus etiam numerandus Celeberrimus WINSLOWIUS<sup>2)</sup>. Verum enim vero, sicut iam de periosteo pericranioe §. LXXXIII. dictum est, existimare conuenit, non in ipsamet membranae pleurae substantia nervos intextos esse, sed eius superficiebus, tanquam firmae basi, solum instratos, ut super eam ad destinata loca decurrant: quo itinere facile speciem prae se ferre possunt, ac si membranam ipsam constituerent.

## §. CII.

Quum igitur pleurae membrana sentiendi facultate careat, illi dolores laterum punctorii, qui Graecorum nomine pleuritidis notissimi sunt, non possunt in illa thoracem interius succingente membrana sedem habere, ceu vulgo creditur, sed aliis locis

1) In diss. saepius alleg. §. IV. p. 4.

2) *Traité de la Poitrine*, §. 25. et 36.



locis nervosis ac musculosis assignari debent, quales in pectore eiusque ambitu plurimi sunt. Est enim hic morbus in sanguinis inflammatione positus, qui sanguis ibi locorum per plurima vasa copiose affluit, et, si per morbum subliterit accumulatus, producit, velut in aliis inflammationum generibus, cum reliquo symptomatum satel- litio etiam atroces istos dolores. Quam huius morbi ideam praecclare ex vasorum sanguiferorum, imprimis intercostalium venaque sine pari, decursu partiumque con- nexione explicavit Illustris BRENDelius <sup>3)</sup>, Praeceptor etiam meus ad cineres usque magnopere colendus. Et quod a sanguine congesto pendeat hic dolor, eo compro- batur, quia sanguinis missione quam optime soluitur; quemadmodum spuria pleuritis scarificatione ipsius affecti loci sanari potest.

## §. CIII.

Tandem ea, quae de pleura cognita sunt, etiam ad reliquas, quae ex pleura productae sunt, membranas transferre licebit, hoc est, existimare, ut mediastinum, exterior septi transversae membrana, tunicaeque pulmonum extimae, quatenus pleurae texturam atque indolem seruant, pariter sentiendi facultate destitutae sint. De me- diastino nobismet ipsis hoc tentando compertum est (§. XCIV. et XCV.); in pulmo- nibus autem periclitatus Cl. ZIMMERMANNUS <sup>4)</sup> idem animadvertit.

## SECTIO VI.

## DE PERITONAE O.

## PROPOSITIO.

§. CIV. Peritoneum sentiendi facultate caret: pariterque membranae, quae ex peritoneo productae sunt.

## EXPERIMENTUM I.

§. CV. In cane, quem similiter atque in experimento de pleura capto con- strinxeramus, cutem in alterutro abdominis latere per aliquod spatium discidimus, quod erat musculosi separauimus, bonamque peritonaei partem omnibus fibris carnis, ea qua decet cautione, nudauimus, simul cruorem, qui nobis erat impedimento, spon- gia deterimus. Interea dum haec parabantur, et dum sanguis abstergebatur, canis quiritatus, seque iactare connixus est. In uniuersum enim animalia ferre nequeunt; si spongia cruor detergatur, in quacunque parte hoc fiat: nimirum quia tali modo semper incisa cutis in facie interiore lanoso et aspero tactu spongiae perstringitur. Tranquillitati reddito cane, nudatum peritonaei locum scalpello lacessimus, deinde etiam butyro antimonii: restitit tranquillus, neque commotus est. At quum posthac dissectam cutem in facie interiore, tum quoque partem aliquam musculosam butyro- antimo-

3) In Dissertat. inaug. de Pleuritide vera et Pleuropneumonia, sub eius prae- sidio habita a IOANN. CHRISTOPH. LAMMERS, Gottingae 1744. §. XII. seqq.

4) In Disp. alleg. §. XVI. p. 17. seqq.

antimonii corroderemus; utroque casu coepit ululare seque iacitare. Abdomen quoadmodum aperuimus: iterum quiritabatur. Quum conquievisset, ab interiore facie peritoneum butyro antimonii stimulaui: nihil sensit. Verum volsella ea, quae dissecta erant, cutem scilicet et musculos, apprehendimus compressimusque: confestim inde dolorem percepit.

## EXPERIMENTUM II.

§. CVI. In haedo, quem, pariter ut in experimento pleurae, ligaueramus, quemadmodum in cane bonam partem peritonei, multos inter balatus, denudauimus. Quo facto, eam membranam lapide infernali tetigimus, alioque loco spiritu nitri fumante. Sed nihil sensit, nam neque balauit: quod pariter omisit, quum postea peritoneum in facie interiore stimulaui. Contra satis sensit, quum musculosam partem eodem spiritu adureremus.

## EXPERIMENTUM III.

§. CVII. In alio haedo peritoneum resectum butyro antimonii lacessiuius: quod tamen nec ab exteriori facie nec ab interiore sensit. Compressit vero amicorum aliquis paullo fortius eius nares digitis: quod statim sensit.

## EXPERIMENTUM IV.

§. CVIII. Praeterea adhuc in alio cane peritoneum butyro antimonii corrosimus: sed aequae nihil eius sensit.

## CONSECTARIA.

### §. CIX.

Haud quidem meminimus, qui peritoneum sentiendi facultate gaudere dixerit, aut propugnauerit. Nihilo tamen minus, quum facile alicui subnasci possit dubitatio, utrum ad illas corporis partes, siue membranas, quibus sensus inest, referendum sit peritoneum, necne, experimentis in eam rem inquirere dignum videbatur Perillustri PRAECEPTORI, quo sic certum statueretur iudicii ferendi fundamentum. Eo certius autem iam constat, peritoneum non sentire, quo magis idem a nobis nouo studio repertum est, quod Cl. D. ZIMMERMANNUS antea deprehendit: hic enim pariter in peritoneo pericula fecit, illudque sensus particeps haud esse perspexit <sup>1)</sup>.

### §. CX.

Neque videtur, sentiendi virtutem ad illum, quem peritoneum praestare debet, usum vel officium requiri, adeoque huic potius fore contrariam. Scopus enim, quem in peritoneo procreando praefixum habuit natura, sine dubio is est, ut illud viscera aliasque nonnullas partes ventris inuoluendo, a mutuis vexationibus et confusione tuta praestet: quamobrem et productiones undique emittit pro tunicis partium extimis

con-

1) Vid. eius saepius alleg. differt. §. IV. Experim. III. pag. 4.



constituendis, et extensionis capax est, si maiorem molem acquirant partes, quas continet, ita tamen ut partibus iterum diminutis, illud pariter ad pristinum arctiorem modum redeat. Quodsi sentientis esset naturae, non posset non fieri, quin istis in mutationibus variisque partium motibus functionibusque saepe doloribus obnoxium foret. Hoc igitur ut caueretur, sensus expers factum est.

## §. CXI.

Neque arbor, in ipsa peritonaei substantia intextos reperiri nervos: sed, qui a nonnullis auctoribus ei tribuuntur, tantummodo per eius superficiem transire. Et his quidem, ubicunque existant, utique sensus inest, et eundem exerunt, si feriantur: quod tamen laud decet ad peritoneum referri.


## §. CXII.

Quaecunque vero de peritoneo ipso dicta sunt, etiam de eiusdem productionibus, seu processibus, et tunicis partium imi ventris extimis intelligere par est, quatenus eandem cum ipso peritoneo naturam retinent. Quod pariter experientiae consentaneum est: nam Cl. D. ZIMMERMANNUS <sup>2)</sup> factis experimentis inuenit, hepar et lienein haud percipere irritationem; quod procul dubio quoque de exteriori eorundem membrana valebit \*).

## EPILOGUS.

Pedem hic figo. Fateor quidem, multa adhuc singulis capitibus addi potuisse: quod autem nec per temporis nec instituti rationem licitum fuit; in maiorem enim molem iam excreuit hoc specimen, quam initio putaueram. Quoad maximam partem tamen generaliora indicaui, quibus facile ad obiectiones a specialioribus petitis responderi potest. Quod vero tot experimenta eaque tam prolixè enarrauerim, factum est, ut unusquisque videat, an in factis ipsis experimentis, an ex iis deductis conclusionibus fallacia quaedam a nobis sit commissa.

- 2) Loc. cit. §. XVI. Experim. II. pag. 17.  
 \*) Quae his CASTELLI experimentis opposita sunt, leguntur apud IGNATIUM RADNICKY in diss. sistente experimenta quaedam, quibus constitit eas partes esse sensu praeditas, quibus HALLERUS cum aliis quibusdam omnem sentiendi facultatem cum irritabilitate denegat. Pragae 1756. quae reperitur in KLINKOSCHII dissertatt. medicis selectioribus. Vol. I. Pragae et Dresdae 1795. 4. p. 117. L.



## XI.

GEORGII HENRICI MUELLER  
 SERIES EXPERIMENTORUM  
 IN MUSCULIS ET NERVIS ANIMALIUM QUORUNDAM  
 INSTITUTORUM HORUMQUE ORGANORUM FUN-  
 CTIONEM S. EFFECTUS NATURALES  
 ILLUSTRANTIUM.

STUTTGARDIAE 1793.

## §. I.

**P**haenomena in musculis et nervis animalium sub italo coelo a Domino GALVANI primum, si non visa, tamen animadversa, physicorum aequae ac medicorum attentionem praecipuam sibi vindicant: horum, quorum quippe interest obscuriores naturae animalis regiones luce nova irradiatas videre, nexumque penitus noscere qui vulgo notas inter atque incognitas istas terras obtinet; Illorum, quorum e re est novum acquirendi indagationis instrumentum; novamque comparationis materiem, quae iam notis admixta ipsas foecundet, ambitumque naturae si non distendat, saltem in angustius volumen redigendo massam quodammodo adaugeat.

Quae quum ita sint non potuit non fieri quin prima horum phaenomenorum notitia, quam, quantum equidem scio, in Germania primus dedit D. J. F. ACKERMANN (Medicinisch-Chirurgische Zeitung, herausgegeben von D. I. I. HARTENKEIL und D. F. N. MEZLER Salzburg 1792. 3. Bd. p. 289-297. Nr. 68.) et meam curiositatem excitaret, iterandaque ad experimenta, quae phaenomena ista exhiberent, invitaret. Sub finem igitur aestatis anni elapsi manum operi admovi, vidi ab aliis visa, sed et alia quaedam observavi, quae si non nova, generaliori tamen sub intuitu iam visa sissebant, curatiusque iam nota determinabant. Galvaniani interim libelli, unde uberiores horum phaenomenorum notitiam haurirem, ex Italia in nostris regionibus aduentum frustra expectans ex litteris ab amico mihi communicatis comperi, novam quandam in lingua humana factam esse observationem, simili in illa adhibito apparatu, quo phaenomena in musculis observata producantur. Phaenomena haec, brevissimis tantum verbis et indeterminatis in litteris nuntiata, curatori examini subieci, nova quaedam observavi, legemque phaenomenorum generaliore addidi.

Dissertationis itaque inauguralis argumentum nuper eligenti nil aptius mihi videbatur tentaminibus memoratis, quippe quae rei tum novitate tum eiusdem dignitate commendata, et si forte nonnunquam titubaverim, excusata satis fore credebam.

Inte-



Interim Galuaniani libelli iamdudum expectati in Germania prodiit translatio ex qua ex insperato percepi, plurima eorum, quae in meis tentaminibus noua inuenisse credebam, iam a D. Galvani et de Volta fuisse animaduersa, meosque inde labores commendatione, quam ipsis inesse antea autumaueram, priuos nunc reddi. Sed pressus temporis, quibus ad exarandam dissertationem circumscriptus fui angustiis nimis, alius pertractandae materiae electionem non admittentibus, ab inceptis eo minus destiti quo certius constat inuentorum, alienis licet iisdem inuentis, neque valorem minui, neque ius possessionis ipsis inhaerens infringi posse, et quo magis euictum est inuenta, quae minus ingenii acumini, quam casui debentur, pluralitate observationum certiora reddi, eorumque noua descriptione latius circumferri.

## §. 2.

Ordo quem in proponendis tentaminibus iam memoratis seruabo, argumenti titulo dissertationis inscripti natura eo determinatur, ut primo experimenta instituta recenseam, indeque dein conclusiones quasdam, functionem musculorum nervorumque spectantes deducam, quas minori ex parte fragmentarias hic sisto, fusius vero et accuratius alio, si fuerit occasio, tempore enucleandas mihi sumo, exspectans interea donec contigerit nouis quae mecum constitui experimentis ideas hactenus mihi subortas tum ulterius excolere, tum accuratius determinare.

Experimentorum, respectu illustrationis, quam diuersis organorum functionibus promittunt, diuersitas, descriptionem in duas seiungit partes, quarum prior experimenta motum muscularem illustrantia, altera experimenta sensationum excitationem dilucidantia comprehendit.

## I. EXPERIMENTA.

*A. Motum muscularem spectantia.*

## §. 3.

Animalia experimentis hisce instituendis inferuentia ex amphibiorum et insectorum classibus elegi, quippe quae durationem et persistentiam effectuum irritabilitatis ceu characterem generalem animantium calidi sanguinis coetibus eo gradu denegatum, seruant. Ex amphibiorum classe genus ranae, prae aliis aptum, adhibui. Quae in huius generis specie, a Linnaeo esculentae nomine insignitae, in aquis stagnantibus ubique nostrarum regionum frequenti, expertus sum, sequentia sunt.

## I.

Occiso animale, erutis e corpore visceribus, denudatis nervis ex medulla spinali prodeuntibus atque musculis quos adeunt, discissa ipsa spinali medulla, irritato nervo vel musculo, vel utroque instrumenti pungentis vel scindentis ope, caro per aliquod adhuc temporis spatium conuellitur. Haec contractio, post mortem artificiali stimulo excitanda, omnibus iam dudum nota est.

## Y 2

## II. Mus-

## II.

Musculo iisdem stimulis non amplius respondente, hic motus denuo excitatur et vehementior quidem quam antea, nervo vel tenui stanni aliusve metalli lamella involuto, vel nummis aureis, (modo non tantis ut tensionem efficiant) cultri laminæ, aliaque metallica substantia imposito, hisque praemissis ope corporis cuiuscunque anelectrici contacto, vel solo vel una cum musculo.

## III.

Variat contractio vehementia, duratione et reproducibilitate maiori minoriue pro materiei nervo subiectae, substantiaeque contactui nervorum inservientis diversae speciei, diversaeque eiusdem facultate fluidum electricum conducendi. Maximam vim exercere videntur aurum atque argentum. Musculi metallis hisce affecti non modo vehementius convelluntur, quam aliorum metallorum contacto sed et repetitis iam experimentis exhausti aliisque stimulis non amplius, respondentes, denuo contrahuntur dictorum metallorum applicatione. Minori vi pollet ferrum et chalybs, minorique manus humana.

## IV.

Nulla oritur contractio si nervus armatus musculusque attingitur substantia idio-electrica e. g. vitro, cera sigillatoria etc. vel saltem corpore quocunque alio aegre tantum fluidum electricum transmittente, qualia sunt ligna ossaque bene siccata etc. Idem quoque obtinetur effectus siue instrumentis contactui destinatis antea communicata fuerit electricum fluidum, idque vel vitreum sic dictum vel resinofum, siue omni electricitate fuerint prius.

## V.

In experimentis hactenus memoratis cadauer raninum incubuit vel lignis faxisque (atque quidem tenipestate magna aeris siccitate insigni) vel et manui meae.

Iam vero cadauer imponitur substantiae cuidam metallica, e. g. stanno plumboe lamellato, monetis cupreis, argenteis, aureis etc. nervoque denudato, partibus vicinis soluto, paruum stannioli segmentum subiicitur. Hisce peractis lamella nervo supposita admoveatur metallo, cui truncus artusque incumbunt, atque ita quidem, ut sese mutuo contingant, vel et alia qualiscunque substantia symperielectrica, ex metallorum praecipue tribu, dictis armaturis ita interponatur, ut ambabus sit contigua; eumprimum id fuerit factum subito oborientur vehementes artuum convulsiones.

## VI.

Quae etiam evidentes adhuc validaeque apparent, si productis ex utriusque armaturae parte in trium, quatuor, pluriumve pollicum distantiam metallicis armaturis ope nummorum plurium sibi invicem armaturisque suis ita appositorum, ut ubique continuus inter singulos nummos, eamque ad quam pertinent armaturam, obtineat contactus, tandem extrema utriusque seriei f. catenae metallica nummo aureo, argenteo, virgula ferrea, cuprea aliaque metallica connectantur.

## VII. Nul-



VII.

Nulli vero prorsus artuum motus insequuntur, cum caeteris omnibus paribus (Exp. VII.) connexio extremorum serierum memoratarum instituitur vitris siccis mundatisque, cera sigillatoria, bacillis sulphureis aliisque substantiis idioelectricis.

Huc et id referendum, quod similem in modum artus nullum commotionis vestigium exhibuerint si vel minima distantia, oculis vix percipienda, obtinuerit siue nummos inter seriem Exp. VI. VII. constituentes, siue nummum seriei ultimum inter virgulamque metallicam utrique seriei connectendae inseruentem.

Atque hoc eo magis memorandum esse censeo, cum equidem mihi persuadere vix possim, exiguum adeo quod in istis experimentis seiunctis metallis intercessit aëris interstitium, satisque praeterea humidi, fluido electrico imperuium fuisse.

Conuenit Phaenomenon hoc cum illo quod obseruauit probeque annotauit SPALANZANI in Raia Torpedine. Et ibi non nisi immediatus contactus concussionem proicit, quam sola appropinquatio recusat.

VIII.

Musculi non mouentur si lamellae stannae neruo subiectae substituitur tabula vitrea parua, eaque consueta methodo metallo, cui artus incumbunt, connectitur.

Item nulli obseruantur tremores, si, manente stannae nerui armatura, artus tabulae vitreae imponuntur metallicisque conductoribus simili modo ac in praeced. exper. attinguntur et armatura nerui et vitrea tabula.

Referenda sunt haec experimenta ad classem illorum, quorum sub Nro VII. mentionem feci.

IX.

Veementius agitabantur musculi cum metallum ipsis substratum tabulae vitreae imponeretur, atque dein consueta encheiresi cum armatura nerui combinaretur.

X.

a) Paraui tabellam vitream 1. pollic. latam,  $3\frac{1}{2}$  longam, ex utraque superficie stanniolo eo modo obductam quo obduci solent tabulae armatae sic dictae Francklinianae. Sublata stannae nerui armatura in plerisque hactenus experimentis usitata neruum imposui superiori tabellae armatae faciei: trunci residuae parti extremitatibusque inferioribus succubuit lamina metallica tabulae vitreae imposita. Instituta iam ope conductoris cupreij, cruribus duobus versatilibus, manubrioque vitreo instructi, inter faciem tabellae superiorem, laminamque metallicam communicatione, femora conuellerantur, atque veementius quidem quam in experimentis I — VIII.

b) Idem euenit si consueta nerui armatura tabellae vitreae non armatae incubuit, ceterisque omnibus uti in Nr. a. comparatis, conductor simili modo applicaretur.

c) Idemque, si truncum femoraque tabula Franckliniana armata sustinuit, alterumque conductoris erus superiori tabellae neruo subiectae (a) superfaciei, alterum vero superiori itidem tabulae Francklinianae faciei appriimeretur.

d) Num femora conuellantur si conductoris ope communicatio fiat inter armaturam tabellae neruo dicatae superiorem, inferioremque tabulae Francklinianae trunco

femoribusque substratae, de eo nihil ex distincto experimento pronunciare possum, cum eiusdem institutio casu fuerit omissa. Illam vero non consecuturam cum fiducia atque certitudine aliqua concludas vel ex comparatione tum experimentorum VI et VII, tum ex statim adducendis e. f.

e) Tabellis duabus armatis (a) sibi superimpositis imponitur nervus cruralis: femora sustentantur tabula Franckliniana: conductoris alterum crus tangit superiorem huius armaturam, alterum vero armaturam superiorem tabellae infimae nervi, vel, contiguam huic, armaturam tabellae supremae inferiorem. Femora hoc in experimento plane non moventur.

f) Neque moventur si in exper. c. conductor ad armaturam inferiorem tabellae nervae adigitur.

g) Itidem non moventur si singulis ita instructis uti in exper. c. nervo alia adhuc tabella imponitur armata, aequalis eidem, cui ipse incumbit, tandemque superior tabellae incumbentis armatura conductore tentatur. Coincidit hoc experimentum cum exper. e.

## XI.

Ranae viventis, illaefae dorsum, atque abdominis superficies obducebantur auro foliato, eo modo ut utraque facies inaurata, dorsalis scilicet atque abdominalis, ubique rite fuerit ab invicem discreta. Instituta conductoris ope inter utramque faciem communicatione plane nil insoliti observatum fuit, strepitus nullus auditus, nullumque prorsus eiusmodi phaenomenon animadversum, qualia in Raia torpedine apparere solent. Neque electroscoopii Bennetiani ope ullum attractionis nervorum vi productae, repulsionisue signum animadvertere contigit: itidemque et lucis nullum phaenomenon vidi, licet fatendum sit distinctiora, ut de hoc decerni possit, certioraque adhuc desiderari experimenta.

### §. 4.

Praeter experimenta in ranis capta, hactenus tradita, quaedam adhuc institui memoratis similia in insectorum coleopterorum specie, in Linneano systemate sub carabi coriacei nomine recensita, specie itaque, in qua corporis non nimia exilitas effectuum observationem haud impedire videbatur, et quae generi appertinet alacritate motuum pleraque reliqua coleopterorum genera superanti. Quae vidi ad iam relata reducuntur, monendum tamen obscuros tantum hosce effectus me observasse, citiusque pereuntes. Adnotandum vero est individuum observationibus destinatum fractura elytrorum laborasse, vigoreque quem alias exserere solent haecce animalia, iam ante destitutum fuisse. Sed forsan et ipsa motuum in statu naturali alacritas impedimentum potius quam adnuncium praebet exserendis talibus effectibus quales hisce experimentis cidentur, et animalia tardiori motu instructa producendis ipsis aptiora sunt.

Plura hic adduci possent phaenomena sententiae huic fauentia, si a proposito longius aberrare animus foret.



## B. EXPERIMENTA

### *Sensationes per nervos excitatas spectantia.*

#### §. 5.

Quae huc referuntur experimenta in gustus praecipuo organo, lingua humana sunt instituta, pluries a memet ipso et quoad partem ab amicis repetita. Occasionem illis instituendis praebuere, ut iam supra §. 1. memoratum fuit, litterae, quibus sequentia huc pertinentia nuntiabantur: „*Man hat vor kurzem die merkwürdige Erfahrung gemacht, dass, wenn man die untere Fläche der Zunge mit einem Blättchen Bley, wie es sich bey den Tabakbüchsen zu finden pflegt, oder Stanniol belegt, auf die obere Fläche einen silbernen Löffel bringt, diesen gegen das Bleyblättchen umbiegt, so entsteht eine eigene Empfindung von einem Salzgeschmack mit Brennen. Silber bringt diese Wirkung allein hervor, andere Metalle nicht.*“ Ex Galvaniani quae nuper Pragae prodit libelli translatione, praesertim ex additamentis in praefatione expositis, nunc comperi primum qui relata expertus sit, fuisse Du. de Volta qui caetera sua de rebus physicis merita et nouo hocce adauxit.

Quae inscius adhuc quid Dn. de Volta praestiterit, iisque tantum, quae ex literis modo allegatis cognoueram, munitus, ipsemet obseruauit, sola tantum hic memoranda, ad sequentia redeunt.

#### I.

Si inferiori linguae faciei subiicitur flanni bractea, superiori vero imponitur nummus aureus vel alia quaeuis lamina aurea, atque dein vel inflectendo flanniolum, vel nummum eidem admouendo utraque haec armatura in apice margineue linguae fiat contigua, tum in ipso contactus momento peculiaris oboritur sensatio antea non percipienda, cum illa, quam post linguae leuem adustionem patimur, quodammodo congruens, atque subinde admixta adhuc euidente salsedinis perceptione insignita.

#### II.

Eadem insequitur sensatio commutatis armaturis modo dictis, auro scilicet linguae supposito, stanno vero eidem imposito.

#### III.

a) Obscurius vero, quin plerisque in casibus plane non obseruatur, si superiori linguae faciei armandae inferuit argentum, quantum quidem in monetis nostris utensilibusque habemus purum, inferiori vero faciei stannum applicatur lamellatum:

b) Itidem, si manente inferiori stannea armatura dorso linguae auri loco imponuntur cuprum, aurichalcum aliaque quaedam metalla:

c) Neque sensatio supra descripta prodit si aurea atque stannea armatura (§. 5. N. I.) non immediate sese contingunt, sed aëreo interuallo, vitro alioque corpore idioelectrico ab inuicem fuerint disiunctae:

d) Neque exoritur nisi armaturarum connexio eo modo instituatur, ut et linguae sinul vel apex vel margo immediate contingatur:

e) Tan-

e) Tandemque sensatio defuit quando superior inferiorque armatura non diversi, sed eiusdem generis metallis fuit, instituta, licet adhibitis ceteris omnibus uti in §. 5. N. I. et III.

## IV.

Cum alterutra linguae facies armaretur ferro laevi, altera vero argento, unitis dein armaturis, eodem non modo, quam in N. I. §. 5. prodit sensatio, sed et, cum diutius in mutuo contactu manerent, armaturae, eum in modum vehemens, ut ingrata deinceps fieret atque molesta. Idem obtinuit cum aurea armatura, argenteae loco, cum ferrea coniungeretur, quin et, ut mihi visum est, cum alia quoque, praeter aurum argentumque, metalla, e. gr. cuprum, mercurius viuus, plumbum, in ferri consortio adhiberentur. Defuit vero memoratus effectus stanno una cum ferro adhibito.

Attamen sensatio haec non perpetuo sese manifestat, effectusque diuersitas, i. e. maior minorue sensationis vehementia subinde determinari videtur, dum diuersitate methodi qua metalla sibi inuicem admoventur, tum ipsius linguae aliis mutationibus. Sic e. g. euidentiores semper effectus obseruantur experientis post ciborum comesturam institutis quam iisdem ante eam susceptis.

## §. 6.

Effectus experimentorum §. praecedente memoratorum si comparantur cum effectibus quos nuntiatos ibidem attuli, quasdam discrepantias offerri patet. Sic e. g. assertio, quod argentum et stannum insigniori, immo summo gradu phaenomena ista prodant, meis obseruationibus non confirmatur: porro ibidem memoratur quod metalla in mutuum contactum posita post aliquod demum temporis spatium sensationem illam excitent, quod ego nunquam obseruasse puto; et quae sunt aliae discrepantiae sensationis descriptionem spectantes. Sed omnis in comparatis effectibus hic oblata diuersitas ex materiarum experiundo adhibitarum diuersitate, aliisque hic loci facile praetereundis absque difficultate concipitur et exaequatur. Sin vero et concedamus discrepantiarum vestigia quaedam et adhibitis istis exaequationibus adhucdum remanere, tamen nil impedit quin utriusque relationis asserta in eo saltem conueniant: peculiarem, si argentum atque stannum lamellatum linguae modo supra descripto applicata in mutuum contactum cieantur, subnasci sensationem, nusquam singulo metallo seorsim adhibito productam. Generalem hanc phaenomeni determinationem suadet experimentorum propriorum cum nuntiatis comparatio. Sin vero iam et propria experimenta curatius conferantur, generaliorem inde phaenomeni expressionem eruere, imo legem quam sequitur praesentia et absentia horum phaenomenorum si non eruere absolutam, saltem augurari exinde, sicque scopo omnis investigationis philosophicae verae propius accedere licet. Videntur nempe statuendis sequentibus fauere: sensationem supra descriptam tum potissimum subnasci, si ambabus linguae faciebus applicentur metalla ea ratione, ne in utraque superficie sint eiusdem generis, sed valde a se inuicem diuersa pondere specifico, ad calcinationem nisu et aptitudine, forsitan et facultate fluidum electricum conducendi: nulla vero, aut parca



parca tantum sensationis illius vestigia apparere absentibus istis conditionibus vel minori tantum gradu praesentibus.

Forſan et lex, quam ſequitur ſenſationum productio, generalius adhuc atque ſimplicius exprimi poteſt. Conceſſa nempe poſitione: eſſe fluidum x, cuius efficacia in hiſce phaenomenis manifeſtatur, ſequens legis expreſſio et pronuntiatio haud videtur inepta: Quo magis metalla experiundo adhibita ab invicem differunt facultate fluidum illud conducendi, eo facilius et diſtinctius iſta ſenſatio producitur. Iam vero ſi quaeratur, quanam ſit lex, ex qua diuerſa procedat metallorum, fluidum x transmittendi, facultas, reſponderi poſſet, hanc legem diuerſitatibus ſupra allatis quoad pondus ſpecificum, ad calcinationem, aptitudinem etc. ſe offerentibus, ſi non exhauriri ſaltem con- determinari.

§. 7.

Experimenta ſenſationis excitationem ſpectantia, qualia in guſtus organo inſtituta memoravi, in aliis quoque partibus ſenſilitate nervorumque nuditate ſe commendantibus ſimili modo tentavi; ſed nimis parca animadverſionum materies, quam experimenta exhibuere haecenus capta, ſilentio haec nunc plane praeterire, ipſaque ditiora alii quondam occaſioni reſervare ſuadet.

## II. CONCLUSIONES QUAEDAM.

### *A. Cauſam ſpectantes.*

§. 8.

Recenſitis iam experimentis, phaenomenisque ad generales, quantum licuit, expreſſiones reductis, conclusiones quasdam, ex ipſis invicem comparatis eliciendas, exponam.

Si quaestio movetur: quanam ſit cauſa illorum phaenomenorum, et quamnam determinationem accuratiorem illi adſignare liceat; ſequentia ex praecedentibus concludi et ad memoratam quaestionem reſponderi poſſe videntur. Poſitis, (quae phaenomenorum conceptum mirum in modum adiuvant, quorumque poſitioni quae alias cognita habemus, et quae mox dicentur, adeo non repugnant ut potius, qua facillime ipſi concilianda, illam ſuadeant,) eſſe nempe materiem in nervis et muſculis agentem, quae ceu cauſa organorum horum effectibus in genere praefideat: hancque materiem ad fluidorum tribus pertinere; fluida haec materies, generalem phaenomenorum horum cauſam conſtituens, propius dein ſequentibus determinari poteſt. Phaenomena in animalibus experta, ſi comparamus cum phaenomenis quae fluidum exhibet electricum ad alia corpora relatum, perque iſta motum et diſtributum, analogiam haud exiguam in utraque phaenomenorum tribu aſſe deprehendimus. Quae nempe phaenomena variam corporum fluidum electricum transmittendi denotant facultatem, iis ſimilia et in noſtris experimentis quoad materiem et in muſculis agentem ubique occurrunt, ſimilemque corporum, materiem hancce transmittendi, indicant facultatem: Eae corporum claſſes, quae fluido electrico conducendo prae ceteris

aptiores sunt, etiam fluidi neruei (si materiam istam ita nominare placuerit) transmissioni aptiores se exhibent: motus per corpora ista transmissioni fauentia, celeritatem, quam in fluido nerueo iisdem fere phaenomenis persuasi, iudicamus. Quae itaque ex varia corporum fluidum electricum conducendi facultate, et ex motuum celeritate adfui possunt conclusiones, indolem fluidi electrici generatim determinantes, expansibilitatem nempe ipsi competere eiusque characterem generalem constituere, diuersamque ipsi ad diuersa corpora inesse affinitatem, eae et ob praemissorum congruentiam de fluido nerueo praedicari, et ad determinationem attributorum illius applicari possunt. Generatim igitur ex allatis ea inferitur assertio: causam phaenomenorum motum muscularem constituentium quaerendam videri in materia expansibili, electricae analogae, modoque analogo sese mouente et per corpora distribuyente, analogosque effectus producente.

Varia quidem sunt, quae conclusiones hasce nimis adhuc praecipitanter factas arguere possent. Concessis nempe similitudinibus antea indicatis inter fluidum electricum et nerueum sese offerentibus, discrepantias quoque haud leues menti ibidem obtrudi asserere posses. Fluidum electricum insigni pollet facultate per atmosphaeras s. ut ita dicam, in distans agendi, in experimentis vero fluidum nerueum spectantibus nullum talium effectuum comparuit vestigium. Sed re curatius pensitata discrepantia haec euanescit: nam et fluidum electricum, si eiusdem vis fuerit debilior, vel, si mauis, si minori quantitate fuerit accumulatum, praesertim in corporibus idioelectricis, vestigia actionis huius sensibus nostris celat: praeterea in Raia torpedine, cuius vim electricitati deberi satis euictum esse videtur, idem defectus actionis atmosphaericae animaduertitur, uti id innuunt obseruationes a Dn. Spallanzani curatissime in hoc animali institutae. Alias quoque, quae hic electricum inter nerueumque fluidum intercedere videntur differentias, simili modo qua tales refelli posse facile patet: Sic lucis phaenomena, electricos effectus comitantia, in nostris experimentis hactenus nondum visa, nec electricitatis comites constantes et essentiales esse neminem doctrinae huius gnarum fugit: Item alia phaenomena quibus electrica vis prodi plerumque solet, v. c. attractio corpusculorum leuium, in fluido electrico, si parca tantum eiusdem adfuerit quantitas parumque condensata, aequae desiderantur ac in phaenomenis in experimentorum serie indicatis: in cuius et praecedentium assertorum conuictionem plenariam phaenomena modo condensatoris sic dicti electrici memoriae lectoris commendare sufficit.

Difficilius remouenda videri posset alia hic obueniens discrepantia: fluidum nempe electricum in corpore animali, qua conductore illius praecipuo, accumulari nequit, nisi sit insulatum: phaenomena vero supra exposita conclusiones inde deducendae hanc potius thesin inducere videntur, corpus animale accumulationi fluidi neruei fauere. Huius vero argumenti, quod discrepantiam haud leuem inferret, sequentium pensitatione tolli videtur grauitas. 1) Phaenomenis antea propositis minus quidem proxime indicatur vera fluidi neruei accumulatio, quam potius eiusdem tantum praesentia, repetitis vicibus sese exerens, et post longius demum temporis spatium euanescens. Iam vero haec illius praesentia, repetitis vicibus se exerens, dependere quidem posset ab aliqua accumulatione, sed nil impedit quin et assumamus eandem



eandem pendere a repentina fluidi genesi, quod solutum, ut ita dicam, corpori inest, et in momento demum actionis euoluitur ac liberatur, similem in modum uti e. g. fluidum electricum in vaporibus aquae bullientis apparens, licet aqua eiusdem fluidi accumulationem non sit passa. 2) Sin vero et concedamus factam esse reuera, assumendamque fluidi neruei qua talis in corpore animali accumulationem, exinde tamen facultas corporis idem fluidum ducendi nondum excluditur: Nam et corpora idioelectrica insigni electricitatis in illius accumulatione in statum quodammodo abire videntur, quo fluidum electricum transmittunt, huiusque rei simile quid in corpore animali quoad fluidum nerueum concurrere potest. 3) Demum et sequentis animadversionis pensatio hic non negligenda: Corporis animalis quibusdam partibus inesse quidem propter humiditatem, qua perpetuo scatent, fluidi electrici transmittendi facultatem; alias vero eiusdem partes, ad humiditas non referendas, fluidi illius collectioni et retentioni potius fauere; uti obseruationibus Dni Bertholon euictum est. Concurfus igitur diuersarum, diuersae indolis partium, etiam aliquam effectuum, pro vario rerum externarum statu, diuersitatem gignit.

Quum igitur discrepantiae haecenus recensitae, si propius pensitentur, euanescant; conclusiones ad ulteriorem fluidi assumti, neruei subinde nobis dicti, cum fluido electrico analogiam, naturamque eius talem, ut supra fecimus, stabiliendam gravari amplius posse haud vereor. Probe vero notandum est, analogiarum numerum nimis adhucdum esse exiguum, earumque quae haecenus demonstrari possunt indolem ita in genere esse comparatam, ut quaedam non tantum ad fluidi electrici speciem, strictae sint referenda, sed aliis etiam communia sint, fluidis elasticis, in classem vaporum a de Luc relatis, e. g. materiae caloris etc. ideoque conclusionem ad plenariam absolutamque electrici fluidi nerueique identitatem nondum valere, sed haecenus obseruatis similem tantum eiusque indolem proxime inferri.

#### §. 9.

Similia cum hisce, quae haecenus prolata sunt coniectaria, ex obseruationibus motum muscularem spectantibus, causamque motuum istorum materialem propius determinantibus hausta, elici etiam possunt ex altera experimentorum parte, quae circa sensationum excitationem versatur. Positis nempe iisdem, quae §. praecedenti posui, adesse scilicet et hic fluidum agens, cui obseruati effectus sint tribuendi; similes et huic fluido adscribendos esse characteres, quales supra exposui, patet exinde, quia et hic similes analogiae, quoad relationes fluidi nostri ad alia complura corpora, nobis obtruduntur, quales fluidum exhibet electricum. Hinc, cum experimenta licet circa diuersos primo intuitu effectus, muscularem scilicet motum, sensationumque excitationem, instituta, in utroque tamen effectuum genere eandem exhibeant conclusionem, ulterius exinde fluit utramque classem eandem etiam communem agnoscere causam agentem materialem, in fluido expansibili, electrico quam maxime analogo, eiusque in modum agente, quaerendam: quod, si quondam magis adhuc confirmetur, complures lites hac de re diu iam agitatae quodammodo compescere poterit.

*B. Quaedam de modo agendi.*

## §. 10.

Hisce iam de causa phaenomenorum horum expositis, quaestio adhuc moveri posset, quinam sit modus, quo causa illa materialis effectus suos producat, quo igitur modo agat, si motus in musculis, quo, si sensatio insequatur, s. quanam sint fluidi illius mutationes effectibus istis coexistentes et praecedentes. Difficillima videtur adhuc ad hasce quaestiones responsio, maioresque et temporis et spatii requirit impensas, quam nunc iam istis dicare possum. Pleraque huc spectantia, inprimis ea, quae modum attinent, quo motus in musculis cieantur, sicco pede praetereo, alii occasione, quae hic asserenda forent, reseruans, atque id tantum hactenus mihi probabile quoad genesis sensationum supra descriptarum hic addo: Quum metalla tantum, quoad facultatem fluidum assumtum ducendi differentia, effectus memoratos sistere videantur (§. 7.), coniecturae ansam praebere, illis in casibus fluidum illud vel saltem eiusdem aliquam partem per alterutrum metallum facilius transmissum in altero resistantiam offendere, sicque in motu suo turbatum ad nervos linguae, qua conductores fluidi aptiores, reflecti, ibique sensationem illam producere. Sed alibi, si Deus vitam otiumque concesserit, de hisce fusius.

---

Prima pars huius dissertationis iam sub auspiciis huius anni typis expressa, totumque opusculum exaratum erat antequam inuenta Cl. VOLTA, CALDANI, FONTANA, GREN, REIL, CREVE, LICHTENBERG, aliorumque publice innotuerint. His itaque uti nequii. Dirus cui succubui morbus reliquae partis impressionem impediuit, otiumque rapuit, ulteriori huius rei indagini alias dicandum. Accipe, benevole Lector! imperfectum opus, ignosce varios eius defectus, quos olim largiore mihi concessio otio, supplere nitar \*).

\*) His adiiciamus plura, quae ad horum rariam historiam pertinent, paulo inferius experimentorum atque decretorum litterarum in additamentis. L.

---





XII.

IO. TRAUGOTT ADOLPH

DE

NERVORUM LONGITUDINE IN COMPENSATIONEM MULTITUDINIS ET VICE VERSA.

ALTORFII 1769.

**R**ationem, ut de magno et ad omnia paratissimo exercitu, nerui, in expeditiones quisque suas, amandantur, contemplanti mihi dudum fuit visum: naturam adfectare, multis ac variis modis, longitudinem filorum nerueorum quantum fieri licet maxime protensam.

Ubi vero, de praetorio sensorii communis, breuissima via, proximis prouinciis statim succurrendo adesse possunt nervosae suppetiae, huc earundem non turmae modicae properant, sed legiones spissae numerosae irrumpunt. Colli carnes, copiis nerueis instructissimae, id quidem iam comprobant. Praestat tamen, prouocare ad nervos capitis, quos ibidem ars atque patientia incomparabilis I. F. MECKELII <sup>1)</sup> plenam in aciem ita exposuit, ut, Neurologi maximi et accuratissimi decus, nostra aetate, tueatur, quanto magis penes eos, qui discipuli coram miracula eius anatomica mecum contuiti fuerunt. Frui ergo his capitis Neurologiae diuitiis iuuat prae primis, quas nullibi agnoscimus aut veriores, aut pleniores. Pauca in plurimis, quae suppetarent, expendamus. Musculos saltem faciei eorumque nervos, cum musculis aliarum corporis partium, comparemus, cumque eorundem neruis. Verum, neglectis Palpebralibus toties nictantibus, aut maxillam tanto robore adducentibus, Temporalis, Massetere, Pterygoideis, his omnibus ac similibus aliis, ceu multum aut fortiter laborantibus non nunquam musculis, neglectis, eos tantum ponderare expediet, quorum parciore ac debiliore obuenit usus, quales sunt Zygomatici, Leuatores anguli oris, Buccinatores, qui iidem tot et tam grandibus neruis nihilo secius praediti sunt, ut eorum multitudine paene superent Adductorem ac Flexores pollicis, actione sua vel C libr. aequivalentes, et comprehensarum manu rerum fortes contentores musculos. Longe euidentiora adhuc ostendit oculus, cuius globus in lubrica pinguedine adeo volubilis. Eius sex musculi, qui, iunctim sumti, Pronatoris Quadrati vix implere videntur molem carneam, absunt tamen tota fere, III. grande, IV. et VI., paria nervorum sibi impensa, quae paria in unum collata multum excedunt Pronatoris in Antibrachio Quadrati furculos nerueos a Mediano. Praeterea, exiguos atque pauciores.

Z 3

1) Mem. de l'Acad. des scienc. de Berlin. T. VII. (hor. script. neur. II, p. 204.)

ciores nervos ire, constat, ad ossa reliqui corporis. Ast illi, qui ad arcum alveolarem maxillae superioris eiusue dentes impenduntur a Vti P. Illo ramo Dentales Posteriores, ac dein ab Infraorbitario furculi Dentales Anteriores, nec pauci, nec adeo exigui sunt, quin evidenter testentur: compensare naturam nervorum multitudine eorundem brevitatem. Sed gratis immorarer diutius probationi isti: musculos ac partes cerebro propiores copiosioribus pro sua portione irrigari nervis, quam quidem alibi. Etenim omnes facile Anatomici mecum consentient: capitis ac colli musculos nervorum multitudine praecedere reliquos, nempe similis usus ac conditionis.

Aliam itaque capitis nervorum statim introduco, pro argumento meo, adfectionem, quam equidem incommodum magis, quam praerogativam aestimo. In morbis scilicet, quando convulsiones, aut deliria imminet, imminentium praefagia legimus communiter ex vultu aegri, cuius naturalem habitum teneri faciei et oculorum musculi, aut spastice aut paralytice obrigescentes, aut irrequie sua instabiles varie immutant. Accusatur vulgo mali causa, cerebri vicinia. Viderint ingenui Viri: quid ita certi arguant. Quantum ego perspicio, explicationis istius eo redit sensus: hoc celerior rem concitari, a causa nervorum systema sollicitante, fluidi nervei adfluxum, quo brevior viae tractus a fonte eius fluidi ad musculum impellendum; porro hoc uberiores derivari spiritus ad illum musculum, quo plures sunt rivi nervosi derivantes; denique hoc promptius, hoc validius fluidi nervei celeriore ac uberiore rore irritatum musculum in motus erumpere, quo minus impeditur pondere mouendarum partium aut antagonistarum renisu. Quae omnia in faciei ac oculi musculis amicas sibi iungunt manus. Cedere in aegrorum nonnunquam incommodum faciei nervorum istam ad spasmos ac convulsiones propensionem ea quidem ratione, haud prorsus nego, quod medici sic praemonentur de nervosarum turbarum ingruente periculo, ac praemoniti artis praesidia temporius, neque semper absque effectu, nervorum concitationibus motibus expediunt. Est vero graue e contrario malum nervorum faciei in motus vitia, siue convulsiva, siue paralytodea, in lingua praecipue frequentia, praeior dispositio, quam natura, praeservandis morbis adeo intenta, profecto non admittit, nisi perquam inuita, ob necessitatem brevis itineris inevitabilem ab encephalo ad faciem capitisque regiones. Generatim hactenus de capitis nervis indicaui: quemadmodum non facile accurrere poterant aliter, quam breui itinere, sic copia praepollere. Sed inesse etiam brevitati huic ac nervorum multiplicationi inimicum quoddam, a quo natura sibi caueat, longiorum nerveorum filorum, ubi licet, amantissima studiosissimaque.

Speciatim iam nunc, per singularia nervorum capitis exempla, amplius confirmare longiorum nervorum amorem, anivus est. Ante omnia autem de brevitatem nervorum ad nares, oculos, aures tenendum illud: maiorem potentiam nerveam, siue maius fluidi illius spirituosi ac nobilissimi impensam requiri, ad multo difficilius exercitium motus, quam ad sensum. Cuius rei argumenta, apud oculatos Viros occurrentia, non attinet, pluribus recolare. Unum ac alterum bene sufficit. Nervos, utpote tenuia filamentula, pro sensu, facilius impelli, ipsos autem difficilius emovere carniū moles in contractionem, pro motu, statim prospicitur. Atque incidit rarissime



sine paralyfis, ex qua, motu superflite, deficeret partis saltim sensus. Si itaque ab his organis sensuum recensitis secessero, quorum breuiores nervi tam facile enoueri se patiuntur, quam longiores, quorum insuper area sensilis copiam plurimum punctulorum nerueorum desiderat, pro aucupio ampliori rerum sensibilibum, si ab his recessero: reliquorum nerueorum elongandorum, in capite, collo ac trunco, admirabilem diligentiam natura exhibuit, ut adeo longitudo ex pollice adiecto maior magnum iam importare videatur emolumentum. Ipsa lingua, quippe quae motu, praeter sensum, vigere debebat, non ex proximo de nervo Ceruicalium IV. aut V, sed de Pari IX. VIII. et Vti IIItio ramo colonias sensum ac motum sibi inferentes accipit.

Et trecenta facile oculum anatomice subactum ac attentum ferunt documenta, quibus in capite et collo discitur: neruea fila, quamlibet ex proximo arripere potuisset Sapientissimus Architectus, data tamen opera longius eadem repetiisse, contraria lege, qua dispensantur vasa sanguifera. Quocunque furculum protensioem repere prospicio, longinquiore etiam incessum affectare ipsum, cognosco. Ex tanta messe paucas legam spiculas. Contueri iuuerit <sup>2)</sup> nervi Duri ramum Posterioem Occipitalem CXIV-CXVIII-CCCIV; qui per postimum occiput versus verticem usque conscendit, et cuius hos occipitales fureulos ex proximo Ceruicalium I. aut II P. suppeditare potuisset. Quos porro praeterlabens iste modo dictus Duri Occipitalis, vel in transitu, omnes dare poterat Auriculares Posteriores neruulos, dat parcissime, sed eminus ac ab inferis per III. pollices sursum aduocatur Ceruicalium III. A CCLXIV-CCLXX. Palpebrales nervi alio modo idem naturae institutum illustrant. Palpebrae superiori non alius propior nervus, quam V. P. ramus Imus, abs quo furculos quoque palpebra plures habet. Sic palpebrae inferiori V. P. Ildus, per Infraorbitarium ac Mala Subcutaneum, proxime prospicere poterat, quemadmodum prospicit. Ast tamen e longinquo suppetiae adhuc arcessuntur palpebris a Duri Transuersali, siue faciei Superiori ramo, ab eius scilicet furculis Adscendentibus. Suffecerint interim haec minoris quodammodo momenti exempla, quia ad maiora ac illustriora propero. In oculis nimirum habeo paradoxa neurologica maxima et vehementer intricata Physiologiae Problemata, quae multam, ut opinor, fortientur lucem, ex longitudine neruorum a natura sapienter quaerenda. Aditum vero mihi prius habeo referandum, quam haec difficillima ingredior. Aditum referabunt pauca Lemmata dicendis praesternenda. Primum mihi decenter rogo, ut concedatur: diuersum esse progressum neruorum sibi inuicem anastomosi iunctorum, prouti vel simili, verbi causa, desuper tractu, iuxta se descendunt et dein confluunt; vel dissimili itinere alter inferne adscendens, alteri descendenti, frontibus, quod dicitur, contrariis, sibi occurrentes trunculum demum constituunt unum. Distributius ac singulatim has sibi contrarias, ex concursu, aut occurso, anastomoses prosequi, e re esse videtur. Procedunt, in exemplo, nervi, quos Durus, Ceruicalium III occurfans et confusus <sup>3)</sup> CCXXXIV et CCLIII mittit, iuxta se CCXXXVII et CCLIV mentum versus decurrentes. Hi ad CCLVIII inter se iunguntur iterumque discedunt in CCLVI et CCLVIII. Habebit uterque

2) I. F. MECKELII loc. cit.

3) loc. cit.

interque novus furculus simul de Duro et de Cervicali filamentula ex CCXLVII et CCLIV mixta. Nervulus CCLVI ad CCXLIX iterum confluit cum furculo alio CCXLVIII. Rami inde denuo emergunt XCIX et XCIV. Ita nominem ob viciniam horum numerorum, quanquam XCIX et XCIV aliorum pertineant. Ramulus XCIV filamentula iam nunc habere potest mixta non solum ex CCXLVII et CCLIV, sed insuper ex CCXLVIII. Quando hic nervulus XCIV cum Mentali nervo confluit, quaterna iam a diuersis nervis filamentula venientia, ultimo suo furculo, utpote qui quatuor nunc parentum filius, commodat parti infertionis suae, nempe hic musculo menti Quadrato ac oris Orbiculari. Varia inde utiliter concluduntur.

Beneficium illud ingens statim dispalescit, quo nostrae prae primis faciei carnes in vulneribus gaudent, ut, abscissis aliquot nervorum trunculis, ob multitudinem tamen nervorum undique ad eandem partem anastomosibus repetitis deriuatorum, faciei cicatrices etiam profundae ac latae rarissime omnes tam diuersae scaturiginis riuos nerveos intercipient. Artuum nostrorum non eadem prorsus est felicitas, quam tamen cordi et visceribus abdominalibus Creator Benignus adpersit, quorum nervi ex plexibus vel per innumeras areolas reticulatis subrepunt, ut non facillime, per tumorem praeternaturaliter excrescentem, aut a flatibus, ingestis, faecibus alicubi accumulatis contractum, omnes partis nervei fontes comprimere se patiantur.

Discitur porro ex diligenti consideratione, quo modo plures nervi iuxta se decurrant ac dein anastomotice concurrant: trunculos nerveos amare angulos recto minores in diuicatione ramorum ex se emittendorum. Unde fit, ut truncus, verbi gratia, descendens desuper, simili quoque itinere, descendentes scilicet suos ramulos ulterius ac prorsum amandat.

Possunt tamen rami suo incessu deflectere a priori tractu trunci, dum diuicantur singuli sub angulis licet minoribus, iterum iterumque repetita anastomosi cum vicinis, sensim sensimque detorquentur abs tramite demum priorum truncorum. In plexibus reticulatis, ubi angulos aliquanto maiores diuicandorum ramulorum natura non adeo reformidat, ista detorsio nervorum a pristina via, hoc citius et hoc certius impetratur; quo saepius reticulati minoribus ac pluribus areolis plexus diuicationes istas ramorum, per tot celebratas nervorum nuptias, multiplicant.

Concluditur tum: per anastomoses repetitas, magis adhuc ac insignius, per reticulatas minoribus areolis nervorum implicationes ac detorsiones, longitudinem eiusmodi nervi implicati et de breuissima via detorti mirum quantum augeri et protendi. Atque persuasum firmissime mihi habeo, tot anastomosium et plexuum committendorum et intricanendorum, sapientissimum, inter alia, fuisse consilium, ut nervi ea ratione in longius ac longius producerentur. Nervorum nobilissimi, siquidem visceribus nostris imperitant, cum Vago, Intercoastalis, plexibus suis ultra industriam ac patientiam humanam intricatis, abunde patrocinantur dictis et dicendis de longitudine nerveorum flaminum, quam admirabili studio eandem natura sectetur. Plexum placet cogitare talem, cuius discum metitur diameter vel IIIum pollicum. Si affirmavero, nerveum filum hinc inde per plexum eiusmodi circumductum lucrari posse VI, VII, VIII pollices, ut longitudine sua duplo productius tandem exeat: contradicentem sane



sane neminem habebō, nisi eum, qui nunquam opus reticulatum retexi, et quam longis filis marsupium vel curtum sit concinnatum, cognouit. Nuptiae autem aliae superfunt adhuc considerandae, ubi nervus ascendens descendenti occurrit, alterque in alterius complexum contrario passu obviam procedit. Dirigat iterum difficiliorem sermonem, distinctamque exponendis inferat claritatem artis <sup>4)</sup> MECKELIANAE egregium specimen. In hoc iuvabit Ceruicalium III attentius considerare, cuius ramus adscendens CCLXXX, quatuor furculis CCXLV. CCL. CCLII et CCLIII, totidem furculis descendentibus de Duro  $\ominus$  occurrit ac committitur. Postquam sic inferne commissus est, quis dixerit, eundem manere commissum, neque ramis iterum abscedere. Si abscedit, ramis profecto de Duro iterum secedit, non retrograde descendentibus, sed potius adscendentibus. Si adscendentibus, hi iidem Duri rami adscendentes non ex longitudine Duri venient aestimandi, sed ex longitudine, per quam Ceruicalis III huc adscendendum habebat.

Coniecturam his innixam audere liceat. Sit ac propagetur Duri nervus Occipitalis superius CXIV-CCCIV indicatus de elabentibus iterum Ceruicalis III furculis admistis. Tum aestimabitur merito accedens inde Occipitali longitudo III. IV pollicum.

Aliam audere liceat coniecturam. Quid si nervuli ad Stapedium et Mallei Internum musculos, subito regressu, sub angulo acutissimo, ex Duro, in aquaeductu FALLOPII regredientes, de Ceruicalis III huc adscendentibus furculis, essent potius propagines.

Quid si eiusdem Ceruicalis similes furculi de hiatu aquaeductus porro elaborentur, nervi Petrofi nomen sortientes, ut VIDIANO dein adiecti, forte cum Palatinis Descendentibus ad velum palatinum denique desinerent, quod velum inter loquendum haud parum habet laborandum.

Quid si vicissim VIDIANI nervi, interueniente Petrofo, adiuncti Duro, soboles esset Chorda Tympani, nervo demum Linguali inserta. Descendens primo <sup>5)</sup> quidem viae senita, qua de Aquaeductu secedit et sensim sursum reflexa exit Chorda, cum angulo acuto insertionis ad Lingualē, coniecturae meae verisimilitudinem maiorem addunt. Quid si coniecturis his conciliarent suam certitudinem artis proficientis futura tempora. Nonne tum inclaresceret adhuc magis naturae ambages quaerentis summum studium, pro nervis, quantum fieri potest, in longius producendis, quos musculis mittendos habet, adfiduum diuque fatigantem laborem sustinentibus, prae aliis.

Et hoc ipsum alterum est Lemina, quod, ut mihi concederetur, rogavi: scilicet, quo intensius ac protractius, prae alio, musculus, per tempus vigiliarum, in opere et actione solet fatigari, hoc quoque largiorem sibi deposcere copiam fluidi nervei, quam largiorem continet fistula longior prae breviori. Eiusmodi vero musculi laboriosi supra reliquos in capite ac collo statim recognoscuntur, quam primum nominantur.

4) l. c.

5) I. F. MECKELII tractatus de V. P.

neruor. cerebri Gottingae 1748. pag. 92. —  
(hor. script. neur. Tom. I.)

nominantur illi, qui officula auditus tendentes apteque moderantes aurium usum ad distincte et attente audiendum acunt, quanquam nullo modo sentiam cum Summo BOERHAVIO, quasi hi muscoli ad quemvis tonum varium se praeparare ac componere possent, siquidem rei componere nos non possumus, quam ne praeuidere ac praenoscere quidem datur. Qui item laryngi praesidentes vocem articulatam aut tonos formare iuvant, quo etiam pertinet gradu inferiori Velum Palatinum cum Isthmo. Denique in sententia adhuc persto, quam per dissertationem <sup>6)</sup> inauguralem olim firmaui: quia, durante vigiliarum tempore, non demissis scapulis ac claviculis, sed sublati, incessum ac statum elegantem adornamus, ad quod Cucullares muscoli agendo valide concurrunt, hos ipsos inter laboriosos suum merere locum. Addo, qui addendus est, Sterno-Cleido-Mastoideum, cuius dignitatem illustris naturae humanae Praeco WINSLOW sufficienter <sup>7)</sup> collaudauit.

His ergo musculis colli ac capitis, prae aliis, multum diuque fatigandis, quam admirabili et ἐν ἀντήμασι plane habita ratione Prouidus Noster Creator neruos elongatum ierit, per ambages et e longinquo ipsos aduocando, id, quemadmodum mihi, simulac neruorum longitudinem aestimare didici, volupe vehementer fuit, sic aliis haud ingratum fore, speraui, meorum meditamentorum consideratum suscipere arbitrium: verane resolutione illos Neurologiae nodos Gordios retexam, dum longitudinem neruorum, eiusmodi paradoxis technis, a naturae sedulo fuisse quaesitam, argumentis huc spectantibus, euincere conor, conatu, quod sciam, primo et forsan imbecilliori.

Initium faciam a notissimo neruo Recurrente, qui ab utroque Asperae Arteriae latere reditu superuacuo de pectore readscenderet ad vocis formatores musculos, in tenerioribus sane quam teneros, nisi aliquot pollicum longitudinem acquireret, ut ex eius re vehementer fuisse videatur, hunc circiter IV pollicum facere quaestum.

Aliud eiusdem emolumenti a longitudine maiori captandi consilium naturae aperit nerui ad VIII. P. Accessorii ortus plane singularis, quo ipse, exemplum absque alio per omnem Neurologiae campum simili, radicem iam iam ad VII P. Ceruicalium saepius fortitur et accedentibus, secundum Ceruicalium superius surgentes singulas phalanges, nouisidentidem augetur. Quod vero maxime mirum: ipsae illae Accessorii sic collectae ceruicales radicae non per proxima foramina interuvertebralia colli, ex theca Spinali emigrant, sed altius producuntur ad cranii foramen Lacerum Iugulare. Reliquae tantum Accessorii radicae, quas a caudice Medullae Oblongatae intra cranium accipit, hae si P. VIII. adiungerentur, ut de cranio una prodirent: triam neruorum viam sic calcarent, neque singularis viae ratio torqueret Physiologos. Computatis ac circumspectis omnibus, nihil certius de Ceruicalium radicularum egregie singulari ortu perspicitur, quam istud: vel IV pollicum protractiorem longitudinem, operae pretium inde referre voluisse debuisse neruum nostrum Accessorium.

Sed

6) De commodis ex scapularum mobilitate homini oriundis. Halae 1759.

7) vide I. F. le CHAT de la SOURDIERE thesin in haec verba: ergo chirurgicae her-

niarum curationi musc. Sterno-mastoidei tensio nocet. Paris 1765. In T. III. Collect. HALLERIANAE dissertt. chirurgg.



Sed quorsum tendit, quibus partibus suos nervulos mittit. Scilicet Cucullari praecipue et Sterno-Cleido-Mastoideo musculus; quod dudum inter omnes a GALENI retro temporibus constitit. Praeter ea Cl. LOBSTEIN Argentinenſis Sector edocet <sup>8)</sup> furculum de Accessorio addi ad ramum Pharyngeum <sup>9)</sup> P. VIII, laryngis demum musculos irrigantem.

Nafalis, P. V. rami Imi foboles, quare cranium intret, ut iterum inde naribus distribuatur, cum nihil ipsum intra cranium, praeter viae suae vestigium leve relinquat, suos potius nervulos naribus referuans, ratio verisimillima videtur eadem, nempe elongatio aliquot pollicum. Etenim per solum foramen Orbitarium Interius Posterius, non Anterius, nares breviori statim via adire poterat, missis ambagibus ad cranium et ad Laminam Cribrosam.

Inter longos porro nervos militat Phrenicus a III. inde nervorum Cervicalium, et, secundum Ill. HALLERUM <sup>10)</sup>, etiam altius, primam ducens originem et longe per pectus deveniens ad Diaphragma, cuius nunquam dormiente agilitate ipsum trahimus vitalem spiritum. Monere fere piget, musculum hunc, post cor, nobilissimum a nervis costarum interstitia legentibus affatim ac propius haurire potuisse hos quidem nerveos riuos. Maluit ergo ex longinquo irrigari.

Tantum denique, cum Cardiacis, nervorum summi principes, nominis magni, intercostalis et Vagus adiiciunt confirmationis ad dignitatem longiorum staminum, siue altam de cranio originem, siue profundum ad inum abdomen descensum spectemus, siue infinita plexuum retia ac reticula suis ex implicationibus, et flexibus sinuosis metiamur, tantum, inquam, hi principes nervorum, filorum longiorum dignitatem extollunt, quantum nulli alii. Quemadmodum vero omnia maxima et nobilissima, ipsa amplitudine sua, dignitate ac splendore, oculis hominum praestringendis aptiora sunt et abs humiliore potius simplicitate capere praestat, quae nobilitas ac fulgor dignitatis velat quidem, neque a se excludere potest, utpote communia bona malaeque altioris iuxta ac inferioris fortis: sic ego quoque simpliciores nervulos in conspectum lubentius itemque facilius produxi, a quibus longitudinis disceretur valor ac efficacia. Ipsos vero nervos sui longitudinis amoris hactenus excitaui testes.

Rem denique eandem comprobeſt quodammodo totum, quantum quantum est, corpus humanum. Magnae omnino proceritatis homines etiam nostra fert aetas, etiam nostra Norica terra, ut huc accedens ego advena proceritatem in sexu potiori adeo frequentem fuerim miratus, Gigantibus interim ad insulam Patagon relegatis. Horum admodum pauci propter cordis robur maius, plures ob fibras corporis debiles, extensiles, plurimi post morbum fere superatum febrilem valde increuerunt. Quia plurimi ex causa contingente, neque proceros prae pusillis nasci nervis ditiores, certo quisquam experimento adfirmaverit: longitudine nervorum sane valent quicquid valent. Artus vero suos, seu vestes longiores, mechanica necessitate aegrius mouen-

Aa 2

dos

8) Diss. inauguralis I. FR. LOBSTEIN de nervo Spinali ad par Vagum Accessorio. Argentor. 1760. Tabulae fig. II. n. 14. — (hor. neur. Script. II.)

9) l. c. 15. 17.

10) Physiol. Tom. III. p. 89.

dos cum moueant suis musculis, hos suis nervis, quos non plures certo habent, ac homuli minoris staturae: nervi verisimillime longitudine potentiore sufficiunt maiori labori

Praelongorum hominum si longiora praeterea secundum naturam somni essent tempora, quod quidem, per XI. discipulatus mei academici annos, commilito ac familiaris tot commilitonum ac familiarium exemplis didicisse, quemadmodum alacritatem generatim mediocris staturae hominum magis viuendam, similiter, mihi, deprehendisse, persuadeo; nervorum sane longitudo tantopere quaesita, cum celsorum hominum productiori somno, magna et noua forent argumenta, pro fluido nerueo, quo nervi nostri, ut fistulae, fluidum fundendo, praestant, quicquid praestant.

Ne vero ex dictis mihi perperam asstringatur: quamcunque et quantumvis productam nervorum longitudinem me proficuum naturae animali perhibere, cuius rei utique contraria nostrum corpus habet documenta, oportet denique subegerere: quoniam verisimiliter modo ac termino istud longitudinis beneficium contineatur atque definiatur. Medullae Spinalis conoideus finis, unde cauda sic dicta Equina incipit separatiores nervos suos, ad artus maxime inferiores, demittere, lumborum vertebra primam inter ac secundam, esse scitur. Ab hoc principio longissimus nervorum in apice forsan hallucis finem iterum inuenit. Quid igitur si duae partes tertiae hominis praelongi ac statura celsi maximam nervorum longitudinem, absoluerent quam in humano genere commode admittendam intellexit omnis verae Matheos summus Stator atque Executor. Vagi et Intercostalis nervi quanquam a suis ex Encephalo incunabulis, ad imam pelvim usque, illas duas tertias partes staturae nondum implere videantur: per ambages tamen plexuum, praesertim crebrius et arctius reticulorum, non dubium est, quin eam longitudinem indispiscantur. Coniectura demum concludere liceat totam praesentem longitudinis tractatiunculam. Quidsi altissime deuenientia Intercostalis ac Vagi nervorum fila, altius quoque, uti Diaphragmaticus cum cardiacis, iam iam in pectore; de media vero altitudine adrepentia et per plexus circumducta, medii in abdominis item visceribus; quae tandem per lumborum regionem inferius admiscantur, ima in pelvi suorum extremorum figerent fines.

Restaret quidem, ut rationem adhuc redderem: quare manus Creatoris nervorum longitudinem maiorem, extra cranii potius et Spinae thecam, quam intra haec caua concinnauerit. Sed caput in se graue, ossea mole haud amplius fuisse aggrauandum, neque Spinae Vertebralis aptitudinem ad decentes flexus, per ampliores vertebrae, fuisse infirmendam; neque massam medullae pulposae mollioris pondus bene admisisse maiorem cerebri acervum, ubi quippe periculum ne superiora, comprimendo urgeant inferiora; neque crassiorem columnam Medullae Spinalis, ubi periculum foret, ne ima detraherent superiora aut gravitate imorum, tanta induceretur huius columnae tensio, quae, ni diuulsionem contraheret, intermediorum tamen noxie elongatorum in imbecillitatem abiret, haec omnino me monitore prolixo non indigent, utpote sua sponte cuique se offerentia incommoda. Quantum caetera laudantur capita magna cerebrosa, quasi amplioris doctrinae capacia: tantumdem culpantur a proclivitate in Apoplexiam. Taceo dispositionem ad rhachitidem.



## XIII.

CHRISTOPHORUS BERNHARDUS CRUSEN  
DE TENSIONE NERVORUM.

G O T T I N G A E 1765.

## §. I.

**T**enduntur nervi, perinde ac cithararum chordae, interdum quidem plurimo humore imbuti, interdum a causis exsiccantibus arefacti. Euenire etiam potest, aliquam corporis partem, aut ob inflammationem, aut aliqua alia de causa, vehementer affectam, nervos sibi vicinos una secum reuellere. Ita GALENUS in eo libro, quem de morborum temporibus conscripsit. Sed neque illud est verum, affectos nervos protinus intorqueri, indurarique, cum reperiantur nonnulli affectus, per quos laxiores euadunt nervi, quemadmodum per atrophiam conspicuum est. In inflammationibus autem, et tumoribus praeter naturam, manifeste intenduntur nervi. Ceterum inflammationis partibus praeter tensionem accidit, ut rubescant, renitentur, intumescant et doleant. Porro convulsiones nervorum Hippocratis testimonio, et a plenitudine et ab inanitione oriuntur, cum nimirum nervi per eas dispositiones immodice tendi possint, quemadmodum chordae in cithara. — Etenim cum venae quidem semper priores in superficie consistant: deinde post eas arteriae, quibus demum nervi subduntur: idcirco laborantes tensionem in imo sentiunt. Quaquam multi tendones (quae corpora sunt nervosa) etc. Sic idem ille in libro, qui inscriptus est de locis affectis, eoque secundo.

## §. II.

Ex quo intelligi licet, in tensorum numerum nervos reponi, iamdudum GALENUM agnouisse. Sed contra disputari potest, ex allatis modo non posse inferri atque intelligi, tensionem nervorum, eamque naturalem, iam dum GALENUM agnouisse, cum de praeternaturali illorum statu ipsi duntaxat sermo sit. Dabo, et libenter quidem, GALENUM heic loci de nervorum praeternaturali modo tensione disseruisse; ex ista tamen, quam adduxit, praeternaturali, non multo labore potest deduci, tensionem naturalem nervorum, hunc et agnouisse, et agnoscere debuisse. Quicumque enim in re quadam duo extrema, ceu oppositos sibi gradus, agnoscit; ille medium horum ut agnoscat, et agnouerit, cogitur. Iam vero GALENUS tensionis nervorum duo extrema agnouit: agnouit nimirum *laxitatem nervorum*, i. e. tensionem nervorum praeter naturam imminutam, et *tensionem nervorum in sensu pathologico sumtam*, hoc est, tensionem nervorum praeter naturam auctam. Ergo GALENUM, medium

harum gradum, ceu tensionem naturalem, ut agnoscat et agnouerit, cogitur. Maioris veritatis intuitu patet, hancque GALENUS ipse agnoscit, cum L. VIII. *de usu partium* haec habet: *Id natura dicendum est medium, quod eadem proportionem ab extremis distat.* Minoris veritatem itidem GALENUS agnoscit, ut ex verbis ipsius, §. praecedente allatis, constat. Quum igitur GALENUS maioris pariter atque minoris veritatem agnoscat et agnouerit; ut conclusionem inde elicitam agnoscat et agnouerit, cogitur. Itaque nerui iam ex mente GALENI in naturali itidem statu tensi sunt. Quo vero rem, intuitu claram atque apertam, dilucidem; exemplo sit pulsus magnus et paruus, plethora et vacuitas, aër calidus et frigidus, et ita porro. Quis est, qui negare audeat, 1) inter pulsum magnum et paruum, medium, ceu naturalem constitui, et constitui debere? 2) inter plethoram, ceu quantitatem sanguinis praeter naturam auctam, et vacuitatem, ceu quantitatem sanguinis praeter naturam imminutam, mediam, hoc est, sanguinis quantitatem naturalem, et poni, et poni oportere? 3) inter aërem calidum et frigidum, medium, i. e. temperatum, dari, et dari debere? Quis est porro, qui dubitet, omne rectum esse normam obliqui: et omne obliquum, obliquum esse ad normam recti? Silentio ut praeteream, GALENUM apertis verbis tensionem naturalem neruorum expressisse, cum L. I. *de motu musculorum* ita ait: *At nervus ipse, via quaedam existens facultatis motricis a cerebro descendens, ut eam communem faciat, extensus est.*

### §. III.

Posteris deinceps temporibus Medicorum haud pauci contrariam ineuntes sententiam, tensionem neruorum, et qui inde ducuntur effectus, plane negarunt. Primus vero eorum, qui tensionem neruorum non negavit modo, verum et acute satis perstrinxit, ni fallor, SANTORINUS Italus est. Ita enim ille in opusculo, quod *de fibra motrice* insignitur, et §. quidem IV. *Uterius dico, nullam fibram, seu peruium corporis villum, aut neruum in corpore viuente naturaliter constituto, tensum esse, veluti, ut aiunt, citharae fides, ita ut uno extremo tacto, seu leuiter moto, ratio tensionis, seu tantum solidi debeat motio illa absque contenti fluidi actione, villi seu fibrae extremo communicari.* Haec enim fibrarum tensio nec habetur, nec pro earum munere est necessaria. Unicuique enim, qui a limine anatomen salutarit, constat, hanc non esse neruorum dispositionem, illi siquidem per corpus laxè vagantur, ut sese accommodent partibus varie sese mouentibus, si tensi essent, ut in flexione partis amitterent illam tensionem, quae simpliciter est necessaria ad propria obeunda munera, aut in partium extensione nimis extenderentur, aut cum incommodo animalis, aut cum periculo totalis distractionis seu diuulsionis. Hoc insuper acrius non probo, quia res per se mihi patere videtur, cum quoque, quia nec talis tensio aut pro sensu, aut pro motu est necessaria, uterque enim ab alia pendeat causa, ut videbimus. Parum tamen sibi constare videtur, quum §. LXX. addit: *Cum saepissime contingat audire neruos relaxari, sit operae pretium inquirere, quid sit, et quo fiat neruorum relaxatio?* — — eo prorsus modo de neruis dicendum, tunc nerui seu fibrae sunt tensae, cum illarum cavitates a liquido neruorum infarciuntur ita, ut partes fibrae prae succi turgentis im-

petu



*petu necesse habeant a contactu remoueri, seu extendi, si vero extendens spiritus deficiat, ita ut partes fibrae non sint amplius in distractione detentae, in cohaesionem venient, quare minuetur fibrae dilatatio, et augebitur longitudo, unde relaxatio. Cur enim tensionis neruorum eorumque relaxationis modum exponere conatur, si tensi non sint?*

## §. IV.

Quoniam igitur de tensione, neruorum maxime, diffensione certatur, speciminis inauguralis loco motam iam dudum controuersiam experientia et ratione componere, animum induxi. Expedit autem prius tensionem uniuersum spectare, antequam ad neruorum tensionem perueniam: hac enim ratione futurum spero, ut unusquisque multo facilius atque dilucidius, quae sum dicturus, percipiat. Nominatim vero causas tensionis, et determinantem, et efficientem: huius porro effectus et signa proponam. Quibus propositis in tensionem neruorum animum dirigens ex causis tensionis, siue, ut aiunt, a priori, et primo quidem ex causa determinante, dein ex efficiente, tensionem neruorum stabiliam. Nec minus ex effectibus tensionis, seu, ut aiunt, a posteriori tensionem neruorum ob oculum ponam. Quibus explicatis atque excussis, tensioni neruorum obiecta discutiam.

## § V.

Corpora, de quibus tensionem adfirmamus, plura eaque varia sunt. Ita enim tensionem de varii generis chordis adfirmamus: sic de fibris, utpote corporibus chordis similibus, ita demum de pellibus, membranis, tunicis, ceterisque huiusmodi quippe partibus ex iisdem veluti conflatis. Haec quidem corpora, cum nondum tensa sunt, vi agenti non nisi qua physicum corpus resistunt: cum vero tensa sunt, vi agenti resistunt, qua corpus mechanicum. Itaque tensio et chordae nominatim, is eius status est, quo constituto vi agenti non qua physicum corpus resistit, contra vero qua corpus mechanicum. Hic vero status chordae tum denique obtinet, cum tanto gradu extenditur, ut vi agenti, hancque ulterius extendere conanti, quaquaersum reniteat. Itaque tensio chordae gradus ille extensionis est, quo chorda vi agenti quaquaersum resistit. Hoc autem definito extensionis gradu, ad contrahendum chorda conatum exercet: nam tensa chorda, eaque dissecta ad utrumque latus resilit, non tensa vero, non item. Itaque tensio chordae conatus eiusdem ad contrahendum est.

## §. VI.

Quadam similitudine conturbati non satis acute quae sunt discernenda, tensionem puta et elaterem, distinguunt. Sed horum facilis est et expedita distinctio. Elasticorum tria genera sunt. Primum ea comprehendit, quae se comprimere patiuntur, et compressa, vis comprimentis remotione, statum priorem recuperant. Ex horum numero aer est, spongia et Sambuci medulla: utpote quae non modo se comprimere sinunt, sed et compressa redeunt ad statum priorem, cum vis, ad arctiores cancellos corpora dicta redigens, remoueat. Alterum haec inuoluit, quae se flecti concedunt,

cedunt, et vis flectentis remotione resiliunt. Quibus adnumeranda sunt pennae, lamellae lignae, osseae, metallorum quorundam, testum porro et ensis lamina: nam memorata modo flecti se sinunt, et remota vi flectente resiliunt. Tertium ea continet, quae se extendi permittunt, seque, postquam ablata vis est, restituunt. In horum numero chordae sunt, iisque similia, et inde confecta: haec enim extensa, vis extendentis dimotione, pristinum locum petunt.

#### §. VII.

Inde evidenter patet, in eo convenire elastica, quod, mutata a vi externa, pristinum statum recuperent, si eundem immutans vis aufertur. Ergo elastica haec sunt, quae, ablata vi statum eorum mutante, hunc, quem ante tenebant, nanciscuntur. Non igitur elasticum corpus statum mutatum ponit, nec restitutionem prioris: haec enim modo elastici signa constituunt. Contra vero elasticum ponit 1) quod mutari status illius possit: ita enim particula testis, et est, et consistit elasticum, siue status huius mutatus sit, siue non sit, siue igitur flexus seu incurvatus sit, siue non sit, et ita de reliquis: 2) corpus elasticum requirit, quod redire in statum priorem possit: ita enim penna, eaque flexa, (utpote corpus, cuius status a priori discrepat), ex inque elasticorum numero est, siue in statum naturalem redeat, siue ob resistentiam obiectam in statu violento persistat: sic porro ensis lamina eaque flexa, (utpote corpus, cuius status mutatus est), elasticum corpus et est, et stabile permanet, siue priorem statum eumque naturalem accipiat, siue oppositam propter resistentiam in violento persistat. Non igitur actualitate, ergo possibilitate elater consistit. Est igitur elater corporis se restituendi potentia, cum vis statum ipsius mutans aufertur. Ista vero chordarum qua elasticarum potentia cum tensioni debetur; tensionem chordarum ab earundem elatere, ut causam ab effectu distare, nemo non videt.

#### §. VIII.

Haec de notione tensionis, eiusque ab elatere discrimine, dicta sunt. Sequitur, ut percontari causas illius annitar. Ad has quod attinet, unaquaeque mutatio duo causarum genera ponit. Alterum quidem ente continetur, quod se mutari patitur: nulla enim admittenda mutatio est, nisi sit quoddam, quod se mutari finit, seu, nisi adsit quoddam, quod ab altero potest mutari. Alterum vero ente continetur, cui immutandi entis alius insita et quasi insculpta facultas est, dicam, ente, quod alterum potest mutare. Sed illud, resistens, patiens, mutandum, et causa vocatur determinans: hoc vero, agens, mutans, et causa efficiens. Unaquaeque ergo mutatio causam ponit, et determinantem, et efficientem. Iam vero tensio chordae mutatio est, quam, tensa nondum, nondum tenebat. Ergo tensio chordae, et determinantem, et efficientem, causam agnoscit.

#### §. IX.

Quod tensionis causam determinantem concernit, quaerenda haec in corpore est tensionis capaci. Cum autem corpus ens sit nexu plurium constitutum, cum igitur in



in corpore, praeter partes, horumque nexum, nihil est, quod cogitemus; corporis ad tensionem aptitudo, aut in partibus corporis sine nexu, aut in nexu spectatis, quaeratur oportet. Non vero in partibus sine nexu spectatis, cum corpus, cuius a vinculis solutae partes sunt, tendi non possit, et tensum, idque dissectum, tensionem amittat. Ergo in partibus in nexu spectatis, atque ita cohaerescantibus. Itaque tensionis causa determinans cohaesio est. Quum vero haec admittenda in omni corpore sit: tensio autem in nonnullis modo obtineat: nam fluidorum nulla, nec solidorum omnia, ineundae tensionis capacia sunt, quaestio nascitur; quantam cohaesione tensionis, qualemue requirat? Nimis vero longus forem, et uberius fusiusque disputarem, si rei differendae rationem secundum evolutionis regulas proponerem. Qua de re adnotasse sufficiat: 1) nullum tendi corpus posse, nisi quantitas resistentiae, ex cohaesione resultantis, quantitate vis tendentis maior sit; aut saltem ipsi aequalis: nam hoc negato, tensionis futurae loco exsurgit ruptio: 2) nullum tendi corpus posse, nisi partes illius, permanente cohaesione, a se inuicem recedere paulisper queant: tensio enim elongationem supponit, eamque pro tensionis gradu vario variam: haec vero elongatio sine aliquali partium disiunctione ne cogitari quidem potest: 3) nullum tendi corpus posse, nisi cohaereat ita, ut mota una istiusdem parte, reliquae omnes uno eodemque tempore, gradu aequali, iuxta eandem directionem, moueantur: motam namque unam partem corporis ad tensionem adcommodati, reliquae istiusdem omnes, eodem temporis puncto, gradu aequali iuxta eandem directionem sequuntur.

§. X.

Ad tensionis causam efficientem quod attinet, hanc facile in tendente, hoc est, in vi, tensioni sustinendae adcommodatum corpus elongante, detegimus: nequaquam enim corpus, tensioni sustinendae adcommodatum, sine tendente in tensorum numerum conici: neque tensioni corporis iamdum tensi, sine tendentis augmento, cumulum addi, experientia edocti scimus. Quodsi igitur tendens chordae adplicatur; nondum tensa in tensam, et tensa iamdum in gradu maiori talem commutabitur. Itaque tensio, et huius augmentum, adplicationem ponit tendentis ad corpus sustinendae tensioni adcommodatum. Quo constituto atque confecto, incidimus in multitudinem directionis, iuxta quam tendentis fieri adplicatio potest. Ad hanc quod attinet, duplex cogitanda chordae directio est, ea nimirum, quae longitudinem chordae respicit, et haec, quae ipsius latitudini obuersatur. Tendens igitur non nisi iuxta chordae longitudinem adplicari, aut latitudinem, potest. Sed illud trahendo agit: hoc vero premendo. Tendens igitur non nisi aut tractione agere, aut pressione, potest. Quodsi igitur corpori tensionis capaci, et iuxta longitudinem, et latitudinem, adplicata inueniantur tendentia: quodsi igitur corpori tensionis capaci, et tractione agentia, et pressione, adplicata inueniantur; ex causa nouimus, et perspicere cogimur, corpus, de quo quaeritur, ducendum in tensorum numerum esse.

§. XI.

Ponderatis causis tensionis, ad huius effectus progredior. Chorda vel tensa est, vel non est. Si tensa non est, tum 1) vi et trahenti, et prementi, parum resistit:

*Ludwig script. neur. min. T. IV.*

B b

2) ne-

2) neque se contrahit, cum vis tractione agens aufertur: 3) ita nec ullam contractionem molitur et edit, cum vis pressione agens aufertur: 4) multo minus discissa se contrahit: 5) nec demum per chordam propagatur actio: pressione tractioneue impressa. Quodsi vero tensa est, 1) vi, et trahenti, et prementi, multum resistit: 2) seque contrahit, cum vis tractione agens aufertur: 3) nec minus se contrahit, cum vis pressione agens aufertur: 4) ita et discissa se contrahit: 5) caeterum per eandem illico propagatur actio, siue pressione, siue tractione, confecta. De veritate ultimi illius certiores fieri facile possumus, si utriusque manus digitis in statum tensum chordam coniicimus. Si etenim, exempli gratia, dextra trahit chordam ita constitutam, in sinistra manu tractionem effectam statim percipimus. Si porro chorda ambabus manibus in statum tensum coniecta, ab alio quopiam digito premitur; pressionem effectam in utraque manu confestim sentimus. Sic itidem tractio pili, quamvis longi, illico perferitur. Ita et propagationem tensionis auctae per omnem chordam e. g. citharae, tonus altior docet. Itaque redundantes ex tensione chordae effectus sunt: 1) quod chorda resistentiam satis insignem digito tangenti obiciat: 2) quod chorda se contrahat, cum vis, tractione agens, aufertur: 3) quod chorda se contrahat, cum vis, pressione agens, aufertur: 4) quod chorda se contrahat, cum hanc discindimus: 5) quod tensio aucta per totam chordam subito usque ad extremitates propagetur, cum tractione in chordam agimus, pressioneue.

## §. XII.

Reliquum est, ut ea persequar, quae dignoscendae tensioni inferuiunt. Quum vero inveniendorum signorum fontes duo sunt, causa puta, et effectus; tensionis signa partim ex causa petenda, partim effectu sunt. Iam vero causa tensionis corpore continetur tensionis capaci, cui admota tendentia sunt (§. 9. 10.) et effectus istiusdem 1) in resistentia lat insigni, quam chorda tangenti digito offert: 2) in contractione, cum vis tractione agens aufertur: 3) in contractione, cum vis pressione agens aufertur: 4) in contractione, cum chordam discindimus: 5) in propagatione veloci tensionis adauctae per omnem chordam ad extremitates usque, cum in eandem tractione agimus, pressione, consistunt (§. 11). Ergo tensionis signa constituunt

I. Praesentia causae tensionem determinantis una cum efficiente: i. e. praesentia corporis tensionis capaci, cui admota tendentia sunt:

II. effectuum tensionis praesentia, et

- 1) quidem, resistentia chordae sat insignis, quam tangenti digito offert.
- 2) contractio chordae, cum vis tractione agens aufertur:
- 3) contractio chordae, cum vis pressione agens aufertur:
- 4) contractio chordae, cum hanc discindimus:
- 5) propagatio velox tensionis adauctae per omnem chordam ad extremitates usque, cum in eandem tractione agimus; pressioneue.

## §. XIII.



§. XIII.

Haec de tensione uniuersim spectata, pro scopo dixisse sufficiant. Proximum est, ut doceam, neruos in tensorum numerum iure meritoque reponi. Quum vero et inueniendae veritatis, et stabiliendae, duplex modo via est, et haec quidem, quam vocant a priori, ex ratione, ex causa: et illa, quam a posteriori, ab experientia, ab effectu, adpellant; primo sic agam, ut tensionem neruorum ex causa constituam: qua constituta, eandem ab effectu ita deducam, ut nemini, nisi experientiam et rationem, unica illa eaque validissima scientiarum et certitudinis fulcra, neganti, ulla, quo se vertat, via relinquatur.

§. XIV.

Duplex tensionis causa est, altera determinans; altera vero efficiens (§. 8.). Et illa quidem corporis tali cohaesione, tantaque consistit, ut sine ruptionis metu totum elongari corpus possit (§. 9.). Haec vero tendente, eoque iuxta longitudinem, vel latitudinem quoque, memorato modo corpori adplicato, continetur (§. 10.) Quod vero

I. causam determinantem concernit; nerui quidem medulla, ob similem pulti consistentiam, sustinendae tensioni minus apta est atque accomodata: contra vero tunica nerui medullam inuestiens, tanta gaudet cohaesione talique, ut se elongari, extendi et tendi, omnino patiat. Nec erit ullus, qui, dummodo in nerui, vel medullae spinalis, plena praeparatione occupatus fuit unquam, negare audeat, quod medullae spinalis vel nerui membrana se vehementer elongari, extendi et tendi patiat omnino. Quod

II. ad efficientem causam pertinet, et

1) quidem, ad tendens iuxta nerui longitudinem adplicatum; neruorum una extremitas in capite, vel etiam spina est, altera vero in partibus, in quas iidem illi ducuntur. Neruis igitur sua puncta fixa sunt. Nec minus utrique neruorum extremitati adplicata tenentur tendentia. Quod enim ad extremitatem attinet, in capite sitam; caput tanto magis a reliquis partibus dimouetur, quanto magis corpus increfcit. Nerui igitur a capite in corpus ducti, tanto magis extenduntur, quanto magis corpus increfcit. Neque minus crassitiei cerebri, quoad increfcimus, semper cumulus additur. Ex quo quid aliud colligi potest, quam ut meninges, utpote summa extremitas tunicae neruos cingentis in ratione increfcantis cerebri dilatentur, atque ita neruorum extensio, quoad increfcimus, augmentum perenne capiat? Quibus accedit, quod spina iuxta longitudinem increfcens, medullam spinalem secum rapiat, atque hanc et profectos inde neruos extendat. Haec de summa neruorum extremitate. Quod ad imam, durante incremento pedes protruduntur, manus, reliquaeque partes, in quas a capite, aut spina nerui ducuntur. Ergo, alteram item neruorum extremitatem directione opposita ad absolutum usque corporis augmentum magis magisque extendi, confitendum. Iam in propatulo esse arbitror, et extra omnem contro-

versam positum, omnes neruos a capite usque ad calcem, ad absolutum usque corporis augmentum magis magisque extendi. Cum autem incrementum iuxta longitudinem statum acceperit, nisi vires, iuxta longitudinem extendentes, decurrantur, aut diminuuntur; eadem illa neruorum ut consistat extensio cogitur. Non vero decurtantur, aut diminuuntur. Cum ergo incrementum iuxta longitudinem statum acceperit; eadem illa neruorum ut consistat extensio, cogitur. Quod

- 2) tendens concernit iuxta neruorum longitudinem adplicatum; sanguifera vasa sanguine impleri, res est notissima. Hac vero impletione vasa seu horum parietes dilatari, eaque dilatatione fibras vasorum seu horum parietum iuxta latitudinem extendi, nemo cum ire inficias iure potest, nemo iure inficias ibit. Iam vero sanguinis loco pulpam neruorum constituas; locoque parietum vasorum, neruorum parietes ponas; et pulpam nerui eiusdem parietes dilatare, dilatandoque fibras parietum iuxta latitudinem extendere mecum statuere haesitares? Quo autem res clara atque aperta euadat clarior: neruos a nato incremento usque ad statum sumus consideraturi. Principio nerui exiles admodum et teretes sunt, progrediente aetate crassiores fiunt, donec tandem incremento cessante hanc, quam tenent, crassitiem adipiscuntur. Haec de neruo, qua totum, spectato. Quod ad partes vero; 1) pulpam nerui initio incrementi tenuissimam inuenimus: dein crassiorem, et incremento demum peracto, crassissimam: 2) parietes nerui ab ineunte incremento minimo gradu dilatatos reperimus: tum maiori, et maximo demum, si maximum gradum incrementi attigit. Ex quo perspicuum est, pulpam neruorum illud esse, quod iuxta parietum neruorum latitudinem applicatum, neruorum parietes dilatat, atque ita fibras, per parietes illorum distributas, latitudinem iuxta extendit. Quumque tendens illud, puta nerui pulpa post peractum incrementum stabilis permanet; neruos a tendente itidem iuxta latitudinem applicato, non extendi modo, sed in statu extenso conseruari, solis luce clarius est.

### §. XV.

Absolute primo veri inueniendi modo, utpote a causa petito; ad alterum eumque ultimum, quippe ab effectu, seu ab experientia desumptum, transitus est. Plurimi vero iique varii tensionis uniuersum spectatae effectus inueniuntur. Ita enim a) et chorda tensa, et tunica tensa, et canalis dilatatione in statum tensum coniectus, digito tangenti resistentiam obiiiciunt tensis nondum, maiorem, eamque satis insignem: b) eadem illa, eaque tracta, remota vi trahente se resituunt seu contrahunt: c) eadem illa, haecque pressa, ablata vi premente, pristinum statum recuperant, seu se contrahunt: d) discissa ad utrumque latus resiliunt: e) actio, chordae siue tractione, siue pressione impressa, per chordam illico propagatur, atque extremitati communicatur (§. 11.). Hos vero, quotquot sunt, neruis competere, non est quod dubitemus. Nam



- I. nervus pressus resistantiam satis insignem tangenti digito obicit.
- II. nervus isque separatus, vi trahenti cedit, eaque remota, ad archiores cancellos redit.
- III. nervus prementi vi cedit, eaque ablata, pristinum statum recuperat.
- IV. nervo discisso, parietes huius se contrahunt, seu ad utrumque latus resiliunt: quod si enim nervus discinditur; particula medullae nervi propter contractos parietes denudata conspicitur.
- V. actio nervo impressa per nervum illico propagatur, et extremitati summae nervorum, puta interiori capitis parti communicatur: nam anima, utpote ens, actiones nervis impressas percipiens, atque in summa nervorum extremitate sedem figens, actiones nervis impressas illico percipit.

§. XVI.

Quum igitur nervi corpora sunt, tensioni sustinendae accommodata (§. 14. n. 1): ipsis tendentia, et iuxta longitudinem et latitudinem, adplicata inveniuntur (§. 14. n. 2): quum igitur nervis causa tensionis determinans continetur atque efficiens (§. 9. 10.): quum porro nervi effectus sistunt, quos a corporibus tensis perfectos novimus (§. 15.): illic iunctim sumti, tensionis, quotquot habentur, signa constituunt (§. 1.); si, quod res est, fateri velimus, fateri cogimur, tensos omnino nervos esse, horumque tensionem, sine experientiae et rationis negatione, diutius negari haud posse.

§. XVII.

Ad ea tandem enarranda refutandaque accedo, quae cum ratione in alteram partem relata leguntur. Petuntur autem: I. a nervi directione: II. a nervo ipso: III. a parte, quacum nervus copulatur. Quod ad

- I. argumentum attinet, a nervorum directione petitum; dicunt: non semper recta via nervi incedunt: nam quandoque curvantur, retrorsum, serpentina directione, decurrunt. Quomodo autem adeo flexum corpus, corpus serpentina directione decurrens, ex tensorum esse numero potest? Quod
- II. argumentum concernit, a nervo ipso desumptum: nervum haud tendi posse autumant propterea, quod nervi fibrae adeo molles et tenerae sint, ut ne leuissimam tensionem sine metu ruptionis sustinere queant. Quod ad
- III. argumentum pertinet, a parte, quacum nervus copulatur, ductum; hoc ita se habet: si tensi nervi essent; aut in flexione partis, per quam vagantur, e. g. manus, pedis, amitterent tensionem, quae simpliciter est necessaria ad propria obeunda munera, aut in partium extensione nimis extenderentur, idque aut cum incommodo animalis, aut cum periculo totalis distractionis seu diuulsionis.

§. XVIII.

Quod nervi recta via haud semper incedant, sed saepe gyros forment, directioneque serpentina progrediantur, anatome testis locupletissimus est. Qua de re tantum abest, ut rem experientia fultam in dubium vocem, ut potius illi verissimo

omni ex parte assentiar. Num vero natum inde iudicium aequè verum, an vero fallax sit, sine omni praëiudicata opinione disquirere operae pretium est. Ratio, cur nervus tensus dici haud posse putatur, directioni eiusdem curvae, serpentinae, etc. verbo, flexionibus et gyris, quos format, innititur, exque hoc fonte, in forma ita ratiocinantur: Quodcunque corpus flexiones et gyros format, istud in tensorum haberi numero nequit: Atqui nervi flexiones et gyros formant; Ergo nervi in tensorum haberi numero nequeunt. Minor experientia anatomica est: maioris vero probatio iure desideratur. Quam cum nemo dederit, nec dare potest; ad solutionem objectionis statim transibo. Accipias intestinum aëre vacuum et flaccidum. Ligata altera extremitate, aërem, quantum capiat, infles, inflatumque liges. Illud intestinum aut tensum est, aut non? Tensum hoc esse dabis. Ergo confiteri cogeris falsitatem maioris: nam intestinum inflatum corpus est, flexiones et gyros formans. Quum igitur a corpore flexo et gyros formante, ad corpus, a principio usque ad finem, tensionis haud capax, concludi non potest, falsum est, nervos, propterea quod flexiones gyrosque formant, tensionis haud esse capaces, et proinde in tensorum numero haberi haud posse. En! apagogicam falsitatis maioris demonstrationem: hanc et ostensivam, quam addo, serena fronte accipias. Pulpa nervorum, et rectae eorum parti, et curvae inhaeret. Quum autem eadem illa pulpa in nervorum parietes agit! agendo eosdem dilatat, dilatando parietum fibras latitudinem iuxta extendit, extendendoque tendit, siue recta via nervus decurrat, siue maxima, qua fieri potest, curva progrediatur; ut eadem tensio nervi maneat, siue recta via decurrat, siue maxima, qua fieri potest, curva, progrediatur, efficitur. Haec de tendente nervorum latitudinem iuxta, adplicato. Quod vero tendens nervorum longitudinem iuxta adplicatum concernit; nervos membranula tenera aut fibris, finitimis partibus ubique, siue recta via incedant, siue curva serpent, alligari, anatome docet. Quodsi igitur reliquae partes, eaeque fibrarum interuentu, cum nervis connexae, iuxta longitudinem, pariter atque latitudinem, crescunt, atque ita extenduntur, ut extensio, in nervos, siue recta via decurrentes, siue curva progredientes, cadat, consequitur.

### §. XIX.

Quod nervorum fibrae adeo molles et tenerae sint, ut ne leuissimam tensionem sine metu ruptionis sustinere queant; experientiae anatomicae ipsi prorsus repugnat. Hoc quo pateat eo exactius, in nervi partes, seu varia illius, animum dirigamus; Duo autem in nervo considerata occurrunt: nervi puta parietes, et corpus eosdem replens, dicam, nervi pulpa. Quod nervi concernit parietes; hi tunica, ergo et fibris constituuntur robustis insigniter. Iam vero ex te quaerere licet: utrum nervi parietes, partem nervi constituant? Constituunt, inquires! Ergo confitearis dico, te ex falso experientiae principio tensionem nervorum impugnasse. Sed regerentem te audio, quod fibrae alterius nervorum partis, puta medullae, adeo molles et tenerae sint, ut ne leuissimam tensionem sine metu ruptionis sustinere queant. At enim vero scias; siue memoratae modo medullae fibrae sine metu ruptionis leuissimam tensionem sustinere possint, siue non possint, mihi perinde et esse, et esse debere. Nam quemad-



quemadmodum e. g. vaſa ſanguifera, ſeu horum parietes, a ſanguine, utpote corpore, tenſionis nullius capaci, replentur, dilatantur, atque ita in ſtatum tenſum coniiciuntur, et coniici poſſunt; ita et nerui, ſeu horum parietes, a nerui medulla, ſiue tenſionis capax ſit, ſiue non ſit, replentur, dilatantur, atque ita in ſtatum tenſum coniiciuntur, et coniici poſſunt.

§. XX.

Tertium et ultimum argumentum, tenſionem neruorum ſerians, SANTORINI eſt. Tanti vero roboris hoc eſſe, ſecum ipſe reputauit Vir egregius ille, ut id modo explodendae tenſioni neruorum par et aequale iudicauerit. Haud vero tale eſſe, ad id, quod voluit, confirmandum, quale videtur, mei eſt ut monſtrem. Mechanicae propoſitioni innititur argumentum SANTORINI. Haec vero expreſſa ita ſe habet: Accipiatuſ veſtis articulatus: Alligetur brachiorum extremitatibus, parumper ad lateralem perpendicularum motis, chorda, atque ita, ut eleuatis brachiis, ſeu extremitatibus, ad longitudinem exporrectis, tenſio chordae inſequatur. Tendatur chorda, eleuatione brachiorum, et horum depreſſione, aut flexione, tenſionem amittit. Ergo chorda, quae extenſione brachiorum veſtis articulati, tenſa redditur, horum flexione tenſionem amittit. Vel: Adprehendas veſtem articulatum, cuius brachia iuxta longitudinem exporrecta tenentur. Alliges extremitatibus huius chordam, atque ita, ut tenſa fiat. Nunc vero ſiectas veſtem, et chordam amittere tenſionem, cernes. Erga chorda, extenſione brachiorum veſtis articulati, tenſa, horum flexione tenſionem amittit. Quibus praemiſſis, ex mente SANTORINI, ſequens ſrui argumentum: Quaecunque chorda, extenſione brachiorum veſtis articulati, tenſa eſt; ea flexione brachiorum tenſionem amittit: Atqui neruus, ceu chorda, extenſione pedis, vel manus, utpote veſtis articulati, tenſus eſt; Ergo neruus, ceu chorda, flexione pedis, vel manus, tenſionem amittit. Minorem, quamquam fallacem, mittam, quoniam eius fallacia damni nihil infert. Maiorem vero, quippe particulariter veram, ideoque falſam, vrgebo. Arripe igitur, ut maioris pateat falſitas, veſtem articulatum. Fac, ut chorda tenſa brachiis exporrectis ita, ut ante, adhaereat. Iam vero chordam ligamentis, aut vndique, aut in articuli ſaltem loco, ita firma, ut tota chorda locum mutare non poſſit. Re ſic conſtituta atque conſecta; veſtem, vel minimo, vel maximo gradu, incurua: et chordam haud amittere tenſionem animadvertes. Ergo chorda, extenſione brachiorum veſtis articulati, tenſa, horum flexione tenſionem non amittit, ſi ita firmata chorda eſt, ut locum mutare non poſſit. Qua de re ita limitanda maior eſt: Quaecunque chorda, extenſione brachiorum veſtis articulati, tenſa eſt, horum flexione tenſionem non amittit, ſi ita firmata chorda eſt, ut locum mutare non poſſit. Maiori ſic limitata, corruiſt conſuſio et tota argumentatio: nam ita firmatus neruus eſt, ut flexione pedis, vel brachii, locum mutare non poſſit. En! ſolutionem argumenti, primo obtutu ſpecioſi atque ſtringentis. Falſus eſt SANTORINUS, quod chordam ſibi finxit immobilem, quaeque de ea valent, ad immobilem adplicauit. Nam chorda mobilis, flexione veſtis articulati, tenſionem amittit propterea, quod a veſte recedit, et reeedens, longitudinem, quam tenebat, cum

cum iuxta longitudinem exporrectus vectis esset, amittit. contra vero chôrda immobilis, flexione vectis articulati, tensionem non amittit propterea, quod a vecte non recedit, et qua non recedens, longitudinem, quam tenebat, cum iuxta longitudinem exporrectus vectis esset, non amittit.

## §. XXI.

En! solutionem apertam et claram dubiorum, et omnium quidem, quae de tensione nervorum cum ratione possunt formari. Quum enim in nervo, praeter nervum ipsum, huius directionem, et partes, quibuscum copulatur, nihil est quod cogitemus; praeter memorata modo, nullum, nisi nihili habendum, aliud quoddam, proferri dubium potest. Postremo autem sicco pede transire illos nequeo, qui tensionem nervorum negantes, hos relaxari adfirmant. Relaxatio, chordarum, exque iis confectorum, proprium est. Iam vero, aut chordae tensae proprium est, aut non tensae? Tensae, inquires. Ergo concedis, relaxationem proprium esse corporis tensi, neque quidquam relaxari posse, nisi quod tensum sit. Hoc constituto atque concesso, te errasse fatearis. Quicumque enim nervos tensos esse, negat: et relaxari eosdem adfirmat; is sibi contradicit.

## §. XXII.

Nouissime ostendam, cur Deus tendens nervorum, iuxta latitudinem adplicatum, solidum esse, idque fixum voluerit? Comprehende animo, et propone ante oculos quaecunque velis tendentia canalium, iuxta latitudinem adplicata; et multum sane, quod nervorum tendenti, iuxta latitudinem adplicato, congruens esset, atque conueniens, inuenies. Ita enim sanguis, qua fluidum pressum, lateraliter agit, ergo vasa dilatat, ergo fibras eorum, latitudinem iuxta, extendit, ideoque tendit. Sic reliqua fluida secreta, qua fluida pressa, vasa, quibus continentur, dilatant, ideoque fibras horum, latitudinem iuxta, extendunt, et tendunt. Ita aër ventriculo et intestinis inhaerens, ventriculum et intestina dilatat, ergo fibras eorum, latitudinem iuxta, extendit, et tendit. Sic victus et feces, primis viis contenti easdem dilatant, ideoque harum fibras, latitudinem iuxta, extendunt et tendunt, et quae sunt reliqua. Ergo omnia, quae habentur, tendentia, eaque canali iuxta latitudinem adplicata, si a nervis mentem et cogitationem auertas, vel fluida sunt, vel solida, et nominatim mobilia, seu non permanentia. Quod 1) ad fluida, eorum quantitas, siue veram spectes, siue adparentem, non semper eadem est: modo enim massa sanguinis maior est, modo minor: nunc porro moles sanguinis maior, modo minor est. Si maior; dilatatio vasorum, ergo horum extensio, pariter atque tensio, minor est. Ergo ex sanguine, utpote tendente, iuxta latitudinem adplicato, non potest non inaequalis tensio sequi. Idem statuendum de fluidis reliquis est. Quod 2) ad solida eaque mobilia, seu non permanentia, attinet; neque ex his, cum dimoveantur, constans sequi extensio, aequae ac tensio potest. Quod vero solidum concernit permanens, ex eo non potest non constans et aequalis tensio sequi. Cum igitur tendens nervorum, iuxta latitudinem adplicatum, solidum permanens est; ut constans inde et aequalis efficiatur nervorum tensio consequitur.

## §. XXIII.



## §. XXIII.

Ex haecenus dictis una patescit:

- I. Nervum esse canalem mollem, solido permanente repletum. Cuius notiois veritas quo pateat eo apertius partium veritatem pariter atque necessitudinem paucis monstrabo. Dico, nervum esse 1) *canalem*: 2) *canalem mollem*: 3) *canalem mollem solido permanente repletum*. Terminus *canali* genus constituit. Huius autem veritatem facile perspicies, cum a pulpa nervi mentem auocaveris; tum enim sane canalem animo comprehendes. Reliquae notiois partes, differentiam specificam constituunt. Differt enim nervus, seu canalis, a reliquis canalibus, quod 1) solido permanente impleatur, et ex numero canalium mollium sit. Priori differentia specifica discernimus nervum a vase sanguifero, utpote canali sanguine repleto, reliquisque canalibus fluido repletis: 2) a canalibus solido, non autem permanente, repletis; ut intestinis, ventriculo, oesophago, etc. posteriori autem distinguimus nervum ab osse canalem formante. Tale enim os quum medulla impletur, convenit quidem in eo cum nervo, quod solido permanente impleatur, nam medulla solidum permanens est; discrepat vero a nervo, quod durum canalem formet.
- II. Encephalum, seu interiorem capitis partem, hoc est, meninges una cum cerebro, summam esse nervorum extremitatem, seu radicem nervorum: idque a nervis materiae respectu haud differre: nam 1) parietes nervorum, continuatio meningum sunt, seu parietum cerebri: et 2) nervorum medulla continuatio cerebri est. Ex quo colligo:
- III. Durae matri nervos inhaerere non posse: Num enim nervi durae matri inhaerant, an vero minus? ab anatomicis in utramque partem defensum, et idcirco dubium maxime redditum est \*).

\*) Conf. ad hunc locum LOBSTEINIUS et VRISBERGIUS. (hor. script. Tom. I. p. 89 et 263.) L.



## XIV.

CORNELIUS IOANNES VOS

DE

## NUTRITIONE INPRIMIS NERVOSA.

TRAIECTI AD RHENUM 1789.

**Q**uod continuo actionum exercitio deteritur, deuasaturque Humanum Corpus, ad sui sustentationem et conseruationem, detritarum partium regeneratione ac restauratione quam maxime indiget, ne vel prorsus in deteritum ruat, vel saltem in plurimos morbos prouinciat atque praecipit.

Haec ut auerteret benigna Natura, omnes intendit neruos, ad scopum suum propositumque ferendum. Plures inuocat actiones, quibus partium amissarum regenerationem, et in locum debitum repositionem molitur. Qui naturae nifus, generali nomine, Medicis *nutritio* appellari consuevit.

Variae autem sunt, imo numerosae admodum diuersarum partium functiones, quae hunc in finem collineant. Omnes vero huc faciunt, ut materiem nutritiam sanguini infundant. E quo demum separatur, et in partes detritas deponitur. Atque ita, nec aliter mechanismum nutritionis absolui, hodie in uniuersum ab omnibus pene Physiologis accipitur. Ut hoc naturae molimen, quo e sanguine particulas nutritientes segregat atque separat, extra omnem dubitationis aleam positum atque euictum esse existiment.

Fatendum tamen, non eodem plane modo sanguineam hanc (*ut ita dicam*) nutritionem explicari. Quin imo maximus fuerit dissensus de vero, quo nutritio peragitur, modo.

Ne tamen expectetis, hanc litem nos fore diremturos. Procul profecto eandem a foro nostro alienam habemus. Quum enim, utrum neruorum in nutritionem verum detur imperium? disquirere proposuerimus, taediosa fortassis, quidni et superuacanea foret illius argumenti pertractatio, aut solidior quaeuis discussio. Quam insuper rei curiosus, in auctoribus, qui de Physiologia scripserunt, uberrime et fufepororatam adinuenire poterit.

Animus vero fert, dum omnis generis quaeftiones, huc spectantes, missas facimus, breuiter tantum nutritionis mechanismum, ut in scholis Physiologicis explicari consueuerit, delineare.

Notandum vero primum opinamur, non omni vitae stadio, eodem prorsus modo, nutritiam materiem corpori subministrari. Qui enim tenellus, materno domicilio inclusus est embryo, per aliam longe viam alimentum accipit, quam qui in  
lucem



lucem iam iam emissus foetus est. Quin imo, in ipsis his iam natis, alia est alimentorum, quae adsumunt indoles atque natura, e quibus dein, quod nutrititii est absorbetur, quod fatui aut inutilis segregatur. Ita alia sibi poscit infantia, alia puerilitas; aliis indiget adolescentia et adulta aetas. Diverſa ſenium petit, eaque iterum diuerſiſſima ſint, oportet, prouti vel incipiens fuerit ſenectus aut decrepita.

Quamdiu in utero moratur homo, triplici fors modo alimentum accipit.

1. Etenim ea verſamur opinione, quod embryo a matre per placentam recipiat materiem alibilem, quam propriis demum viribus in ſui commodum et nutritionem impendit, ita ut hoc reſpectu *propriam ſibi reuera vivat vitam*.

2. Liquorem amnii, continuo per os naresue vel per vtraque ſimul recipit et in ventriculum excipit. Siue quod eo perueniat deglutendo, quod non improbable videtur, ſiue ipſius liquoris preſſione aut gravitate ſpecifica, ſiue vtraque cauſa ſimul cooperetur. Perinde eſt, quum inconcuſſum ſit reuera lymphā hac nutriente, quam vel foetus ipſe ſeparat vnice, vel ex aliorum mente, vna cum matre componit, embryonem in utero pro parte ali.

3. Neque plane repudiendam cenſemus eorum ſententiam, qui vaſis cutaneis materiem hanc aliquo modo reſorberi et ita partim foetum nutriri perhibent. Profecto ſi caſus nonnullos rariores attenta mente volueris, ſi vaſculorum cutis naturam et uſum conſideraueris; haud ita facile ipſis fidem denegaueris.

Ex triplici hoc fonte embryo, ſuum in hoſpicio materno conſicit nutrimentum. Verum ubi in viuas prodierit auras, cum domicilio alimenta mutantur. Viuit in aëre libero atque reſpirat, ſed neque de matre per placentam, neque de amnio liquore particulas nutrititias recipit ulterius. At, de materno ſinu, e mammis diuinum ore haurit alimentum, lac ſcilicet. Quod increſcente aetate reſpuit iterum. Et duriora ſenſim ſenſumque comedere addiſcit, quum vero properat ad ſenium, ad puerilem iterum reuertitur diaetam et vitae genus. Omnibus itaque vitae terminis alimentum accipit homo. E quo, prouti indoles eorum diſcrepat atque natura, plus minus nutrititii extrahit, quod in ſui corporis ſuſtentionem, partiumque detritarum amiſſionem, ſequenti modo praeparat.

Ore alimenta ingerit, manducando comminuit, inciſoriis dentibus diuidit, dilacerat caninis, molarium ope atterit. Iis praeterea ſaliuam admiſcet, ſiue quod ſtimulo ſuo eandem copioſius huc e glandulis alliciant cibi, ſiue quod preſſione, quae per muſculos fit, emulgeantur, ſiue utramque cauſam coniunxeris. Haec ſaliua, cum bona aëris athmoſphaerici quantitate iuncta, alimentis in ore probe permiscetur, et ita in pultem rudiorē redigitur. Tunc vero deglutit et verſus ventriculum pellit. Heic loci, affuſis humoribus variis, aliisque concurrentibus cauſis, alimenta macerantur, reſoluuntur, uno verbo digeruntur, ut in pultem uniformem, grifeam mutentur, quae ventriculo egreſſa, affuſis in inteſtinis aliis humoribus, bilem puta, ſuccum pancreatis, liquidum entericum atque mucum ex grifeo colore albefeit.

Ex hac materia albicante, vaſa lactea, in villis inteſtinorum patula, abſorbent liquidum tenuius, albicans, nutriens; chylum vulgo dicunt: an vero et venae meſeraicae quid chyli abſorbeant? ſub iudice lis eſt.

Neque conuenit, utrum vasa lactea id agant vi capillari tantum? num vero peculiari vitali, aliisque causis conspirantibus? certe quemadmodum ubiuis fere, ita et hic, mire discrepantes videbis Physiologos.

Quicquid sit! chylus vere absorbetur, inque vasis lacteis exceptus, traiectis bis semelue glandulis, quae in mesenterio sunt, lymphaticis, in receptaculum chyli influit. An vero in hac sua via chylus mutationes patiatur? et qua in re illa mutatio consistat? contrariantur Physiologi.

In cisterna lumbali, chylus, cum lymphâ viscerum et partium, quae infra septum transversum haerent, permiscetur. Et per ductum thoracicum ascendit, inque eodem cum aliarum partium lymphâ unitus, adfurgit usque ad venam iugularem vel subclauiam lateris sinistri. Ubi ex ultimo, quo ductus thoracicus patet osculo, non semel aut simul omnis chylus euacuatur, sed lento, sed aequabili, sed continuo fluxu exoneratur.

Admixtus autem sanguini chylus, cum eodem hoc per uniuersum circulator corpus et in ipsum sanguinem mutatur, e quo demum, circulationis itidem beneficio, in organis visceribusque nostri corporis, iuxta leges a Summo Nostro Conditore sanctitas et constitutas; at modo nobis non ita facile adsequendo! separatur materies, quae vel in organi illius priuum vel uniuersi corporis publicum impenditur usum, ut nempe partes detritae deperitaeque regenerarentur, aut deficientes applicarentur. Ut ita humanum corpus uiuat, vigeat, nutriatur.

En ita, quantum licuit breuiter et ad viuum quasi delineatam accepistis nutritionis, quae per vasa ex ipso vitali liquido fit, theoriam, quaeque firmis adeo et inconcussis innititur fundaminibus ut, qui huic obloqui aut opponere velit, profanus facile neque fors immerito haberetur.

Non itaque vano metu vereor, me temeritatis accusandum esse. Siquidem de *Nutritione Nervosa* quid concinnare et euulgare auferim. Profecto fateor, prima fronte res admodum paradoxa et infelix ludibrii ingenii soboles videtur. Ast! suspendas quaeso iudicium; non enim volupe est nutritionem, quae e sanguine fit, aut impugnare aut quantulumcumque infringere. Non studeo nouam fundare theoriam aut hodiernam inuertere. Longe profecto, longeque abest. Quin imo, plane eadem opinione versamur et nutritionis mechanismum eo, quo supra tradidimus modo, omni molimine tuemur.

At! cura nostra unice in eo collocata est, atque illud hoc in specimine disquirere libuit: Utrum scilicet praeter nutritionem, quae e sanguine per arterias fit, et per nervos materia nutrititia adveheretur? Num nervi unice huic officio famulentur? Si vero id non per materiale quid praestant, quousque eorum vis extendatur? et qua in re proprie hoc neruorum officium consistat? inuestigare placet.

Ad peculiare hoc thema elaborandum et pro nostris viribus paulo plenius aduibrandum, nos compulsi excitauitque, quem elapso anno, *Syluaducensium Experimentissimus Chirurgus*, IAC. VAN DER HAAR, publice edidit, libellus; qui Belgico idiomate inscriptus pro titulo habet. *Proeven. over de Herzenen en Zenuwen, en eenige derzelver ziekten. enz. enz.*

Eximius



*Eximus Vir*, in hoc tractatu plura de vi nervorum nutriente disseruit. Eaque in sententia versari videtur, quod nervi Corporis Humani reuera aduehant succum naturae peculiaris, quem, si non unice nutritioni inferuire contendat, magnam saltem partem, imo plus quam ipsum sanguinem, huic officio famulari autumat. Quaeque pro sua stabilienda opinione adfert argumenta, nobis tanti momenti visa sunt, ut non incongruum nec omnis utilitatis expers fore duxerimus, si quidem hoc argumentum paulo accuratiori examini subiiciamus.

Ut vero hoc propositum felicem fortiatur euentum, sequenti ordine procedamus.

1. Disquiremus, utrum illius theoriae, de vi nervorum nutriente, vestigia, in Medicorum tam Veterum quam Recentiorum scriptis inuenire valeamus. E quibus vel directe vel indirecte, ad hanc nutritionis speciem concludere possumus.

2. Nutritionis nervosae theoriam, ex fautorum mente, argumentis adumbrare et stabilire annitemur.

3. Examinandus erit modus, quo illa nutritio, quae per nervos fieret, foret explicanda.

4. Inuestigandum, utrum recepta haec multis theoria, ut suos fautores, atque patronos nata est, ita et aduersarios, atque impugnatores habuerit? Quorum argumenta in medium proferemus.

5. Speciatim, in Hypothesin *Expertissimi* IAC. VAN DER HAAR inquiremus.

6. Denique quid ex dictis concludendum proposituri.

## SECTIO PRIMA.

*Disquiritur, utrum illius Theoriae, de vi nervorum nutriente, vestigia in Medicorum tam Veterum quam Recentiorum scriptis inuenire queant? e quibus ad hanc nutritionis speciem concludere possumus.*

Quum nostro inprimis seculo, in scholis Physiologicis hodiernis, modernorumque Physiologorum scriptis, ne quidem mentio huiusce nervorum usus atque officii fieri soleat: (Sive quod minoris momenti argumentum habuerint, aut dudum iam explosum existimauerint, aut cum BACONE VERULAMIO illas et consimiles alias hypothesas, veluti *hominum cerebella et potentes nugas* irriferint: perinde est, quum certum sit, nostris saltem temporibus, vix aut ne vix quidem illius mentionem iniici.) Hinc mecum cogitare coepi, utrumne iusta foret paulo attentior disquisitio et inuestigatio? an scil. prioris aevi Medici illius nervorum actionis et praesidii fortassis notionem habuerint?

Neque oleum omne et operam, dum anxie in id et laborioso sane opere inquisuerimus, perdidisse videamur, quum ex Antiquiorum tam, quam Recentiorum operibus haud difficulter collegeris, eosdem, de hac nervorum in Nutritionem efficacia, omnino et aperte disseruisse.

Sequens Elenchus omnem dubitandi locum tollit.

*Elenchus praecipuorum auctorum, qui hac de materia scripserunt.*

Ne tamen hic exspectetis plenarium omnium auctorum, qui vim neruorum nutritientem agnouerunt, catalogum. Curta, quae nobis est suppellex, ingens Veterum Medicorum, qui forte hac de re agere potuerunt, scriptorum copia, et numerus, nobis quidem omnem possibilitatem adimit, ut huic expectationi satisfacere in integrum valeamus.

Imo vero, ne taediosi finis aut molesti, ne quidem omnium eorum, qui nobis ad manus sunt, auctorum consensum tradere constituimus, praecipua tantum memoraturi testimonia. Dum interim in genere notare velimus, ex Veteribus plurimos, neque tamen omnino omnes, hac in opinione stetitisse.

Caeterum. OLIVA SAMBUCO, *Docta Mulier*, systema philosophicum scripsisse fertur, eius sensus: *ut homo esset arbor, cuius radices in cerebro essent, ex quo succus alibilis se per uniuersum corpus diffunderet.* Vid. A. V. HALLER in *elem. phys. tom. IV. pag. 404.*

FR. GLISSONIUS de *hepate* p. 412. 457. et W. CHARLETON eadem opinione versati fuisse dicuntur.

GEORG. ENTIUS in *Antidiatribae* in M. Truſtoni M. D. *Diatribam de respirationis usu primario.* Quae ipsius operibus medico-physicis annexa p. 441 et seq., plura in huius sententiae fauorem disserit.

Quin imò G. COLE in *Consilio pro epilepsia* p. 85. de febr. interm. p. 49. 63. 72. R. VIEUSSENIUS C. 15. BOHN p. 214. Aliique succum nerueum nutrire putarunt. Vid. A. V. HALLER. *Elem. Physiologiae* tom. IV. lib. X. Sect. 8. §. 30. pag. 404. et seq.

THOM. WILLISIUS. *Celebris* suo tempore *Anatomicus*, in libro, quem inscripsit *Anatome cerebri et neruorum. Cap. 19. pag. 183. et 184.* Nonnulla de vi neruei succi nutrititia affirmatiue disserit. Quin imò totum *Vicesimum Caput* unice concinnauit de *liquore neruoso; et utrum iste, an humor sanguineus sit nutrititiuus?* In quo capite ea videtur versari sententia. Quod licet sanguis reuera ad nutritionem faciat, imo vero insigniter contribuat, tamen nec neruis aut cerebro hoc munus prorsus denegandum sit. Nolo autem iam huic Auctoris sententiae diutius inhaerere, quum ad sectionem IIIam de hac WILLISII sententia disquirendi aptior erit locus.

POTRO STEPHANUS BLANKAART, *Celebris* itidem *Anatomicus*, in noua ac reformata *Anatome* edita. *Amstel. 1686.* quoque ea opinione fuit versatus, quod fluidum nerueum actu nutriat. Nam parte XXma ipsius libri, ubi de *Intestinis, eorumque motu morbitque* disserit, pag. m. 365. §. 78. ubi de *usu sanguinis* verba facit, ita loquitur.

„*Ea opinione versor, quod liquidum nerueum aut liquidum cerebrale, non tantum sit materies motus, sed quoque nobis nutrimentum adferat.*“

Magnificum profecto effatum, quo nullum clarius aut minus obscurum. Quod aperte adeo pro vi neruorum nutrititia militare videtur.

THEOD. CRAANEN *Celebris* olim in *Acad. Lugduno Batava Professor* in *tractatu Physico-Medico de Homine. edito 1689. cap. 53. p. 401.* quaestionem mouet: *Num nerui nutrant Corporis partes?* Ad quam licet ipse negatiue respondet. Apparet tamen



tamen ex hoc loco, quod de eo nervorum usu olim iam fuerit scriptum atque disceptatum, quin imo ab *Anglis* hanc opinionem amplexam fuisse, ex *Viri Celeberrimi* verbis sponte patet.

At, non incongruum duco IOAN. VESLINGII *syntagma Anatomicum Traiecti ad Rhenum anni. 1696 publice euulgatum* euoluisse. Non quidem ipse VESLINGIUS videtur *cap. XIV.* ubi *de nervis* agit pag. 219. nervis vim nutrientem tribuisse. Siquidem effatur. *Per quos, (sc. nervos) spiritus animalis, sensus motusque localis auctor, in partes corporis singulas deferitur.*

Verum in haec VESLINGII verba notam G. BLASII inspexisse iuuauerit. Qui haec habet. *De usu nervorum MOEBIUS varias sententias habet, GALENI nempe, HIPPOCRATIS, BACKII, GLISSONII et CHARLETON.* Concluditque genuinum eorum usum esse.

1. *Ut spiritum animale elaboratum in cerebro motuque eius ad medullam oblongatam et spinalem deductum hauriant, et ad partes pro motu, sensu, nutritioneque promouenda vehant.*

2. *Ut simul succum alimentarem, quo ipsi nutriuntur, e medulla imbibant.*

E quo loco videtur concludendum, aliquod saltem nervorum in nutritione esse momentum. At sufficiat haec ex prioris seculi scriptis collegisse. Quum haec testimonia ad nostrum scopum satisfacere videntur. Progrediamur itaque ad nostri aevi scriptores, visuri utrum ut hi aliquid in affirmatiuam nutritionis nervosae partem reliquerunt.

Non itaque reticenda est, quam HEISTERUS de hac nervorum utilitate fouet, sententia. Quippe qui *Volum. I. Comp. Anatomies, capite de nervor. structura* pag. 166. §. 301 argum. IVto ita effatur. *Nervo resecto, sensus, motus imo nutritio illius partis, cui inferebatur, cessant: Idque idcirco dicit. Ut indicio sit liquidi alicuius influxum, quod alias ad haec praestanda affluebat, sublatum esse.*

§. 302. Usus nervorum traditurus, ita eloquitur. *Ufus igitur nervorum, mea sententia est, spiritus, siue liquidum subtilissimum, in Cerebro et spinae medulla secretum, fouere, ac pro sensu, motu et nutritione, ad omnes corporis partes; imo subtilissimis suis fibrillis, ad omnia partium puncta deferre.*

Verum sententiae illius patroni, fortassis prouocare possent ad Summum BOERHAVIUM quaerentes, *utrumne ex nonnullis ipsius operum locis confici posset, eundem et hac in opinione stetisse?*

Ita forte prouocarent. Ad BOERHAVII *Instit. Med.* §. 77. et 120. Unde argumenta deduci possent in fauorem nutritionis nervosae, quae tamen utrum quidem id probarent, quod probandum? merito quaesueris. Potiori fors iure argumentum confici videtur. Ex §. 291. Ubi BOERHAVIUS ita effatur *Humor ille, ob simplicitatem, subtilitatem, mobilitatem, volatilitatem perfectam, appellatur spiritus nervorum, isque naturalis, vitalis et animalis.*

E quo loco coniecturari posset, spiritus illos naturales BOERHAVII fore, qui nutritioni impenduntur, qui naturam corporis sustentarent, dum vitales organorum vitalium actionem conseruarent, animales vero spiritus motus siue voluntarios siue inuolunta-

luntarios perficerent. Dum utrique interim et sensui inferuissent. Atque ita ferme concluderes BOERHAVIUM hac opinione fuisse versatum; quod nervorum spiritus nutritioni partim impenderentur.

Verumtamen videtur, nostro quidem iudicio, non ita tuto ex hac §. concludi, nervorum usum tanti fecisse BOERHAVIUM, ut et nutritioni famulari fuerit opinatus. Nam

1. Si spiritus in nervis reuera dentur, qua de re certitant acriter Physiologi, videtur tamen diuisio spirituum in vitalem, animalem, naturalem, arbitraria maxime atque insulsa. Quum nervi, qui spiritus illos vehere creduntur, promiscue partibus prospiciant. Quin imo unus idemque truncus vitali organo ramos impertit et naturali, proinde spiritus illi nervei organis vitalibus praeessent et naturalibus.

Vix itaque diuersam actionem illorum expectares in vitalibus, quam naturalibus organis, in quibus tamen ultimis, spiritus nutritionem peragerent. Contrariaturne eadem omnium spirituum in omnibus nervis, ut aiunt, indeles et natura, ut in alio nervo sensui famularentur, in alio vero nutritioni impenderentur, quin et in unius trunci diuersis ramis? Verum

2. Si admiseris istiusmodi spirituum diuisionem, attendas quaeso, quid de Hypothesi fiet. Si spiritus sit vitalis, animalis, naturalis, quaerendum primo opinamur, quid proprie per illos spiritus intelligant nervosae nutritionis fautores? Suntne ex mente BOERHAVII, spiritus illi, qui diuersa organa alluerent. Ita ut alii organis pro vita laborantibus praesint, alii partibus motui inferuentibus et sensui impendantur, alii partibus et organis infundantur, quae id quod a corpore nostro alienum fuit et ingestum in nostri Corporis naturam adsimilant atque commutant. At si ita comparatum sit! si alius sit spiritus in organis vitalibus, alius in organis sensoriiis et motoriiis, alius in organis naturalibus; si solus naturalis spiritus sit qui nutritioni impenderetur; qui quaeso fit, ut organa vitalia, sensoria et motoria laete adeo vigeant et nutriantur? quum tamen spiritibus illis naturalibus, ex Hypothesi nutrientibus, destituantur. Vides ergo! multum imbecillis huic argumento inesse.

Ad haec, BOERHAVII effatum arbitrium aliquomodo et aequiuocum est. *Spiritus enim naturalis*, alio sensu sumi potest. Quum BOERHAVIUS *nervos naturales* vocat *ultima vascula arteriosa*, vid. MARHERUS in *Comment. ad hanc §. vol. 2. pag. 441.* tum et *tertii volum. §. 440. p. 12.* et ipsa BOERH. verba. Ubi minima vascula *nervos* vocat. §. 446. si iam ultima arteriosa vascula sint nervi naturales, per spiritus naturales intelligi debet eorum vasculorum succus, qui materies nutrititia. Eo itaque sensu spiritus naturales, aut nervos naturales nutritioni inferuire tuto adfirmari potest. Palam vero cuique fore existimamus, quod, si eo sensu BOERHAVII verba acceperis, quo accipi posse supra monuimus, argumentum exinde deductum dubium admodum et claudicans existat.

Neque aliud erit fatum, siquidem forte ex §. 242. no. 4. conficere argumentum velint. Nam licet BOERHAVIUS nervos plures, maioresque exiguas, ratione molis, glandulas accipere adferat; licet glandulae, conglomeratae saltem, pro corporis sustentatione liquida naturae diuersae elaborent; non tamen ex insigni nervorum copia et



et exigua glandularum sensibilitate argumentari licet, ad effusionem liquidi alicuius nervi, quae iuxta BOERHAVIUM intra glandularum caua fieret aut demum ad nutritionem, quae ex succi illius nervi effusione et cum humoribus glandularum excretionem consequeretur.

Etenim, demonstratum huc usque non est, imo *perpetuum manebit problema*, ut MARHERI verbis utar, *num liquidum nervum in glandulas effundatur? num vero is solum in his nervorum usus sit, qui est in partibus aliis omnibus?*

Verum propius ad rem accederet, siquidem ex §. 478. Quaestione tertia, nervosae nutritionis fautor ratiocinari velit.

In hac etenim quaestione BOERHAVIUS aperte quaerit. *Quam ob causam, nervis corruptis quomocunque, pereat nutritio illius partis eo nervo praeditae? idemque simul et in arteria obtineat?*

Estne haec §. euidentissimum indicium BOERHAVIUM nutritionis munus nervis tribuisse? profecto fateor! prima fronte iurares BOERHAVIUM his verbis vix aliud quid intueri, quam, quemadmodum vitium arteriae macies excipit, ita corrupto aut vitiatō nervo eadem superuenit, quippe quia nutritionis materiem nervus acque ac arteria subministrat.

Regerit tamen Commentator MARHERUS. An omnino recte, ipse iudex esto. Quod hac §. BOERHAVIUS loquatur de nervis, quos *naturales* vocare consuevit, per quos, uti uberrime in *Commentariis* demonstravit, non nervos, sed minima vascula intellexit. Vid. ipsa BOERHAVII verba §. 446 et 440. collata cum §. 434 et 446.

Proin ex hac §. secundum MARHERUM, argumentum legitimum deduci non posset, quum lis agitur de *nervis motoriiis et sensoriis*. Atque tum quaestionis cardo eo vertitur, *utrum hi veri nervi nutrant?* nulla habita ratione nervorum naturalium siue minimorum vasculorum, quae, secundum nostri aevi scriptores, liquidum nutriendum partibus subministrarent.

Ut vero ab hac parte argumentum impugnet et subvertat MARHERUS, varias affert rationes et argumenta, quibus totum ratiocinium corruere cogit. Quae tamen, quum rerum ordo illis aptiorem conciliauerit locum, hic potius iam non proferemus, eadem deinde fusius exposituri.

Atque ex fusiori hac sententiae BOERHAVII de vi nervorum nutriente consideratione pronum erit colligere, quid respondendum ad §. 447. ubi de nutritione agens effatur. *Quod quum fieri nequeat, nisi liquido in haec vasa aduecto: nonne tibi clarum, materiem ergo proximam nutritionis esse humorem subtilissimum nervum, eius finissimum?*

Quisque enim de *nervis naturalibus*, eorumque liquido sermone esse clare perspicit.

Ex omnibus his, quae hucusque nauseoso forte labore disputauimus, nostro quidem iudicio, liquet: BOERHAVIUM veris nervis non aperte adeo nutritionis munus tribuisse, ut solidum certum argumentum in fauorem vis nervorum nutrientis inde deduci liceret.

Sicco itaque pede reliqua dubia, aut saltem minus clara BOERHAVII effata, quae huc spectant, transire placet. Per transfennam tantum hic monentes, quod, licet loca dentur in *Instit.* *Ipsus Medicis* ubi aperte docet spiritus animales effundi, eamque effusionem memorabilia symptomata excipere, tamen conclusio minus certa foret, si analogice inde deducere volueris, quod spiritus illi, quemadmodum in cavitates has effunduntur, ita et deponantur in partibus solidis intra earum interstitia, et dein ob delicatiorem, qua pollere creduntur, naturam in illas mutarentur, easque nutrent. Quum dubium maxime plurimis sit ea de spiritibus doctrina: neque in specie vel hilum certi inuoluit, quicquid de hac spirituum effusione garriant nonnulli.

Ita §. 77. BOERHAVIUS succum gastricum vocat *spiritibus diuitem*. Itidem §. 120, de chyli mutationibus in glandulis meseraicis agens, dicit *forte ipsi spiritus admiscuntur*. §. 590. Ubi de semine verba facit, quaestionem mouet. *An toto illo itinere retardato, semper aliquid accedit per vascula minima, nervos, aliaque?*

Atque haec quaestio Commentatorem MARHERUM tanti visa est ponderis, ut ipse ita respondeat. *Si etiam nulli alteri humori animali nerueum liquidum, (cuius et ille summus fautor atque protector) affundi crediderim, semini tamen hoc affundi firmiter persuaderim, saltem phaenomena seminis iacturam subsequencia hoc euincere videntur. Quamquam Alii ea phaenomena a convulsione potius, quae violenta semper, cum actu venereo coniuncta est, quam a liquidi neruei dispendio repetere malint et seq.*

E quibus si ratiocinari aut argumentari velis. Quod, quoniam amisso semine, et copiosiori inprimis illius quacunque de causa effusioni, totius neruosi generis imbecillitas superueniat, et corporis marcor; si cum amisso semine spiritus neruei effusi deperdantur; si asseruato semine, et neruorum spiritibus corpus vigeat et nutriatur; si exinde velis inferre liquidum nerueum nutrire; vereor, ne claudicans admodum et infirmum sit istiusmodi ratiocinium.

Verum quid iuuat ad minus certas has, quae e BOERHAVIO desumuntur, coniecturationes ut testimonia confugere; quum non desiderantur, qui audaciores aperte magis de neruorum vi nutriente differuere.

Ita in *Commentariis de Rebus in Scient. Naturali et Medicina gestis* vol. 2. parte 3. dissertatio exstat. Quam F. SIMSON *Anglus* concinnasse fertur, quaeque edita *Edinburg.* Anno 1752. pro titulo habet. *An inquiry how far the vital and animal actions of the more perfect animals can be accounted for independent of the brain.* In huius dissertationis tentamine quinto pag. 228, ita effatur. *Interim nullius esse utilitatis cerebrum, putandum non est, sed illa, in parando fonte aequalis omnium partium nutrimenti posita est.* Et pag. 233. ait: *Sin vero numerum neruorum in una parte ex diuersis locis consideremus; tunc eos securitatis causa datos esse opinandum est, ne defectus fluidi fiat nutritiui.*

Imo ex *Illustr. SWIETENII Comment. in H. BOERHAVE aphorismos de cognosc. et curand. morbis.* Capite de vulnere in genere pag. 237, §. 162. ubi de vulnere neruorum agit, haud difficile collegeris, eundem nutritionis munus aliquomodo nervis tribuisse. Ita enim scribit. *Neruorum actiones in corpore humano observatae sunt distinctissimae omnino: quidam enim sensum praebent partibus, ad quas tendunt; alii motum*



motum muscularem efficiunt; nutritio partium denique, et vita, ab aliis videtur pendere.

M. H. GEISWEIT in *dissert. de causa Rachitidis proxima*. GLISSONIUM et MAIOWIUM ea opinione versatos fuisse inonet, quod per nervos partium nutritio fieret. Imo ipse *Auctor* a nervorum integritate nutritionem partium dependere autumat.

TH. REN. GASNIER in *thesi Anno 1721. Paris. defensa*. SANTORINUS *obs. anat. n. 37*. FERRET in *thesi. Ergo solus nervorum succus est alibilis. Paris. 1737*. KINNEIR *on nerves. p. 45*. GEORGI *de hom. prop. 52. (qui humorem radicalem in cerebro parari docet)*. BERGER *de succi nutrititii per nervos transitu*. Inter huius seculi scriptores, qui de nutritione, quae per nervos fieret, scripserunt, ab A. v. HALLER in *Elem. Phys. Vol. IV. Lib. X. Sect. VIII, §. XIX. pag. 384 et §. XXX. pag. 405 in not. (y)* memorantur.

Verum ne forte molesti simus; plura aliorum consimilia testimonia iam taceamus notantes, ex hodiernis scriptoribus, neminem de nutritione nervosa aperte magis scripsisse, quam supra memoratus I. van der HAAR. Qui dum miratur, de hoc haud sane levis momenti argumento nihil, vel saltem perparum dictum fuisse, ex professio de hac materia disseruit, et quidem solido adeo ratiocinio ex sua, quam de cerebri et nervorum fabrica condidit, Hypothesi, eandem explicare fuit annisus, ut omnibus facile hac in arena palmam praeripuisse videatur.

Et haec quidem ea sunt, quae de auctoribus, qui hac de re egerunt, in medium proferre utile fore duxerimus. Sequitur, ut progrediamur ad alteram huius Thematidis partem, quae continet argumenta, quibus nutritionis nervosae theoriam stabilire conantur fautores.

## SECTIO ALTERA.

*Nutritionis Nervosae Theoria, ex Fautorum mente argumentis adumbratur, stabilitur.*

Qui ea opinione versantur, quod nervi nutritioni *per materiale quid* reuera praesint; non tantum verbis rem adfirmare, verum etiam argumentis et exemplis illustrare omni molimine conantur et quidem sequentia adducunt.

1. Quum materia nutrititia non nisi ea esse possit, quae variorum et multiplicis generis instrumentorum actione praeparata sit et fluidissima reddita: hinc nervuum liquidum, utpote plurimorum organorum concursu paratum, nutritioni suapte natura famularetur.

2. Cerebri moles et nervorum numerus in immioribus animalibus grandius est, quam in adultis; sed in immioribus largior est nutritio; indicio, eum in finem haec organa data esse, ut nempe amissa restituerent.

3. Si in nervis debilitas sit, corporis incrementum et nutritio, in ratione nervorum debilitatis augmenti, decrescit atque minuitur.

4. Ex ipsa succi neruei natura argumentum conficiunt, viscidum etenim et glutini similem, huic officio perquam idoneum crediderunt. Conferantur Ill. Halleri Element. Phys. Vol. IV. libr. X. Sect. VIII. §. XXX. p. 405.

5. Vulnerato nervo, nutritio illius artus perit, cuius nervus sauciatus fuit, totusque lente perit, consumiturque tabe. MONROO on the nerves p. 473.

6. Prouocant ad paralyfin, a causa euidente, sine praeuia sanguinis dyscrasia, excitatam. In qua motus aut sensus aut utriusque simul priuationi breui succedit Atrophia.

7. Affectio scorbutica, quando labes succum neruosum ita corripuit, ut in aegrotis vertigine et scotonia, cum doloribus vagis, spasms et crebra membrorum resolutione correptis, statim caro veluti in tabidis concidit, ac sine pulmonum vitio aegri, quasi tabe affecti, emarcescunt: atque hoc momentum inprimis T. WILLISIUS urget.

8. Conantur suam opinionem stabilire ex contabescencia, quae immodico veneris usui, gonorrhoeae inueteratae, ulceribus strumosis et abscessibus superuenit, quaeque oriretur ex succi neruei nutrientis dispendio.

9. Atrophias quasdam, et certa quaedam exanthematum genera dari, quae non ita a sanguine, quantitate aut qualitate peccante orirentur, sed a succi neruei defectu aut iniqua dispensatione dependerè videntur.

10. Ex Therapeia argumentum conficiunt, nempe, quare emplastra cephatica in phthisi opem adeo insignem praestent? quaerunt, an seri in pulmones depluentis catarrhum, ut vulgus opinatur, fistunt? nihil minus; verum, quia cerebrum roborando succi nerui crasin prius vitiatam restituunt. Vid. WILLIS. l. l. p. 196.

En haec praecipua sunt argumenta, quae ex prioris inprimis seculi scriptoribus adducere placuit, quibus suam opinionem egregie stabilitam arbitrantur. Iuberet quidem ordo, ut heic loci IAC. van der HAAR hypotheseos mentionem iniiceremus. Verum quum eandem accuratiori examini subicere ferat animus, eam iam pertranscamus, deinde fusius exposituri.

Caeterum num ea, quae protulimus argumenta, aliquam probabilitatis speciem habeant, nec ne? aliis diiudicandum iam relinquimus. Quum procedendum sit ad tertiam nostri Argumenti partem, quae modum, quo illa neruorum nutritio accipienda sit, tradit.

### SECTIO TERTIA.

*Examinatur modus, quo illa nutritio, quae per nervos fieret, foret explicanda.*

Ut felicem euentum nouum hoc argumentum fortiatur, ne forte errore hercle! perturpi, prioris aevi scriptorum sententiam cum *Nonissima Expert.* I. van der HAAR Hypothesi confundamus, totum hocce negotium ita dispescere lubet. 1. *Agemus de explicatione Antiquiorum.* 2. *Inquiremus in Hypothesin Ingeniosissimi van der HAAR.* — Dum nostram explicationem conclusio tradet.



## §. I.

*Nutritionis nervosae explicatio secundum principia Antiquiorum.*

Non eodem plane modo, indiscriminatim ab omnibus Antiquioribus, qui pro vi nervorum nutriente militant, Fautoribus, haec nervorum actio accipitur et explicatur. Dantur, qui plenarie hoc munus nervis tribuunt, nec ullam fere sanguinis habent rationem; imo vero, sanguinem potius suo motu detergere et auferre, quam apponere particulas, arbitrantur. Sed et inter hos sectatores nonnulli succo nerueo id tribuunt a spiritibus distincto; Alii promiscue his vocabulis utentes, iam spiritibus, iam vero nerueo succo id condonant. Alii et sanguinem et succum nerueum nutritioni impendi opinantur: et proin binos nutrimenti fontes statuunt, quorum alius per arterias, alius per nervos nutrimentum subministrat. Alii iterum ultimum hoc non eodem modo explicant, et mira profecto videtur, quam WILLISIUS fouet, sententia. Quae omnino hic exponi meretur.

Ea nempe in opinione versatur. Quod in nervis dentur spiritus animales, et succus nervosus, qui spirituum eorum vehiculum existeret, quem succum nervosum humori nutritio, copiose ab arteriis suggesto, instar seminis masculini, alterius sexus genitino affundi et commisceri statuit. Tum vero elementis suis actiuis, materiem crassiorem, per arterias allatam, velut fermento imbuere, et spiritu animali impraegnare; partes dividere et alias, ab aliis extricatas particulas, spiritu illo manducente, corporibus sibi met mensuratis adponere, et in illorum substantiam adsimulare, autumat. Verum, quum spirituum animalium magna copia adfundatur, illi, qui a nutritione residui sunt spiritus, ubique in fibras, quasi in propria domicilia, diuertunt, ibidemque in motus ac sensus munia parati commorantur: ita WILLISIUS.

At quicquid demum in hanc sententiam notari posset consulte praetereuntes, nosmet potius accingamus ad explicationem, quam ex spirituum animalium theoria, quae Physiologos, priori maxime seculo, exagitavit tantopere, fautores et patroni tradere student.

Est nempe hodie in uniuersum recepta opinio, ex encephalo medullaque spinali omnes oriri nervos: cerebrum et cerebellum viscus constituere singularis prorsus fabricae, in quo duplicem inprimis substantiam agnouere Physiologi, corticalem nempe et medullarem. Priorem vasculosam, vel in totum, vel saltem magnam partem, habuerunt. Posteriolem obscuram, non quidem e vasculis rubris sanguineis ita constatam, licet et ea gerat, sed ex vasculis sanguineis minoribus, tenerioribus compositam credidere. Reliquae, quae in encephalo dantur cauitates et prominentiae, incerti admodum usus habentur. Qui vero spiritus animales dari perhibent, medullam modo memoratam e canaliculis subtilissimis fabrefactam ponunt. Qui e cortice reciperent, nescio quem subtilem et diuinum liquorem, cui spiritus animalis dedere nomen. Spiritus hic e vasculis his medullaribus, ubi nervi ex encephalo producuntur, per nervorum itidem subtilissimos tubulos veheretur ad partes, quas illi nervi adeunt, in quibus dein, propter insitam spirituum qualitatem, sensum motumque, propter vero blanditiem, subtilitatem et delicatam eorum naturam, ubi neque sensui ulterius im-

penduntur aut motui, partibus, quibus inhaerent, iniungerent particulas virtutis eximiae, quibus hae ipsae vere nutrentur; siue quod huic muneri unice siue simul cum sanguine famulentur, mixti, aut separati praesint. Ita opinantur, qui e *spiritibus nervorum*, quos vocant *animales*, nutritionem deriuant: verum speciosam et fortassis paullo magis ad naturae simplicitatem accommodatam Hypothesin nuperrime condidit, uti saepius iam monuimus, *Expertissimus* L. van der HAAR. Quam sequenti §. paucis, quantum licet, tradere placet.

## §. 2.

*Sistens Hypothesin Expertissimi Iac. van der Haar, eiusque explicationem  
vis nervorum nutrientis.*

Ex ingenti sanguinis quantitate, quae encephalon petit, quamque plus  $\frac{1}{2}$  totius massae sanguineae cum HALLERO aequalem facit, concludit Auctor, memorabilem quandam secretionem ibidem locum habere. Eandem spirituum animalium secretioni famulari Veteres cumque iisdem Recentiorum haud pauci statuerunt. Alii tamen usui tantam sanguinis copiam inferuire, coniecturari videtur. Et ex eo ipsum cerebrum actu formari suspicatur.

Etenim praeter membranas, nihil aliud in cerebro detegi scribit, quam mirifica quaedam caseoso-mucosa vel gelatinosa substantia, quae in aqua soluta ne vel hilum fibrosi, aut vasculosi commonstrat. Quam a Veteribus non inepte *parenchymatis* nomine insignitam esse opinatur. Illam caseoso-mucosam aut gelatinosam substantiam cerebri in homine viuentem fluidam esse ponit, et interstitiis mirae tenuitatis fibrosae alicuius substantiae inhaerere vel contineri autumat. Quomodo vero ex  $\frac{1}{2}$  fere sanguinis parte, quae caput aut encephalon alluit, intra cranium cerebrum formetur, non determinare audet. Hanc autem cerebri substantiam gelatinosam non ubique sentire statuit: verum tum demum sensibilem euadere asserit, ubi ex fluidiori ipsius statu, sensim sensimque magis concentrata et condensata in substantiam magis consistentem, medullarem aut spongiosam, abit: e qua dein medulla tam oblongata quam spinalis una cum nervis oriuntur. Corticalem cerebri substantiam, neque vascularem, neque glandulosam habet; at mollem, unctuosam, vix organisatam, materiem albam, medullarem, inuestientem pronunciat.

Neque, si recte Auctoris mentem affecuti simus, videtur coniecturatione omni destitutus, ut explicaret modum, quo materies illa cerebri ex fluido statu condensetur. Ponit nempe, de caseoso muco vel gelatina cerebri magnam copiam liquidi dimitti, quam, dum euaporare non valet, in cavitates cerebri seu ventriculos deponi suspicatur, qua vero copia haec separetur, et qua via ex ventriculis his euacuetur, sibi meti hactenus latere ingenue fatetur.

Medulla spinalis neruique vasa ipsi videntur e cerebri membranis formata, sed non caua aut capillaribus vasculis, spiritus vehendo dicatis, conflata: ast subtili quasi medullari et spongiosa aut lanuginosa materie, e medulla oblongata oriunda, repleta, quae



quaeque cum mucosa aut gelatinosa cerebri substantia ad omnes corporis partes per haec vasa cerebralialia vehitur.

Materies autem illa cerebri non tantum intra cranium aut nervorum involucria contineretur, sed et ultra haec territoria per totum corpus diffunderetur; dum nervi instrumenta essent quibus aduehitur. Atque talis esset materies, qua fibras musculares madere saepe observamus, modo debita anatomico fuerit prudentia et circumspectio. Hanc materiem cerebri mediante respiratione, qua cerebrum ita moveri scripsit, ut in inspiratione aliquo modo deorsum, in expiratione vero sursum cederet, per nervos lente et aequabiliter propelli et ad corporis usque extrema duci contendit. Neque in cerebro tantum, verum etiam in medulla spinali et nervis similem motum obtinere, obscurum licet, suspicatur.

Videtur, ex *Auctoris* mente, cerebrum per totum corpus diffusum esse, et ideo omnes eius partes consentire, non tamen exinde sequi, animam ubique in corpore adesse, et partem ipsius amoveri, ubi pars corporis amputatur: nam dicit, si encephali, quod cranium includitur, pars auferatur [*ubi nonnulli animae sedem ponunt*] simul et partialis animae sublatio eam cerebri iacturam comitaretur; quod tamen neutiquam evenire experientia firmat. Totam speculationem de usu cerebri huc redire opinatur. *Quod nempe chylus, lympa, gelatina, dum cordis et pulmonis beneficio primam quasi praeparationem fuerint experta, et ertam quamdam perfectionem nacta, intra cerebrum deponantur, ibique a circulo sanguinis libera quietem patiantur, lenem percolationem, et mutationem subeant, et dein a medulla spinali et nervis recepta, nutritionis, sensus, motusque ergo, versus omnes partes vehantur, diffundantur, dispergantur.*

De usu cerebri atque nervorum, quatenus *nutritionis mechanismo* praesint, multa differit *Auctor* et varia argumenta adducit, quibus hanc cerebri et nervorum utilitatem stabilire fuit annisus quae quidem in primis sequentia sunt:

1. Si praecipuus quidam nervus exstirpetur, pars non moritur, ut in arteriae notabilioris praecisione; verum prius in parte sensus motusque perit, et brevi emaciatur tota. Licet vis cordis, et sanguinis circuitus, *saltem ad eius emaciationem*, fere eadem maneant. Unde patet ex mente *Auctoris*, omnino *vitam*, non vero necessario *nutritionem*, ab arteriis, ut quidem plurimi sibi imaginantur, verum a nervo, et quicquid aduehitur, succo proxime dependere.

2. Si ad homines adultos, qui iuniores aut pueri convulsionibus fuere obnoxii, et inde in Hemiplegiam inciderunt, attendamus. Apparet ordinario, si non semper; partes paralyticas pollices aliquot et longitudine et marcore a sanis distare. Neque tamen cor, et arteriae, si ab illis nutritio dependeret, sufficientem sanguinis quantitatem, qua partes nutriri possent, adferre denegarunt. Saltem circulus sanguinis neque augetur neque minuitur. *Nisi in ratione partium paralyticarum emaciationis aut minoris incrementi.*

3. Qui spina bifida nascuntur infantes, partes infra tumorem paralyticas et atrophicas monstrant, et post tumoris rupturam, cerebri et nervaeque materiei effusionem, emaciati et convulsi supra tumorem pereunt.

4. Quod

4. Quod in embryone, et neonatis, hominibus aequè ac animalibus, caput ratione voluminis maius sit, et cerebrum copiosius; quo nutriri eo melius et incrementum accipere possunt.

5. Quod post conceptum caput et cerebrum primum formentur, et proinde primum, unicum, et praecipuum incrementum embryonis inde sit deducendum, quo reliquae partes nutrentur et euoluerentur.

6. Post XII a partu dies caput foetus ordinario minuitur, vel saltem non augetur, dum reliquae partes interim augentur insigniter; forte a respiratione, qua cerebri motus, materiaeque nutrientis propulsio, et diffusio generaretur, hoc phaenomenon non dependeret.

7. Quod animalia rapacia plurima, si non omnia, cerebrum suae praedae ante ipsas carnes avidissime adgrediantur; uti in felibus nostris domesticis, glirum capita mox deuorantibus, aperte patet. Indicio ipsa haec, caeco licet instinctu, omnino tamen impelli, ut id, quod prae reliquis magis foret nutritium iisque saluberrimum, statim ingurgitarent.

8. Olim cerebrum iuniorum animalium maxime fuit commendatum, ad senes debiles aut atrophicos facili modo alendum, nutriendum, roborandum. Ut sic divino hoc nutrimenti genere e summo vitae discrimine quasi eripiantur. Et ex hac diaeta multum boni redundasse sibi visum fuisse memorat *Auctor*.

9. Ubi mucosa neruorum materies vitata aut degenerata est, in parte adfecta semper molestus dolor oritur cum emaciatione, ut ut aeger caeterum rite alatur.

10. In dolore *Ischiadico inueterato*, ubi neruorum mucosum corpus vitatum, acre, et degeneratum est, non dolor tantum, verum etiam macies obseruatur: at undenam ille oriretur? an a nerui *Ischiatici* laesa actione per acre quoddam, et materiae neruorum nutritiae dyscrasia? num vero a sanguine arteriae cruralis, qui in latere adfecto eodem modo circulatur quam in sano?

11. In doloribus nocturnis venereis macies ab acri neruorum mucoso corpore oriretur, dum nihilominus bene pascuntur et rite digerunt.

12. Podagra vera, quae sine cordis aut arteriarum consensu vel urina flammea, sed cum conuulsionibus, erectionibus penis inuoluntariis, priapismis, et pollutionibus incipit, videtur a neruorum mucoso corpore forte oriri; saltem mentis corporisque vigor restauratus post paroxysmum, et macies particularis crurum videntur arguere, quod defecerit neruorum nutriendus mucus.

13. Forte ex *Pistionum Colica*, quam insignis dolor excipit, cui prius macies, dein sensus motusque abolitio superuenit, posset concludi, neruorum mucosum corpus, vitatum prius, nutritionem labefactasse, dyscrasia nempe, deinceps et reliqua neruorum munia vitasse.

14. Petit *Auctor* argumentum a *Tabe* ita dicta *Dorsali*, in qua cum dolore dorfi horripilatorio, una cum urinae crassae, turbidae, non purulentae excretionem, aut copioso sudore viscido, emaciantem, licet aeger bene edat et rite digerat, vehementer tamen contabescit et marcescit. Rationem phaenomeni quaerit *Auctor* in nimis tenui cerebri et neruorum corpore mucoso, quo corpus vix nutriri et sustentari posset.

15. Ra-



15. *Rachitis*, quam *Auctor* ad cerebri nervorumque potius quam ossium morbos refert, pro argumento inferuire posset, dum in hoc mali genere cerebri et nervorum substantia vitata est, et tunc iam, ubi ossa nullam mutationem fuerunt passa: imo vero aquosa nimis videtur esse illa cerebri materies; qua fit, ut corporis nutritio labefacteretur infirmeturque.

En *B. L.* quantum licuit breuiter exhibuimus Hypotheseos, *Expertissimo* vander HAAR excogitatae, summam: quam idcirco proferre congruum duximus, quia caeteris audacior aperte magis de hoc nervorum munere et praesidio disseruit, idque satis solido ratiocinio assequi fuit annisus, ut eam reticere iniquum merito dixeris atque iniustum.

Verum traditis iam variorum sententiis, qui pro vi nervorum nutriente militare videntur, videamus iam, utrum haec theoria ut suos fautores ita et aduersarios habuerit?

## SECTIO QUARTA.

*An Theoria, de vi nervorum nutriente, ut suos Fautores nata est, ita et Aduersarios habuerit et Impugnatores?*

Ut omnium opinionum et hypothesium, ita et huius theoriae communis fors fuit fatumque. Quod, dum varios sibi fautores adsciscerit, ita et haud paucos aduersarios nata sit. Quorum certe plurimi longis sat telis hanc sententiam impugnarunt: alii vero dubitanter tantummodo hac de re disseruerunt. Hic vero breues esse studeamus, ne forte instituti limites prolixa nimis rerum consideratio transgrediatur. Ne itaque expectetis, quae in responsa, ad fautorum argumenta, iterum notari possent. Vetat quippe et illud penſi ratio.

Accipite ergo praecipuorum catalogum, qui nutrititiam nervorum vim per aliquid materiale abnegant.

Dubius hic videtur fluctuare I. A. KULMUS in *annotationibus ad Tab. VIII. pag. m. 40.* ubi dicit: *Negari nequit dari in nervis fluidum, quod nervos ad necessarios motus peragendos humectat, fortassis etiam nutrit.* Ita et I. H. a BRUNN in *dissertatione* (hor. script. neur. T. II.) *Sistente experimenta quaedam circa ligaturas nervorum in vivis animalibus institutas. Dubiam omnino esse vim nervorum nutrientem adferit.*

At haud pauci sunt, qui theoriae memoratae audacter se opponunt: inter eos plurimi dantur, qui per nervos aliquid fluere omnino ponunt, sed huic materiae naturam electricam, aetheream vel igneam tribuunt, et proin nutritioni ineptam: ab illis adeoque non facile expectaueris, ut in fauorem vis nervorum nutrientis differant. Praeterea omnes, qui nervis naturam solidam, nullo fere succo scatentem, tribuunt, non facile nervorum vim nutrientem tuerentur.

Verum et illi, qui in nervis liquidum aliquod agnoscunt, quoad indolem, et naturam consimilem illi, quo nutritionis nervae fautores utuntur ad suam opinionem explicandam, huic sententiae strenue se opponunt.

*Ludwig script. neur. min. T. IV.*

E e

Ita

Ita Celeberrim. TH. CRAANEN in tractatu de homine pag. 401. Anglorum, de succo nerueo partes nutriente, doctrinam falsam proclamat. PH. VERHEYENUS in anatome corp. hum. lib. 2. tract. 4. cap. 8. p. 287. videtur et in hac opinione stetit, quod nervi proprie non per suam materiem nutriant, vid. ipsius responsum ad argum. 7.

III. HALLERUS in element. phys. vol. IV. lib. X. Sect. VIII. §. 30. quoque huic doctrinae non videtur favere, quin imo in primis lineis physiologiae, quas Goettingae anno 1780. H. A. WRISBERG edidit cap. X. §. 385. pag. 212. ubi agit de quaestione, quoniam liquor nervosus abeat? dicit nutrire non credas, nimis mobilem, a quo non expectes adhaesionem, id tardi est humoris et visceri.

Celeberrim. HAASIVS in anatome repetita cerebri nervorumque C. H. pag. 129. §. 245. in responso ad quaestionem quo sensu nervi corporis partes nutrire credantur? non materiale quid, e quo nutritio per nervos fieret, agnoscit, et eo sensu nervis vim nutrientem denegare videtur.

Ita et Clar. ROB. WHYT, in tractatu, quem anglico idiomate inscripsit, observations on the nature, causes, and cure of those disorders, which have been commonly called Nervous, Hypochondriac, or Hysterical, etc. quam recensitam invenire potestis apud SANDIFORTIUM in naturali et medica bibliothec. vol. 2. parte 2. tract. XI. pag. 386. ubi ex auctore memoratur, eundem hanc doctrinam, qua ponitur per liquidum nerueum corpus nutriri, summe ridiculam habuisse atque insulsam, quisquis enim secum considerat imperceptibilem nervorum subtilitatem; et quam tarde liquidum aliquod per illos a cerebro aduehatur; ille difficulter sibi persuadebit, nutritionem et incrementum corporis per hanc viam fieri.

Neque MARHERUS videtur nervis vim nutrientem tribuisse, videantur praelectiones Ipsius in H. BOERH. inst. med. vol. 3. p. 55 et 56. imo ex Recentioribus, quorum supra mentionem iniecinus, haud desiderantur, qui licet nervorum in nutritionem imperium agnoscant, neutiquam tamen eosdem hoc munere defungi opinantur per suum, quod effunderent, liquidum. Dantur tamen qui prorsus negant, neque argumentis destitutos se opinantur. Nam neque VALSALVA neque Cel. BRUNN neque Illustr. HALLERUS, a ligatis de industria nervis, suis in experimentis atrophiam umquam subsecutam fuisse observarunt. Et contabescencia, quae in aliorum experimentis, nervorum ligaturae aut pressioni subsecuta fuit, videtur ab arteria cum nervis simul ligata, aut alio modo laesa dependisse. Vid. Comment. de rebus in hist. natur. et med. gestis vol. IV. parte III. pag. 433.

Cel. CRAANEN pro argumento habet, quod, si a nervorum succo nutritio derivanda foret: tum in omni parte paralytica indiscriminatim atrophiam deberet oriri; id quod tamen minima fit. Verum utrum hoc argumentum tanti ponderis sit, ut vir eximius existimat? Tibi, B. L. diiudicandum relinquimus.

Illustris HALLERUS l. c. argumentum adducit, quo conatur theoriam memoratam invertere, desumit autem 1. a spirituum nimia subtilitate et volatilitate, ad nutriendum inepta. 2. a nutritione plurimarum partium, quae vix aut ne vix quidem nervis gaudent. Veluti sunt hepar, lien, pulmo, membranae plurimae, aliaque organa.

Celeb.



**Celeb. MARHERUS** regerit, dari partes singulares, paralyticas ex nervorum vitio, quae tamen probe nutriuntur, imo per plures menses, et annos, abs ulla atrophia subsequente. Porro ait, in illis paralyseos speciebus, in quibus simul et atrophia adest, falso saepe nervos incusari, quum diligentior inuestigatio docuit, saepe eandem causam, quae nervos adfecerat, et ipsas arterias simul affecisse.

Adhaec, saepe atrophiam in parte paralytica praesentem, a nervorum vitio obortam credimus, dum marasmus ipsam paralyticiam diu praecesserat. Insuper, nullum certum experimentum adlatum fuisse dicit, quo directe demonstratum fuit, reuera a solonervio laeso nutritionem perisse. Quod, quae pittonum colicae superuenit atrophia, ne hilum pro vi nervorum nutriente militat, quum ex ipsius colicae causis, absque quod ad nervorum vitium confugiamus, hanc atrophiam haud difficulter explicari posse sibi videtur.

Ex omnibus illis, quos huc usque adduximus auctoribus, qui non ita in fauorem doctrinae veterum disseruere, haud pauci sunt, qui, licet a nervis proprie non deriuent materiale quid, cuius beneficio corpus nutriretur, tamen ea versantur sententia, quod ad nutritionem stabilem requiratur omnino nervorum integritas, non quatenus liquidum aliquod nerveum aut succum nervosum, qui nutrititia qualitate polleteret, aduehant. Verum quatenus nervorum sit singulare in vascula imperium; quo eorum actionem et munus sustineri, et conservari contendunt, de quo nervorum praesidio deinceps plura visuri sumus.

Et ex hac aduersariorum, de nervorum in nutritionem influvio, sententia, facile fore sibi videntur diluere omnia illa, quae pro vi nervorum nutriente materiali militant, argumenta: regerunt itaque ad

1. Quod licet liquidum nerveum sit plurimum organorum concursu, ex affirmantium mente paratum, illud tamen quam maxime fluidum existat, ut ipsi pronunciant, et subtile, quo proin nutritioni famulari nequit. *Nutritio etenim viscerum humoris est tardique.* HALLER *prim. lin. phys. Cap. X. §. 385. p. 212.* tum et THEOD. CRAANEN *l. c. p. 401.*

2. Cerebri moles et nervorum omnino quidem in iunioribus maior est, ratione habita voluminis totius corporis, quam in adultis. At num exinde proflueret nutritionem a cerebro esse? Vix ipsis videtur. *Aequo enim iure dicere possemus, aiunt, cor in ratione corporis grandius est in iunioribus quam adultis; itidem glandulae suprarenales et thymus glandula, maiores sunt in iunioribus quam in aetate magis provectis, adultis; atqui vero iuniorum largior est nutritio quam adultorum; Ergo a corde, a glandulis suprarenalibus thymove nutritio corporis.* Nonne potius e maiore cerebri, nervorumque volumine ratio deducenda est maioris sensilitatis, qua iuniores pollent? Estne sapiens naturae consilium, grandius cerebrum iunioribus dare, ut sensus motusque rite procederent, et perficerentur? Ac domicilium animae, utpote prae omnibus partibus maioris utilitatis, primum formare, et evolueri si ita verum! ad maiorem perfectionis gradum, quae consistit in incrementi termino maiori, et partium, ex quibus conflatur, evolutione perfectiori? nonne cerebrum idcirco natura grande dedit magnumque? ne forte ab osseo receptaculo duro, cui inhaeret, quodque in dies magis magisque indurefcens, encephalo resistentiam moveret nimiam

et vim, cerebri ulterius incrementum suffocaretur aut plenarie prohiberetur; nasciturne ideo magno capite instructus infans; magnoque encephalo gaudens? ut natura angustiori vitae stadio in sui fauorem uteretur, ad cerebrum magis magisque euolvendum, antequam ossa, duriora facta, omnem distensionem efficaciter prohiberent. Ad haec, an ex eo quod iuniorum maior sit nutritio, eo tempore, quo cerebrum ipsis maius, inferre licet a cerebro corporis esse nutrimentum? Estne potius largior iuniorum nutritio ab ipsa materia alimentaria, qua utuntur, maxima vi nutrititia polente, deriuanda? dum interea minor est virium dispendium, ac copiosior alimentorum ingestio saepius iterata; unde copiosus blandusque chylus, sanguis et liquor nutritivus, qui per arterias, non vero per nervos, adfertur. Dein hisce tantum euinceretur. Si ad nervos cerebrumque maiora sit confugiendum; quod actio vasculorum melius procedat et inde largior sit nutritio.

3. Quod in ratione debilitatis nervosi systematis, corporis debilitas, et nutritionis decrementum oriuntur, non demonstrat, uti tamen arbitrantur, per nervos materiam nutritivam advehi; verum docet tantum, quod actiones omnes, naturales aequae ac reliquae, quarum integritas a nervorum actione, quatenus sensum motumque in iis conservant, omnino dependet, iam sint labefactatae, et suo munere non, ut par erat, defungantur; hinc digestionem, quaeque ab eadem pendet, chylicationem depravari: quo proinde chylus pravae notae et conditionis paratur, qui insuper, ab actionibus vitalibus, corde et arteriis, vel et aliis mixtis functionibus, iam propter nervorum debilitatem infirmis, motu sensuque necessario destitutis, non praeparatur, ut decet, aut transformatur in bonum, et laudabilem sanguinem; unde proin particulae separari non possunt, quae nutritioni aptae, per arteriarum ultimas myriades, detritarum partium in locum subministrandae essent, quo partes non ita vigent et nutriuntur: Quin imo marasmo et atrophia periclitatae contabescunt. Ad haec, non uniuersaliter verum est illud assertum, quum, nervorum systemate insigniter debilitato, tamen nutritio corporis rite processerit.

4. Videtur hoc argumentum eos spectare, qui praeter spiritus animales succum aliquem nervosum posuerunt, quo spiritus ille, facile caeterum dissipandus, quasi coercetur, et ad partes, ut nutriret, veheretur. Verum, contrariaturne haec theoria sibi met ipsis? adfirmant rapide spiritus fluere et celerrimo motu ad partes vehi; ut motus muscularis et sensus explicationem omni numero absolutam dare possent. At vero, perspicientes inde nutritionem non posse explicari, scite liquidum aliquod viscidum inuocant, quod glutinosum, vehiculo inferuisset spiritibus; posuere itaque spiritus, quatenus sensibus praesint, subito moveri, quatenus succo nervo admixti, ut nutrant, lente fluere: manifeste proin opposita sibi que contraria statuunt. Attamen ita ratiocinari debuerunt, ut nervis praeter sensus motusque munia et nutritionis vim delegare possent.

5. Vulnerato nervo, nutritionem illius artus, ad quem tendebat, perire; artumque lenta perimi tabe, nihil evincit. Saltem non demonstrat, nervos unice nutritioni famulari, et in hoc nostro casu eo munere non defungi. Verum videtur ratio quaerenda in eo, quod nervo praeciso vis vitalis, qua minima vasa agunt, langueat aut



aut pereat, quo materies nutriendo accommodata; per minima vascula adlata, in iisdem neque elaborari aut ulterius propelli potest in ultimas minutissimasque arteriolarum myriades, quae illam materiem consueverant adferre, ut a fibris susciperetur, susceptaeque assimilaretur. Vid. HAASIVS *de Cerebro et nervis l. c.* Verum regerunt oblocutores insuper, quod in aliis casibus, ubi praecisi fuerunt nervi, tamen atrophiam non fuerit subsecuta. Vid. *Comm. de rebus l. l.* at utrumne ultimis hisce se ipsos suomet iugulent gladio? merito quaesueris.

6. Quod ad atrophiam breui paralysem subsequente[m], quae a causa euidente sine praeuia sanguinis dyscrasia excitatur: haec non demonstrat, quod per nervos materiale quid veheretur, qua praesente nutritio fieret, ablata vero, ut in hoc casu, pars marasmo periclitaretur et consumeretur tunc; verum exinde sequitur nervorum integritatem et officium haud labefactatum requiri, ut nutritio stabilis sit consistatque. Quod nervorum munus non dependet a materia quadam alibili, a nervis subministranda, sed quod in eo situm est, quod vasorum minimorum actionem, qua materies alibilis e sanguine separata assumitur, aduehitur, substituitur, integram feruent et illaesam. Ad haec dari paralyse[m], quae licet a causa euidente oriantur; licet a sanguinis dyscrasia excitentur; tamen ab atrophiam non excipiantur. Quod omnino requiritur, ut serius ocius ea superueniat, si nempe a nervo, in paralyse suborta laeso, nutritio partium proxime dependeat.

Porro, licet paralyse a causa euidente abs ulla sanguinis dyscrasia oriatur; et ab atrophiam partis paralyticae excipiat; non tamen arguit necessario nutritionem proximam a nervo esse. Potest enim, si ponamus a nervo dissecto in homine euchymo paralysem generari, aegri constitutio et vitae genus hoc stadio, quo paralyse primo tentatur, ita suum corpus mutasse, ut sanguinis dyscrasia lente furtimque subrepsit; potest animi tristitia, metus, quo partis laesae usum in posterum abolitum fore praevidet aeger, omnes actiones, naturales inprimis et animales, ita infirmare, ut suo munere non, uti par erat, defungantur. Praeterea, aeger potuit laboriosam vitam olim egisse, quum iam desidam viuat et saepe tranquillam: qua tamen nihil aptius est ad actionum labefactionem, et digestionis chylicationisque inuersionem, quo necessario crasis humorum inficitur. Si vero desidam semper egit vitam; dubitandi locus foret, utrum quidem adeo certe ab omni dyscrasia immunis fuerit. Ad haec respiciendum et in hoc casu est ad vulneris illius statum et conditionem, ipsius forte inflammationem, suppurationem, sanguinis praeterea, dum vulnus infligebatur, effusionem et iacturam: inquirendum foret, utrum eum nervi praecisione arteria maior simul sauciata erat? quod vix euitari potest, si maior nervus et profundior fuerit abscissus. Idque saepe in vulnere non de industria facto: forte et ipsa vulneris deligatio nimis stricta in censum veniret. En talia et millena plura prius perpendenda forent, ut pondus argumentum nanciscatur. Idque non tantum obtinet in paralyse a nervorum praecisione oriunda; verum ad ea quoque attendendum in quacumque paralyse, a causa quavis euidente suborta, si iusta et legitima conclusio foret inferenda.

7. Quod hoc numero adfertur argumentum nimium videtur probare. In scorbuto, suntne sanguis et omnes humores vitii? si quidem paulo prouectior fuerit; languentne in scorbuto exinde omnes actiones? estne chylus, quem scorbutici ex alimentis tenacibus saepe et duris, quibus vescuntur, praeparant, pravae notae et ad nutriendum ineptus? an e tali Chylo tenaci, quandoque et acri, laudabilis sanguis expectandus? quo partium nutritio fieret? Non opinantur. Ad haec, an memorata symptomata, affecti systematis nervosi indicia, dum scorbutica labes eousque inualeuit, rationem suppeditant sufficientem, ut concludi possit ad nervorum vim nutrientem? potestne sanguinis dyscrasia scorbutica tabem inferre, ut modo vidimus, dum nervi hucusque sani? quae tabes tunc augetur, ubi nervoso systemate affecto, et illud nutritioni id detrahat, quod contribuere affueverit, ut stabilis sit nutritio et ex voto procedat. Videntur nempe, scorbutica labe inualecente, dum partes non satis nutriuntur, homines emaciari, et tum iam, ubi ne quidem laesi nervosi generis suspicionem inieceris. Ubi vero eousque processerit, et tam altas egerit scorbutus radices, ut nervi etiam patiantur et munere suo rite defungi non valeant; quid miramur? maciem evidentius inualescere: tunc enim praeter sanguinis dyscrasiam, nutritioni ineptam, a nervorum laesione minorum vasorum actio, qua materiam paucam, alibilem forte hucusque aduexerant, elaborarant et subministrarant, aboletur, languet: quo, quae iam inualuerat, macies augetur et de die in diem maius incrementum capescit: caro statim velut in tabidis miro modo concidit. Illud vero omne abs ullo pulmonum vitio fieri potest; neque miramini! quum non omnis atrophia sit a pulmonum vitio: licet incertum omnino, infidum et quam maxime fallax sit, quod de morbis pulmonum saepe fertur iudicium. Ubi ne quidem Naturam de pulmonum morbo somnari fere iurasses; post mortem, tristi heu nimium! Experientia, eosdem affectos miraris atque obstupefcis.

8. Heu qualis conclusio! Immodico veneris usui, gonorrhoeae, ulceribus strumosis et abscessibus tabes superuenit: Ergo oritur a succi nervi nutrientis dispendio, dyscrasia aut penuria. Quasi vero in coitu, in gonorrhoea, purus putus liquor nervus effunderetur; estne semen, quod hic deperditur, liquidum illud subtili adeo modo, tot tantisque naturae moliminibus segregatum et praeparatum, quod hic amissum maciem et atrophiam inducere videtur? Suntne quae aegros istiusmodi edunt animae curae edaces, tristitia et id genus alia nervosi systematis mala? quae labefactando actionum exercitium, partim ad nutrimentum elaborandum, partim per arterias adplicandum requisitarum, nutritionem subvertunt; non quatenus haec curae nervorum actionem, qua materiam nutritivam vel plane non, vel non nisi vitiatam subministrarent, suspendant, sed quatenus irregulari et perturbata generis nervosi actione, sensum motumque, in partibus ad rite agendum requisitum, inuertant. Estne in gonorrhoea venerea iuuetata, acrimonia venerea materiae sanguinisque dyscrasia et cacochymia inculpanda? Qua nutritionem infirmitat. Quod ad ulcera et abscessus; estne materies purulenta, saepe resorpta, hic considerata? Quin imo an ipsa puris confectio erit flocci habenda? Nonne totius massae sanguineae dyscrasia,



fia, vitae genus, innumera alia, quae mala haec excipiunt, incusanda potius, quam nervosi humoris dispendium?

9. Si illa argumentatio quid ponderis haberet, determinandum prius foret, ad quales proprie atrophias et qualia exanthematum genera heic respiciant argumenti propugnatores. Notandum, quales causae praecefferint; qualia subiecta inuaserint; quae omnia diligenter expiscanda et inuestiganda essent, ut erui posset, utrumne potius e sanguinis dyscrasia aut peccante copia, licet haec abesse credantur, reapse forent deducenda?

10. Ultimo denique ex Therapeia argumentantur. Si Cephalica emplastra opem in phthisi praestant inquirendum 1) esset, si pro nervorum vi nutriente velis dimicare, quid illa emplastra praestiterint; hic tacet WILLISIVS. 2) An phthisis vere conclamata fuerit? quod non memoratur: imo vero 3) an veri nominis phthisis adfuerit? aliquando enim pro phthisi habetur, quod nequidem phthisis est. 4) An non potius roborando solida, vim vitalem in iis resuscitando, dum motum sanguinis vasorumque actionem instaurauerunt, egerint? quam quod speciali cerebri corroboracione succi nervi nutrientis crasin restituerint. Utrumne in nervos eo tantum sensu fuerint operata, quod iis qualitatem reddiderint, cerebri energiam restituendo, qua sensui et motui iterum famulari potuerunt, et actiones resuscitare, quae a nervorum integritate et munere quadantenus dependent? ad haec, nonne nervorum cerebrique energia restituta, actio fibrarum pulmonis et tonus vasorum restitui potuit? quo expectoratio promouetur et puris iam secreti excretio, quin et novi puris regeneratio efficacissime prohibetur: quod enim a partium actione infirmata, et praecipue pulmonis, possit congestio humorum fieri, inprimis in corpore cacochymo, et ita phthisis induci, quid miramur; quare itaque et hanc actionem, apto morbi regimine instituto, non possemus restituere et phthisin debellare? atque eo respectu emplastrorum cephalicorum usum, caeteri roborantium generi, omni numero parem esse quisque videt, neque vel hilum priui sere sibi vindicant; quid vero proprie illud sit, quod roborantia nervis et cerebro reddunt; quis determinabit? ubi densis obvelata tenebris se ipsa abscondit natura. En ita accepisti, quae doctrinae Veterum de vi nervorum nutriente eorumque argumentis opponunt aduersarii. Quae utrum satis ponderis habeant et valoris? ipse diiudices.

Propero iam ad Hypothesin *Expert. VAN DER HAAR*, quam accuratiori examini subiicere iubet ordo.

In qua exponenda ita procedere velimus, ut 1) proponamus nonnulla, quae in fauorem nutritionis nervosae ex Hypothesi notari adhuc possent. 2) Talia adducturi, quae ipsi repugnant et eandem aliquatenus inuertunt.

*Nutritionis nervosae theoria ex Auctoris Hypothesi ulterius  
urgetur.*

Pauca tantum ea sunt, quae in Auctoris, de usu nervorum per suam substantiam nutriente, Hypothesin notari possunt.

1) Si

1. Si Hypothesin auctoris de fabrica cerebri et nervorum veram ponamus, profecto ex natura ipsius substantiae, e qua cerebrum et nervi constarent, sequeretur eisdem omnino nutritioni praeesse: est etenim gelatinosa lymphatica; atqui veroeuictum est, istiusmodi materiem esse nutriendo aptissimam: quid mirum itaque? si nervi istiusmodi liquido scatentes nutrent corpus.

2. Quod maximus scrupulus adversariis fuerit, qui veterum de nervorum vi nutriente opinionem impugnavere, quod scil. spiritus nervei essent subtiles nimis mobilesque; unde nutritionem non expectas, quae tardi humoris est viscidique. Confer. HALLEY et MARHER. l. l. Verum in hypothesi auctoris ea nervis tribuitur conditio, qua materiem viscidam, tardam, lente motam, aduehere statuitur; nervis itaque illud conciliat, quod HALLERUS et MARHERUS inprimis desiderant, ut nutritioni praeesse possent. Argumentum itaque impugnantium pro hac auctoris hypothesi militare videtur.

3. Nonne vis nervorum nutriens itidem in hypothesi fauorem probari posset ex eo, quod omnes partes, quo plures habeant nervos, eo melius nutriantur et eo promptius resituantur, quam quae minori nervorum copia gaudent. Nonne exinde forte maior musculorum nutritio et promptior deperiti reparatio dependeret, dum membranae vix nervis praeditae tarde excresecunt aut reparantur. Nonne collapsus musculorum et partium superiorum emaciatio ac extenuatio, quae in hydrope, v. g., Ascite, saepe observatur, derivanda foret a feri et lymphae effusione morbosa intra abdominis cavum? quo fit, ut cerebrum necessariis particulis lymphaticis, gelatinosis destitueretur, suoque defraudaretur nutrimento, quo partes non satis nutririi possent, inque illis torositas et nutritio periret.

Haec et similia plura in fauorem illius hypothesi, quae nutritionem nervorum a peculiari cerebri nervorumque fabrica deducit, si urgere animus sit, notari forte possent. Quae tamen omnia non aequè magnam vim possidere haud diffitemur. Verum iam videamus, quid huic sententiae potest opponi. Dispecimus ideo novum hoc argumentum in binas partes.

1. Ipsam hypothesin de cerebri nervorumque fabrica, per partes eundo, diiudicabit.

2. Speciatim argumenta, quae pro vi nervorum nutriente adduxit Auctor, refutabit.

## §. I.

### *De ipsa hypothesi circa cerebri nervorumque fabricam tentamen.*

Ex *Illustr.* HALLERI calculo, plus quam  $\frac{1}{2}$  pars totius massae sanguineae cerebri peteret; inde concludit auctor ad insignem secretionem, quae hic locum haberet. In quem locum notare velimus. Quod ex egregio MARHERI de hoc HALLERI calculo tentamine, quod *vol. 2. praelect. pag. 339 et 340.* videre potestis, omnino constet, non tantam sanguinis quantitatem cerebrum adire, quam quidem HALLERUS perlubuit. Insignem tamen copiam sanguinis cerebrum petere, habita tamen ratione visceris molis et usus, non maiorem, ut exinde totum encephalon formari legitime

con-



cōiecturari possit. Plures enim sunt secretiones, quae ab hoc sanguine debent fieri; atque ideo tanta copia caput petit, absque quod tamen cerebrum ipsum actu e liquido, de sanguine secedente, instar parenchymatis formari opinandum sit.

*Pag. 8.* Auctor cerebrum, praeter suas membranas, neque e fibris, neque e vasis constare asserit. Quoniam in aqua maceratum cerebrum, et vitrea lente obiecta augefcente conspectum, nihil fibrosi, multo minus vasculosi, detegis, semper vero quid mucosi; et accuratori indagine nihil aliud in eo detegitur, quam mirabilis *caseoso-mucosa vel gelatinosa substantia*. Videtur auctor hic paululum ambiguus, ubi cerebro denegat vasa. Nam nescis, utrum de corticali et medullari substantia simul, num vero de ultima tantum agat? de utraque tamen sermonem esse, vox *cerebrum* aut *encephalon* videtur innuere. Sed et incertum aliquomodo videtur, utrum sanguinea vasa? num vero tenuiora denegat? per quae ultima spiritus fluere veteres arbitrati fuerunt. Nobis tamen videtur; dum dicit nil vasculosi in cerebro reperiri, id omne vasorum genus respicere, imo vero ipsa sanguinea vascula aperte corticali substantiae denegat *p. 27.*

At quid fuit illud, quod RUYSCHUS, quod ALBINUS in substantia cerebri corticali sua repleuerint cera? fueruntne vasa? an vero illi id falso perhibuerunt? an proprii nostri nos fefellere oculi, dum vasa in corticali substantia ceram descripsisse plus semel vidimus? Neque tamen corticalis substantia proprie ad cerebrum non pertinet. Et licet ponamus non pertinere; et cerebrum proprie vocandum esse medullarem substantiam; ne vel tum procedit assertum, quum manifesto vasa rubra in eadem inuenire quisque valebit. Falso itaque, nihil vasculosi in cerebro dari statuitur. An forte vasa haec, tot tantisque Viris observata, auctoris oculo se subduxerunt? num vero, subtili nimis ratiocinio, ad cerebrum vasa non pertinere posuerit? vix opinamur; de viscere enim si in genere sermo sit, agitur de omnibus partibus, ita et de encephalo differens, vasa excludere non licet. An itaque auctor innuit, praeter illa vasa, quae, ni in re feria ludere sit volupe, negari non possunt, reliquum, quod indolis obscurae et intricatae videtur, vasa non gerere aut vasculosum esse? Ita profecto. Et pro argumento adfert, quod mucosae naturae quid semper appareat. Quasi dicat, *cerebrum praeter vasa maiora, quae negare neque volo neque possum, si solvatur in aqua, vasculosam eam naturam, quam ipsi olim tribuerunt, non monstrat, quod etenim a vasis rubris colore differt, vitrea lente intuitum, mucosi quid tantum exhibet*. At iam quaestio est, an mucosum illud excludat naturam vasculosam? an cerebri in aqua maceratio, dum ea partes a se divellit, et dissolvit vincula, (quoniam mucosam indolem ad lentem exhibuit, vasa vero non demonstraverit. An, inquam, firmum dat argumentum cerebrum vasculosum non esse? Ut conclusio haec legitima foret, erat determinandum. 1) Quamdiu maceratio fuerit protracta? 2) Qua lentis specie utatur? an satis subiectum auxerit? 3) An non pelluciditas, quae in macerato datur, vasa diaphana oculo forte subduxerit? 4) Quid demum fuerit illud mucosum? an corpus inorganicum num vere organisatum? haec et alia plura notanda prius, si legitimam conclusionem inferre volueris. Adhaec, estne falsa argumentandi species? non video vasa, ergo non dantur! quis vidit unquam in magnete

vias, per quas materies magnetica vehitur? an tamen non dantur? quis in minutissimis infectis eorum vascula minima umquam oculis vidit? an tamen iis desituuntur? tenellus in ouulo embryo nulla vasa monstrat, imo ne quidem cor, si mature examen instituat, an tamen eo tempore iisdem caret? profecto si ullibi, hic sane inuocanda est analogia.

Verum recte veteres opinari scribit, dum cerebrum *parenchyma* vocant. Quid autem sit *parenchyma*; quidque veteres per illud intellexerint; satis superque notum. Verum, quomodo per rerum naturam fieri possit, ut in *parenchymate* oriantur vasa et membranae, quae organisationis indicia, difficillime conceptu est. Sique cerebrum sit *parenchyma*; qui sit, ut effusus extra vasa sanguis, qui veterum *parenchyma*, abs degeneratione albicet in cerebro? dum in hepate, liene et similibus veterum *parenchymatibus* rubet. Si sit cerebrum materies extra vasa fusa coagulataque; qui quaeso sit, ut in eo formentur eminentiae, ventriculi, septa, cavitates? in genere omnes illae organisationes et formae, in omni omnino homine constanti adeo lege obseruandae, quae omnem *parenchymatis* excludunt ideam. Si dixeris alteram partem altera citius coagulari, et ita eminentias formari et caua, intra coagulatas partes obuia, liquore tenuiore repleta; regeri forte posset, quare in tenellis infantibus idem aequae ac in decrepitis senibus obtineat? quare in quolibet subiecto, quouis vitae termino, simili fere se habeat inodo? quare non aliquando, in decrepitis saltem, haec desint, et vastum coagulum forment? Verum, videtur auctor hanc *parenchymatosam* cerebri fabricam ideo adsumsisse, ut phaenomena varia eo elegantius explicare et enucleare posset. Infirmam tamen esse veterum de *parenchymate* theoriam omnes omnino physiologi hodierni agnoscunt.

Liquorem ventriculorum auctor pag. II. miro modo deducit ex *substantia gelatinosa caseoso-mucosa cerebri*, quae bonam partem liquidi dimitteret, quae euaporari non poterat, quamque simplici modo in ea caua percolaret. Nititur haec theoria naturae cerebri substantiae, effusus enim et secretus liquor in cerebrum transformeretur, fluidior pars insensilis, mucosum corpus, debet condensari, ut sentiret. Ad illam condensationem requireretur, ut liquida pars separaretur. Quae dum nequit euaporari, ne coagulatio forte prohibeatur, hic ponitur segregari, et in ventriculos cerebri deponi.

Estne tamen potior eorum sententia (dum tota auctoris hypothesis unice insistit naturae cerebri *parenchymatosae*, iam dudum explosae) qui e vasculosis plexibus, in ventriculis cerebri obuiis, deriuant liquidum, quod includunt? Suntne nouissima VICQ D'AZYR tentamina, quae arterias hic venasque reuera dari confirmant? Nonne ut in reliquis cavitatibus, ita et in his, dum arteriae venaeque praesto sunt, analogice recte concluderetur, vaporem hic praesentem ab arteriis secerni? Nonne a munere venarum plexuum suspenso, aut arteriarum vi secernente aucta, aut sanguinis dyscrasia, quibus copia liquidi in his cauis augetur, desumenda potius ea hydrocephali species, quae in ventriculis sedem habet? quam ab istiusmodi liquido, quod ipsa cerebri substantia forte dimitteret. Neque tantum analogice ad ea concludimus. Quum HALLERI tentamina docent omnino ab arteriis oriri et venis resorberi illum, quem

ven.



ventriculi cerebri continent, fumum seu rorem aquosum. Dicit enim: *Ex arteriis eam aquulam exhalare manifestum est, siquidem tenuis liquor, in arterias impulsus, de omni ventriculorum superficie exsudat, quod experimentum saepe iteravi. Coloratas etiam, ut dixi, gelatinae ectypos in ventriculis saepe vidi, quando arterias replerem.*

*Neque obscurius idem humor in venas sorbetur. In magnos enim venosos truncos si aquam puram tinctamue, aut gluten in spiritu frumenti dissolutum egeris, nihilo obscurius de omni eadem superficie sudabit perspirabilis humor, quam per arterias exhalauerit.*

*Minime adeo dubium videtur, ut in pericardio, pleura, aliisque corporis humani caueis, ita in cerebri ventriculos, tenuem humorem perpetuo de arteriis exhalare, et perinde continuo per venas resumì, atque aliarum in universo corpore cauearum exemplum hic consentit.*

*Venarum vero officium quoties languet, solet autem in chronicis morbis languere, toties collectus mador in aquam colligitur, et mole etiam memorabili ventriculos cerebri descendit. Vid. A. v. HALLER Elem. Phys. Vol. IV. Lib. X. Sect. I. §. XIX. pag. 43 et 44.*

*Pag. 11. et 12. Auctor agit de motu cerebri, qui a respiratione pendet, quo scilicet in inspiratione aliquomodo deorsum, in expiratione sursum cederet. Hunc motum in cane observari dicit, ablata cranii portione, tum et in hominibus, quorum cranium fractum aut trepanatione apertum est, quique iterum mente constant. Hunc motum in clauso cranio forte plus minus magnum esse contendit, in infantibus ἐννεφρολαοκήλη laborantibus similem motum observasse meminit; hunc motum a respiratione esse autumat, eiusque in cerebrum efficaciam et vim exemplis arguit, desumptis ab aegris, qui tussientes, sternutantes, profunde inspirantes, dolorem vel sensationem in cerebro percipiunt; puellae casum adducit, quae tussi convulsiva laborans, sub tussiendo cicatricem a vulnere capitis, per sex menses iam coalito, superstitem dilacerarat iterum, et per vulnus cerebrum copiose ad II uncias expulerat: indicio manifesto, quod summa sit respirationis in encephalon vis et potentia.*

Auctor inprimis hunc cerebri motum hic memorat, et tot argumentis stabilire annititur, ut eo melius posset exponere propulsionem materiae cerebri, ad sensum motumque, sed inprimis ad nutritionem requisitae.

Notamus tamen *primo*. Quod de illo cerebri motu, licet quidem non ita de illius usu, fuse satis sit scriptum ab HALLERO *Vol. IV. Elem. Phys. Lib. X. Sect. V. §. XXXVIII. et seq.* et *Memoires sur l'irritabilité etc. Vol. I. Sect. IV. p. m. 158. et seq.* tum et MARHERO in *Praelect. Vol. II. pag. 344.* et passim ab aliis. De usu vero illius motus, ne mireris, non ita differuisse, quum reuera ille non videtur naturaliter obtinere.

Concedunt omnes omnino Physiologi in nonnullis casibus, in vulneribus v. g. partem cranii insignem auferentibus, et quae pluribus aliis consimilibus, omnino observari talem cerebri motum, quo fit, ut in inspiratione subsideat, in expiratione adfurgat. Verum, motum illum non naturalem existere sequentibus probare conantur.

1. Ille motus non apparet in experimentis, nisi cranii pars maior fuerit ablata, et dura mater a cranio fuerit separata; verum ablato cranio, aufertur in ea parte resistentia, neque iam coercetur encephalon. Non mirum ergo est, maiori sanguinis copia sub experimento ad illam cerebri partem pulsa, cerebrum eleuari. Nulla iam, ablatis ossibus, posita resistentia, nisi quae a dura matre fit.

2. In animalibus aut aegris, in quibus hoc phaenomenon apparet, respiratio, si ad eam probe attendamus, profundior et anxia magis est. Qua sanguinis motus intenditur versus omnes partes, proin et in cerebrum, quo illud iam ab omni pressione liberum adscendit. Neque tamen hinc inferre licet, idem etiam fieri in encephalo, suis undique ossibus coercito, semperque pleno, quod fit in eodem, fracta caluaria, et aucto, quo continetur, receptaculo. Nam quod reuera a resistentia cranii in his casibus ablata, non vero a naturali quadam conditione fit ille cerebri motus, inde patet, quod, si exigua cranii particula auferatur, tantae tamen magnitudinis, ut duram matrem visui obferat, ille motus non obseruatur. Verum necesse est, ut amplissimo foramine caluariae vulnus pateat, teste HALLERO. Iam vero, si ille motus cerebri sit naturalis, inque clauso cranio aequae obtineat quam in integro; qui quae fit, ut attenti in phaenomenon obseruatores eum non viderint in exigua plaga, omnino vero in ampliori. Oportet autem, si ille motus vere semper detur, ut aequae in minore quam in maiore caluariae plaga conspiciendum se praebeat. Atqui vero in minore plaga resistentia cranii habetur, et nullus motus cerebri; (nisi forte pulsatorius artieriarum.) In maiore cranii iactura resistentia cranii sublata est, conspiciturque motus; estne itaque a resistentia, in plaga maiore ablata, quod cerebrum a sanguine, impetuosius ad locum, a pressione iam liberum, adacto, in expiratione prematur extrorsum? Imo vero, ab hac resistentia minore aut sublata hunc motum cerebri pendere, ulterius patet, si dura mater vulneretur. Tum enim cerebrum per vulnus expellitur et in fungosas quasi excrescentias degenerat. Quae phaenomēna unice oriuntur a sanguine praeter naturam in locum minus resistentem cum vi adacto, praecise ut in faucibus nonnullis artieriarum tunicis oritur aneurisma a sanguine in interiores tunicas premente.

Adhaec, necdum sufficit ad motum illum cerebri conspiciendum, cranii tantum magnam portionem abstulisse. Verum accedere debet durae matris siue digitorum ope siue vi laedente a cranio separatio: caeterum enim nullus plane encephali motus obseruatur. Qui tamen obseruaretur in amplo vulnere, si vere semper obtineret. Praeterea encephali plenitudo exacta, firma durae matris ad cranium adhaesio, in statu naturali nullam encephali eleuationem aut subsidientiam permittit. Eleuari enim nequit, quum duram matrem proxime tangit, subsidere non valet, quum vasorum et membranarum ope eidem sit alligatum.

Non interim miramur, in his casibus motum talem obseruari, qui se ad respirationem accommodat. Eo enim tempore quo inspiramus, dextrum aut anterius cor se exonerat; venae iugulares sanguinem suum effundunt in atrium venosum anterius; hinc sanguis ab encephalo desertur; hinc illud subsidet. In expiratione vero, pulmo collapsus minus sanguinis recipit; venae iugulares non possunt a suo sanguine liberari,



liberari, dum cor antea suum non expellit. Congeritur itaque sanguis in vasis encephali, quae inde distenduntur, et cerebrum turget. Iino vero, in expiratione sanguis ab auricula dextra in venas cauas earumque ramos quasi repellitur, quo de nouo sanguini calcar additur, et in venis encephali copiosius colligitur: ex HALLERO MARHER.

Hic vero motus sanguinis non nisi in respiratione non naturali, in tali, quae in vulneratis his obseruatur anxia et profunda, obtinet. In placida vero et naturali vix aut ne vix quidem conspicitur. Saltem non ultra diametrum vascula eleuare leuior congestio valet. Concludendum itaque:

1. Motum illum alternum cerebri in animalibus aut hominibus cranio vulneratis, obseruatum, omnino quidem a respiratione pendere, sed praeter naturam produci, neque nisi omni fere ablata cranii resistentia conspici.

2. Eum motum in pleno integroque cranio nequidem esse possibilem, saltem difficillimum.

Eum tantum produci, ubi vulneri calvariae grauiori, ut assolet, iungitur respiratio difficilis et anxia, non vero conspici cum respiratione placida.

Et haec quidem fusc adeo erant pertractanda, ut dein responderi posset ad effectum, quem inde deduxit auctor. Ex his quoque facile intelligitur, quid de motu illo cerebri in *ἐνκεφαλοκήλη* sit dicendum. Ponitur enim in hoc vitio ossium cranii defectus vel mollities praeternaturalis. Quo resistentia minor, cerebri in hunc locum pressio, et maior sanguinis influxus.

Quod vero in *tussientibus* etc. in cerebro dolor aut ingrata sensatio oriatur, quid miramur? In his enim casibus cum expiratione violenta sanguis cum vi versus caput pellitur. Unde partes in cranio premuntur, quo dolor. Maioremque reuera congestionem factam fuisse intra calvariam, docet faciei rubor et tumor. Arguit oculorum, ut aiunt, scintillatio. Inde vero tantum sequitur, quod a fortiori expiratione cerebrum patiatur,

Atque similiter erit respondendum ad casum puellae, cuius mentionem supra iiecimus. Opinamur itaque, influxum respirationis in motum cerebri in naturali et placida respiratione vix obtinere, ut sensibilem quemdam effectum inde fortiaris. Omnino tamen, in expiratione sanguinem in capite aliquomodo congeri, in inspiratione expelli, ponendum. Verum, utrum inde notabilis adeo motus exspectandus, cui auctor tantum tribuit conceditque, ut ex eo materiei cerebrialis, humorisque nutritii per nervos propulsio explicari posset? merito quaesueris. Leuissimus enim ille totius encephali motus, vix aequiparari potest resistentiis, quas millenae causae nervis continuo mouent.

Progreditur auctor *pag. 13. et seq.* ad sensum cerebri. Recte omnino duram matrem insensibilem habet; si vero cerebrum pungatur, secetur aut conquassetur, quin imo pars auferatur, animal aequè minus inde patitur, quam ubi dura mater conuellitur. Imo laete viuit et satis subito apto regimine conualescit. In hominibus simile quid obseruatur in vulneribus cranii, ubi iacturam patitur cerebrum. Quin et heterogenea impune in cerebro feruntur: et ulcerationes profundae per sectiones profundio-

res fuerunt sanatae. Ex omnibus his, si recte auctoris mentem capio, tantum concludendum, sensum in cerebro non ubique dari, corticalem substantiam non sentire; neque medullarem in omni suo puncto. Verumtamen, si in cane profunde aliquomodo adigatur laedens instrumentum, tum dolor oritur a convulsione aut paralyfi excipiendus.

Sed quae ratio cerebrum in hoc loco sentire, in alio non ita? Respondet auctor, quod *gelatinosa substantia cerebri tum evadat sensilis, ubi ex fluidiori statu in densiorem aliquomodo; medullarem, siue corpus lanuginosum aut spongiosum (Donsaartig) unde medulla oblongata et spinalis cum nervis oriuntur, abierit.*

Verissimum est effatum, corticalem cerebri substantiam non sentire. Nullum, saltem minimum sensum inuolucra encephali et membranas possidere. Sensu vero gaudere medullarem substantiam, inprimis ad medullam oblongatam, spinalem et nervorum origines. At, qua in re proprie ille sensus consistat, huc usque latet. Si que recte diuinaverim, in aeternum fortassis latebit. Illum vero sensum in medulla haerere, quae esset gelatinosa cerebri substantia in densiorem medullam vel corpus spongiosum mutata, miri quid videtur inuoluere. Sique bene iudicauerim, haec auctoris de cerebri fabrica coniecturatio ne vel hilum probabilis continet.

Equidem contendo dari in cerebro vasa, et ex iis, si non in totum, magnam tamen partem, substantiam corticalem componi. Opinor in medullari substantia quoque vera decurrere vasa. Quae utrum in eandem terminentur, num secus? utrum in eadem calorem conseruent vel aliud quid praestent? non determinare ausim. Dari tamen autopsia monet.

Quae vero sit proxima medullae cerebri fabrica, me ignorare ingenue fateor. Utrum etenim tota sit vasculosa? utrum sit solida aut alius structurae? non determino. Eandem vero oriri e materiei gelatinosae cerebri fluidioris condensatione in corpus firmitus, compactius, lanuginosum aut spongiosum, sequentibus motus rationibus mihi persuadere vix possum.

1. Si origo medullaris cerebri substantiae sit quaerenda in condensatione partis gelatinosae cerebri; necesse est, ut alia cerebri pars sit fluidior, alia densior. Fluidior aut saltem minus consistens pars cerebri est corticalis substantia. Densior est medullaris. Atqui substantia corticalis, si non in totum, saltem maximam partem, vere vasculosa est. Quod reliquum superest non vasculosum, est forte, qui vasa ordinat, cellularis textus. Non vero gelatinosi quid monstrat. Est ad tactum molle, unctuosum; digitis facile destruendum. At idem fere in testibus obtinet, quorum tamen minima vascula, subtilissima, haud ita facile denegaueris. Substantia itaque cerebri fluidior vasculosa est, non gelatinosa. Quo pacto itaque concentrari, et condensari mihi fingerem? Verum, an forte medulla ipsa duplicem hanc naturam possideret? ita ut, ubi corticalem substantiam spectat, sit fluidior gelatinosa, densior vero et compactior ubi ad centrum cerebri propius accedit. Non facile crediderim ita ratiocinari posse. Quum sole clarius sit medullarem cerebri substantiam ubique aequae consistenter, tam in centro ovali toto, quam ad pontem Varolii aut medullam oblongatam: saltem, si quae forte sit quoad consistentiam differentia, illa erit perquam exigua.



gua. Quo pacto itaque *auctoris* verba accipiam? quum cerebrum non sit gelatinosum, ubi fluidius est, at vasculosum. Unde non facile condensatam medullam deduxeris. Verum

2. Ne quidem possibile est partem cerebri aliam fluidiorem posse existeri, aliam vero densiorem inde formari. Compactioremque esse ad cerebri centrum, fluidiorem ad cerebri extimam superficiem. Quod enim ita *auctor* fabricam cerebri sibi fingat, fere coniecero ex illis experimentis, quae ut locum sensus, ipsiusque sedem determinaret, instituit. In illis quippe laedens instrumentum nullum sensum detegebat aut excitabat, ubi superficiem cerebri irritauerat aut leuiter sauciauerat. Omnino vero, ubi profundius adactum densiorem medullam offendeat. Atque hoc effatum ita quidem euincere annitar.

Si cerebri substantiae pars altera sit fluidior, gelatinosa; altera densior medullaris, qui quaeso fit, ut substantia haec gelatinosa suam fluiditatem deponat et condensetur? Scio equidem *auctorem* posuisse, medullarem substantiam de se dimittere aquam, lympham tenuiorem, eamque intra cerebri cavitates deponere; aut, nescio quo modo, euaporare aut percolare. Ast, hanc coniecturam infirmam maxime et claudicantem esse, supra eruisse videar. Quum alia longe sit origo liquidi ventriculorum cerebri. Erantne arteriae choroidei plexus, quae illud vaporis forma exhalant? An liquidum ventriculorum cerebri fluidum vere et condensatum obseruatur, si cum viuento animali periculum instituitur? An notabilis est cavitas ventriculorum cerebri in homine viuento? negant id plurimi neque abs omni iure. Estne, ut in reliquis *C. H.* cauis vapor tantum, quem exiguum eorum cauum continet? Atqui tamen cerebrum si condensetur, non vaporem, sed veri nominis liquidum dimittere ponitur. Estne proin tota illa speculatio summe infida? An forte menstruum aliquod coagulans aderit? vix opinamur. An itaque vasorum ope, quae partem gelatinosam in superficie tangunt, absorbetur tenuior pars? quo reliquum condensaretur, vix probabile. Nam siue posueris gelatinosam cerebri substantiam esse ipsius corticem; quod tamen dubium, siue adsumseris praeter corticem cerebri in ipsa medullari substantia duplicem dari materiem, tenuiorem *gelatinosam*, densiorem proprie *medullarem* dictam, perinde est, quum in neutro casu tanta fieri possit condensatio; si omnino ulla? quanta requireretur: etiamsi posueris, de gelatinosa materie per venas quid resorberi.

Si adsumseris fluidiorem cerebri substantiam gelatinosam esse corticem; erunt vel vasa durae matris, vel piaae, quae eam secernunt atque absorbent; si posueris in medulla ipsa duplicem dari substantiam, tenuiorem aliam, aliam densiorem; erunt corticis arteriae quae lympham plorant, venae quae condensationis ergo resorbent. At ex *auctoris* mente cum veteribus cerebrum est parenchyma; in prima itaque sua origine uniformem, aequabilem, aequae fluidam substantiam habuerit oportet: quum condensari non poterit; nisi deposita fluidiori parte: attamen in ventriculos cerebri non deponi vidimus; requiritur itaque, ut per vasa absorbeatur; quum tertia via certo nondum demonstrata sit.

Vasa vero in tenello embryone nondum agunt ante eorum euolutionem; oportet itaque, ut hoc vitae stadio cerebrum uniformem, aequae fluidam naturam habeat, in quo nihil inuenies quod altero sit compactius. Ut itaque condensetur gelatinosa substantia, et sentiens medulla formetur, requiritur, ut liquidum per vasa venosa reuehatur. Ponamus iam illa euolui et resorptionis munere defungi; quid itaque resorbent? Estne illud liquidum, quod eorum osculis proximum? profecto videtur. Verum estne secretio absorptioni naturaliter proportionata? ita est. Nonne itaque praecise tantum aduehunt separantque arteriae? quantum resorbetur. Quomodo itaque liquidum cerebrum poterit condensari? adhaec, primum videntur in viuificatione cor et arteriae agere, dein venae. Poterunt itaque arteriae iam aliquid liquidi adduxisse, antequam venae quid resorperint; idcirco semper esset fluidi nimia abundantia, ut pateretur aut admitteret condensationem. Verum, hic forte quis reget exempla varia absorptionis et condensationis humorum in nostro corpore passim obseruanda; e quibus sibi videntur tuto inferri posse, et in cerebro talem condensationem fieri. Ita fortassis prouocarent ad seminis in suis vesiculis inspissationem; verum Nos non ferit illa obiectio. Quum seminis illa inspissatio non obtineat in ipso organo secretorio, teste scilicet, at in alio receptaculo, intra quod natura arterias pauciores, numerosiores vero et copiosiores venas apertas voluit, ut inspissari possit. At in cranio ipsum habetur organi secretorii cauum, in quod plurimae patent arteriae, multae quoque venae, sed in ratione arteriarum minus copiosae, saltem non copiosiores; a quibus proin absorptio tanta exspectari nequit. Adhaec, nullum certum argumentum potest adduci, quo probatur, quod in proprio colo humores a sola inspissentur absorptione; quod enim a cerumine, mucos, in propriis colis inspissatis deducitur, non id probat quod probandum; quum et per emunctoria sua in aërem libere perspirent materiem subtiliorem, aut in caua maiora dimittant. Neque tamen cerebro patet in aërem via, quantum saltem scio; neque in alia caua aditus, per quem subtiliorem partem deponi certo est euictum.

Neque bilem pro exemplo adduxisse iuuat, quum in proprio colo non condensetur, at in vesicula fellea, ubi morari natura voluit, ut copiosiores venae plus absorberent, quam arteriae pauciores dimittunt. Adhaec, per ipsos vesiculae felleae poros discutitur diffilaturque tenuior bilis portio, id quod coli intestini biliosus color manifeste euincit.

Non itaque ex his, quae adduximus, gelatinosae materiei cerebri fluidioris in medullarem condensationem et inspissationem euictam opinamur. Eam proin, quum nequidem probabilem tantum sistat coniecturam, amplecti non valemus.

*Pag. 19.* Auctor de medulla oblongata et neruis agit, quae ipsi videntur omnino quidem vasa esse, at non caua aut ex capillaribus vasculis formata. Verum subtili quasi repleta medulla, a spinali medulla oriunda, aptaque, ut cum gelatinosa cerebri substantia ad omnes partes vehatur, et quemadmodum per arterias sanguis, ita per neruos substantia cerebri, quasi per vasa cerebralia, moueretur.

Substantia mucosa aut gelatinosa cerebri, quae intra cranium haeret, condensationis ope fieret medulla. In neruis inseruiet, ad medullam teneram, lanuginosam  
neruo-



nervorum materiem, alendam et contra iniurias defendendam; talem autem substantiam per nervos omnino veli ligaturas docuisse asserit. Veruntamen, licet nervorum veram fabricam, aequè minus ac illam medullae cerebri hucusque demonstratam puto, statuo tamen, e cerebri substantia eos formari, atque illud medullare, quod in nervis haeret, sensui motuique inferuire reor. Pono praeter substantiam cerebri medullarem et aliam materiem, quam intra nervorum vaginas, aut si inavis inuolucra, reconditam esse opinor; quamque cum COTUNNIO lymphaticam habeo; quae quoque manifeste apparet intra medullae spinalis inuolucra; in primis ad caudam ita dictam equinam. Crediderim, hanc lympham nervorum medullam cingere et si rite sit constituta defendere, praecipuis ubi nudos fere decurrere nervos iurares. Forte et inde nervorum medulla proprie quid accipit. Quod prius ipsi praestat usum. Statuo cum COTUNNIO, hunc liquorem acrem redditum, aut alio modo degeneratum, varios in nervis morbos producere. Non verò opinor dari materiem quamdam mucosam aut gelatinosam cerebri, ni pro eadem habueris lympham modo memoratam. Neque hanc materiem, gelatinosam cerebri esse, quae super fibras musculares et alias corporis partes effusa dicitur. Verum eam aliunde ortam et per arterias adductam fuisse credo. Eius vero indolem esse lymphaticam, hinc inde forte oleosis particulis nuptam opinor. Unde unctiosa est et aliquomodo ex griseo albescit.

Neque tumorem nervorum post ligaturam pro argumento habeas velim; quod materies quaedam cerebralis per eosdem descenderet. Quum una eademque ligatura non tantum materiei cerebri, si reapse illa deolveretur, obicem ponat. Verum inuolucra ligando, eorum quoque vasa generis diuersi intercipis, et liquidis, quae continent vehuntue, moram iniicis. Adhaec, materies lymphatica, quae nervorum inuolucris et medullari eorum substantiae intermedia est, hac ligatura in suo decursu sistitur; sensim sensimque colligitur propter lentiores illius secretionem, atque hinc illa, quae vincula nervorum excipit, intumescit: neque materiem cerebri per nervos respirationis beneficio deolui credideris; quum illius in cerebrum vis et efficacia, si placida sit et naturalis, cum clauso cranio, non obtineat; saltem vim illam exiguam adeo esse, ut tot numero et tantas, quas nervi offendunt pressiones et resistentias, vix aut ne vix quidem vincere valeat.

*Pag. 26. ex auctoris mente sequeretur, cerebrum per uniuersum corpus diffusum esse. Nititur haec hypothesis fabricae cerebri et effuso liquori cerebrali; qui, ut musculares fibras, ita et reliquas partes inungeret. At ultimum illud non ita verum esse supra demonstraui; eatenus itaque totum negamus. Ab altera vero parte concedimus, certo quodam sensu, omnino cerebrum per nervos, ubicumque illi dantur, in toto corpore adesse, modo memores simus proprie cerebrum vocari, quod caluariæ includitur, viscus.*

*Pag. 27. Corticali substantiae cerebri naturam glandulosam et vascularem aperte denegat, eamque mollem unctuosam, vix aut ne vix organisatam, albam medullarem includentem, pronunciat. Dicit enim, notum est, MALPIGHIUM corticem cerebri glandulosum, RUYSCHIIUM vascularem vocasse. At controuersa illa; quoniam neque unum, neque alterum obtinet, ab ipso BOERHAVIO non fuit decisa etc.*

*Ludwig script. neur. min. T. IV.*

G g

At

At miramur auctorem illud, quod oculus videt, manus tangit, quod analogia suadet et pericula confirmant, quod omnibus, ut ita dicam, sensibus percipimus, aperte denegare aut saltem in dubium vocare. Quare etenim vix organisata dicitur corticalis cerebri substantia? quae omnino organisata est. Aut, si cerebri cortex organici nihil contineat, profecto fateor me dubitare, utrum quidem totum humanum corpus sit organisatum? At, nonne sibi contrariatur auctor? dum organici quid parenchymati hoc loco tribuit, quod alibi illi denegat? Nonne organici quid omnem parenchymatis ideam excludit? ita demum homines sumus.

Progreditur auctor pag. 28. ad diluenda eorum argumenta, qui ex eo, quod cerebrum in uniuerso adest corpore, forte concluderent animam itidem per totum corpus diffusam esse. Quodque proin, aliqua corporis parte mutilata, simul animae portio auferatur. Verum, utrum metaphysicum hic aequae feliciter agit auctor, quam assolet chirurgum agere, forte dubitaueris. Regeat enim, si ponas in cerebro animam haerere, et portionem cerebri abscindas, simul partem animae demeres. Quasi vero sententiae illius patroni, qui in encephalo animam residere autumant, quoque statuunt, illud immateriale per totum cerebrum esse dispersum.

Sed properat auctor ad neruorum praesidia et usum, quem pag. 30. aperte nutritioni, sensui, motuique dicatum proclamat. Videamus, quae pro hac sententia adducit, argumenta.

1. Si experient. viri mentem recte capio, argumentum, quod hoc numero adducitur, huc rediret.

*Exstirpato neruo prius sensus et motus partis perit, dein emaciatur; si vero arteria praescindatur, ligetur, comprimatur aut alia quadam causa laedatur, statim partis vita perit moriturque. Ergo ab arteria vita, a neruo nutritio pendet.*

Verum, quum VALSALVA, HALLERUS, BRÜNN, quanta nomina! contrarium obseruarint, videtur ex omnibus his sequi, quod neruorum integritas ad nutritionem requiratur, non vero, quod ea ab iisdem proxime dependeat.

2. Hoc argumentum, quod ab hemiplegia et emaciatione partium desumitur, quae conuulsiones infecuta sunt, ne hilum euincit. Docet enim tantum, quod neruorum actio requiratur ad nutritionem, minime vero infert ipsos actu nutrire. Nam licet emaciatio corporis obtinuerit; licet arteriae sanguinis sufficientem quantitatem ad partes aduehant; quaestio tamen erit, utrum ille sanguis bonus fuerit et laudabilis? utrum forte a morbi causis praegressis, aut praesentibus, aut aegri diaeta, morbiue taedio ab infantia ad usque adultam aetatem et ultra durantis, cuius vix ulla curandi spes affulget, utrumne haec sanguinis crassa furtim inuerferint? Quo fit, ut partes hae, accedente neruorum labe, sublato eorum influio, emaciatas et consumptas fuerint. Adhaec, an certum est quod de sanguine hic fertur iudicium? Potuitne in maioribus vasis sufficiens quantitas dari? Quin tamen minima vascula vix sanguinem contineant: suntne praegressae conuulsiones, quae partes maxime vexauerant, instrumenta, mediaque efficacissima, quibus sanguinis circulus in intimis partium recessibus fuerit inuersus? Quum ossa, ut cum Praeceptore Aestumatissimo Cel. OOSTERDYK SCHACHT loquar, arteriae, penae, nerui, glandulae vel comprimuntur vel disrumpuntur.



puntur. Suntne haec, maximi convulsionum nocummenti argumenta? quibus non tantum nervos, sed durissima ossa, sed arterias venasque, maxime pati *Venerandus Senex* testatur. Quid itaque? si ab earum functione laesa nutritio vitietur, infirmetur. Attamen, nec praeteriunda ipsa auctoris verba, dicit enim, *sanguinis circuitum saltem ad eius emaciationem fere eundem manere*. En itaque, quid miraris nutritionem depravari? quum ipse sanguinis circuitus inuertitur; quid miri, si liquidi nutrientis necessaria quantitas ad rite alendum defecerit? ubi sanguis non, uti oportet, partes alluit.

3. Quod a spina bifida desumitur argumentum, nostro quidem iudicio vix quid euincit; dum ratio phaenomeni eadem plane est. Nervorum quippe illud laesum est imperium, quo vasorum actionem determinant, quinimo, in illis infantibus tota humorum massa et crasis vitata est; neque in sanguine particulae nutriendo satis aptae; atque inde quoque est quod extenuantur. Minus verò emaciari partes, quae supra tumorem haerent, non miramur, quum in illas nervorum imperium adhuc illaesum superest, vel saltem non ita graviter affectum: infra vero tumorem deest illud nervorum imperium, sanguinis interim crasis vitata; cui forte vasorum aliqua accedit pressio, qua sanguinem minori copia aduehant.

4. Ad hoc argumentum valet responsum, quod in alterum Veterum argumentum supra tradidimus.

5. Quod hoc numero attulimus argumentum erit diluendum observatis, quae primam partium evolutionem in embryo spectant, e quibus manifestum erit, cerebrum non omnino primum perfici, ut inde reliquae partes possent nutriri et evolui. Quae enim corporis partes in germine humano, quod matrem continere plurimis arripit, omnium primo, *Summi Nostri Conditoris* iussu, formentur, nemini hucusque patefactum existimamus. Hac de re itaque non litigemus, de partium evolutione tantum dicturi.

Constat enim ex fidelissimis et accuratissimis, HALLERI inprimis, observationibus, quod primordia foetus sequenti modo in ovis incubatis se habeant.

Nempe, duodecima ab incubatu hora, foetus primum conspiciendum se praebet, et praeter caput caudamque, h. e., praeter partem crassiorem et graciliorem nihil cernitur. Quin imo in iis partibus, quae apparent, nihil distincti se offert. Hora septuagesima caput mutatum apparet, et alae conspiciuntur. Iamque in capite binae exiguae vesiculae pro cerebro deprehenduntur, et similis una pro rostro, una pro fronte, una pro occipite.

Post dies IV hepar valde mucosum conspicitur. Hora CXX, seu V elapsis diebus cerebrum totum fluidum observatur, dum reliquae partes corporis teneriores existunt. Contra vero prima vestigia cordis iam iam pulsantis, albidum, pellucidum hora XLVIII, ergo LXXII horis citius quam cerebrum visui se offert. Oportet autem hora XLVIII iam nonnulla adfuisse vascula, caeterum irritum et superuacaneum fuisset cordis pulsantis molimen. Non itaque inferre licet corpus a cerebro fuisse nutritum, quia illud prius evolueretur. Quum ex dictis liquet cor longe citius perfectionem acquisivisse quam cerebrum. Et tunc iam humores circumduxisse, ubi natura

ne quidem de cerebri euolutione videbatur somniare. *Vid. MARHER. Vol. III. praelect. p. 12 et 655.*

Imo vero licet XII ab incubatu hora caput caudaque iam conspiciantur: tamen exinde non sequitur, cor eo tempore nondum fuisse euolutum. Etenim, quum pellucens cor pellucidos vehebat humores, hinc facile prae nimia sua pelluciditate oculis se subducere potuit. Licet reuera et adfuerit et forte iam pulsauerit. Et quamquam caput XII hora se visui offerat; ex eo tamen non profluit cerebrum actu esse euolutum, qua de re omnino quaeritur. Conspicitur etenim thorax omnino ante pulmones thorace contentos. Concludendum itaque, quod argumentum hoc auctoris admodum sit imbecille, neque probare embryonis euolutionem et nutritionem a cerebro esse. Quum non tantum serius euoluitur, verum cor longe citius quam encephalon perficitur. Hinc potiori iure concluditur, a corde materiem nutrititiā partibus per vascula subministrari.

At non tantum in ouiparis certum est cor ante cerebrum euolui. Verum et in viuiparis animantibus, in oue v. g., idem obseruatur. In ea enim ad undeuicesimum diem inconspicuus foetus est. Hoc vero die apparet vermiculo similis, lunatus, capite pene bisido, ad caudam contracto, cum suo funiculo. Caput vero imperfectum est. Neque cerebrum euolutum. Sed spatio unius diei ex inconspicuo videndum se praebet cor vere pulsans, et rubro sanguine plenum. Qui quaeso iam fit, ut sanguinem vere rubrum intra angustum adeo temporis spatium accipiat? An cerebrum solum tantum nutrimenti adduxit, quo cor euolutum sanguinem rubrum sibi parare potuit? vix videtur, quum ipso hoc tempore ne quidem encephalon conspiciatur. Verum, addamus alia, quae forte magis rem illustrabunt.

Si per momentum adsumferis cerebrum omnibus partibus citius euolui, et nutritionem partium earumque euolutionem efficere; mox quaestio oritur, quomodo fieri possit ut cerebrum huic muneri inferuiat? omnes corporis partes, cerebrum, cor, reliqua in germine primordiali reuera praeexistunt, et euolutione ac incremento tantum indigent. Si iam cum auctore ponas cerebrum esse, quod euolutionem partium peragit; omnino et cum eodem ponendum, eo munere per suam substantiam nutriendam defungi. Adsumendum insuper est, quod illud materiale in primordiali germine praeexistat. Caeterum enim, si dein formari contenderis, in absurdum ingens incideres. Iam vero, si cerebri materies nutriens praeexistat; illa euolutio, illud partium incrementum fieri non poterit, nisi dimissa a cerebro nutrititia materie. Verum si de cerebro hucusque exiguae molis materies nutriens decedat; si illa sit, quae unius diei spatio tantas in tenello embryone mutationes producit, certum est, quod totum cerebrum pene consumptum esset, et misellus embryo necessario periret antequam ad euolutionis perfectioris culmen peruenire potuerat.

Nam vasa, quae encephalon petunt, materiem sufficientem pro cerebri sustentatione non potuerunt adferre, quum nondum erant euoluta. Neque cor humores poterat adferre, quum a cerebro erat euoluendum. Adeoque, consumpto cerebro, oborta materiei nutriendae penuria, de vita embryonis esset actum.

Ex



Ex omnibus his, meo iudicio, liquet cerebrum non esse, quod prius evolutum partes nutrit et evolvit.

6. Quod ex capitis post partum decremento et reliquarum partium incremento a respirationis in cerebrum efficacia deducitur argumentum, non maiorem vim possidere videtur, quam quod modo discussimus. Nam

1. Phaenomenon illud neque certum est, neque semper obtinet, quo proin argumentum inde deductum non maioris est ponderis. Si enim natura ideo foetui maius dedisset caput, ut, quamdiu in utero haeret, sibi nutrimentum inde posset parare et colligere, quod, ubi in vias prodiit auras, respirationis beneficio per totum corpus; reliquarum partium incrementi et nutritionis ergo, diffunderetur. Certe semper et indiscriminatim hoc phaenomenon conspiceretur. Quod tamen minime verum. At

2. Alia longe phaenomeni ratio est. Quum enim foetus in utero ultimis gravitatis terminis soleat capite suo orificio uteri insistere, necessario aliter fieri non potest, quin humores maiori copia versus calvariam determinentur in externis aequae ac intimis cranii recessibus. Hinc necessario volumen capitis augetur et infantes cum capite solito maiore nascuntur. Ubi vero in lucem emissus foetus est, mutatur corporis situs et humorum congestio in capite cessat, imo fit reuulsio; hinc caput volumine minuitur. Mutatio autem illa serius ocus accedit, prouti per maius aut minus temporis intervallum in utero, capite deorsum spectante, foetus haeserit. Atque haec ratio, quare iam spatio VI. VII. VIII. dierum manifesta capitis, quoad volumen, immutatio observatur: iam vero per XII, XIII et ultra dies immutatum fere perstat. Arguitne hanc nostram coniecturam anatome?

Et haec quidem de ipsius phaenomeni explicatione. Verum iam quaestio est, qui fiat, quod illa mutatio non in omnibus omnino infantibus aequae obtineat? At, qui in physiologicis et arte obstetricia vel levissime tantum versatus est, nullum hic inveniet scrupulum. Non eodem enim modo foetus in utero semper haeret. Iam capiti insistit orificio uteri; iam vero abdomine eidem incumbit, capite alterutrum latus superiora versus spectante; iam iterum clunibus insidet, capite sursum directo; in quibus casibus nulla fere congestio fieri potest, hinc nec magno capite instructi tales infantes nascuntur.

Suspicio itaque, qua in re utrum omnino recte iudicaverim? non determino. Utrumne illi casus, in quibus cum maiore capite nascuntur infantes, tum tantum obtineant, ubi capite suo uteri orificio perpendiculariter fere insisterunt?

Non vero tale quid conspici, ubi alium a priori hoc diversissimum aut plane oppositum habuerunt. Unde fit, quod aliquando illud phaenomenon conspiciatur, aliquando non ita.

Quod autem attinet ad alteram argumenti partem, nempe incrementum partium maius, post capitis decrementum, a respiratione, cerebri materiem per nervos protrudente, desumptum, quisque perspicit illa firmo adeo talo non inniti, quin physiologice demonstrari posset, aliam longe esse causam et rationem illius partium reliquarum evolutionis et incrementi, etiamsi capitis cerebrique subsidentiam insequatur.

Nempe totum auctori damus, quod post foetus natiuitatem, cum capitis aliquando quoad volumen imminutione, postquam foetus aliquoties respirauerit, reliquae partes vegetiores increscant et nutriantur. Illud vero non a cerebri materia nutrititia, respirationis ope ad partes promouenda, at ab alia longe causa dependet. Id quod sequentibus probare annitemur.

Dum in vias auras prodiit foetus, aërem solet prima vice haurire et de nouo expellere, idque per omne vitae curriculum alternis repetit. Funiculo umbilicali, dum nascitur, iniicitur, vinculum; et nutrimentum suum iam de sinu materno mox accepturus est. Verum, his mutationibus varia in tenello corpore subuertuntur. Circulatio sanguinis alio alioque procedit modo. Quaeque antea, tum propter corporis situm, tum propter reuulsionem, vix vitale liquidum accepere partes. Hae, ligatis iam arteriis umbilicalibus, praeclosa via reuulsoria, iam maiorem sanguinis copiam, et proin plus materiae nutrititiae recipiunt. Unde melius nutriuntur et increscunt. Atque inde patet ratio, quare artus inprimis inferiores laetius iam excrescant, absque quod cerebri materiem nutrientem inuocemus.

At, ligatis de industria vasis umbilicalibus, omnis sanguis, qui caeterum ad placentam vehi consueuerat, iam totus quantus intra vasa foetus remanet et circulator. Vasa haec magis magisque distendit, et ea iam describere valet, quae hucusque nondum permearat. Atque inde totum corpus postmodum increscit.

Respirationis quippe beneficio chylus promptius mutatur in sanguinem. Cordis vasorumque actio, qua materiem ad penitiores urgent recessus, fit validior. Maiorem porro nutrimenti copiam ingurgitat foetus. Quibus omnibus fit, ut chylus generetur copiosior et sanguis copia abundans, quo corporis partium incrementum et euolutio.

Quibus omnibus si addideris eas, quas breuitati studentes forte omiserimus, potentias. Non immerito concluderis a corde et sanguine aliisque causis concurrentibus nutritionem et incrementum corporis foetus post natiuitatem, etiam si subsideat caput, esse desumenda. Non vero a materia quadam nutriente cerebri, respirando ad partes pro nutritione per neruos deuoluenda.

Verum, liceat his alia addere, quae tum in huius, quod iam pertractamus, argumenti, tum aliorum, iam supra traditorum aut postea exhibendorum gratiam hic notare utile duximus.

Nempe auctor statuit materiem cerebri duplicem pro sensu, motu, et nutritione ad corporis partes per vasa ita dicta cerebralia propelli. Ut vero hanc propulsionem nobis persuadeat, respirationis utitur mechanismo, qua, ut supra vidimus, cerebrum inuouetur et sic in neruos et per illos ad partes influeret et propelleretur materies nutrititia. Iam quaeso, ut per momentum auctori totum concedas, aequae quoad cerebri structuram quam respirationis efficaciam. Et, ni ego vehementer hallucinor, totam hypothesin de nutritione cerebri et neruorum materiali infirmam, quin pene dixerim falsam esse, ex sequentibus patefcet. Si cerebrum reuera nutritioni inferuiat; si materies cerebri nutriendi scopo per vasa ita dicta cerebralia, i. e., per neruos ad partes fit deuoluenda; si causa propellens materiem cerebri sit alternus, qui respirando fit, cerebri motus; si respiratio sit unica causa propellens, ut auctor *pag. 12.* innuit; si



si ita nutritio in homine iam nato et respirante peragatur; quid tum fiet de embryone, qui utero inclusus naturaliter non respirat? Deficit hic potentia propellens; deficit, ut ita dicam, cordis cerebialis actio. Atqui vero omnino requiritur respiratio, si materies cerebri nutrienda erit deuoluenda, ut nutrimentum partibus subministraretur, quin imo ab eadem hac propulsione maxime dependeret nutritio; ita quidem, ut ea languente nutritio labefacteretur, vigente consistat; neque tamen respiratio in utero propellere poterit substantiam cerebri; utpote quae, omnibus rite constitutis, naturaliter non obtinet; nihilominus foetum in utero probe nutriri non facile abnegaueris.

Frustra aliam causam dari conieceris; si quidem ad arteriarum cerebri pulsus confugas. Nam auctor pag. 12. dicit. *Ille motus cerebri non dependet ab arteriarum pulsu, qui quinquies fit spatio unius respirationis, sed unice ab ultima: nam hic pulsus omnino quidem arteriarum membranis, non vero toti cerebro, manifestum adeo motum communicare valet.* E quibus patet, quod ab hac potentia propulsio illa non sit expectanda.

Si iam haec ita obtineant in adultis; si in iis exigua adeo sit arteriarum vis et potentia; quidni erit in foetu? Cuius omnia vasa adhuc minus valide pulsant. Adhaec vasa cerebri structura sua ab illis reliqui corporis distant; tunicae omnes sunt teneriores, inprimis muscularis. Verum posito, aliquam esse vasorum in cerebrum pulsando efficaciam; quid quaeso expectandum a fibrillatione arteriolarum intra molle encephalon? Estne corpus molle, quod partium tremores et fibrillationes certo physicorum experimento, suffocat, quod proinde leuioribus illas arteriolarum cerebri oscillationes eo promptius suppressit? Nonne ipsa materies cerebri prae sua mollitie proprie eam demeret causam, qua necessario ex hypothese indiget, ut nutritioni praeesse possit? At nondum difficultatibus finis. Nam posito, ab arteriarum cerebri pulsatione in hoc viscere sensibilem quemdam motum generari; an ille motus poterit superare tot numero et tantas, quas nervi in suo decursu a pressione, a pondere partium, aliisque causis experiuntur, resistentias? Porro, si arteriarum in foetu pulsatio materiem cerebri reuera propellat; quid fiet de misero uteri incola in eo corporis situ, ubi capite suo orificio uteri insistit? an leuior arteriarum pulsus valebit materiem cerebri contra propriam gravitatem propellere, dum in enormes irrumpit resistentias, quas tamen omnes vincere tenetur, si partes nutrimentum e cerebro recipiant, conspirante hac causa propellente? vix videtur.

Vides ergo, quod ab arteriis materiae cerebialis propulsio in foetu non sit reputanda; neque a respiratione, qua non utitur foetus quamdiu mediis in aquis utero inclusus fluctuat. Neque praeter has binas potentias aliae dantur, unde propulsio illa derivari posset. Nam dura mater, quum muscularem naturam non habeat. et cranio insuper stricte sit alligata, in censum hic venire non potest. Neque nova materiae cerebri secretio sufficientem pressionem exercere valet, utpote nimis exigua; neque quum fluidum sit et parca simul copia secernatur, tantam vim exercere poterit, quae tot resistentias vincere valeret.

Ex omnibus his liquet, materiem cerebri, licet vi nutriente polleret, in foetu tamen non propelli, quum non respiret; propellenda tamen est, ut possit nutrire foetum, quemadmodum auctor pag. 36. inde embryonem nutriri ponit, dicit enim: *Cerebrum primum, unicum et praecipuum nutrimentum embryonis est, e quo reliquae partes miro modo nutriuntur et evolvuntur.*

E quibus omnibus ita ratiocinamur. Si materies cerebri, ut nutriat, per respirationem erit propellenda; sequitur, propulsione illa plane deficiente, nutritionem per cerebri materiem non posse fieri. Atqui vero in embryone propulsio illa cerebri fieri non potest; ergo per materiem cerebri in foetu non peragitur nutritio.

Verum, si foetus in utero aliunde quam e cerebro nutriri potest; si in utero e sanguine nutrimentum accipiant partes; quare hoc munus in infante nato et adulto homine sanguini denegatur. In quibus insuper, ut supra vidimus, perexiguus, si ullus, est cerebri motus.

Atque ita opinamur palam esse, totam hanc hypothesin de cerebri nervorum nutritione per suam materiem falsis admodum et infirmis inniti fundamentis. Quum talia adsumat in gratiam phaenomeni, quae, licet absint, tamen non prohibent, quominus effectus, ex aliis causis omnino praesentibus facile explicandi, conspiciantur.

Has itaque acrioris ingenii coniecturas missas facientes properamus ad reliqua argumenta, quae licet silentio praeterire facile possemus, exercitii tamen causa ad trutinam reuocare placet.

7. Auctor ipse dubitat, utrum illud argumentum, quod in nutritionis nervosae fauorem ex animalium, rapacium inprimis, nisu, quo suae praedae cerebrum statim deuorant, desumit, omnino certum sit? Nobis sequentia obstat videntur.

a. Animalia rapacia non quidem ita nutritioni sui corporis studere, ut e millenis partibus praecise eligerent eas, quae ipsis omnium maxime nutritiis particulis abundantes arriderent. Nonne saepe miramur, eadem haec ruere in alimenta, in quibus vix nutrimentum exspectares? Eadem plus palato et gulae indulgere, quam ad corporis sui nutritionem attendere? adeo quidem, ut saepe maxime noxia, quaeque illis pessime cedunt, auide deuorent. Adhaec, robustior eorum ventriculus ex omnibus fere alimentis nutrimentum extrahere valet. Verum

b. Si ponamus eadem idcirco cerebrum ante reliquas partes deuorare, quia caeteris partibus magis est nutriendum; an inde sequitur, viscus illud totius corporis nutritioni famulari, ita, ut suam materiem nutrientem quasi partibus subministraret? Num vero exinde tantum profluit, in cerebro multas dari particulas nutriente vi praeditas? insuper

c. Ex eo, quod animalia cerebrum mox deuorent, non sequitur illud plus nutritii in se continere, quam aliae partes; nonne enim saepissime miramur, canes durissima et exsucca admodum ossa avidissime adgredi? est certe his animalibus in ossibus nutrimentum. An inde merito inferre liceret, ossa toti corpori materiem alibilem praebere?

Sed dicamus plura, nam te amamus, B. L., Africae et Asiae multis populis coriaceae rhinocerotis cutis egregius, quin fere unicus, summe ab iisdem adamatus, reli-



reliquis alimentis maxime expetitus cibus est, unde probe nutriuntur et laete viuunt. An iam inferre licet, cutim rhinocerotis esse, quae toti huius animalis corpori materiem nutrientem suppeditat? adde

d. Non semper omnino certum est, animalia rapacia statim caput adgredi; sunt, quae abdomen prius adeunt; dantur, quae alias partes, intacto etiam cerebro, mox deuorant; imo vero haud desiderantur, quae prius vulnerant suam praedam, et tum effluentem e vulnere sanguinem avidissime ingurgitant, intactis partibus solidioribus. Si itaque exinde ratiocinari velimus; eodem iure possemus dicere, quod sit sanguis, qui per vasa partibus materiem nutrientem subministrat. Neque profecto illa conclusio a vero distaret, licet praemissa non ita firma habeamus.

e. Dubitandi locus est, si omnino verum ponamus, quod animalia rapacia cerebrum prius comedant; utrumne coeco instinctu adacta potius ideo haec animalia cerebrum statim adgrediantur, ut eo certiora essent de nece suae praedae; metuentia quasi, ne fortassis se unguibus subduceret, aut ita agentia, quasi natura ipsis indiderat a grauiori cerebri laesione corporis subsequi resolutionem et certam mortem. Profecto mira sunt, quae instinctus in animantibus profert phaenomena.

f. Posito omnia, quae auctor suspicatur, esse vera, non tamen inde profluit, quod cerebrum, ut ut huic animantium generi egregium conciliat alimentum, in homine eam efficaciam habeat, quod uniuersum corpus nutriret, quemadmodum ipsum cerebrum nutritur.

8. Quod attinet ad hoc argumentum; neque illi plus ponderis inesse videtur, quam quod modo examinauimus. Nam quum ea, quae e musculorum carne fiunt, iuscula corpus egregie nutrant, an inde inferendum, carnem muscularem toti oeconomiae humanae alimoniam suppeditare?

Praeterea GALENUS *Lib. 3. de alim. facult. Cap. 7. de Cerebro* ita effatur. *Cerebrum omne, cibus est pituitosior, crassique succi et tarde permeans, ac ad coquendum difficilis: non minimum etiam cerebrum omne stomacho nocet. Quidam autem ipsius mollitiae decepti, ipsam aegrotis exhibent, cum praeter alia, nauseam etiam concitent. Quin imo cum cuiuspiam a cibo vomitum mouere vis, huius partem pinguius conditam, postremis epulis edendam exhibe; illis vero caue exhibeas, qui non appetunt, quos veteres ἀποστρώς appellabant. Merito igitur nemo cerebrum summis epulis mandit, cum omnes ipsa experientia edocti, sciant ipsum nauseam excitare. An haec GALENI verba cerebri, ut cibi, laudem? num vero infamiam depingunt?*

Scio equidem cerebrum arte praeparatum a GALENO laudari, et succi ipsius crassitiem et vim nauseosam origano aut aliis incidentibus vel calefacientibus esse corrigendam; quodque, si ita recte conficiatur, alimentum corpori praestet haud contemnendum. At, num alimentum, quod tot cautelis est praeparandum, ne forte noceat, merito nutrimentum vel cibum eximum, utilem, salubrem et reliquis partibus magis nutrititium appellaueris? vehementer dubitamus. Si enim his aut similibus cautelis uti liceat, non foret difficile ex aliis C. H. partibus, quae vix quid nutrititii in se continere videntur, egregium et aegris maxime proficuum alimentum parare, adeo quidem, ut hac in re nullum cerebrum esset praerogatiuum.

9. Auctor praeter adducta hucusque argumenta ad stabiliendam suam hypothesin pag. 41. ad alia confugit, e quibus pateret, nervorum mucosum corpus nutritioni famulari. Nam, si illud sit vitiatum, acre, aut alio modo degeneratum, cum dolore taedioso simul partis infert maciem.

Ast quanta conclusio! nam, si ponamus dolorem excipere partis maciem, posito a nervorum corpore mucoso, ex auctoris hypothese vitiatum, dolorem oriri; aut tamen inde sequitur, quod, quae superuenit macies, itidem a vitiatum hoc corpore mucoso oriatur eatenus, quatenus haec materies suam indolem nutriente vel prorsus vel maximam saltem partem amiserit? vix opinamur; quum ex omnibus his tantum profluat, quod, si acre quoddam nervum vellicet doloremque creet, illud eo tantum sensu maciem inferat, non quatenus natura sua nervorum lymphae siue corpus mucosum alendo sit impar; verum quatenus actionem nervorum in vascula prohibeat, labefactet.

Adhaec, si acre nervorum vellicans, dolorem, macienique inducens, adsumseris; nonne tum suspicio oritur? utrumne ipse sanguis sit vitiatum, ipsiusque crasis mutata, qua nutritio perit vel infirmata fuit? aut qui sit, ut lymphae nervorum acris euadat, licet ipse sanguis reuera bene sit constitutus; quod si erueris, proba! inde profluere nervos per suum corpus mucosum nutrire. Quod autem sanguini et humoribus dyscrasia inferatur, quid miramur? quum dolor, humorum motum saepe mire intendens, ad eam disponere valeat. Neque inde, quod hi aegri rite fuerint constituti, sequitur sanguinem fuisse laudabilem, inque eo particulas nutrientes non defecisse; quum certum sit, non omnem passum, ut ut largiorem, bonam semper excipere chylicationem.

Liquet proin a nervorum imperio vitiatum: a sanguinis dyscrasia forte iam presente, aut breui subsecutura: a chylicatione itidem laesa: phaenomenon hoc potius, quam a solo vitiatum corpore mucoso, eiusque vi nutriente pessumdata, dependere.

10. Urget ulterius suam de nutritione nervorum ope corporis, quod vehunt, mucosi coniecturam. Nam ab eodem acri reddito aut alio quouis modo degenerato non tantum dolorem oriri, sed et maciem generari, exemplo sciaticae inueteratae illustrare conatur. De cuius maciei causa pag. 45. quaerit: *An a nervi ischiatici actione laesa? num vero a sanguine arteriae cruralis, qui in latere affecto eodem modo circulatur ac in sano, macies oriatur?* verum, licet nervus ischiaticus reuera hic sit adfectus: causa tamen morbi non consistere videtur in degeneratione alicuius corporis mucosi nervorum. Nam ex egregiis et accuratissimis Cl. COTUNNII observationibus constat, eam materiem, quae hic peccat, esse lympham, quae tum per nervi ischiatici vaginas de spinalis medullae interstitio, quod illi et inuolucris illius intermedium est, aduehitur, tum vero ex arteriolis ipsius vaginae intra illius cauum deplorat. Quae si insignem acrimoniam contraxerit, inque nervum hunc decumbat, stimulaudo nervi vaginam *inflammat*, et primum morbi stadium ponit. Dein vero *hydropem* generat, et ita ischiadem confirmat: quam tandem cum partis atrophiae *semiparalys* excipit. Vid. Dom. COTUNNII de *Ischiade Nervosa commentatio ad Virum Ampliss. GERARD. L. B. van SWIETEN, quam collegit E. SANDIEORT. in thesaur. differt. Vol. II, diff. XIX.*

E qui-



E quibus manifestum, quod non sit nervorum corpus mucosum, iam degeneratum, quod dirui hoc malum generat, verum lymphā degenerata, quae per vias indicatas adfluit. Quam si velis corporis mucosi nomine insignire, non opponimus, modo memores simus non mucosam sed lymphaticam indolem possidere. Atque hic primus argumenti error; verum plura alia adhuc expiscanda sunt, si legitime sit concludendum ad nutritionem nervorum materialem, et quidem.

1. Potuit Ischiadis causa, praeterquam quod nervum ipsum adfecerit, et in aliis partibus, in nervi illius vicinia positis, aliquod malum, quo arteriae aliqua pressio fuit causata, generasse; ad quod non ita attenderunt medici. Ita, v. g. tumorem generare potuit, qui, quum partes vastissimae arteriam cingant, non ita facile visui se obtulit.

Scio equidem posse regeri, quod auctor diserte dicat, circulationem aequē bene in morboſo latere procedere quam in sano; quodque proin nulla poterit arteriae pressio suspicio iniici. Attamen nulli dubitamus, quin hoc assertum non ita sit generaliter verum, quum in dolore ischiadico saepissime spasticae oriuntur contractiones et crampi, quinimo musculorum convulsiones; quibus sanguinis circuitus toties in die mutatur, ut notabiliores in circulatione differentias hic inuenerit *Cotunnus. vid. Eundem l. l. §. V. et XXXIII.* Iam vero, si sedes vere convulsas sanguis non imineat; quid miramur? vasa materiem nutrientem partibus non subministrare et ita maciem induci.

Non tamen prorsus abnegare volumus, circulationem aliquando, praesente dolore ischiadico, eodem fere modo in morboſa parte se habere, quemadmodum fit in sana; verum, qui bene attendit, obseruabit euidentissime, quod ille sanguinis circuitus mox incipiat turbari, ubi primum inuadere incipit macies: euidentius dein subverti, ubi atrophia altiores agit radices. Neque tum miramur maciem inualeſcere; quum nervi iam plane inertes arteriarum actionem infirmant et simul muscularem tollant. Erit itaque atrophia, in dolore ischiadico conspicienda, sequela nervorum imperii in vascula et musculos vitati; et semiparalyſeos ischiadicae fidissima comes. Adhaec, ipse auctor, ut supra vidimus, aperte dicit: *in nervorum laesione sanguinis circuitus idem fere manet, saltem adusque partis emaciationem, vid. pag. 33. et alibi. Non mutatur sanguinis circulus post laesionem nervorum, nisi in ratione atrophiae incrementi, vid. eundem pag. 34.* Si iam illud generatim verum sit; quid impedit, quominus idem in sciatica fiat? at

2. Ponamus cum dolore ischiadico circulationem in utroque artu eodem modo procedere, saltem ita videri; non tamen legitima est illa sequela, *quia in maiori, quam manu tango, morboſi lateris arteria pulsus aequalis est illi lateris sani; ergo circulatio in toto artu rite procedit, et nutritio, si illa e sanguine fit, probe peragretur.* Quaestio quippe non est, utrum in vasis maioribus sanguineis, aut minoribus arteriis, circulus sanguinis e lege procedat? Verum, huc cardo quaestionis vertitur, utrum illa ultima vascula sanguinea, e quibus minutissima vascula, rubrum sanguinem non admittentia, oriuntur, rite sint constituta? Utrum priora aequē ac posteriora sufficientem liquidi copiam et accipiant et praeparent?

Neque tamen hoc ex totius massae sanguineae in ramis maioribus circuitu vel diuinari poterit. Praeterquam quod, ut vera fateamur, aliqua semper, ut ut leuissima, sit in sanguinis in parte morbosa circulo differentia. Non quidem ita in initio, quam in prouectiori malo, ubi prima tabes et semiparalyseos se manifestant indicia. Quae, continuo magis magisque inualecente atrophia, sensim manifestior euadit.

Accedit dein, quod non unice a neruo ischiatico artus inferiores, inprimis femora, ramos accipiant: quinimo a neruo obturatorio musculi femoris triceps, obturatores, pectineus, gracilis et plures alii ramos sibi adsciscunt; et à neruo crurali antico siue medio insignes ramos musculi femoris alii acquirunt. Imo, qui secundum sartorium musculum adusque condylum ossis femoris internum excurrit, cruralis antici ramus, ille in interno pedis latere prope venam saphenam ad condylum internum migrat, et ex eo loco ad pollicem usque cuti sensim demum implantatur, plures in suo decursu musculis, quos praeterit, impertit ramos. Adhaec, sacrales nerui varios in gluteos vel et in alios musculos ramos dimittunt. Non poterit itaque in affecto artu nutritio tantopere deprauari, quemadmodum omnino fit; quum et alii nerui sint illaesi et sani, qui materiem nutrientem praeter ischiaticum aduehere possent: atqui tamen videtur ischiadicae posterioris, utpote frequentius obseruandae, mentio tantum iniici. Quum *ischias antica Cotunnii* rarius obseruetur, neque frequentius semel simulque adsint. Quae itaque ratio, quod partes omnes aequae emacientur, dum non omnes a solo n. ischiatico magno ramos accipiunt, et proin, si per neruos fiat nutritio, suo non destituerentur nutrimento.

Scio equidem, quod illae partes, quae a n. obturatorio, sacralibus, crurali antico accipiunt furculos, et a neruo ischiatico maiori ramos habeant. At non ignoro inter eas dari, quae plures a prioribus accipiunt ramulos, quam a posteriori. Non itaque in tantum emaciarentur.

Vides ergo, non recte a n. ischiatici corpore mucoso, nutriente, iam degenerato maciei causam desumi; quum omnibus his tantum probetur, quod integritas et neruorum imperium illaefum ad nutritionem stabilem requiratur, eamque a neruis dependere, non vero inde sequitur nutritionem per neruos proxime absolui.

Possit tamen quis ipsis his verbis nos impugnare et proprio, ut habet prouerbium, iugulare gladio. Si enim a neruorum imperio dependeat nutritio; si ab ischiatici nerui imperio laeso desumenda sit artus atrophia; quare tum illae partes, quae ab aliis neruis tot accipiunt ramos, itidem marcescunt, neque tamen eorum imperium, uti illud n. ischiatici, laesum est.

Fateor veri speciem prae se ferre videtur obiectio. At non est quod diu haesitemus in respondendo. Nam licet nerui obturatorius, sacrales, cet. neque inflammatione vaginarum neque hydropo laborent; videtur tamen eorum in vasa imperium, per consensionem, cuius mira sunt in corpore phaenomena, labefactari. Videtur, quae lente obrepit sanguinis dyscrasia, et suam symbolam huc conferre. Ut adeo ex binis his causis nutritio euidenter infirmetur.

II. Desumitur argumentum a macie, quae venereos dolores nocturnos vel insequitur vel comitatur. Hic enim marasmus oriretur a neruorum corpore mucoso dege-



degenerato, nimis tenui et acri, licet aeger sufficientem alimenti copiam adsumat et bene digerat.

Verum, quum huic argumento diu inhaerere nolumus, sequentia tantum quaerere lubet.

1. An hic nulla ratio habenda ipsius morbi et feminalis liquidi effusionis?
2. An in his aegris sanguinis dyscrasia bonam promittit nutritionem?
3. An passum largiorem et bonam ciborum ad oculum digestionem optima semper chylicatio et demum haematosis excipit?

4. Nonne potius argumentum probat? quod cacochymus sanguis ad nutriendum ineptus, maciem inducat, dum humores, optimi antea, iam degenerantur et dolores generant? Sique ulla sit in hoc morbo nervorum potentia, numne illa tantum sit posita in eo, quod forte nervorum in vascula imperium laedatur; quo, e cacochymo sanguine paucum illud nutrititii partibus vel plane non subministrant, vel aegre et vix elaboratum.

12. Quod attinet ad argumentum ab auctore *pag. 45.* a podagra desumptum.

α. Ipse auctor determinare non audet, utrum sit verus nervorum morbus? et proin incertum, argumentum sistit.

β. Utrum symptomata *pag. 46.* memorata, animi nempe corporisque vigor restitutus et crurum macies, quae post paroxysmum observantur, indicent, mucosum nervorum corpus vitiatum, quod maciem intulerat, et corpus mentemque affecerat, iam esse eliminatum? Dubitandi locus. Nam videtur in podagricis in ipso sanguine acrimonia adesse, saltem ita saepissime, unde nutritionem minus ex voto successisse non miramur.

γ. Solent in podagrieis, antequam paroxysmus inuadat vel sub eodem, pedes plus minus tumere, prouti maior minorue humorum congestio, inprimis a dolore, aut materiei morbificae in pedes decubitu oriunda, obtineat. Quae partim perspirando, partim restituto partibus robore, partim sopito dolore, vel discutitur, vel revehitur vel non de nouo allicitur. Atque hinc non miramur, quod ab his causis pedes prius tumeant et dein iterum detumescant. Quod phaenomenon facile minus attentos imponere possit, ac si durante paroxysmo pedes fuissent extenuati.

Quod attinet ad mentis corporisque vigorem post paroxysmum restitutum; videtur hic tantummodo, si recte diuinauerim, indicare, quod corpus et mens aegrotent simul, si in alterutro morbofi quid obtineat. Id euidenter in podagrico dolore patet, in quo corpus aliquando maxime patitur, et ita quidem, ut crampi, priapismi et pollutiones secundum auctorem adsint, quibus omnibus anima a corpore mire adficitur: si itaque dolor ille cessat; quid miramur? omnia illa symptomata pacari, et corpus et mentem suas recuperare vires, suisque muneribus rite et exquisite cum oblectamento defungi. Quae omnia ita explicari possunt, absque quod ad acris nervorum mucosi corporis eliminationem aut emendationem confugiamus.

13. Quod a pictonum colica desumitur, argumentum recte ab auctore non nimis fuse pertractatur, quum *atrophia, illius colicae speciei superveniens e causis ipsis,*

absque quod ad neruorum mucosum corpus confugiamus, *egregie explicari possit, uti opinatur* MARHERUS.

14. Argumentum, quod auctor desumit a tabe dorsali, in qua pulmo, imo totum corpus, satis bene valere videntur, aegri bene pascuntur, rite digerunt, et tamen atrophici euadunt, vix quid valet, si nempe macies a cerebri et neruorum corpore mucoso nimis tenui oriatur. Nam, omittitur hic causa, quae tabem intulerat, quae iacuria multum valoris argumento detrahit. Quum enim saepe excipiat foedum illud et nefandum iuuenile crimen, quod TISSOTUS viuis adeo depinxit coloribus, ut unicuique horrorem incutiat: vel venerem nimiam insequatur, in quibus omnibus casibus feminis nimia profusio. Hinc non miramur corpus suo defraudari nutrimento et consumi. Quae profecto facile intelliguntur, absque quod cerebri vel neruorum mucosum corpus nimis tenue, et ita quasi ad nutritionem ineptum, adsumferis. Similia forte in aliis huius vitii causis haerent, latitantque momenta, quae omnia prius expedienda, antequam concludamus.

Adhaec talia in morbo conspiciuntur symptomata, quae maciem per se absque neruorum vitio inducere valent, ita sudores pingues, visceri; urinae oleosae; suppurationes internae, post mortem saepe tantum detegendae, quinimo pulmonum labe; tubercula; ulcerationes et similia: quae aliquando viuente homine nullo modo se manifestant, et in cadauere demum sero nimis apparent. Quae, dum totam sanguinis massam vitiant, facile marasimum inducunt.

15. Utrum omnino iusta sit ea rachitidis explicatio, quam auctor pag. 51. et 52. tradit, vehementer dubitamus. Certe opinamur auctorem nimium suae hypothese de cerebro et neruis tribuere. Nam, licet facile concedamus, quod rachitidem cerebri et neruorum vitium saepe comitetur, tamen vix aut ne vix quidem nobis persuadere possumus, eandem a nimis copiosa, tenui, vel aquosa cerebri materie proxime dependere, quum inter eos, quibus C. H. saepissime adscitur, morbos nullum fere hactenus minus cognitum, minus perspectum putamus, quam rachitidem. Tuto tamen affirmare possumus, quod in hoc mali genere omnino in sanguine sit cacochymia, in solidis laxitas et incredibilis debilitas, et humorum saepissime dyscrasia acida. Quod effatum, si temporis angustia et instituti limites permitterent, lubenter solidius adumbraremus. Iam tantum, quid veri in auctoris hypothese, quid falsi insit, dicturi.

Concedimus auctori, cerebrum in hoc morbo saepe admodum esse aquosum; negamus tamen id semper obtinere: neque talis cerebri conditio argumentum praebet, quod actu ossa adficiat, quum ante eorum incuruationem aquositas cerebri inuauerit: quippe quia mirum non est, cerebrum, ut viscus mollissimum, ante ossa a cacochymo sanguine infici.

Sed addamus alia, quae ipsam auctoris coniecturam quodantenus infirmabunt. Neinpe, si mucosum neruorum corpus, copia abundans, sit maioris nonnullarum partium monstruosae excrescentiae causa; mirum est, in hoc vitio maciem eas partes inuadere, quae copiosissimis neruis gaudent: dum illae, quae fere neruis destituuntur, lacte increscunt et nutriuntur, veluti ossa, hepar, lien et similia.



Si nimis tenue et aquosum sit nervorum corpus, certo partes illae, quae plures nervos habent, promptius ab aquosa cerebri materie penetrarentur, promptius emollescerent. Veruntamen contrarium omnino observatur; nam ossa, hepar, et similia viscera citius emollescunt, plus ab aquosa materie distenduntur; minus vero musculi et aliae partes nervis ditissimae. Adhaec quum e sanguine formetur cerebri materies; quum sanguinis dyscrasia et solidorum inertia praecedat encephali vitium; non poterit de illo sanguine materies secerni bona et laudabilis. Atqui vero omnino praecedunt sanguinis cacochymia indoles et solidorum inertia; nulla ergo ratio, quare non potius ab his causis symptomata oriantur eo, quo solent explicari, modo.

En haec sunt pauca ea, quae in hypothese auctoris notare placuit. Quae si non plane eandem inuenerint, multum tamen de ipsius valore detraxisse videantur.

Liceat hisce nonnulla addere, quae hypothese auctoris omnino repugnant adeo quidem, ut nos hactenus eandem amplecti non valeamus. Inprimis sequentia sunt.

1. Si nervi et cerebrum materiem vere nutritivam partibus subministrant; variae indolis materiem ex hypothese ad diversas vehent partes, aliam ad ossa, aliam ad alia organa: verum, ossa vix aut ne vix nervos accipiunt, optime tamen nutriuntur et vivunt. Aliae dantur in corpore partes, quae, habita ratione voluminis, et paucos et eos insuper exiguos nervos accipiunt: nihilominus tamen laete vivunt et bene nutriuntur. Quae, quaeso iam est via, per quam illae partes nutrimentum suum accipiunt? quum nervi illud non nisi parca admodum copia aduehere possint, si illi vera nutritivam partibus subministrant materiem.

2. Varia est indoles materiae nutritivae pro diversis partibus; ossibus particulis scatet, quae ad ossa vehitur: aliis, quae ad alias partes; pro quovis organo discrepat. Verum, dic sodes, qui fiat, ut arterias ossificatas inueniamus, non vero nervi ipsi a proprio liquido ossescant? Nervi tamen et ossibus suum alimentum praebere tenentur, si omnium partium nutritioni praesint: quod si non ita sit, si tantum in nonnullis huic muneri famulentur; quid tum impedit, quominus caeterae partes aequae ac illae, quae per nervos nutritivam materiem sibi non adsciscunt; ex ipso vitali liquido nutriantur? Estne ratio ossificationis arteriae sita in eo, quod aduehat particulas osseas, vel in os demum concrecentes? nam quomodo arteriae ossescere poterunt, si particulis osseis destituantur? At si arteriae contineant tales particulas, quare tum per eas non fieret ossis nutritio.

3. Nati fuerunt infantes torosi, bene quoad artus et totum corpus nutriti, quibus deerat encephalon; neque medulla oblongata insuetae erat magnitudinis: qualem casum SANDIFORTIUS et plures alii descripserunt. Unde iam pendet in his infantibus nutritio? an a nervis? vix opinamur. An ab arteriis? ita profecto. At si in his casibus per arterias fiat nutritio; qui quaeso fieret, ut in omni subiecto per hanc viam nutritio non possit absolui. Verum

4. Ex auctoris hypothese admissa necessario profluit, eas partes, quae suos a cerebro accipiunt nervos, longe melius nutrir, quam quae a spinali medulla ramos accipiunt. Nam

Si in cerebro sit duplex materies, alia gelatinosa, lymphatica, alia caseosa, lanuginosa aut spongiosa; si prior condensatione in posteriorem abeat; si prior nervis nutritionis ergo insit, posterior sensus motusque beneficio; si maior sit proportio et copia prioris in cerebro, quam in spinali medulla; quod clarum: medulla enim tota fere constat e substantia lanuginosa sentiente: hinc necessario minorem materiae nutritientis copiam aduehere poterunt nervi medullae spinalis, minus enim mucosi continent, plus vero caseosi vel lanuginosi: proin partes, quas n. medullae spinalis adeunt, plus materia sentiente, quam nutriente gaudent; exquisitiori itaque sensu, pariori vero nutrimento erunt praeditae. At in cerebro ipsiusque nervis aliter res comparata; in iis enim copiosius mucosum corpus, quam in medullae spinalis nervis: et tamen partibus prospiciunt non magis torosis, non melius nutritis, quam quae a spinali medulla nervos habent. Vides ergo maiorem a spinali medullae nervis esse nutritionem, minorem a cerebro, vel saltem ad summum aequalem: quod tamen manifeste sibi contrariatur; quum non possit abundare in effectu, quod deficit in causa,

Verum si forte ea, quae hucusque disputauimus, minus feliciter sint elaborata; nec omni prorsus vacent dubio, alia addamus, quae fortassis plus stringunt.

Nempe posito, in cerebro et medulla spinali aequae magnam copiam materiae tum sentientis tum nutritivae inesse; certum tamen ex auctoris hypòthesi manet, illam materiem nutrientem, respirationis ope excitato in cerebro motu, ut suo munere defungi possit, esse propellendam. Iam vero, id de cerebro imbecillibus, ut suo tempore vidimus, argumentis demonstrare auctor fuit annisus. De medulla spinali nondum probavit, quod et ea tali modo conquassetur: licet quidem pag. 24. suspicetur, similem motum in medulla spinali, quinimo in ipsis nervis, at fere inconspicuum, obtinere. Requiritur tamen ille motus in medulla, si nervi spinalis medullae reuera nutritioni famulentur, et actu, quemadmodum auctor ponit, praesint. Neque hic coniecturari licet a respiratione, qua cerebrum moueretur, in medulla motum generari: quum ille motus, si obtineret, non eo usque suam vim et potentiam extendere valeat, ut sensibilem quemdam motum in extremo caudae ita dictae equinae, multo minus proin in nervis, queat excitare: possemus eum in finem periculum facere, ni instituti ratio id vetaret.

5. Si nervorum munus sit nutrire, quis erit sanguinis in corpore usus? An unice ad materiei cerebri in capite secretionem, aut humorum noxiorum per corporis cloacas eliminationem in corpore circumuehitur? num vero tantum calor ergo per vasa circulatur? vix opinor. Nam ligata arteria non tantum calor, sed motus, sed vita partium perit. At non est, cur diutius nos contorqueamus, quum auctor noster sanguinis in corpore usum pag. 33. determinet, ita enim effatur: *Indicio luculentissimo, quod, omnino quidem vita, neutiquam vero nutritio ab arteria, ut opinatur, sed a nervo et qui ex eo fluit nutriente succo, proxime dependeat.*

At qua in re consistit illa conservatio partium vitae? an in solo calore, quem sanguis adfert? non opinor. An in sensibilitate et irritabilitate? Vix videtur, quum et illae partium viventium qualitates a nervis debeant: praeterea, si ponamus irritabilitatis ergo unice ad partes vehi; quare tum naturam sanguinem et illas partes alluere voluit



voluit, quae neque irritabiles neque fere sensiles sunt. Quid, itaque est, quod vitam nuncupas, quodque ab arteria pendere autumas? Quid est illud, quod arteriae praestant vitae? estne nutritio partium? ita profecto. Abs illa enim omnium partium vita perit. Si vero ablata prius dein restituatur, tum partes, quae iam inceperant mori, de nouo iterum vitam recuperant. Adhaec, ea omnes indigent partes siue irritabiles fuerint siue sensiles, siue utraque facultate aut alterutra destituantur. Omnes omnino partes, hac vigente, viuunt; laesae aut sublatae, languent, pereunt; restituta, denuo excresecunt et vitam suam manifestant. Unde iam pendeat nutritio? an ab arteriis? num vero a nervis? ipse B. L. diiudices.

Et haec demum ea sunt, quae in hypothesein *Expert. van der HAAR* animaduertenda nobis non incongrua visa sunt. Quae si aliquantisper arriserint, nobis gratulamur: sin minus; in magnis tamen voluisse sat est.

Interim iubet instituti ratio contrahere vela, ne forte nimium in hoc campo exspatiando aliis argumentis locum disputemus. Pergamus itaque ad ultimam argumenti nostri partem, quae conclusionem ex dictis sistit.

## SECTIO ULTIMA.

### Conclusio.

Ex omnibus hisce, quae uberrime de nutritione nervosa disputauimus, nū vehementer hallucinemur, videtur concludendum. Quod nutrititia materies sanguini reuera inest, et per vasa ad omnes partes vehatur, ibidem, mirabili sane modo particulae a sanguinis massa separantur; quae partibus, intra quas deponuntur, sunt analogae. Quae particulae a sanguine secedunt tum motu ipsius mutato, tum forte, ut nonnulli arbitrantur, attractione partium similium, tum demum aliis causis, partim cognitis, partim certis, aut tantum dubiis. Quibus omnibus fit, ut a sanguine in parte nutrienda materies segregetur, intra minima vascula deponatur, quae eandem forte propria, ut videtur, actione ulterius elaborant, inque minutissimas arteriolas propellunt, e quibus demum emissa partibus apponi et accrescere videtur modo nobis non ita facile assequendo.

Haec tamen nutritio, illa partium nutrititiarum appositio, perque sua vascula aut elaboratio aut propulsio, ut cum constantia fiat, nervis indiget; a quorum integritate illorum actio videtur dependere, quaeque ad eam sustentandam omnino requiritur.

Hoc nervorum in minima nostri corporis vascula imperium, euidens adeo certumque est, ut iure negari non possit; si tamen quis eius probationem forte petat, illi, ne forte argumentis destituti videamur, satisfaciemus.

Quum a stimulo oris ingens salivae in os fiat influxus; quum in famelicis os salivae totum quasi inundetur ad grati ferculi conspectum; absque quod muscoli vel hilum moveantur aut glandulas salivales premant: videtur certe illa adfectio nervis inducta, modo nobis incognito, vascula emissaria relaxare aut humores allicere, quo fit, ut in os influant. Ita a sola tristitia lacrymae funduntur, a solo terrore scirrhum mammae irrefolubilem vidit *Ill. van SWIETEN*. Suntne haec indicia, quantum sit

neruorum in vascula imperium? quo eorum motum et actionem retardare, intendere aut suffocare valent.

Sed quid nos diutius contorquemus in iis, quae dubio forte aliis non vacant. Liberaliores et magis aperti simus, dum talia proferemus, e quibus neruorum in minima vascula imperium sole meridiano clarius patefiet.

Ita, vascula minima relaxari et spasmo affici posse; eorundem in liquida secretionibus actionem aliquando augeri vel minui; illudque omne a solis nervis affectis dependere, satis demonstrant superque, quae animi pathemata excipere miramur phaenomena. Ita, pallida natura virgo, ad impudicum verbum prolatum, subito rubore vultu suffunditur; iamque rubrum sanguinem admittunt vascula, quae aut nullum antea vehebant aut multo parciorem. E contrario, altera rosei et rubicundi coloris, incusso terrore quantum non pallet, ut nullum iam sanguinem vasa admittant, quae modo eodem erant turgida: porro, subito terrore incusso ingentem copiam urinae aquosae tenuissimae excernimus, quae ante et crassior et minori copia secernebatur. Rubefacientia omnia, epispastica, vesicatoria, parti alicui apposita, insigni copia alliciunt humores ad locum, cui applicantur. Frigus subito ad calidum admisum corpus poros cutis et vascula ita constringit, ut *cutis anserina* inde oriatur. Similis aliquando terroris est effectus. Quae amor, ira, laetitia, odium, moeror, metus, terror in sanguinis circulum imprimis ad minima vascula edant effecta Clar. GAUBIUS in pathologia de vi noxia animi perturbatione docet. Idem HAASIVS de cerebro et nervis pag. 29. §. 246. euincit.

Nonne haec omnia, quae hucusque adduximus, quaeque MARHERO tanti visa sunt momenti, certa praebent indicia, quin imo inconcussa argumenta, e quibus patet, *summum esse neruorum in minima vascula imperium*? quod si auctum fuerit, eorum actionem auget; si abnorme fuerit suffocat; si omnino defecerit labefactat; quo fit, ut muneri, cui famulari tenentur, non ulterius praesint. Nonne inde patet, quare laesis nervis pereat saepe nutritio? dum aut nimium est neruorum imperium, quo vasculorum actio suffocatur, aut plane sublatum, quo et illa tollitur: et unde fiat, quod materiem nutrititiā, quam e maioribus vasis minima vascula accipiunt, non promoueant aut forte elaborent, et ita partes, ad quas tendunt, suo nutrimento defraudentur<sup>1)</sup>.

Si vero quaeras, quid demum proprie nervi agant? quomodo huic officio famulentur? quomodo in minima vascula operentur? id quidem nobis latet, et fortassis in aeternum latebit. Saltem a spiritibus ita dictis nerveis aut animalibus illud si velles repetere, multis forte difficultates moueret, aut a solidi nervi tremore, vel electrica quadam virtute, aut aethere subtili, aut nescio qua alia e causa deducere: illud quidem omne facilius adsumitur, quam probatur. Ita nodus diffecatur non vero, ut par

1) Hisce omnibus accedit, quod vitia neruorum ipsas aliquando fibras musculares et maiora vasa, quae ad humorum in penitiores recessus propulsionem suam con-

ferunt, ad agendum reddant inertia, et sic partium nutritionem hoc nomine itidem prohibeant, subuertant.



par est, soluitur. Neque expectaueris, nos aliquid hic adsumpturos in gratiam phaenomeni, ut idem illud explicemus: quum doctam potius hic fateri ignorantiam, quam temerarii latentia naturae mysteria perspicere nobis aut aliis persuadere velimus.


Neque a materia quadam, siue ex nouissima hypothese nuperrime deprompta, siue ex alia consimili forte elicienda, nervorum ad nutriendum usum deriuare possumus. Quum de ipsius summa incertitudine, quum pene dixerim, falsitate persuasi sumus. Ne tamen credideris, nos illud nervorum imperium tantum adsumsisse in gratiam phaenomeni, ut ita eius rationem reddere possimus. Verum et alii plures, inque Apollinea Arte haud exigui momenti viri dudum iam hac in opinione steterunt.

Ita Celeb. HAASIVS in *anatomie repetita cerebri et nervorum C. H. pag. 129. §. 245.* in responso ad quaestione[m], quo sensu nervi corporis partes nutrire credantur? Ita effatur. Attamen, cum omnibus istis momentis id tantum probetur, esse nervorum singulare in vascula minima imperium, horumque actionem istorum munere sustineri, dici debet, absque nervorum vi aptam ad nutriendum materiem neque in vasis minimis elaborari et adduci, neque a fibris suscipi susceptaque assimilari posse.

Quin imo VERHEYENUS in *anatomie l. l.* eadem fuit versatus sententia. Et in *spirituum fluxu per nervos fibrarum constrictionem causando materiem nutritiam a sanguine adlatam ad penitiores partium recessus urgendo*, nervorum vi[m] consistere asserit. Pro *spirituum fluxu per nervos*, potius dixerim in *nervorum actione*.

Neque aliter censuit ROBERT WHYTT in *nervous disorders pag. 99.* Certis inquit experimentis et observatis constat, motum humorum in minimis vasis maximam partem dependere ab influxu eorundem nervorum: et si ille deficiat humores vel plane non circulari per vasa vel saltem admodum tarde, unde partes, ad quas pertinent, collabuntur, et non, ut decet, nutriuntur. vid. *physiological Essais pag. 49 et 50.*

Et hac in opinione ex hodiernis plures versantur, quorum tamen omnium indicem, quum finem huic specimini inponere ferat animus, non facile expectaueris. Si vero dicta nostra in huius materiae elaboratione aliquem sibi conciliare valeant periti lectoris assensum, magno mihi ducam honori. Quae inconcinna aut minus accurate exposita occurrunt, ut ea iuuenili ingenio condonare velit obsecro.



## XV.

ADOLPHUS MURRAY  
DE  
SENSIBILITATE OSSIIUM MORBOSA.

UPSALIAE 1780.

## §. 1.

**S**i quis unquam mortaliū, per sua merita, immortale sibi peperit nomen, certe illusterrimus ab HALLER is est, quem ultima venerabitur et maximi faciet posteritas.

Singula enim eius Anatomica et Physiologica scripta (de caeteris alii iudicent) tantae eruditionis, et in perscrutandis naturae mysteriis, sagacitatis produnt documenta, ut quempiam illi equiparandum vix, ac ne vix quidem iustus rerum arbiter inueniat: praecipue vero gloriam eius adaugēt, quod in enodandis difficillimis Physiologiae partibus sollertissime defudauerit, inque iis plura, quā ante illum ullus, praestiterit.

Ut vero unicum, quod ad materiam in hac dissertatione pertractandam ducet et summae est celebritatis, documentum adducam, nemo sane doctrinam sensibilitatis et irritabilitatis mille experimentis ab eo enodatam et stabilitam perleget, quin summa perfundi se admiratione sentiat Viri, qui ad hanc physiologiae partem illustrandam et ab erroribus repurgandam ultimos adhuc vitae annos impendere graue non duxerit. Praesensit enim emolumenta maxima in totum genus humanum ex hac doctrina redundatura, hique suauissimi stimuli ad laborem difficillimum perficiendum incitarunt animum eius, superabiles omnes spernentem difficultates. Erat enim contra falsas magnorum virorum opiniones per experimenta in viuīs animalibus instituenda diuincandum. Quum vero animaduerneret, plurimos errores saepius repetitis obseruationibus unice profligandos per minimam in experiundo negligentiam facile exoriri, alios neutram in partem inclinantes, eosque sagacissimos obseruatores ad eadem pericula inuitauit; quo coniuncto studio doctrinam hanc demum certissimis superstrueret fundamentis.

## §. 2.

His suis itaque conaminibus limites genuinos inter sensibilitatem et irritabilitatem animantium praescripsit, ut non solum pro certo sciamus, fibris muscularibus unice irritabilitatem competere, neruosque sensus acerrimi esse participes; verum etiam has duas corporis facultates nullam habere cognationem, musculo enim tacto, in ipsa eius carne mutatio subita et efficacissima exoritur, quae tamen ulterius non defertur; si vero neruus a corpore quodam attingitur, nullam ipse sensibilem mutationem subit, verum impressiones ei illatas ad cerebrum propagat, ibique animam de contactus indole et vigore consciam reddit.



§. 3.

Sed nervos eosque ſolos ſentiendi facultate eſſe praeditos, partesque omnes, quibus nervi deſunt, ſenſu etiam deſtitui, altera eaque probatiſſima eſt HALLERIANA adſertio. Licet enim nonnulli magni nominis viri, inque his diuus BOERHAVE et BRANCHE totum corpus ex nervis componi crediderint, ſubtilioribus tamen diſſectionibus et ipſis experimentis in vivo animali inſtitutis didicimus, tum nervis tum ſenſu quasdam carere partes. Sic duram piamque matrem, arachnoideam tunicam, tendines, ligamenta omnia, perioſteum, latiffimas inembranas, pleuram nempe et peritonaeum, telam cellularem, nullam nervi fibrillam in ſuam intimam compoſitionem admittere, et ſine doloris ſenſu fauciari atque laceſſi, ex plurimis certis experimentis novimus. Negari quidem non poteſt, a validiſſimis aduerſariis ſententias has fuiſſe oppugnatas, eorum vero argumenta plurima, ratiociniis aſtutiſſimis potius, quam experimentis ſtipata, repetitis non ſolum novisque experimentis HALLERUM ipſum deſtruxiſſe, verum etiam cauſas errorum, et in argumentando fallaciam detexiſſe, merito gaudemus.

§. 4.

Cum enim funiculi nervorum tela cellulari inter ſe et ad partes appoſitas ligentur, eiusque ope numeroſi neruuli in ſuperficie tendinum et capsularum ad deſtinatas ſedes decurrant, omnis cura adhibenda erit, ut prius a membranis ſuis cellulofiſque vaginis vel carne ex tendinum ſuperficie in ulceribus efflorefcente, repurgentur partes irritandae, ne ſenſus ſub experimento inſtituendo excitatus his adſcribatur, qui nervis tamen circum repentibus debetur. Contra hanc cautelam non adeo facilem obſervatores aduerſantes peccaſſe, ipſa nos docet experientia. Altera eſt cautela, ut ſana nullaſque labe infecta loca inquisitioni ſubiiciantur. Nam, ſi vel maxime nonnunquam pari euentu ſuſceptum experimentum in membris morbo affectis ſuccedit, commutationem tamen aliquando tantam ex morbo partes ſubeunt, ut tendinum e. gr. ipſa exterior ſubſtantia reſoluatur, huicque reſolutioni nervi, extus in cellulofa circum ludentes, admisceantur, adeoque tendinum maſſas corruptas ſenſiles inveniamus, quas in aliis animalibus ſanisque inſenſibiles deprehenderemus.

§. 5.

Hanc vero alterationem ſingularem inſenſibilium partium nullam citius ſubire puto, quam ligamenta, et niſi ex ipſa eorum ſtructurae tranſmutatione morboſa rationes phaenomenorum eruere liceret, parum abeſſet, quin in eam fallacem licet abriperemur ſententiam, ut partes nervorum plane expertes, morboſa ſub conſtitutione, ſenſum ſtatuereſmus adipiſci. Etenim ſi vulnus quoddam ligamenti ſanis infligitur, aut tota capſa articularia ad euacuandam aquam aperitur, perforatur, amburitur, cauſticis liquoribus irritatur, ne minimo doloris ſenſu adſcitur homo: quando autem pure clam collecto, decubitu humorum lento et acri funguae ſtructurae ligamentorum ipſa patitur, incisiones non ſolum dolorificae eſſe ſolent, verum etiam aegri continuo dein dolore non raro excruciantur, in conuulſiones et ſpaſinum cynicum cito aliquando abeunte. In his autem morbis lente prorepentibus ligamentorum textura maximam

Tubire solet mutationem; humore nempe stagnante et irritante, cellulosa tela ipsa, tam ea quae fibras singulas ligat, quam quae ligamentosas fibras formauit vel exterius stratum totum obtegit, excrescit, turgescit et adeo euoluitur, ut ipsum articuli volumen augeatur, et nerui inter extrema strata leuiter antea decurrentes, non solum fortius ad ligamenta reuinciantur, sed ab ipsa morbosa substantia quasi circumuelentur et includantur. Et, si coniecere liceat, vero simile videtur, neruorum ipsorum telam cellularem, singulas fibrillas in fasciculos colligantem, irritatam euolutione noua adaugeri, quo fibrillae, sine ulla interioris medullae irritatione in latiora spatia disperfcae, multa plura quam in statu sano loca, externae violentiae impatientia reddunt. Etenim in plerisque neruis a cerebro remotis, non solum fasciculi cylindrici, nusquam confusi, sed ad finem usque distincti, verum etiam horum neruuli minimi, microscopio vix distinguendi, si arte separantur, tenera cellulositate obducti et ligati conspiciuntur, eaque cellulositatis adeo non nunquam augetur et durefcit, quod in ischiade neruosa semel obseruauimus, ut triplam neruus acquirat crassitiem. Praeterea diu afflicti nerui et in pauca puncta vi quadam continuo lacesciti multo aciores, cum denique irritantur, in anima excitare videntur sensationes, quam cum antea nullam perpeffi fuerunt iniuriam; unde etiam prono alueo fluit, quod ab acri materia, circa articulos collecta, vel alio modo irritati nerui vehementius vi illata afficiantur.

## §. 6.

Ab iisdem fere causis sensibilitatem telae cellulosa singulari, quam illi MECKEL nuperrime defendendam in se suscepisse videtur, deriuandam esse reor. Nam cum nerui quemcunque stimulum perfontes tantum imperium in arterias exercent, ut, ad auerruncandum stimulum, humores ad loca stimolata deriuent et ipsum sanguinem per vasorum parietes in tela cellulari exprimant; sensibilitas vero eorum a stimulo perpetuo agente adeo increfcit et cum circumiacentibus ita comunicatur, ut leuissimo tactu ventique halitu moleste tota pars afficiatur; id nostram admirationem mouere non debet, quod quaecunque fibrilla ab inflammatione vexata ad tactum nunc doleat, nosque sentientium locorum limites cum insensibilibus confusas existimemus. Sub omni praeterea vel lenta vel violenta inflammatione noua filamenta cellularia euoluuntur, telaque cellularis prius existens tam variis subiicitur mutationibus, ut in locis saepe, ubi parca fuerat, exuberet, in aliis vero in arctiora vincula concrefcit, adeoque priorem neruorum cursum non tantum perturbet, verum etiam iis in locis, ubi antea nulli fuerint, alios recipiat atque condant, veluti noui furculi neruorum hic sub inflammatione progeminassent.

Sed aliud demum phaenomenon singulare adhuc est adiiciendum: videmus nempe, cum magnam semel subierunt nerui vehementiam, quod impressiones comunicatae, morbo profligato, superstites saepe maneant, hisque neruis multo iam delicatiorem sensum inesse. Singularitatem hanc praecipue in iis obseruamus, quibus natura multo subtiliores dedit neruos, quorumque corpus debilitate quadam neruorum laborat, qua ad impressiones retinendas aptiores et ad sensationes a minimo stimulo excitandas procliuiores reddi videntur. Et ex his coniunctis causis forsan sensibilitas cellu-



celluloſae ſeroti, quam cel. MECKEL in illuſtri hernioſo obſeruauit, exorta fuit. Nani quod ingens numerus neruorum in ſuperficie darthi circumuagetur, darthus uero ipſe et celluloſa ſubiaccens, licet neruuli quidem eam permeent, nulli uero ibi permaneant, inſenſibilis ſit, non diſſectiones tantum teſtantur, uerum quoque operationes chirurgicae ad hydroceleꝝ radicitus curandam inſtitutae. Dartho nempe diſciſſo, nullo de dolore amplius queritur aeger; ſi uero lenta inflammatione uel acri quodam humore prius ſerotum teſtesque corrupti fuerunt et nerui ſupra dictam ſubierunt mutationem, ad unumquemque cultri icſum aeger dolore quaſi fulmine percutitur.

§. 7.

Allatae circa cellularis telae apparentem ſenſibilitatem rationes ad explicandum osſium ſenſum, quem hiſce pagellis pro ingenii mei modulo tueri uolui, parum conſerunt. Magni nominis uiri eam in dubium uocant, et aperte negant, neruos ad oſſa deferri, quum oſſa ſana terebratula ſine doloris ſenſu perterebrentur. Expendamus igitur argumenta, quibus de ſenſibilitate osſium conuincamur iſſique alia contrariam ſententiam conſirmantia adiiciamus; ne ſine ſufficiente ratione partes ſummi HALLERI in hac re deſeruiffe uideamur.

§. 8.

Quemadmodum omnes partes neruis carentes nulla ſenſatione eſſe praeditas, ueritati atque experientiae quotidianae conſentaneum eſt, et ad explicanda phaenomena in oeconomia animali obuia conſert, ita illud certe, quod celeb. CALDANI <sup>1)</sup> protulit, contendens, non omnia loca, quae neruis ſunt inſtructa, perceptibili praedita eſſe ſenſatione, ad nodum hunc gordium ſoluendum maxime idoneum inuenio. Plura exempla adferri poſſunt ſententiam hanc affatim conſirmantia. Hepar, ſplen, renes, pulmones et vaſa arterioſa neruos accipiunt plures, cum uero ſubtiles ſint et tenuiores, uiscera haec, ut et vaſcula fere inſenſibilia deprehenduntur, ita ut nullo fere doloris ſenſu a cauſticis laceſſi et incisionibus irritari poſſint. Inflammationes, quae grauioribus comitantur ſuppurationes, in hiſce uisceribus detectae fuerunt, nullis omnino ſignis praecedentibus. Quid? quod ſaepe uterus, magno neruorum plexu ditatus, inflammatur et ſub partu laeditur, immo in operatione caeſarea cultro aperitur ſine magna uolentiae ſenſatione. An uero hiſce partibus, quae, licet neruos habeant, attamen parum uel nihil ſentiunt, oſſa ſint adnumeranda, quaefſio eſt, quae, quam uariis iſſique difficillimis premitur difficultatibus, noſtram meretur inueſtigationem. Binae enim viae, quibus exiſtentia neruorum in parte aliqua demonſtrari ſolet, artiſcioſa nempe nerui diſſectio, uel ſi ob ſubtilitatem hoc fieri uix poteſt, experimenta in animantibus inſtituta, ad oſſa quod attinet, tam lubricae et erroribus obnoxiae eſſe uidentur, ut omnia tentamina nil niſi incertum rerum prodant ſtatum. Summi etiam anatomici de neruis osſium ambigue loquuntur, ſique nonnulli eos prorsus negant, alii pauciſſimos, non ubique, ſed in nonnullis tantum locis diſperſos admittunt,

1) HALLER memoire ſur l'irritab. et la ſenſib. T. 3. p. 71.

mittunt, vel alteram, licet timide ineuntes viam, eorum existentiam experimentis suffulti vel negant vel vix admittunt. Ill. HALLERUS <sup>2)</sup> aperte dicit, paucissimos ossa per tubulos suos arteriarum sodales penetrare, ossa plana vero, ut in cranio, nullos, qui innotuerint: quam leue pretium autem his cognitis adscribat, ex alia assertionione magni huius obseruatoris <sup>3)</sup> perspicitur, cum ossa non sentire dicit.

Et sane rationes non desunt, quibus eorum in ossium nervis detegendis impotentia expurgari possit. Nerui enim in artubus, alias durioribus membranis obducti, musculos penetrantes, vel super ossa decurrentes, in adeo subtilia filamenta abeunt, ut acutissimi plures obseruatoris oculum effugiant, nec subtilissimum instrumenti tactum ob mollitiem pulpae cerebri simillimam ferant. Quo propius etiam nerui ad fines suos veniunt, cylindricam suam amittere videntur formam, et in planam quasi fasciam aegre ab ipsis cellulosis filis fortioribus distinguendam extendi. Hanc facile decipientem formam plurimi quinti septimique paris et ceruicalium nerui super cranium circumuagantes, plexus hypogastrici abdominis furculi multique alii acceperunt; unde non mirum, quod cum descriptionibus auctorum adeo raro dissectiones ex asse conueniant et difficilius iidem detegantur nerui.

Arterias nervos frequentes comitari et communi cellulosa cum illis irretiri, ubicunque videmus. Raro enim truncus nerui maior longum incedit ductum, sine arteriae cuiusdam comitatu, quod in neruo crurali et ischiatico est videndum, sed nervus phrenicus suum etiam habet comitem, nerui brachiales, plerique nerui muscutorum suos. Quo subtiliores vero euadunt, eo fortius arteriis adglutinantur, ut ab iis separari nequeant, nec sine acutiore disquisitione pateat, an arteria sine sodali neruo incedat. Eodem porro modo, quo arteriolae furculos subtilissimos emittentes, cellulas tenuiores obambulant, nerui pariter ramosi, retia neruea utcumque formantes, superficiem telae cellularis circumlegere videntur. Mirari igitur non licet, quod veterum plurimi, totque recentiores telae cellulari, periosteo atque pericranio sentiendivim adscripserint, cum in ipsa harum membranarum superficie furculos nerueos detegere potuerunt et experimentis, etiamsi fallacibus, sententiam comprobari autumarunt. Ab hoc errore cel. CHESELDEN et summus HALLER, cum suis illustribus asseclis, inter quos cel. CASTELLUM, FONTANAM, TOSSETTUM et CALDANUM nominasse sufficiat, innumeris suis experimentis, nos iam diu liberarunt, disceptationem de sensatione ossium aliis relinquentes.

### §. 9.

Quamquam igitur difficile nervos ad ossa usque prosequi liceat, et a periosteo ad alias transcurrere partes videantur, in nonnullis tamen locis eos ad canaliculos ossium deducere possumus. In tuberculo occipitali, musculis insertionem praebenti, praeter vasa plura penetrantia, nonnulla fila nervorum ceruicalium subtilia arteriarum ductum ad ipsam ossis substantiam sequi videntur, et ramuli quidam subtilissimi temporalium profundiorum, crotaphitide penetrato, alis sphenoidalibus maioribus se immittunt.

Plures

2) Element. Phys. Lib. X. Tom. IV. p. 198.

3) Ibidem p. 272.



Plures in cranio detegere non potui, sed in artubus multo facilius procedit labor; nam in ossis brachii apertura, sulco bicipitali vicina, in femore prope lineam asperam, in tibiae facie posteriore et superiore, inque calcanei latere interno cum ipsis arteriis nutritiis nerui immerguntur, arteriae in ductu suo reuincti. Non desunt igitur exempla neruorum ossium interiora penetrantium.

§. 10.

Altioris vero indaginis exoritur iam quaestio, quomodo neruuli hi ossium dispergantur, utrum omnes ad medullam ossis tendant, an vero nonnulli in fibris ipsis ossibus subsistant. Omnis, quaecumque tandem fuerit, subtilior dissectio in hoc negotio deluditur et per experimenta in viuis instituenda, veritas unice erit enodanda. Primus ergo, ni fallor, Cel. DUVERNEY <sup>4)</sup> fuit, qui medulloso farcimini, tenerrima pellucida cellulositate arachnoideae simili extrinsecus obducto, inque minora, multiformia, vesicularia loculamenta diuiso, certis argumentis sensibilitatem adscripsit, licet diuus HIPPOCRATES iam adserat, vulnera ossium ad medullam penetrantia, deliria ob dolorem excitare. Contendit enim, arterias, venas neruorumque propagines, communi vagina cellulari inclusas et canaliculos ossium permeantes, in superficiem huius membranae infinite multos emittere ramulos, eosque cum medulla eam vitalitatem communicare, quam in sequentibus detexit experimentis. Quum enim tactu rudiore medullam eorum, quibus crura vel brachia amputata erant, laceffens, aegris eo dolores excitari obseruaret, aliis magis conuenientibus experimentis eadem tentamina in animantibus instituit. Femur nempe viui animalis, carne omni membranisque discissis, ut os ab omni parte nudum esset, ferra detruncandum curauit, cumque inde vehementibus cruciatibus angeretur animal, ab experimento tam diu destitit, usque dum tranquillitatem pristinam recuperaret animal, tumque stylum in medullam intrudit, quo vehementissimae sensationis probebantur signa. Harum observationum certitudinem Celeb. ALEX. MONRO quoque <sup>5)</sup> dissectionibus suis innixus, defendere non dubitat, nec minus Clar. DEVENTER et BERTIN <sup>6)</sup>, eadem sub experiundo phaenomena saepenumero viderunt. Si vero contra haec acute obii-ciunt aduersarii, animalia tot praeceuntibus incisionibus prius adeo fuisse exagitata, ut vereri liceat, ne dolor, quem a noua irritatione deriuant, potius a priore fuerit excitatus, cum adeo difficile sit sub eodem experimento nouos a praegressis distinguere sensationis effectus; eandem certe contra alia experimenta, quae partium denudationem requirunt, ferri posse exilimauerim obiectionem, licet vana esset, si cautela a Cel. DUVERNEY adhibitae rite obseruantur. Confirmatur etiam haecce sensibilitas medullae Cel. BORDENAVII experimento <sup>7)</sup>, cum sine praeceunte violentiore laniatione, canalem ossis cuiusdam aperiret, et irritatione membranae medullae animal dolo-

4) Mémoires de l'Acad. des Sciences, Paris A. 1700. p. 196. item Oeuvres anatomiques 1761. p. 352.

5) The Anatomy of human bones, Edinburgh 1741. p. 20.

6) Traité d'Osteologie p. 216.

7) Mercure de France, Jun. 1757.

doloribus affici viuis, videret. Sique dubium quoddam eo tempore nihilo fecius contra sensibilitatem medullae ei haerebat, illud experimentis Cl. TROIA<sup>8)</sup> profligatum esse speramus. Hic enim, cum ad enodandam difficilem circa regenerationem ossium materiam, columbarnum canumque femora amputaret, et medullam stylo immisso destrueret, violentissimi doloris signa constanter edere animalia, vidit, prioris iniuriae immemora.

## §. 11.

Morbi denique medullam adgredientes sensibilitatem eius in aprico collocare videntur. Quando enim medulla ossium, mitem suam, per humores lue venerea, scorbuto, scrophulis atque rachitide inquinatos, amittit naturam, et in acrem putridamque fanie commutatur; inflammationes clandestinae mox exoriri solent. Sub his autem in medullis ipso citius tardiusue dolores excitantur atrocissimi, fixi, nunc continui nunc pungentes et cum calore atque pulsatione interna coniuncti. In ipso denique canali abscessus generantur, substantiam ipsam ossis in omnem sensum dilatantes et carie illam intus destruentes. Dolorem vero hunc in ipso osse eiusque medulla residere, inde patet, quod partes ossa obtegentes, sub initio morbi nulla sint contaminatae labe, tumoris eleuati pressio nullum doloris incrementum faciat, calida vero intus sumta vel externe applicata eum adaugeant, quodque, cum demum caries ipsam superficiem destruxit, ossea substantia in pumicem quasi conuersa, aliquando ad tactum summam prodat sensibilitatem. Terribilem hunc morbum a PETRO DE MARCHETTIS, M. A. SEVERINO multisque aliis descriptum, sub spinae ventosae nomine nominamus, eumque a nodis rachiticorum indolentibus distinguimus, licet inficias non sit eundum, spinam ventosam extrema ossium praecipue adgredientem, in principio morbi, quo aliquando ossa unice inflata apparent, nec semper dolent, cum iis magnam habere similitudinem. Exoriente vero dolore profundo, cute etiamsi adhuc intacta, malignam, cancro comparandam, tumoris indolem mox agnoscimus. Spinae ventosae praeterea extremitates ossium non solum adgrediuntur, verum etiam alias ossium partes, ut diaphyses et ipsum cranium. In diploë cranii RIOLANUS iam humorem inuenit collectum, acerbissimi doloris atque exostoseos causam, et BONE-TUS in *Sepulchreto* suo immedicabilis doloris rationem a fanie inter binas cranii tabulas deriuat. Saepe etiam abscessus in internis ossium latebris sine ossium intumescencia generantur, qui summos, et cum perforatione ossis solum leuandos, excitant cruciatus.

## §. 12.

Sententia nostra de sensibilitate medullae ossium, quam etiam Ill. HALLER aperte negare non videtur, sic declarata, alteram eamque multo difficiliorem attingamus quaestionem, an nempe ossea substantia sensu sit praedita? Nervos nonnullos canales ossium penetrare audiuius, sed cum dissectione Anatomica fibrillas ipsi substantiae sese immergentes detegere non valeamus, plures celebratissimi Viri ipsam naturam

8) De nouorum ossium regeneratione, Lutetiae 1775.



naturam viuentein conſulere allaborarunt, cumque ſub ignis <sup>9)</sup>, butyri antimonii, ſpiritus niri fumantis aliorumque corrodentium applicatione, et ab icſtu, roſione atque ipſa offium perterebratione nullum doloris ſenſum exortum fuiſſe obſeruauerunt, omnem offibus ſenſationem abrogare non dubitarunt. Quid? quod Cel. CHESELDEN, HALLERUM, CALDANUM et VERNAM, cet. teſtes habemus oculares, quod cranio in aegris, ſenſus et mentis optime compotibus, ope trepani, perſoſſo, hi ſciſcitati, declararunt, ſe nihil ſentire, nec ullo ſub operatione angi dolore. Perforatiuo etiam et radula Chirurgi ſuperficiem offis corruptam ſaepe abradunt, ſine ullo aegri incommodo.

Sed pulchra etſi haecce experimenta primo intuitu totum diſquiſitionis cardinem fuſſiſſe videantur, puto tamen, illis nil aliud demonſtrari, quam quod offa ſana vel leuiter corrupta omni ſenſu ſint expertia, neruique latentes, ſi qui adſunt, naturalem ſuam facultatem non exerant. Sic etiam Cel. CALDANI, cum de inſenſibilitate nonnullarum partium agit, ſequenti ratione caute ſe exprimit: „aut nulli in iis partibus, quas inſenſibiles praedicauimus, inueniuntur nerui, aut ſi quidam exiſtunt, ii talem videntur induiſſe indolem, ut impreſſiones externas recipere atque transmittere non valeant, adeoque ſenſu carent“ <sup>10)</sup>. Nec aliud de his ſubtilioribus ſurculis ſane ſperandum erit, quippe cum firma ſubſtantia interpoſitos neruos ita perſtringat et comprimat, ut obiectorum impreſſionibus animam mouere nequeant. Uti enim callis obductae manus pedumque plantae ſenſum ſubiectorum neruorum non experiuntur, artusque compreſſione protrahiore neruorum ſupent acrioremque ſenſum et denique omnem amittunt; ſic etiam ii, qui ad ipſam ſubſtantiam offium diuiduntur, materia adeo compacta atque dura non poſſunt non quaſi ſtrangulari et proprietates ſuas eſſentiales exuere. Extima praecipue offium ſtrata, quae ſemper firmiora ſunt, minima produnt ſenſus indicia, interiora autem et diploë multo maiora <sup>11)</sup>, cum textura heic mollior, totum neruorum organiſinum nondum deſtruxerit.

§. 13.

Si vero haecce fortiora vincula neruis ab offeis fibrillis impoſita, rurfus in affectionibus offium variis ſoluuntur, hi deperditas vires recuperare videntur, ita ut omnes illatas iniurias aegre ferant. Scio quidem hancce receptam et a multis obſervatam ſenſibilitatem a nonnullis fuiſſe in dubium vocatam, ab aliis varia ratione explicatam vel etiam plane reiectam <sup>12)</sup>. Sed argumenta his obii-cienda et ex praxi petita non leuioris eſſe ponderis et difficulter refelli credo. Caſum ergo primum enarrabo, eo memorabiliorem, quod, meo quidem iudicio, ſenſibilitatem offium extra aleam dubitationis collocare videatur. Lugduni Gallorum Anno

Kk 2

MDCCLXXIV

9) Mem. ſur l'irritab. et ſenſibil. Epiſt. Caldani. T. III. p. 36.

11) Anatomie chirurgicale par Palfin reſondue par Petit. T. I. p. 17. an. 1753.

12) Lege commentat. III. HALL. T. 3. p. 1. Nov. Comment. Gott. 1773. inferſtam.

10) Ibid. p. 348.

MDCCLXXIV commorans, aegram in Nofodochio magno quotidie visitaui, et ipse experimenta, suafore Cl. CARET, Nofocomii tum Chirurgo primario sagacissimo, varia institui. Accipe igitur illa, quae ex aduersariis excerpti.

Ancilla XXXVI circiter annorum, quae supra indicato anno innumeris angebatur cruciatibus, malorum suorum natales lapsui ante sex retro annos facto adscripsit. Ex scalis enim fortuito decidens, caput in lapidem ita illisit, ut in ossis parietalis medio cutis vulneraretur. Laesionem hanc autem adeo leuem credidit, ut sine chirurgi auxilio eam se consolidare posse speraret. Cito etiam hoc successit; cum vero cicatricis formatio ante ulcusculi perfectam depurationem promoueretur, illa, ut fieri solet, inaequalis, crassa atque ad tactum dolens fuit, quae tamen incommoda, successu temporis, mitigari aegra sperauit. Sed post biennium cicatrix multo turgidior facta, tam acerbe dolere incepit, ut noctes atque dies insomnes transigere cogeretur. Dirupta demum cicatrice, mitigati sunt violentiores cruciatus, cumque ulcusculum aliquantum dilataretur et aptis remediis purgaretur, omnis dolor discessit, et coalitio ipsa non tarde infecuta est. Eodem vero passu quo ulcus coiuit, dolores consueti capitis, nulla profligandi arte, iterum increuerunt. Adiuit demum aegra summis defatigata doloribus Clariss. CARET, auxilium ipsius sibi expetitura. Hic sub capitis examine duas cicatrices sibi vicinas inueniebat, recentiore nempe et primam, easque tumidas, inaequales, duras et ad tactum dolentissimas. Excidebat igitur ambas ad os usque, quod tum carie late erosum deprehendebat. Ex hac quidem operatione lenimen iam sensit exoptatissimum aegra; cum vero cariei esset obueniendum, totam ossis erosi superficiem a suis tegumentis prope liberatam, butyro antimonii, lacte aliquantum edulcorato, penicillo obliniuit, probe simul sollicitus, ne adiacentia eo polluerentur. Inunctionem vero illam adeo grauiter ferebat femina, ut statim atrocissimis premeretur doloribus et conuulsionibus vehementissimis totum corpus exagitantibus, quas tamen, acredinem omnem lacte et oleo colluens, demum lenire potuit. Aliud igitur consilium coepit Chirurgus praestantissimus, cum ex irritatione praecedente substantiam ipsam osseam, spongiae instar excrescentem, et exploratione accuratiore cariem in sua medietate ad ipsum cranii cauum penetrantem, videret. Sperabat scilicet, ut trepani coronis tribus quatuorue, recenti firmoque ossi applicatis, totum carie correptum frustulum excindere, et per aperturam, si quae vitia duram matrem adgressa essent, ea libere destruere posset. Solito itaque more cutem circum circa in ea distantia a loco adfecto incidebat, ut terebratula commode applicari posset, et periosteo optime abrafo, coronam primam admouebat. Inopinato vero phaenomeno interrompebatur mox operatio, nam trepani cuspidem et quauis instrumenti circumgyratione acerbis adeo percelleretur doloribus misera, ut non solum eiulatu eos prodere cogeretur, sed membris vehementer conuulsis, animo liqueretur. Absoluta igitur prima hac opera, quam ad scopum insufficientem vidit, trium reliquarum coronarum applicationem ad crastinum distulit; cum vero noua tentamina ad perficiendam operationem instituerentur, et iisdem aegra corriperebatur symptomatibus, unicam singulis diebus ceteris applicauit, iamque his demum feliciter peractis, ad alterum operationis momentum properauit, ad excisionem nempe carie destructi frustuli.



stuli. Attonitus vero cito obseruauit, ipsam duram matrem cum eo non tantum cohaesionem contraxisse, sed ex superficie eius fungosam excretionem cum illo ita se commiscuisse, ut os sine lata durae matris excisione excindere non valeret. Ad tactum leuiorem omnemque quamcumque irritationem adeo insuper dolebat locus affectus, ut ne radula quidem vel forcipe frustatim correpta ossa tollere auderet. Fato ergo miseram hanc mulierculam committere coactus fuit Cl. CARET, a natura id expectans, quod arte obtinere non potuerat. Foramina etiam trepano facta cito coiuerunt, et superficies optimae notae carne tecta fuit, fungosa vero caries in eodem statu diutissime persistit. Demum vero cute pedetentim sine praegraeessa exfoliatione locus corrosus obduci videbatur, eadem autem proportionem, qua ulceris extensio minuebatur, dolores capitis, quibus per plures menses liberata fuerat, rursus ingruiebant. Quam postea sortem subierit femina, ignoro; id vero sancte adseuerare possum, me saepe specillo nudum os in variis locis, inscie aegra, tetigisse, eamque semper ex leuiore tactu dolore statim fuisse cruciatam.

§. 14.

Quod igitur in genere antea contendere audebam, ossa nempe sub morbosa dissolutione sensibilia fieri, illud casu hocce plane euictum esse spero. Quum vero ossium substantia variis obnoxia sit commutationibus, quaeritur, an in omnibus et in quibus praesertim restitutae sensibilitatis obseruauerint indicia scriptores. Tota scilicet ossium massa iam sanie verniculatim quasi eroditur, iam terra omni orbatur, et glutinosa eius pars, quae formam ossis, licet saepe contortam simulet, intacta remanet, iam autem glutine spoliatur, et terra relicta ossibus singularem fragilitatem largitur, iam denique acredo quaedam humores corripens, terra et glutine in ossibus exuberante, tam vehementer in fibras osseas agit, ut expandi et tumores formare osseos cogantur; sed an in omnibus his morbis sensibilitatem ossa sint nacta, nondum satis repetitis experimentis est confirmatum.

§. 15.

In carie ossa saepe sensu praedita sunt. Contendere quidem nolo, in omni carie dolores existentes ab ossibus ipsis exoriri, omnemque ossium erosionem cum dolore esse coniunctam; nam saepe nullis grauioribus incommodis stipatur, et dolorificus sensus, de quo aegri sub exfoliatione naturali frustulorum, eorumque extractione queruntur, aliam saepe agnoscit causam, nempe periostei, in superficie sua pluribus in locis instructi neruis, fortiolem diductionem atque dilacerationem. Contendere autem sustineo in nonnullis cariei speciebus ab humorum lae ortis, et praecipue in scorbutica, venerea et cancrofa, ipsa cariosa officula tantam obtinuisse sensibilitatem, ut specillo ruditer tangi sine aegri incommodo non possint. Etenim quaedam acredines gradu alias videntur antecellere. De veritate huius rei quisque facillime conuinci potest, et NICOLAUS MASSA in carie femoris, cum ulcere magno coniuncta, eam optime detexit. Quid? quod papillae carnea<sup>13)</sup>, rubentes et

Kk 3

vascu-

13) MONRO on the bones, item BAGIEU des amputations 557. citante HALLER.

vasculis innumeris intertextae, ex superficie ossium denudatorum uberrime efflorescentes, suaeque propulsione vi strata externa ossium labefactata a sanis separantes, singularem produnt sensibilitatem. Granulosam hancce carnem eo minus a textu celluloso circumiacente et periosteo ossa rursus tegente, ut nonnulli volunt, deriuamus, cum ea, quae a media superficie et a centro ossis progerminat, vel quae, si BELLOSTII methodo cum perforatio exfoliationem promouendi utimur, ex foraminibus ipsis eleuatur et excrescit, aequae sensibilis sit, ac margines ipsi ulceris periosteo tecti. Caro quoque sub frustulis cariosis ex profundo enata, et ex fissuris rimisque corrosorum ossium euoluta, qua proprio admiuiculo natura a sano osse corrupta seiuungere atque expellere adnititur, eandem, si tangitur, sensationem prodit. Ab externa vero os obducente cellulosa eo minus haec erit deriuanda, cum saepe superficies externa circumcirca exsiccata et membranis destituta inueniatur. Cel. TENON<sup>14)</sup> praeterea, innumeris experimentis nixus, huius carnis ex ipsa cellulari ossis tela natales deriuat, ostenditque eandem ea ratione osseam demum acquirere duritiem, ut maiorem sensum firmitatem nacta, ad basin cartilaginea euadat, atque tum demum, ulcere consolidato, tota in durum os commutetur.

## §. 16.

Ossa, sine externa laesione, morbo emollita, sentire ex obseruationibus cl. DEIDIER et PETIT, quos ill. HALLER allegat, iam patet. Mirandam sane metamorphosin ossa in eo morbo subeunt. Absorpta enim terra omni, gluten ossium cum remanente cellulari substantia parenchyma singulare format, scalpello scissile et ceræ instar flexile. Ex obseruationibus vero multis circa hunc morbum collectis, perspicimus, variis gradibus emollitionis ossa affici; iam enim totius corporis ossa morbo correpta esse inuenimus, ut ex famosissimo mulieris SUPPIOT<sup>15)</sup> a multis descripto casu et ex eo, quem ill. PRINGLE<sup>16)</sup> nobis reliquit, elucet; iam vero nonnulla tantum ossa corripì videmus; in nonnullis maior terrae quantitas. in aliis minor est destructa, quo ipsa firmitas variis subiicitur vicissitudinibus. Id quod vero praecipue memoratu dignum et ad sensibilitatem ossium demonstrandam conferre videtur, in eo consistit, quod aegri omnes, antequam ossa emollescant, de dolore totius corporis et praecipue artuum conquerantur, et incedendi vel artus mouendi difficultate laborent<sup>17)</sup>. Alii in ipsis ossibus sensum lassitudinis percipiunt, pungentibus mixtum ictibus. Sub his ipsis continuis vexationibus, urina eiecta calcareo sedimento copiosissime ditata inuenitur, atque tum demum ossa torqueri et musculorum tractioni obedire incipiunt, firmitate iam nunc ossis omni destructa. Videmus igitur sub hac commutatione ossium structuram valde agitari, et aegros non vehementer errare, cum

14) Memoires de l'Acad. Royale des sciences An. 1758. sur l'exfoliation des os, 2de et 3me memoire.

15) Philosoph. Transact. Vol. 48. An. 1753.

16) In eodem Volum. p. 297.

17) LUDWIG. progr. de laesa ossium nutritione.



cum offa dolere contendant. Annuit etiam ill. PRINGLE, hocce malum a medulla, diffolvente qualitate inſtructa, originem ducere et ab interiore ſuperficie ad externam proſerpere. Variæ humorum corruptiones offa prædicta ratione adgredi ſolent, ita ut nonnunquam acridinis genuinam indolem indagare non valeamus, ſed ſcorbuticam acrimoniam luemque veneream inprimis ſuos in offa exſerere effectus, et non ſolum ad emollienda illa, verum etiam ad fragilitatem illis conciliandam, plurimum valere, quotidiana docet experientia. Præeuntibus doloribus continuis, fixis et atrociffimis in interiore brachii ſubſtantia hærentibus, adeo os ipſum, velamentis eius intactis lacſum fuit, ut motu violentiore frangeretur<sup>18)</sup>. Clam vero et ſine ullis præeuntibus ſignis raro ſiphilis offa deſtruit: vexantur enim ægri doloribus ſic dictis oſteocopis, ad deſperationem uſque interdum furentibus, ſubque his offa corripì videntur. Quo profundius vero malum iacet, eo violentiores excitare dolores, et maiorem offium promouere deſtructionem ſolet. Aliquando tamen exoſtoſis vere venerea, quam ea ratione formatam credunt, quod virus ipſum inter fibras oſſeas nidulans, ſuam effi-  
caciaſſimam adeo exerceat, ut fibras expandat atque eleuet, lancinantes et continuos dolores comites habet, quos autem eo minus perioſtei neruorumque ibi proſerpentium tenſioni adſcribere poſſumus, cum exoſtoſes ſic dictæ benignæ, licet ſæpe maximi voluminis, dolorem nullum excitent, malignæ vero vehementer furant.

§. 17.

Duplex vero, cum ſenſibilitas offium non ſit deneganda, ea prodiit phænomenon, explicatione phyſiologorum indigens. Primum nempe, quid cauſæ ſit, cur nerui hi ſubtiliores, ſubſtantiam ipſam intrantes et a dura materia per tot annos undique ita compreſſi, ut in ſtatu ſano inſitam ſuam vim exſerere non poſſint, illam tamen occultatam retineant; cum aliis experimentis in neruis inſtitutis didicimus, eorum medullam ligatione et compreſſione diuturna, vel violentiori, facile admodum deſtrui: alterum autem, quaenam ſit ratio cur in his morbis maiorem ſæpiſſime inueniamus ſenſum, quam qui a tam ſubtilibus metui poſſit neruis. Cõcedo quidem lubentiſſimè, omnia ratiocinia, niſi ab ipſa probe obſeruata natura fundamenta ceperint, lubrica eſſe atque vana, eumque difficilem in ſe ſuſcipere laborem, qui experimentis unice hæc quaefitiones enodare aduſus fuerit. Nullus tamen dubito, quin obſervationibus ſæpiſſime iteratis, experimentis et diſſectionibus frequentioribus extra hæc caliginem, qua adhucdum obuoluimur, denique emergere poſſimus. His nempe, quod ad primam difficultatem attinet, certiores nos reddi poſſe confido, an ne ea præciſe loca, quæ neruis permeantur, etiam in offium ſtatu ſano ſenſum prodant, an ne neruorum canales ita ſint firma materia circumuallati, ut a materie circumiacente premi non poſſint, et an ne in iunioribus, qui molliuſculis minusque firmis præditi ſunt offibus, ſenſus ſit exquisitior, et in ſenibus ille ob offium maiorem firmitatem ita perdatur, ut nulla ratione reſuſcitari queat? Quantum his dilucidatis

18) Mediciniſche und Chirurgiſche Wahrnehmungen, Erſte Sammlung von MUTZEL. Berlin 1754. caſ. XIX.

his disquisitionibus theoria ossium sensibilibus ex tenebris emergeret, nemo non praevidet.

Quod vero ad alterum phaenomenon attinet, ossa nempe morbosa maiorem sensum prodere, quam a tam delicatulis fibrillis expectaremus, illud ab antea cognitis aliquam explanationem admittit. Mirificum enim sentientis naturae in nervis augmentum in partibus inflammatis et diu irritatis observauerunt cl. WHYTT <sup>19)</sup> HALLER et alii. Hominem noctu videntem, cum oculus inflammatus esset, a cerebro inflammato, tetano correptum; ab ictu cranio illato, ingenio summo praeditum, qui stupidus fuerat, describunt observatores, quibus docemur, sensationes ab irritatione diuturna et pertinace adaugeri. Huic vero explicationi, ut et alteri, circa nervorum, ope cellularis telae auctam crassitiem, cum ad summam nervis ossium a morbo irritatis et corrosis iniunctam sensibilitatem explicandam non sufficere videantur, aliam hypothesein adiungam, forsitan non plane contemnendam. Experimentis scilicet in nervis institutis condocemur <sup>20)</sup>, telam cellularem fibrillas reuincientem insensibilem esse, earum vero medullam unice sentire et eandem medullam, quae maximum cerebri volumen constituit, simili facultate esse praeditam. LAURENTIUS quidem, SIMSON alique cerebri medullae laesiones a viuo animali non sentiri contendunt. Horum vero experimenta parum recte instituta esse, omnemque medullae laesionem a viventibus aegerrime ferri, optimis ill. HALLERUS euicit argumentis. Docta praeterea docet experientia, resectum nervum in innumeros medullares colliculos protuberare et fungosam carnem vel concrementum glandulosum, teste cel. I. van HORNE et MAIOW, ex dissecto vel compuncto nervo excrescere, cum cellulosa ipsa tela circa expressam medullam contrahatur. Nec ullum in chirurgicis initiatum fugere potest, ex cerebro, si ipsa eius substantia dilaceratur laediturque, fungos enasci magnos; quibus omnibus ex observationibus patet, medullae vim sese evoluendi et expandendi inesse. Fungos vero cerebri ipsos sensiles esse, celeberrima doctissimorum virorum experimenta testantur. Licet enim LOTHIEVI fungos cerebri insensiles, eosque, qui nonnunquam a dura matre progerminant, cum cl. LE CAT et WHYTT, sensiles describat, in GOOCHII <sup>21)</sup> et IOHANNIS FANTONI <sup>22)</sup> experientia contraria, atque naturae rei plane conueniente, nostram reponere fiduciam debemus. Ex hac enim scimus, veros cerebri processus periculose laedi et a vitriolo admoto vertiginem et oculorum distortionem exortam fuisse. Si vero caro, qua tegitur dura mater, sentit, ex diploë ossium sensili originem duxisse videtur. Ex his autem allatis experimentis in eam ducor sententiam, ut existinem, nervulos in morbis ossium, ab acredine quadam laceffitos, demumque corrosos in fungulos quasi excrescere posse, qui, cum latiori superficie sint instructi, non possunt non sensibilitatem illam adaugere, eamque ad omnia quasi puncta partis laesae expandere.

His

19) Physiological Essays p. 120.

21) Cases and Practical remarks in Surgery Lond. p. 10.

20) HALLER Elem. physiolog. Lib. X. p. 312.


22) Opusculorum medicor. et Phys. Genevae 1738. Observ. 28. p. 172.



His omnibus ALEXANDRI MONRO explicationem sensibilitatis morbosae ossium addere lubet. Notissimum est omnibus, sensationem nullam existere posse, nisi nervi tali mollitie et flexibilitate sint instructi, ut corpora prementia impressionem quamdam in illis exferere possint. Ossium ergo duritie in statu sano nervos defendente, imminuta et ablata, naturam suam indolem iterum acquirere videntur, cum iam nunc impressioni obsecudent, veluti unguis, si priores morbo sint destructi, recrescentes, dum molles sunt, sensum habent exquisitum, cum vero dein plane amittunt.

Sed diutius in hoc argumento immorari, parca in difficili hoc labore experimentorum copia vetat. Ossa in statu sano insensibilia, morbo sensibilia fieri, tot rationibus comprobare volui, quot colligere et experimentis arguere mihi licuit; nullo alio impulsus incitamento, quam ut alii in eam rem suam acrius conuertant attentionem, atque, si forte erraverim, me in veram veritatis viam reducant.

---



## XVI.

IOANNES HENRICUS RAHN  
DE MIRO INTER CAPUT ET VISCERA  
ABDOMINIS COMMERCIO.

G O T T I N G A E 1 7 7 1.

## PROOEMIUM.

**U**t omnes corporis viui partes mutuas sibi in peragendiis functionibus suppetias ferrent, altera alteri pro irritamento esset, iunctis uniuersarum viribus singularum integritas conseruaretur, illata sociis danina quasi pacto foedere ab omnibus oppugnantur, totum corpus intimo et amicissimo consensu conspirare necesse erat. Artissimis hinc vinculis singulas partes cum vicinis et remotissimis iunxit adoranda CREATORIS sapientia, et non solum ope telae cellulosae per totum corpus regnantis omnia inuicem combinauit, sed etiam per vasorum et neruorum communitatem, partium vicinitatem, membranarum continuitatem, fabricae et officii similitudinem propiorum et magis peculiarem sympathiam inter has et illas partes administravit, manifestissimis consensus illius inter utrumque oculum, utrumque renem, mammas et uterum, vesicam et glandem exemplis. Nullum vero consensus huius admirabilis exemplum dignitate excellit, maioremque ineditis attentionem meretur, quam illud, quod mirum viscerum abdominalium cum toto corpore commercium sistit, cuius licet ratio obscurior, phaenomena tamen certissima sunt, cuius necessitatem quoque facile perspiciet, qui perpendit, inter dignissimas corporis nostri functiones eam esse, cui viscera imi ventris praesunt, ab ea chyli elaborationem, solidorum et fluidorum laudabilem conditionem, neruorum vires, totius corporis vigorem dependere. Ciborum solutio, dilutio, in nostram naturam assimilatio, innumera vasa postulabant, quae tum digerentem calorem afferrent, tum diluentem laticem in receptacula chymi exhalarent, tum particulas menstruorum digestiuorum secretioni idoneas in destinata viscera deponerent. Quot neruos requirebant innumera secretoria illarum partium organa, maxima ventriculi et intestinorum in minimis punctis mobilitas? forsitan ipse chylus in innumeris glandulis mesenterii dilutus, subtilisatus, fluidi neruei admixtionem exigit. Quomodo cita illa languescentium ex inedia virium refectio; torpidae ex eadem causa et tristis mentis per nutrientem et excitantem ventriculi parietes alluentem haustum subito rediens vigor et serena hilaritas; remediorum praestantissima ex ipso ventriculo in remotissima loca efficacia; plures aliae primarum viarum in totam corporis oeconomiam vires impetrari potuissent, nisi ex toto corpore sentientes nerui ad has partes in alterum quasi cerebrum colligerentur? At quot ex horum viscerum cum uniuerso corpore consensu in functionum suarum integritatem et exinde vicissim  
in



in reliquas partes redundant commoda, tot ob eundem consensum oriuntur ex laesis organis digestionis damna, non in vicinis modo sed remotissimis quoque partibus; hinc horrendi illi et cito mortiferi venenorum ventriculo saltem receptorum effectus; hinc tanta malignorum miasmatum cum salua deglutitorum vis, herculeas corporis vires ad infantilem impotentiam infringendi; hinc incredibilis vermium, acris bilis potestas, totum corpus in convulsiones ciendi, omne nervorum systema perturbandi, sanguinem ad summum aestum incitandi, in remotissimis partibus dolores, inflammationes excitandi: et quis enumerabit innumeras affectiones, quae ex acri primarum viarum colluvie, laesa quocunque alio modo digestionem, obstructis visceribus abdominis in nulla non corporis parte, experientia quotidie docente, oriuntur, quarum curationem frustra quis aggreditur, nisi ad consensualem hunc ipsarum originem attenderit? Ex quibus etiam sponte patet, quanti momenti consensus huius cognitio Medico esse oporteat, et merito sane HOFFMANNUS, si ulla in rebus medicis doctrina scitu perquam necessaria et utilis sit, hanc ipsam de sympathia fructuosam esse dicit. Summis hinc laudibus extollendi sunt egregii viri, qui ex instituto tum in fontes huius consensus inquisierunt; tum phaenomena eius, uti in aegris apparent, accuratius descripserunt, varias causas multiplicium morborum, quae exinde originem ducunt, tradiderunt, illisque apta remedia opponere docuerunt, inter quos merito ill. HALLERUS, LANGHANS, REGA, VATER, BUCHNER, WHYT, primi nominandi sunt. Eadem huius thematis insignis dignitas etiam me permovit, ut amplissimae huius doctrinae partem, consensum nimirum inter caput et viscera abdominis, dissertatione inaugurali fufius exponendam mihi sumerem. Quodsi B. L. pauca inueneris, quae non antea a doctissimis Viris melius dicta sunt, vel multa maioris momenti me praeteriisse reperies, partim iuventuti, partim temporis breuitati et argumenti magnae ubertati imputes, rogo.

### §. I.

Innumera fere sunt symptomata, quae, quanta sit inter caput et quaelibet inni ventris viscera conspiratio, aperte ostendunt, et millenae observationes docent, nullam affectionem dictorum viscerum esse, quae non aliquando caput in consensum duxerit; nullumque fere capitis morbum esse, quin ex laesione ventriculi vel alius nobilioris visceris abdominalis originem duxerit. Ut euidentissime haec pateant, quosvis capitis morbos pertractemus, eorumque varios ex abdomine origines ostendamus, incipientes ab illis, qui externum caput afficiunt.

### *Dolores capitis consensuales.*

### §. II.

Mittere hic liceat, quae ad dolorum capitis, ratione sedis, ambitus, sensationis quam exhibent, vehementiae, durationis, varias diuisiones et cognomina pertinent; neque idiopathicum vel aliunde quam ex ventre consensualium causas varias enarrare, huius loci est; id tantum praemittimus, horum dolorum sedem plerumque ex-

tra caluariam esse, in partibus cutaneis et musculosis, quibus cranii ossa obteguntur, et per quas non solum vasorum copia, sed innumeri insuper nervorum rami et surculi, quinti et septimi paris cerebri, et cervicalium propagines distribuuntur, multa ubique inter se commercia ineuntes. Longe enim frequentius has externas quam internas cranii partes illos dolores obsidere, suadent tum ipsa aegrorum sensatio, doloris externa compressione variorumque topicorum applicatione mitigatio, tumor partitis dolentis interdum apparens, varicosae venarum externarum distentiones post inueteratas cephalaeas <sup>1)</sup>; tum praesertim doloris migrationes, quae adeo accurate nervorum externorum decursum sequuntur, uti in homine quodam vidit Ill. v. SWIETEN <sup>2)</sup>, cuius hemicrania semper eo loco, quo ex foramine supraorbitali ramus quinti paris emergit, incipiebat, sensim deinde nervorum anastomoses persequens per totum dimidium caput dispersebatur. Ex eodem nervorum capitis externi decursu et anastomosis facile explicatur, cur clavi hysterici et hypochondriaci non raro ex dolore in fronte subito in vehementes occipitis dolores et spasmos, ad cervicem et scapulas protensos transeant <sup>3)</sup>; cur in hemicrania oculus affecti lateris tumeat, splendorem amittat, intra orbitam deprimatur, vel extra eam promineat, lucem adeo moleste ferat, pupilla coarctetur <sup>4)</sup>, lachrymae riuus instar effluant, palpebrae nictitent, <sup>5)</sup> nares e directo multo stillent sero <sup>6)</sup>. His positis, facile comprehenditur, quomodo ex variis vitiis praecordiorum consensuales cephalalgiae produci possint; arctissimam enim nervi intercostalis cum quinto et septimi paris ramo duro, et nervis cervicalibus, paris octavi cerebri cum primo pare cervicis communicationem esse, ex anatomicis notum est; affecto ergo in abdomine nervo intercostali vel pari vago, facile irritatio transibit in illos capitis, dolores et spasmos creabit, qui eo facilius contingent, ubi simul, ut plerumque fit, ob spasmos abdominales sanguinis ad capitis vasa maior congestio oritur. Unice huic congestioni sanguinis capitis dolores febriles adscribit cl. LANGHANS <sup>7)</sup> at cum saepissime in febribus inflammatoriis, praesertim pectoris manifestissima congestio sanguinis ad caput signa adsint, tinnitus aurium, oculorum tumores, genarum rubores, carotidum pulsus, venae turgidae, licet de dolore capitis non quaerantur aegri; et ex PROSPERI ALPINI observatione, saepe profusissimae narium haemor-

1) A. N. C. Vol. I. obs. 89.

2) Commentar. in Aphor. BOERH. T. II. p. 534.

3) Ob commercium inter nervos frontales, occipitales et cervicales. vid. MONRO Nervor. anat. contr. Eranequerae. 1754. p. 41.

4) Ob coniunctionem primi rami quinti paris et tertii ad ganglion ophthalmicum, ex quo nervi ciliares. MECKEL Diss. de quinto pare nervorum cerebri. Goettingae 1748. §. 48. 130. hinc quoque hemicrania post iteratam puncturam ad cataractae depositionem. WEPFER obs. de af-

fect. cap. obs. 53. et visus duplicatus cephalaeam sequens. HEISTER Medic. Wahrnehm. B. I. p. 716.

5) Ob communem nervorum frontis glandularum lacrymalium et palpebrarum truncum, et anastomosis inter nervos lachrymales, subcutaneum malae et temporarium profundum internum. MECKEL l. c. §. 45. (— hor. sc. I.)

6) Ob ramum nasalem nervi ophthalmici. MONRO pag. 11.

7) Diss. de consensu Partium C. H. Goettingae 1749. §. 22 sqq.



haemorrhagiae nullum plane capitis dolorem aut obscurissimam grauitatem inferant <sup>8)</sup>; acerbè quoque non raro caput doleat sine signis congestiōis, videtur neruorum potius quam vasorum consensus accusandus esse; licet non negemus, tensionem ex sanguinis mole et impetu multum conferre posse, ut nerui facilius ex irritamento quodam afficiantur, acriusque doleant, unde toties cephalalgias febriles, licet causa ipsarum nondum remota sit, minuimus per venaesectiones, pediluua, phoenigmos, quae plethoram minuunt, impetum sanguinis ad inferiora dirigunt.

## §. III.

Sed ipsas consensualium capitis dolorum causas quod attinet, licet diuersissimae sint, in eo tamen conuenire videntur; quod aut circulum sanguinis in vasis abdominalibus difficiliorem reddendo, stricturis spasmodicis et congestionibus ansam praebeant, aut stimulo suo ipsos neruos per viscera abdominis distributos proxime afficiant. Ex priori causa ortae diuturnae cephalalgiae memorabile exemplum narrat Ill. MORGAGNUS <sup>1)</sup>, in pueri nempe, qui a prima fere adolescentia doloribus capitis vexabatur, cadauere nulla alia morbi causa inueniebatur, quam peruersus situs renis dextri, arteriae magnae et venae cauae incumbētis, et haec vasa ad vertebrae comprimentis. Simili modo obstructio alui capitis dolores producit; saepissime chronicarum cephalalgiarum accessiones, exacerbationes unice ex neglecta alui libertate proueniunt, aluus enim libera in quibusvis capitis morbis semper mirabilis, semper utilis <sup>2)</sup>, ubi vero eadem adstricta parum reddit, caligines, dolores, aliaeque superioris ventris mala increascunt <sup>3)</sup>. Omnium saepissime febriles capitis dolores ex alui tarditate originem ducunt, quod optime HOLLERIUS <sup>4)</sup> notauit, qui, priusquam de venaesectionibus in capitis dolore decernatur, videndum esse monet, num dolor hic propter adstrictam aluum, aut vapores ventris excitetur, tunc enim quoad dolorem venaesectionem necessariam non esse, sed clysterem sufficere, ut libera aluus fiat. Non raro benefica ipsa natura in febrium incremento et vigore, dum leuantes vel criticas narium haemorrhagias, aut morbosae materiae per sudores et exanthemata eliminationem molitur, ut in priori casu largior sanguinis copia caput, in posteriore peripheriam corporis petat, aluum stringit; at inde graues non raro capitis dolores simul oriuntur, anxium medicum reddentes et dubium, num illorum leuamen ex alui post peractas excretiones spontanea restitutione expectare liceat, num ad auertenda, quae crudis retentis, ipsius doloris vehementia minantur grauiora mala, naturae auxilia retardare, impedire per alui apertionem conducat; accedit, quod saepe medicus decipiatur, ut dolorem capitis pro haemorrhagiae criticae prodromo habeat, qui talis non est, quod in cephalalgis verminosis aliquoties sibi accidisse fatetur cl. van den BOSCH <sup>5)</sup>, eadem quippe symptomata, quae instantis haemorrhagiae narium signa

Ll 3

haben-

8) De praesag. vita et morte. pag. 44.

1) De sedibus et causis morbor. per anat. indagatis. Epist. I. art. 17, VI.

2) BAGLIV Opera. edit. Lugd. an. 1745. pagg. 69. 75. 275.

3) CELSUS de Medicina L. I. Cap. 3. Edit. Lugd. p. 31.

4) De morb. intern. Lib. II. Cap. 21.

5) Hist. constit. epid. verminosae. Lugd. Bat. 1769. pag. 293.

habentur, alius obstipata, aurium tinnitus, oculorum rubrae suffusiones, narium gravitas, pruritus et stillae, etiam vermium intestinalium frequentes effectus sunt, qui, si ante morbum nullis sese signis prodiderunt, neque in praesenti nunc morbo in suspicionem cadunt, et hinc facile illa symptomata pro indiciis futurae haemorrhagiae salutantur.

#### §. IV.

Praeter obstructionem alui inter frequentissimas cephalalgiae consensualis causas ponenda est, quaecunque vitiosa primarum viarum colluies, quae nervos ventriculi et intestinorum irritat, siue tenax sit pituita, fluctuante suo motu his partibus molesta, siue acida saburra. siue acris corrupta bilis. GALENUS <sup>1)</sup> iam saepissime observavit, flava in ventriculo bile contenta caput dolore affici, ut et mox bile eiecta dolorem sedari. Quoties videmus post graviore animi affectus, iram praesertim, cephalalgias oriri, quae non raro, nisi educantur biliosae sordes ex illa perturbatione ortae, acerbae et pertinaces fiunt? gravissimas ex hac causa cephalaeas observavit HOFFMANNUS <sup>2)</sup> et aliis nil proficientibus unice purgantibus sanavit. Gravem hemicraniam in cholérico post quemcunque irae paroxysmum oriri, post aliquot horas vero bilioso vomitu solui vidit BIANCHI <sup>3)</sup>; de viro quodam taediosa hemicrania vexato narrat BORELLUS <sup>4)</sup>, qui reiecta per vomitum bile instar aquae fortis in terra bullientis, mire et subito levabatur. Plures novi, dicit ill. van SWIETEN <sup>5)</sup>, quibus semel in mense subito oritur immanis capitis dolor, et febris, postquam aliquot horis haec perpeSSI sunt, magnam bilis copiam vomunt, et illico se optime habent, purgans semel aut bis in mense datum, quo accumulari iam incipiens bilis euacuatur, antequam turgeat, tollit haec mala. Non mirabimur hunc, quod dolor capitis adeo frequens plurimarum febrium comes sit, cum toties febricitantium primam regionem maiore vel minore sordium copia gravatam esse sciamus; hinc HIPPOCRATES <sup>6)</sup> illis, quibus in febre non exitiosa caput doleat, aut caligent oculi, biliosam vomitionem imminere praedicat et alibi <sup>7)</sup> febricitantibus, quibus urinae sint conturbatae instar iumentorum, dolores capitis aut adesse aut futuros dicit; talem vero urinam inter certissima vitiosae primarum viarum colluiei signa esse, quotidiana experientia docet. Aliquando, quod egregie hunc cephalalgiae originem confirmat, in initiis et incrementis febrium plane absunt vel mitissimi sunt dolores, et demum in decremento, aegros vexare incipiunt, ubi nimirum materiae febrilis sanguini antea commixtae pars ad ventriculum et intestina deferitur, neque statim ex corpore eliminata has partes irritat, hinc tolluntur quamprimum sordes istae vel vomitu vel alui profluvio eiiciuntur; recte hinc monet HOLLERIUS <sup>8)</sup>, sanguinem detrahendum non esse, si post septimum

1) De loc. affect. Charter. Tom. X. pag. 442.

2) Opera omnia. Tom. II. pag. 235.

3) Historia hepatica. P. III. pag. 511.

4) Hist. et Obs. rar. phys. med. Centur. obs. I.

5) Comment. in aphor. БОЕРН. Т. II. pag. 44.

6) Prognost. III. 35.

7) Aphorism. Sect. IV. 70.

8) De morb. int. L. II. Cap. 21.



num demum diem dolor capitis primum inuadat, sed alium liberaliter mouendam. Ex quibus etiam patet, cur vehementissime caput doleat in iis praesertim febribus, quarum maxima causa in primis viis haeret, in febribus continuis biliosis, bilioso-pu- tridis, intermittentibus, et tunc nullis omnino remediis leuetur, nisi quae doloris cau- sam ex corpore expellunt FORESTUS<sup>9)</sup> de aegro continua febre laborante narrat, qui ingenti capitis dolore ne minimam ex somno requiem concedente vexabatur, sta- tim vero dolore liberabatur, et in somnum incidebat, quamprimum multae pituitae copia vomitu exierat; et RIVERIUS<sup>10)</sup> acerbissimam pungentem lancinantem hemi- craniam in paroxysmis febris intermittens tertianae inuadentem emetocathartico, quod duas porraceae et aeruginosae bilis libras eduxerat, adeo perfecte sanauit, ut sequentem febris accessionem ne minimus dolor comitaretur. Atrocibus cephalalgis aegros Culenburgeneses epidemica febre laborantes vexatos fuisse dicit cl. KLOEKHOF<sup>11)</sup>, purgationibus vero sursum aut deorsum, sponte, vel, post missum ob febris vehe- mentiam sanguinem arte factis, ocysime leuabantur. Acutissimi capitis dolores febrili- biles Lausannensi iuncti erant, quos pro tempore tantum leuasse lintea aceto ma- dida fronti applicata, curantibus mulierculis, folis sedibus sanatos fuisse affirmat ill. TISSOT<sup>12)</sup>; intolerabiles cephalaeas ex eodem fonte in febre anomala Bataua obser- uauit cl. GRAINGER<sup>13)</sup>. At non solum febriles, sed chronicae quoque et diuturnae cephalaeae, hemicraniae, saepissime ex cacoehylia imi ventris originem ducunt, uti optime notauit GALENUS<sup>14)</sup>, dicens: dolores capitis diuturni et soluti difficiles a leui causa vehementes accessiones habentes, ita ut nonnulli malleo se percuti arbitrentur, alii caput contundi distendique sentiant, neque strepitus, neque vocem vehementio- rem, neque lucis splendorem, neque motum tolerare possint, non paucis ob sensus in ventriculo exuperantiam excitari; et plerumque in talibus aegristum ex causis occa- sionalibus, tum ex caeteris symptomatibus manifesta signa deprauatae digestionis de- prehendemus; ex aliis morbum ab animi affectibus vehementioribus, ira, moerore praesertim originem fuisse audiemus; alii diarrhoeam, dysenteriam suppressam dolores secutos fuisse dicent; in aliis alias causas praegressas fuisse, quae digestionem praesertim laedere, bilis secretionem et crasin perturbare, cruditatibus et sordibus an- sam praebere solent, comperiemus; in plurimis linguam sordidam, gustum oris de- prauatum, appetitum morbosum, molestias circa praecordia, inordinatam alui ege- sitionem, reliqua sordium intestinalium signa prehendemus; et saepissime tunc no- bis continget, atrocissimos etiam diuturnos tales dolores, quos frustra alii venaesectio- nibus, temperantibus, cephalicis, sedantibus, topicis tollere conati sunt, paruo dige- stiuiorum, euacuantium apparatu breui tempore radicitus sanare; modo grauiora vis- cerum abdominalium vitia, pertinaces obstructions absint, quae bilis et reliquorum humorum intestinalium secretionem et excretionem peruercentes, cruditatum perpe- tuam

9) Obseruat. Lib. VII. obs. 15.

10) Obseruat. Cent. I. obs. 27.

11) Opuscula medica. Trai. ad Rhen. 1747. pag. 4 et 82.

12) Dissert. de febr. bil. in Opusc. med. T. I. pag. 7 et 91.

13) Historia febr. anomalae Batauae Altenburgi 1770. pag. 31. 32.

14) De loc. affect. Charter. T. X. p. 448.

tuam nec exhauriendam copiam generant. Plura talium grauissimorum capitis dolorum consensualium exempla apud obseruatores leguntur. Sic POTERIUS<sup>15)</sup> de viro narrat, cephalaea vexato adeo atroci, ut in paroxysmis amentiam, coecitatem, sopores tandem produceret, a qua tamen liberabatur, postquam noxii humores ex praecordiis euacuari erant, digestionis organa vigorem recuperauerant. CAROL. PISO<sup>16)</sup> exemplum affert nobilis virginis subita hemicrania, cum capitis in postica conuulsione, tortura oris, maxillarum adstrictione, succedentibus manuum et brachiorum torporibus, affecta, quae tamen post haustum hydreleum, redditumque vomitu plurimum biliosum fluidum, breui sibi restituebatur. Acerbum occipitis dolorem per totam hiemem affligentem cum vertigine et obliuione, nullis aliis remediis quam purgantibus sanauit FORESTUS<sup>17)</sup>. Foeminam vidit GAHRLIEP<sup>18)</sup> hemicraniae obnoxiam, cuius accessiones semper limpidissimae sed fauces acrimonia erodentis lymphae vomitu iunctae erant, non obscuro consensualis ex stomacho originis indicio. Merito hinc BALLONIUS<sup>19)</sup> medicos monet, ne in diuturnis capitis doloribus nimis secure venas frontis aut occipitis aperiant, nec audacter arterias temporum referent, cum, quod saepe caput doleat, potius per quandam effumationem, quam sanguinis copiam fiat, quae potius purgationem, quam venaesectionem postulet. Quanta ex peruersa illa methodo capitis dolores quoscunque venaesectionibus, nullo plane respectu ad causam habito, medendi, tunc praesertim ubi ex foridibus imi ventris proueniunt, oriantur, tristia exempla in Epidemia Lausannensi vidit ill. TISSOT<sup>20)</sup>; non solum enim nullum leuamen inde eueniebat aegris, sed potius dolorum exacerbationes, maior virium prostratio, anxietates, sopores, hepatis obstrukciones, tabes; quos effectus quiuis facile praeuidebit, qui modo perpendit, venaesectionem semper nocere, ubi neque plethora, nec inflammatoria spissitudo morbum producit; intendere mobilitatem et sensibilitatem neruorum, resorptionem acris colluuii in sanguinis massam promouere; laxitatem solidis inducere, ideoque noxae materiae excretionem retardare, vim acuere. Neque melior fors aegris talibus doloribus excruciatibus promittenda erit, qui anodynis efficacioribus et opiatis tristem sensationem demulcere conantur; sedabitur forsitan doloris vehementia; sed mox acerbius redibit, incurabilior semper euadens; quo modo enim prodesse poterunt remedia, quae, nisi caute adhibeantur, motum peristalticum ventriculi et intestinorum minuunt, excretionem aluinam retardant, sanguinem commouent, et ad caput determinant? narrat GRUBELIUS<sup>21)</sup> de aegro febre laborante, et graui cephalalgia affecto, quam medicaster opio sedare conabatur: statim dolores cessabant, somnus redibat, sed hunc excipiebat delirium et mors horrenda. Unica hic spes est a remediis, quae sordes acres soluunt, diluunt, mitigant, euacuant, digestionem corrigunt, nouas cruditates praecauent.

## §. V.

15) Observ. Cent. II. obs. 74.

16) De morbis ex serosa colluuiie. obs. 13.

17) Observ. Lib. IX. obs. 63.

18) E. N. C. Dec. III. a. 1. obs. 83.

19) Opera, ed. Tronch. Tom. I. p. 87.

20) Diff. de f. bil. Op. T. I. p. 108.

109.

21) E. N. C. Dec. III. A. V. VI. obs. 54.

vid. etiam TRALLES de opio S. II. p. 219.

220.



## §. V.

Etiam vermes intestinales, uti tot malorum, sic dolorum capitis nunc mitiorum hunc grauiorum non rari sunt auctores. Legimus de foemina taenia vexata, spasticis ex hac causa affectibus obnoxia, quorum paroxysmi semper cephalalgia insigni incipiebant, cum spasmo nuchae, sensuum obnubilatione insequente, et finiebantur deiectione aluina <sup>1)</sup>. Virginem per quinquennium cephalaea misere excruciatam, et tantum non in rabiem actam, lumbricis expulsis, ab omni dolore liberauit PAULINI <sup>2)</sup>; et FÜRSTENAU <sup>3)</sup> de foemina narrat, quae de immanibus capitis doloribus acerbis fundebat querelas, ordinabantur venaesectio, scarificationes, antea vero digestiua et pillulae mercuriales laxantes praescribebantur, quibus assumtis ingentem saburram pituitosam et verminosam supra et infra eiecerat, tanto cum leuamine, ut venaesectio et scarificatione non indigeret. Neque ipsae ascarides caput intentatum sinunt; ab iis sensum titillationis in vertice molestum et quotidie recurrentem excitatum fuisse refert HOYERUS <sup>4)</sup> et adeo acutum capitis dolorem, ut conuulsiones ciceret, ab his animalculis in puero ortum obseruauit HOFFMANNUS <sup>5)</sup>; similia cephalalgiae verminosae exempla narrant cl. van den BOSCH <sup>6)</sup> et van PHELSUM <sup>7)</sup>.

## §. VI.

Sed praeter colluuias istas sunt aliae quoque causae, quae caput per consensum dolore afficiunt; et inter has maxime memorabilis est praeternaturalis sensibilitas et irritabilitas ventriculi et intestinorum, qua lenissimum stimulum tam acriter sentiunt, ut mox in spasmos cieantur et per consensum enormes turbas in toto corpore excitent. Saepissime ex hac causa dolores capitis oriri videmus in hypochondriacis et hysteriis; plerumque enim neruosa horum aegrorum symptomata ex morbofo statu neruorum canalis alimentaris produci, egregie demonstrauit cl. WHYTT <sup>1)</sup>. Frequenter ipsi aegri sentiunt spasmos in abdominis regione incipientes sensum per pectus et collum ad caput propagari, ubi nunc sensum tantum vibrationis et oscillationis integumentorum musculorumque capitis et faciei produciunt; nunc intolerabiles dolores excitant, qui modoinciput, modo occiput, in his dimidiatum, in aliis uniuersum caput occupant; aliquando in exiguo loco, qui transuerso pollice tegi potest, cum frigoris sensu iugiter defixi; enormibus bilis aeruginosae vomitibus non raro iuncti <sup>2)</sup>, nullis remediis cedentes, nisi quae spasmodicas illas stricturas in abdomine tollunt, nimiam ventriculi sensibilitatem sopiunt; hinc qui atrocissimi antea erant, post unicuique emissum ructum

1) Fränkische Sammlung. B. VIII. p. 480.

2) E. N. C. Dec. II. A. V. App. p. 63.

3) A. N. C. Vol. IX. obs. 98.

4) E. N. C. Centur. VI. obs. 73.

5) Opera omnia. T. III. p. 42.

6) lib. cit.

7) Histor. Ascarid. patholog. Leouard. 1769. p. 195. 200. et alibi.

1) Observat. on the nature, causes and cure of nervous disorders, Edingb. 1765. p. 127. sq.

2) SYDENHAM Opera med. Edit. Genev. T. I. p. 257. BRENDÉL Dissert. de valetud. ex hypochond. Goett. 1752. §. 6. WHYTT lib. cit. p. 305.

ructum aut flatum statim mitiores reddi, per aliquot laudani guttas vel pauca castorei grana paucis momentis fugari, solis remediis quae iustum canali alimentari tonum reddunt, reiectis cephalicis, per chinae corticem et martis limaturam ex radice tolli non raro videmus; immo unico cerato ventriculo imposito contumacem hystericam cephalalgiam sanauit **CARDANUS** <sup>3)</sup>. Curandum habuit iuuenem **ILL. TISSOT** <sup>4)</sup>, qui vix a cunabilis remotus, saeuis et continuis capitis doloribus erat vexatus; increuerant usu venae sectionis, purgantium, aquarum mineralium et thermalium, balneorum, iusculorum, aliorumque sub variis formis tentatorum remediorum farragine; quam diu paroxysmus aderat, deficiebat appetitus; balneis frigidis et china perfecte restituebatur. Ex simili sine dubio causa oriuntur periodicae illae cephalalgiae, quae nunc manifestiori, nunc nulla plane febre iunctae sunt, vario typo, vt plurimum vero quotidiano, aequalibus interuallis inuadunt, quarum historiam optime conscripsit **CL. MEDICVS** <sup>5)</sup>. Contingit quidem, quod intermittentes tales dolores aliquando vnice ab acri primarum viarum colluue dependeant; quare non raro cum diarrhoea biliosa iuncti sunt, interdum cum hac alternant <sup>6)</sup>, et euacuatis fordibus sponte cessant. Sic periodicam cephalalgiam vomitu solutam obseruauit **I. A. MURALTO** <sup>7)</sup>; et **LANZONUS** <sup>8)</sup> se ipsum epidemica quotidiana cephalaea per diarrhoeam biliosam liberatum fuisse scribit. Grauiissimam hemicraniam sinistri lateris ad ipsum collum et humeros extensam, cum erysipelato faciei tumore et odontalgia vehemente stipatam, quauis nocte accedentem, biliosa diarrhoea solutam, memorant **MEDICI SILESIACI** <sup>9)</sup>. Periodicam cephalalgiam obseruauit **LENTILIUS** <sup>10)</sup>, cuius paroxysmos humoris falsissimi vomitus cum leuamine praecedebant et comitabantur, et mitigabantur per copiosos aquae frigidae haustus, quibus acre illud dilutum fuisse videtur, vt minus irritare posset; sic etiam **WAGNERUS** <sup>11)</sup> de viro narrat, intermittente cephalalgia vexato, cuius insultus nonnisi accedente vomitu finiebantur; quare etiam **BAGLIVI** <sup>12)</sup> vomitoria et purgantia ante paroxysmum exhibita, tanquam optima aduersus periodicos capitis dolores remedia extollit. Attamen frequenter quoque accidit, vti etiam in aliis periodicis morbis, quod nulla vel pauca ffordium intestinalium signa in his aegris deprehendantur; vel illis licet euacuatis, nihilominus paroxysmi statim tempore recurrant <sup>13)</sup>, et continuatis euacuantibus exacerbentur; manifesto indicio, aliam causam eos producere, hanc vero in nimia canalis alimentaris sensibilitate et debilitate ponere, suadent magna roborantium stomachicorum, nunquam fallens corticis peruiani iusta methodo adhibiti, aduersus hos dolores efficacia <sup>14)</sup>; facilis eorundem reditus ex qua-

3) SCHENCK obs. med. pag. 53.

4) De morb. ex manu script. in Opusc. T. I. p. 187.

5) Geschichte Periodischer Krankheiten. B. I. p. 16. 17.

6) Journal de Medecine. Tom. XIV. p. 42.

7) E. N. C. Dec. II. A. VIII. obs. 12.

8) E. N. C. Dec. III. A. I. obs. 32.

9) Medic. Siles. Satyr. Spec. IV. obs. 3.

10) E. N. C. Dec. II. A. III. obs. 40.

11) E. N. C. Dec. II. — — —

12) Opera. pag. 249.

13) TORTI Therapeut. spec. pag. 103.

14) MEDICVS lib. cit. p. 344. MORTON opera med. T. II. p. 147. Journal de Medecine T. XXV. p. 442. DE HAEN The- ses de divif. febr. p. 134.



quacunque causa, quae digestionis organorum tonum minuit, animi affectibus, evacuationibus, diæta.

## §. VII.

Inter frequentiores consensualium cephalgiarum causas etiam plethora vasorum abdominalium referenda est. Nam ubi sanguis difficulter per haec vasa transit, et sensiles ventriculi et intestinorum tunicas distendit, saepe spasmodica harum partium crispationes oriuntur, quae per omnem syntaxin nervosam propagatae innumera mala, frequentissime vero cephalalgias, excitant. Hinc dolorifice illae cervicis et capitis tensiones, quae in pluribus mulieribus menstruum eruptionem praecedunt; graves illae cephalalgiae, hemicraniae, clavi, retardatum vel subito suppressum fluxum menstruum, lochiorum, haemorrhoidum sequentes; aliquando quidem hi dolores potius ex congestione retenti sanguinis ad caput oriri videntur, hinc vicaria narium haemorrhagia soluuntur, uti in foemina illa, quae ex tristitia suppressa menstrua habebat, et quousque plenilunio saevo capitis dolore afficiebatur, mox tamen cruento narium fluxu soluto<sup>1)</sup>. Alias vero nulla congestionis signa adsunt, et ex sola plethora abdominali, stasibus et spasminis ansam praebente, per nervorum consensum oriri videntur; hinc exiguae saepe capitis partem occupant, neque venae sectionibus semper minuuntur, statim cessant, quam primum redeuntibus illis fluxibus particularis haec plethora tollitur; tales clavos oculi dextri canthum occupantes ex mensium retardatione et subita sufflammatione observarunt PECHLINUS<sup>2)</sup>, HEISTERUS<sup>3)</sup>, et plures, et ex haemorrhoidum anomalia immanem faciei sinistrae dolorem, omnes huius partis nervos successivè afficientem, fixam tandem sedem in musculo zygomatico occupantem, qui nullis etiam probatissimis remediis nisi dolentis loci extirpationi cedebat, describit DEGNERUS<sup>4)</sup>. Sed ubi etiam ex aliis causis infarctus vasorum meseraicorum oritur, sympathicis doloribus caput affici potest; sic ZACUT. LUSITANUS<sup>5)</sup> saevam cephalgiam ex suppresso menstruo atrae bilis vomitu observavit, quae evanescebat, dum consuetus vomitus restituebatur; at nigri vomitus causam praecipuam esse infarctum vasorum ventriculi et intestinorum, egregie ostendit non satis laudandus Ill. TISSOT<sup>6)</sup>; etiam HILDANUS<sup>7)</sup> de viro inueterata hemicrania laborante narrat, qui neque arteriotomia, neque setaceis, variisue aliis externis et internis remediis levabatur, profluio vero nigri et coagulati sanguinis per alium ab omni dolore liberabatur. Ex his quoque patet, cur frequenter caput doleat iis, quibus viscera abdominis, hepar praesertim et lien, obstructa, scirrhosa sunt; non solum enim hi perpetuas cruditates in primis viis habent, sed simul sanguis, dum libera eius circulatio per illa viscera prohibetur, accumulatur in vasis mesenterii et spasmos producit;

Mm 2

inemo.

1) E. N. C. Centur. III. IV. obs. 154.

2) Observ. phys. med. L. II. obs. 58.

3) Medicinische und chirurgische Wahrnehm. B. I. p. 437.

4) A. N. C. Vol. I. obs. 161.

5) Prax. admir. L. II. c. 13.

6) in Epist. ad ill. ZIMMERMANN. de morbo nigro etc.

7) Observat. chirurg. Cent. II. obs. 9.

memorable est, quod dolores ex hac causa aliquando caput e directo visceris affectu inuadant, sic ex obstructione hepatis cephalalgias dextri lateris, et in alio lienis emphraxi laborante hemicraniam sinistri lateris obseruauit FORESTUS<sup>8)</sup>; idem in iis, qui calculo alterutrius renis laborant, saepius obseruauit BARTHOLINUS<sup>9)</sup>.

### §. VIII.

Etiā exulcerationes sensibilibus abdominis viscerum, vti alias spasmodicas affectiones, sic etiā cephalalgias producere possunt, vbi acri sanie nerui afficiuntur. Sic in iuvene, qui post crapulam vehementi cardialgia, vomitibus et acutissimo capitis dolore afficiebatur per octodecim menses durantibus, post mortem ulcus magnum ad cardiacam, ventriculum humoribus corruptis, foetidis et atrabiliariis refertum inuenit HILDANUS<sup>1)</sup>; simile ulcus in ventriculo, saluo cerebro, ostendit cadauer pueri perpetuis capitis doloribus per longum tempus fatigati<sup>2)</sup>; et a vomica vteri immanes cephalalgias et occipitis spasmos, opisthotoni instar caput posteriora versus trahentes, in puerpera obseruauit SCHUCHMANNUS<sup>3)</sup>. Similem mitiorem licet occipitis dolorem et nuchae spasmodicum<sup>4)</sup> obseruare, mihi occasionem praebuit Collegium clinicum summe venerandi praeceptoris Ill. SCHROEDER, nimirum in foemina, per plures iam annos vteri vomica laborante, quae quoties puris effluxus per genitalia instat, spasmodicis illis doloribus afficitur, qui perdurant usque dum puris effluuium cessat, renouantur, quoties de nouo pus in utero colligitur.

### §. IX.

Cum tandem febrium phreniticarum, paraphreniticarum, aliarumque neruofarum inprimis acutiorum, (quas etiā malignarum nomine multi insigniunt), origo longe saepius in praecordiis sit, ex inflammatoria stasi in visceribus, varie alienatis et corruptis humoribus in visceribus hypochondriacis retentis et collectis, quam in ipso cerebro, uti inferius prolixius ostendere locus erit; non dubitamus, quin etiā dolores illi, qui aegrotorum dictis febribus laborantium capita, maxime occipitio et ossibus bregmaticis, pertendant<sup>1)</sup>, similibus colli, lumborum, manuum, furarum doloribus, linguae tremoribus, apoplexiis, animi abiectioe aliisque neruosis symptomatibus iuncti, consensualis saepius quam idiopathici originis sint; pluries saltem his febribus defun-

8) Observat. L. IX. obs. 48. 49.

9) Centur. IV. epist. 6.

1) Observat. Cent. III. obs. 20.

2) BONET sepulcr. anat. L. I. S. I. obs. 123.

3) E. N. C. Dec. III. A. IV. obs. 42.

4) Consensus partium genitalium cum occipite facile ex communicatione primi et secundi paris neruorum cervicalium cum neruo intercostali explicatur. Vid. Clar. ASCHI Diff. de primo pare neruorum me-

dullae spin. Goettingae 1750. Fig. III. litt. μ. ξ. Σ. Fig. IV. litt. Σ. 2. Hinc etiā Agnesia ex occipitis vulneribus E. N. C. Dec. I. A. IV. obs. 104. HILDANUS Centur. VI. obs. 59. BAGLIVI oper. p. 347.

1) BRENDEN Diff. de Phrenitide. Goettingae 1756. p. 6. HUXHAM Opera phys. med. T. II. p. 78. HILLARY obseruat. on the epidemical diseases in the Island of Barbados. Lond. 1759. p. 37.



defunctorum cadauera non maiora cerebri vitia, quam possit alias acutas febres inuenire solenne est, ostendunt<sup>2)</sup>).

### §. X.

Ex dictis satis patet, quot dolorum capitis causae in abdomine haerere possint, in quas sedulo inquirendum medico incumbit, antequam quod nimis cito saepius fit, ipsum cerebrum grauius recondens vitia accuset. Ex iisdem apparet, quam fallacia sint signa idiopathici cephalalgicarum originis, si ex doloris fixa fede, vehementia, mali diuturnitate depromantur, cum etiam sympathicas summa atrocitate per plures annos saeuire posse exemplis demonstrauerimus, quoties nempe insuperabilia vitia in praecordiis haerent, vel ad leuiore causas non attenditur; vidit, ut unicum adhuc exemplum addamus, BAGLIVI<sup>1)</sup> foeminam, quae grauissimo capitis dolore per annos quamplures affecta erat, praescripto puluere a chymico, potentissime vomuit, et statim sanabatur. Immo possunt tandem aegros morti tradere, licet ne minimo vitio cerebrum affectum sit. Narrat RIVERIUS<sup>2)</sup> de puella, quae a duobus mensibus grauissimo capitis circa frontem et supercilia dolore torquebatur, singulis propemodum horis recurrente, lethalem epilepsiam tandem accersente; grauem in cerebro abscessum latitare, doloris continuas, vehementia, in epilepsiam et mortem transitus, puris ex mortuae naribus effluxus suadebant, sed ecce, aperto capite nil inuentum fuit, praeter serosum humorem in cerebri substantiam et ventriculos effusum; an probabilis tanti doloris causa? Vidit ill. TISSOT<sup>3)</sup> hystericam virginem, ex cephalalgia incongruis remediis ab empirico tractata, subito mori, secabatur caput, at ne minimum inueniebatur vitium. Sed possunt etiam consensuales dolores, inducto sensim per congestiones illas et spasmos in cerebro vitio, tandem in idiopathicos mutari; falluntur vero, qui videntes post mortem talia vitia localia, illa ut primas morbi causas accusant, cum prioris nonnisi effectus erant, licet postea doloris diuturnitatis, grauiorum insequentium symptomatum et mortis auctores fiant; mihi saltem probabile videtur, quartanam illam cephalalgiam in puero quodam, quam semper fames et ingurgitatio ciborum insignis praecedebant, consensualem fuisse, licet post mortem sinister cerebri ventriculus aqua limpida ad libram unam repletus inuentus fuerat<sup>4)</sup>, uti etiam intermittentes illi capitis dolores in epilepsiam tandem transeuntes et mortem, licet corruptum hinc inde cerebrum, scirrhusae obstructions, stagnans in ventriculis lympa inueniebatur<sup>5)</sup>, sympathici in primo origine, ob vomitus quibus solvebantur, fuisse videntur.

Sed ponamus, locale cerebri vitium adesse, quod dolorem excitat, etiam tunc inter praestantissima palliativa incurabilis morbi remedia erunt, quae praecordiis prospiciunt; trahuntur enim in consensum abdominis viscera, ubi cerebrum laesionem

Min 3

accipit;

2) BRENDÉL I. c. §. 9.

1) Opera p. 360.

2) Obseruat. Centur. I. obs. 37.

3) Epist. ad ill. DE HALLER. de variol.

apoplex. et hydr. in Epist. med. pr. pag. 169.

4) E. N. C. Cent. III. obs. 14.

5) E. N. C. Dec. II. A. X. obs. 117.

accipit, perturbantur in suis functionibus, hinc oriuntur cruditates, sordes, ex his spasmi, congestiones, noua igitur priori iungitur doloris causa, et malum exacerbat; immo possunt idiopathici capitis dolores, recte monente BRENDelio <sup>6)</sup>, prorsus intermittere, ita ut cum repetant, consensu alterius partis et alibi locorum haerente vitio prognascantur; et sapiens ill. TRALLEs <sup>7)</sup> monitum, nec satis imprimendum est, ne in obstinatis cephalalgis nimis liberales simus in propinandis opiatis, cum experientia constet, quaecunque demum causa foueat cephalalgiam, semper hanc initius affligere, si ventriculo bene sit, intendi, si is male habeat, opium vero ventriculi functioni valde inimicum esse. Tandem etiam in haereditariis et connatis capitis doloribus nunquam negligi debet sedula ad praecordiorum statum attentio; licet enim ob peculiarem fabricam solidorum, quam ars immutare non valet, penitus extirpare nequeant, multum tamen emolumenti his aegris praestabimus, ubi omnes causas, quae paroxysmos inuitare, accelerare, exacerbare possent, studiose remouemus; si enim, uti BALLONIUS <sup>8)</sup> dicit, dispositio iam iam adest in cerebro, a parentibus contracta, ea tamen non prius sese offert, quam malignus vapor a partibus inferis venerit, qui parti molestus est. Exemplum hereditariae cephalalgiae, quae probabiliter a vitiis digestionis alebatur, narrat BONETUS <sup>9)</sup>, pridie enim accessionum, quae crebro et saepe absque causa euidente inuadebant, semper praeternaturalem famem suslinebat aegra, et ipsos paroxysmos vomitus humoris modo acidi et quasi vitriolici, modo biliosi et amaricantis comitabantur.

### *Oculorum morbi consensuales.*

#### §. XI.

Quanta sit oculorum cum visceribus abdominis sympathia, plurimi illorum morbi, qui unice remediis vitiis ini ventris oppositis tolluntur, aperte demonstrant. Incipiamus ab *Inflammatione Oculorum*; si enim ullus morbus, sane hic frequentissime ex abdomine originem trahit. HIPPOCRATES optime iam annotauit, quam arcte ophthalmia cum cacoehylia intestinali cohaereat; dum lippientibus alui profluvium spontaneum prodesse <sup>1)</sup> oculorum ruborem in febre orientem, alui diuturnam malignam affectionem significare <sup>2)</sup>; et ex alui profluvio bilioso suppresso exanthemata circa cutem, oculorum inflammationes et illacrymationes oriri <sup>3)</sup>, praedixit. GALENUS quoque ex iis, quibus oculi phlegmone tentabantur, nonnullos sola purgatione per aluum uno die sanatos vidit <sup>4)</sup>. Nonne ex his medicinae parentum observationibus patet, in ophthalmiis non raro colluuiem vitiosam in primis viis haerere, ex qua illae totae pendeant, ita ut sponte cessent, hac expurgata? imo quotidiana experientia hoc satis confirmat. Saepissime nimirum oculorum phlogoses etiam graues oriri videmus, sine externa occasione, absentibus reliquis internis earum causis, ubi vero mani-

6) Diff. de dol. cap. §. 10. in Opusc. T. II. p. 154.

7) Tractat. de opio. S. I. V. p. 223.

8) Opera edit. TRONCHINI. T. II. p. 280.

9) Sepulcr. anat. L. I. S. I. obs. 14. app.

1) Coac. 225. Aphor. L. IV. 17.

2) Coac. 220.

3) Coac. 28.

4) Method. med. L. XIII. C. 2.



manifestissima saburrae acris primarum viarum signa deprehendimus, cui si remedia opponamus, facili negotio inflammationem tollimus, quae pertinax resistebat, et indies augebatur, quamdiu, vel unice topicis, vel remediis internis veram causam non attingentibus, malum aggrediebamur. Legimus expertissimorum medicorum scripta, et facile de veritate huius ophthalmiarum originis conuincemur. In oculorum inflammationibus, dicit PECHLINUS <sup>5)</sup>, cum frustra diu laboratum topicis et collyriis fuit, uno saepe purgante totus morbus profligatur. Grauem epidemicam ophthalmiam describunt MEDICI VRATISLAVIENSES <sup>6)</sup>, cum vehementi capitis dolore, et coecitatis secuturae periculo iunctam, aduersus quam nil erat utilius, quam profluvium alui siue sponte natura motum, siue pharmacis excitatum. Etiam HUXHAMUS <sup>7)</sup> similes epidemicas lippitudines observauit, in quibus crebra catharsis multo magis quam venaesectio profuit; et cl. STRACK <sup>8)</sup> in aegris morbo cum petechiis laborantibus, oculos saepe adeo inflammatos vidit, quasi rosea tela obiecti fuissent, euacuatis vero putridis intestinorum sordibus statim pristinum nitorem recuperauerant. Ex vermibus intestinalibus quoque non raro in pueris oculi inflammantur, quale exemplum apud SCHENCKIUM <sup>9)</sup> legimus; et mihi ipsi contigit, ophthalmiam grauem, quae a pluribus mensibus puerum vexauerat, eo ipso die, quo cholera accedebat, qua multa pituitosa, biliosa, et vermes per superiora et inferiora euacuabantur, fere omnino euanescere.

Sed grauiora aliquando latent in abdomine vitia, quae difficiliorem ophthalmiae curationem reddunt; pertinaces nimirum viscerum, hepatis praesertim et mesenterii, obstructions, digestionem peruercentes, spasmos et congestiones excitantes. Hinc chronicae illae lippitudines, toties in infantibus conspicuae, quorum mesenterium duris tumoribus scatet, probatissimae etiam externae medellae, repetitis alui ductionibus ne hilum cedentes, nisi simul efficacissimis resoluentibus tenax pituita visceribus impacta resoluatur, educatur, digestionis functioni robur et vigor addatur. Hinc tanta laus, quam recentiores quidam Angli, inprimis cl. FOTHERGILL <sup>10)</sup>, cortici peruviano aduersus chronicas ophthalmias tribuunt; efficacissime enim debili ventriculo et intestinis tonum restituit, viscidas et glutinosas cruditates praeuertit, eadem roborante vi stimulum obduratis viscerum vasis addit, resolutionem obstructionum adiuvat, secretiones instaurat, non sine cautione tamen roborantia in his casibus adhibenda sunt, licet enim species sit obstructionis ex atonia et succis stagnantibus nondum concretis, quae tonicis egregie debellatur, longe plures tamen recte monente incomparabili TISSOTO <sup>11)</sup>, quas augent tonica citius adhibita, dum roborando vasa

5) in Dialogo de potu Thee.

6) Hist. morb. Vratisslav. Lauf. et Genev. 1746. pag. 237.

7) Oper. phys. med. T. I. p. 341.

8) Observ. medicin. de morbo cum petechiis. Carolsruhae. 1766. aegr. 14. 15.

9) Observat. med. p. 154.

10) FOTHERGILL on the use of the cort.

peruv. in serophulous disorders in *Medic. Obs. and Inquir.* Vol. I. p. 303.

11) De febre bil. Lauf. Opusc. T. I. p. 74. Conferri quoque hae de re meretur HILLARY'S Inquiry into the Means of improving med. Knowledge. Lond. 1761. p. 496 sq. BISSET'S Medical Essays and Observ. Lond. 1766. p. 119. sq.

vasa nimis immobilem materiam altius visceribus impingunt, obstructionem insuperabilem reddunt, curationis spem tollunt, quae raro fallit, ubi praemissis resolventibus materia infarcta funditur, mobilis redditur, educitur, et tum demum roborantia adhibentur, ne liberata vasa debilia et atona remaneant, et mox reciduet morbus. Ex his etiam liquet, cur chronicae tales ophthalmiae, quae aut topicis saltem, aut ineptis internis remediis tractantur, sensim in grauiore morbos transeant, tales, quos alias ex viscerum imi ventris obstructionibus oriri videmus. Sic HIPPOCRATES<sup>12)</sup> in epidemicis notauit, multis post diurnitatem ophthalmiae fluentis factam esse lienteriam, tenesimum, diarrhoeam biliosorum, tenacium, crudorum, mordacium, nonnullis aquosorum; et memorabile est, quod de Nobili Veronensi narrat BAGLIVI<sup>13)</sup>: hic enim, postquam ophthalmia, qua vexabatur, usu topicorum intempestiue cohibebatur, noneducta prius per lenia purgantia serosa acri mesenterii viscerumque naturalium colluue, paucum post tempus tympanitide, alui siccitate, febre hectica, anasarca afficiebatur, et tandem moriebatur.

Possunt etiam ex aliis causis excitati spasmus abdominales ophthalmias producere; hinc oculorum rubores, inflammationes, in virginibus et foeminis ex menstruum suppressione, et in viris ex anomalia fluxus haemorrhoidalis, quarum memorabilia exempla narrant BOEHMERUS<sup>14)</sup> et HEISTERUS<sup>15)</sup>. Ex similibus sanguinis circa viscera stasibus provenire quoque videntur rubores illi oculorum et cruenta ecchymomata, quae aliquando circa vigorem phrenitidis, paraphrenitidis, sinumque nervosarum febrium apparent<sup>16)</sup>, ab HIPPOCRATE<sup>17)</sup> iam damnata, si in febribus cum vomitione et singultu, grauiorum nempe praecordiorum vitiorum signis occurrant. Etiam hypochondriacis ophthalmiae solennes sunt, quo tempore spasmus abdominis et flatibus tenentur, quin aliquando diurnis et permolestis epiphoris vexantur<sup>18)</sup>. Sunt quoque periodicae ophthalmiae, quae certis temporibus recurrunt, quarum historias collegit cl. MEDICUS<sup>19)</sup>, et de quibus recte annotauit HOFFMANNUS<sup>20)</sup>, eas non minus ac reliquos morbos, qui statas periodos seruant, plerumque fundamentum habere in visceribus abdominis ideoque remediis viscerum vitiis oppositis tollendas esse; talem ophthalmiam periodicam, sinulque vehementer dolorificam, et epilepticos insultus proxime minitantem, cortice peruiano sanatam fuisse, narrat TORTI<sup>21)</sup>; similem oculorum dolorem, sine rubore quidem quotidie iisdem horis accedentem, adeo vehementem ac si bulbus oculi cultro ex orbita exstirparetur, solo cortice curavit SAINT MARTIN.<sup>22)</sup>

## §. XII.

- |   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| 12) Epidem. I. hist. 2.                       | 17) Aphorism. Lib. VII. 3.            |
| 13) Opera. p. 576.                            | 18) HOFFMANN. Opera Tom. II. p. 166.  |
| 14) A. N. C. Vol. IX. app. p. 61.             | BRENDEL de valet. ex hypoch. p. 15.   |
| 15) Medic. und Chirurg. Wahrn. B. I. p. 1063. | 19) Geschichte period. Krankh. §. 19. |
| 16) BRENDEL diss. de phrenitide. p. 7.        | 20) Opera. T. II. p. 168.             |
| de cogn. paraphr. et febr. malign. p. 15.     | 21) Therapeut. special. p. 426.       |
|   | 22) Recueil period. T. XIII. p. 228.  |



## §. XII.

Sed ad ipsas etiam interiores oculi partes mirus ille consensus extenditur, et varias visionis laesiones producit. Primo huc pertinet *mydriasis* siue dilatatio pupillae *consensualis*, quam saepissime in iis obseruamus, qui vermes in intestinis gerunt, eamque, si non pro signo pathognomico, saltem pro syndrome et optima diagnosi vermium intestinalium habendam esse, repetitae obseruationes docuerunt Clar. COOPMANS<sup>1)</sup>; quod propriis etiam experiētiis confirmat Clar. VAN DEN BOSCH<sup>2)</sup>, qui saepissime ex solo hoc signo una cum splendore et renitentia albugineae vermium praesentiam cognouit, lumbricorum nempe, in iis enim, qui ascaridibus vexabantur, pupillam potius coarctatam se inuenisse affirmat; quod quidem discrimen ulteriorem medicorum inquisitionem meretur; obseruationibus saltem Cl. v. PHELSEM<sup>3)</sup> constat, pupillae amplitudinem in ascaridosis non ininus ac in reliquis verminosis occurrere. Etiam de narcoticis quibusdam venenis notum est, quod similem mydriasin excitent, uti de stramonio obseruauit RAIUS<sup>4)</sup>; eandem una cum oculorum ardore, pressione, quasi ab inspersis arenulis, in plurimis, quibus belladonnae doses propinaverat, obseruauit Cl. GREDING<sup>5)</sup>. Ex iisdem vero et similibus causis non raro etiam grauiora mala oculum afficiunt, *Scotomiae*, *Amblyopiae*, *Nyctalopiae*, *Hemeralopiae*, *Amauroses*. Saepissime omnium horum affectuum unica causa est acris quaedam saburra ventriculo et intestinis contenta, qua euacuata pristina oculorum acies redit. HIPPOCRATES<sup>6)</sup> iam ex falsis oculorum splendoribus vomitum biliosum praedixit; et GALENUS<sup>7)</sup> suffusis similia oculos imaginari dicit, diutius collecto in ore ventriculi tenui excremento, maxime in iis, quibus optica facultas quam facillime sentit, et tali modo affectos innumeros, tum praesentes, tum absentes, data ipsis picra se sanasse affirmat. Etiam ALEXANDER BENEDICTUS<sup>8)</sup> obseruauit nonnullos cum aliquando nil viderent, sine ulla manifesta causa repentina alui profusione lumen accepisse. FORESTUS<sup>9)</sup> iuuenem vidit, qui per interualla utriusque oculi suffusione laborabat, eo maxime tempore, cum largius potasset, vel cibaria cruda sine ordine deuorasset, coctione vero peracta, ructibus emissis, aut leni subsequente vomitione distinctius videbat. De femina, cui, quoties ventriculum acida saburra molestabat, quaeuis obiecta densa quasi caligine cincta apparebant, narrat Cl. WHYT<sup>10)</sup> lapides cancrorum, magnesia alba, aqua calcis, vomitoria, et amara visum restituebant. Hemeralopiam eodem tempore plures milites inuadentem, emeticis praecipue sanauit, iisdem puellae ex refrigerio corporis occaecatae visum restituit Clar. FOURNIER<sup>11)</sup>; qua-

1) in not. ad MONRO anat. nerv. contr. pag. 39.

2) Hist. constit. epid. verm. p. 329.

3) Hist. ascarid. path. p. 193.

4) DE SAUVAGES Nosol. method. Edit. in 4to. Vol. I. p. 748.

5) LUDWIG Aduersaria medico-practica. Vol. I. P. IV. p. 699. sqq.

Ludwig Script. neur. min. T. IV.

6) Prognost. III. 39.

7) de loc. affect. L. I. C. 2. Charter. T. VII. p. 384. 454.

8) SCHENCK Observ. med. p. 159.

9) Observ. med. L. XI. obs. 22.

10) Observations on the nervous disorders, p. 21 et 310.

11) Recueil period. T. V. p. 102. 426.

quatuor milites febre intermittente et simul nyctalopia vexatos unico vomitorio, quo biliosae cruditates euacuabantur, sanauit Cl. MEDICUS <sup>12)</sup>; et Cl. RIBE <sup>13)</sup> casum narrat iuuenis, qui postridie, ex quo de sublimi arbore in humum ceciderat, coecus reddebatur, sensim tamen repetitis emetici dosibus visum recuperauit; imo unico clystere puellam, quae derepente visu orbabatur, curauit RONDELETIUS <sup>14)</sup>; eandem enematis cathartici praestantissimam virtutem in viro hypochondriorum doloribus, ventris constipationi obnoxio, et subitanea amaurosi afflicto obseruauit HELWICH <sup>15)</sup>. An vero alia ratione absorbentia illa, emetica, clysteres, ophthalmicam hanc vim exercuisse probabile est, quam acres primarum viarum sordes corrigendo, et euacuando? Ex eadem acri intestinali colluvié sine dubio originem traxerunt amauroses illae, quas ex suppressis diarrhoeis et dysenteriis obseruauit LANZONUS <sup>16)</sup>. Non minus etiam vermes intestinales visionem aliquando laedunt; sic ab ascaridibus nyctalopiam excitatam vidit Cl. VAN PHELSUM <sup>17)</sup>; et ex lumbricis plenarias coecitates ortas describunt HANNAEUS <sup>18)</sup>, VANDERMONDE <sup>19)</sup>, HIRSCHL <sup>20)</sup>. Eo facilius vero visus laeditur, ubi dicta ventriculi et intestinorum irritamenta graues simul cardialgias et colicos dolores excitant; ex quacunque enim causa hae partes spasmodicis stricturis torquentur, per consensum oculi affici possunt; sic PLATERUS <sup>21)</sup> colicam quotannis cum amaurosi recidiuam obseruauit; similes coecitates colicam comitantes memorant NEBEL <sup>22)</sup> et FABRE <sup>23)</sup>, quae tamen mox emeticis et clysmatibus, quae colicae causam euacuabant, cedebant. Memorabiles praesertim sunt illae amauroses, quae colicae saturninae <sup>24)</sup> non raro superueniunt, non tollendae, nisi plumbeum venenum in ventriculo et intestinis haerens, horribiles illas harum partium constrictiones produciens, corrigitur et tempestiue e corpore eliminatur. Aliquando vegetabilia quoque venena maiori dosi in ventriculum recepta visus abolitionem excitarunt; sic PELARGUS <sup>25)</sup> de puerulo refert, qui altero die post comestas baccas solani coecus factus est; et Cl. GREDDING <sup>26)</sup> veram amaurosin in adolescente post iteratas belladonnae doses sequi vidit.

Interdum vero nullam alienam materiam primas vias irritantem accusare possumus, sed solam nimiam ventriculi et intestinorum irritabilitatem; uti in quibusdam periodicis amblyopiis et coecitatibus, quas, frustra adhibitis emeticis, purgantibus, innumeris aliis, cortex peruianus tollit <sup>27)</sup>; facile inprimis hypochondriacis et hysteri-

ricis

12) Samml. med. Beobachtungen II. B. p. 364.

13) Abhandl. der Königl. Schwed. Acad. der Wissensch. I. B. 10. Art. p. 81.

14) in HELWICH obs. phys. med. obs. 23. schol.

15) Obseruat. phys. med. obs. 23.

16) E. N. C. Dec. II. A. X. obs. 87. Dec. III. A. VII. obs. 70.

17) Hist. Ascarid. path. p. 194.

18) E. N. C. Dec. II. A. V. obs. 170.

19) Recueil period. T. X. p. 129.

20) Gedanken die Heilungsart der fal-

lenden Sucht betreffend. Berlin 1770. §. 32.

21) Obseruat. med. L. I. p. 110.

22) E. N. C. Dec. III. A. III. obs. 81.

23) Journal de Medecine T. XX. p. 346.

24) DE HAEN Diff. de Col. Pisonum. p. 36. Rat. medendi. T. III. C. 2. T. X. C. 1. 2. SEGNER et ILSEMANN. Diff. de Col. Saturn. Goett. 1752.

25) Commerc. Nor. 1732. p. 334.

26) LUDWIG Aduers. med. pract. I. c.

27) MEDICUS Geschichte period. Krankh. p. 344. Sunt qui etiam nyctalopiam illam

et



ricis spasmodicis colicis, quae toties sine ulla materia occurrunt, visus debilitas, imo aliquando amauroses sese addunt, vel cum illis alternant, uti aliquoties in feminis hystericeis observavit MORGAGNIUS<sup>28)</sup>, et alii. Peculiarem scotomiam in hypochondriaco observavit SEBAST. ALBRECHT<sup>29)</sup>, haec enim quotidie post somnum inuadebat cum sollicita animi fractura, et semper molesto in hypochondrio sinistro sensu praenunciabatur. Et GODART<sup>30)</sup> hystericeam feminam memorat, cui circa tempus paroxysmorum epilepticorum, quibus obnoxia erat, et qui manifeste consensualem originem habebant, omnia obiecta monstruosae magnitudinis apparebant, quare hunc affectum oculum microscopicum appellat, tollebat castoreo et martialibus. Etiam febres intermittentes suppressas, uti in aliis aliae spasmodicae affectiones, ita in quibusdam spasmodicae colicae et ex his amauroses sequuntur; talem coecitatem ex hac causa productam vidit, et aliquot olei caieput guttis sanavit Cl. TREW<sup>31)</sup>; similem observavit ANDR. EL. BUCHNER<sup>32)</sup>.

Non raro quoque spasmi abdominales, quos fluxus menstruus suppressus excitat, coecitates sine sensibili oculorum labe producant; qualem PECHLINUS<sup>33)</sup> in virgine vidit, cui menses difficulter crumpebant, mox post sanguinis ex pede missionem, quae fluxum promouebat, evanescentem; similem ex mensium ob pedum refrigerium subita suppressione ortam et redeunte fluxu solutam observavit HEISTERUS<sup>34)</sup>; et apud SENNERTUM<sup>35)</sup> exemplum legitur feminae post conceptionem ad tempus partus usque occoecatae. Ex iisdem tandem spasmin abdominalibus originem trahunt coecitates, quae parturientibus aliquando accidunt<sup>36)</sup>, non minus ac illa, quam ex calculo renum ortam vidit ADOLPHI<sup>37)</sup>.

### §. XIII.

Etiam Lacrymarum secretoria organa spasmin abdominalibus aliquando afficiuntur, ut copiosius laticem suum excernant. Hinc lacrymari oculos et albugineam splendere observamus in verminosis<sup>1)</sup>; lacrymantur, quibus anxii cum nausea quadam alius supprimitur<sup>2)</sup>. Molestam epiphoram saepe patiuntur, quibus debilis est digestio, sensilis ventriculus, ideoque stomachicis curavit Ill. TISSOT<sup>3)</sup> inuoluntarium lacrymarum profluvium, quod aegros febris biliosa Lausanensi debilitatos vexabat;

Nn 2

et hemeralopiam incolarum zonae torridae cortice peruiano tollere conati sunt, ob periodicum huius affectionis decursum. GRAINGER an essay on the more common Westindia diseases. p. 61. quem vero non ex vitiis corporis, sed unice a periodico diei et noctis reditu dependere ostendit HILLARY obs. on the epid. diseases in Barbados p. 297. sqq.

28) Epist. anat. XVIII. p. 310.

29) Commenc. Nor. Ann. 1738. p. 218.

30) Recueil period. T. XIII. p. 393.

31) Commenc. Nor. Ann. 1737. p. 187.

32) Miscell. phys. med. mathem. A. 1728. p. 1066.

33) Observ. phys. med. L. I. p. 853.

34) Medicin. und chir. Wahrnehm. I. B. p. 590.

35) Prax. med. L. I. p. 853.

36) HOFFMANN. Oper. T. III. p. 229.

37) A. N. C. Vol. II. obs. 87.

1) VAN DEN BOSCH hist. constit. verm. p. 329.

2) HIPPOCRATES Coac. 208.

3) Diss. de f. bilios. Lauf. Opusc. T. I. p. 82.

bat; ex eadem causa hystericas feminas saepe in lacrymas effundi videmus <sup>4)</sup>. uti eadem alio tempore largiorem salivam, alio copiosorem urinam excernunt. Rarum epiphorae consensualis quoque exemplum GOEZIUS <sup>5)</sup> in femina observavit, quae ab initio ad finem usque cuiusvis graviditatis copiosas lacrymas et salivam fundebat.

#### §. XIV.

Palpebrarum quoque et bulbi oculi musculi non raro afficiuntur, ubi imi ventris nervi irritantur. Quanta mutatio in oculis infantum observatur, quorum prima regio saburra acri repleta est? inordinate et rapide hinc inde moventur, nunc sursum, nunc deorsum, absconditis sub palpebris pupillis, modo ad latera attrahuntur, modo extra orbitam pelluntur, vel intra ipsam deprimuntur; in aliis palpebrae distrahuntur, bulbi figuntur, ut attente obiecta aspicere crederes, somno licet correptos; haec omnia horrorem adstantibus iniicientia spectacula evanescent, simulac alius subducitur, vel vomitu acris expelluntur. Etiam in adultis, licet raro nisi in connubio aliorum convulsuorum affectuum, tales oculorum motus perversiones ex irritamentis in praecordiis observantur. Sic strabismus spasmodicum cum oculorum dolore critica diarrhoea biliosa solutum vidit Cl. PAMARD <sup>1)</sup>. Observavit etiam BORELLUS <sup>2)</sup> periodicum tertianum strabismus, et alium in femina quadam, qui per totas et singulas praegnationes durabat; quorum origo aequae sympathica fuit, ac illius spasmi palpebrarum suppressas haemorrhoides sequentis, electricitate quae fluxum restituerat sublatis, quem memorat Cl. BAUMER <sup>3)</sup>. Frequentissima quoque hypochondriacorum querela est, oscillare et tremere palpebras, quasi dormituri cum sensu quodam asperitatis et ponderis aegre moveri, in superciliis et fronte pressionem quasi constringentis zonae se percipere; et de circulis illis liuidis palpebras circumscribentibus, inflationibus istis palpebrae inferioris cuilibet notum est, iis plerumque cacochyliam imi ventris, spasmos abdominales indicari; hinc solennes verminosis, lienosis, chloroticis, menstruantibus.

#### §. XV.

Quomodo vero recensita oculorum vitia ex laesione viscerum abdominis oriuntur, coniectura facile assequetur, cui nexus ille nervi intercostalis cum nervis oculi et adiacentium partium cognitus est. Facile enim irritatio nervi intercostalis ramis in abdomine distributis applicata, transibit per ipsius radicem a secundo quinti paris ramo ortam in reliquos huius nervi ramos; notum vero est, a primo quinti paris ramo ophthalmico non solum lacrynales glandulas et palpebras ramos accipere, sed ab eodem etiam cum filamento tertii paris nobile ganglion ophthalmicum constitui, ex quo rami ad iridem abeunt; cum vero tertium par cum quinto anastomosi iungatur, et a sexto alteram suam radicem intercostalis accipiat, non mirum, quod etiam musculi

4) SYDENHAM Oper. T. I. p. 259.

5) A. N. C. Vol. II. obs. 204.

2) Histor. et obs. rar. med. Cent. II. obs. 1.

3) Acta Acad. Elect. Mogunt. Vol. I.

1) Journal de medecine. T. XXIII. p. 63. p. 286.



musculi bulbi oculi in consensum trahi possint <sup>1)</sup>. Quod vero haec sympathia a nervo intercostali proveniat, experimentis PETITI <sup>2)</sup> satis patet; ligato nempe canis nervo intercostali in collo, oculus reddebatur defixus, lacrymans, lippus, visus caligine sensum obducebatur; pupilla dilatabatur, tandem plane, ut in gutta serena fit, immobilis reddebatur; relaxato vero nervo, novus oculo rediit fulgor. Sed etiam in homine pectore vulnerato ex nervi intercostalis laesione amaurosin secutam fuisse, refert STALPART VAN DER WIEL <sup>3)</sup>.

### *Narium affectus sympathici.*

#### §. XVI.

Magnum esse inter Nares et eas partes, quae a nervo intercostali ramos accipiunt, ob nasalium ramorum cum hoc nervo arctam coniunctionem, consensum, quotidie tum in sanis tum in aegrotis apparent exempla. Subsistimus in iis, quae viscerum abdominis cum illo organo commercium ostendunt. Huc primo pertinent vitia odoratus; falsae nimirum odorum perceptiones, quae interdum ex spasmis abdominalibus producuntur, ubi nempe ob irritationem nervorum in abdomine per consensum in ramis nasalibus similis motus producitur, quem res graeolentes in ipsis excitant. Sic observavit HARDERUS <sup>1)</sup> in pastore quodam hypochondriaco, qui certis temporibus lintea lotio madida odorare sibi videbatur, aliis in eodem loco constitutis tale quid non olfacientibus, similem molestissimum foetoris cuiusdam sensum insultus epilepticos ex hypochondriis oriundos praecessisse refert Ill. MORGAGNUS <sup>2)</sup>; et Cl. BAUMER <sup>3)</sup> de iuvene narrat emprosthotono periodico vexato, qui ingruente paroxysmo moschi odorem naribus attrahere sibi videbatur.

Inter frequentiores vero consensuales narium affectus referendi sunt, molesti illi pruritus, quibus toties verminosi vexantur, intolerabiles saepe, ut perpetuo nasum fricare cogantur, unde tetrae aliquando huius partis exulcerationes, et ipsorum variorum dilacerationes contingunt; et mirandum sane est, quod non lumbrici solum in ventriculo forte haerentes, sed in remotissimo quoque a naribus intestino recto degentes ascarides hanc titillationem producant <sup>4)</sup>; ex quo non minus ac ex absentia similis sensationis in faucibus et gula probabile fit, hoc symptoma potius nervorum commercio <sup>5)</sup>, quam continuationi membranae Schneiderianae per fauces, oesophagum atque omnem intestinorum tractum <sup>6)</sup> adscribendum esse. Minime vero adeo certum ac indubitatum animalculorum interaneorum signum hoc symptoma constituit, ac muliercularum cohors, et nonnulli medici credunt; simili quippe narium pruritu

N n 3

non

1) Conf. Cl. MECKEL diff. de quinto pare. v. BERGEN diff. de nervo intercost. in ill. HALLERI diff. anat. select. Vol. II, p. 871.

2) Mem. de l'Acad. des Sc. A. 1727.

3) Observat. Cent. I. obs. 31.

1) Observat. anatom. pract. obs. 40.

2) De causis et sedib. morbor. Epist. XIV. art. 28.

3) Acta Acad. Elect. Mogunt. Tom. I. p. 305.

4) V. PHELsum hist. ascarid. path. pag. 198.

5) WHYT observ. on the nervous disorders p. 35.

6) LANGHANS diff. de consensu part. C. H. p. 67.

non raro dentientes afficiuntur, si etiam ventrem vermibus vacuum habeant <sup>7)</sup>, etiam in aliis spasmodicis morbis non a vermibus pendentibus idem symptomata saepe obseruatur; memorat cl. ST. CLAIR <sup>8)</sup> infantem tussi pertinaci, sudoribus nocturnis a longo iam tempore afflictum, accedentes pauores sub somno, epileptici insultus, perpetuae narium fricationes, morbum verminosum esse suadebant, at data anthelmintica nullos vermes expellebant, neque intestinorum mortui infantis sollicita disquisitio tales detegebat, sed sana omnia imi ventris viscera, tubercula vero in pulmonibus inueniebantur, ex quibus apparet, etiam ex aliis partibus, quae neruorum opem cum naribus consentiunt, quod de dentibus et pulmonibus manifestum est, hoc symptoma prouenire posse.

### §. XVII.

Non raro *Sternutationes* quoque ex irritamento viscera abdominis afficiente originem consensualem ducunt. Sic legimus de sene, qui in crebras sternutationes incidit, quoties ventriculum iusto plus oppleuerat, quae vomitu soluebantur <sup>1)</sup>. Frequenter infantes verminosos, etiam adultos quosdam, matutino tempore a leui motu vermium versus ventriculum repentinum sternutare videmus, quousque vermis vel alia etiam materia vomitu eiicitur, vel vermium inquietudo assumpto cibo sedatur. <sup>2)</sup> Post febrem tertianam curatam horrendas sternutationes sequi vidit LANZONUS <sup>3)</sup>, quas probabiliter ex vermibus productas fuisse credit; etiam PETR. ALBRECHT <sup>4)</sup> filiolum quarto febris verminosae die in enormes sternutationes incidere vidit, usque ad decimum diem, quo moriebatur, protractas. Periodicarum sternutationum plures historias collegit cl. MEDICUS <sup>5)</sup>, has vero eiusdem ac reliquae periodicae affectiones originis fuisse, confirmat egregia Corticis Peruuiani in iis sedandis efficacia, quam expertus est cl. BERGIUS <sup>6)</sup> in ancilla, quae per aliquot hebdomadas immanibus sternutationibus per interualla redeuntibus, cum ingrata circa ventriculum sensatione iunctis, nec ullis remediis nisi laudato cortici cedentibus, vexabatur; et uti omnes spasmodici morbi, qui intermittentium febrium paroxysmos symptomatice comitantur, vel eas sponte aut incongrua medela iusto citius suppressas sequuntur, eandem plerumque ac ipsae illae febres originem agnoscunt <sup>7)</sup>, sic non dubitamus, quin ex eodem quoque fonte promanauerint, et eodem specifico remedio praecaueri et tolli potuissent sternutationes illae, quas tertianae febris tertio paroxysmo superuenientes, et in quarto miserabiliter ad mortem deducentes obseruauit LANZONUS <sup>8)</sup>; et istae, in quas virgo quaedam inciderat, quae tertianam febrem propter instantes amicae nuptiarum solennitates,

7) MORGAGNI de sed. et caus. morb. Ep. XXXI. art. 5.

8) Medical Essays by a Society in Edimb. Vol. II. p. 293.

1) A. N. C. Vol. II. obs. 190.

2) BOERHAVE Praelect. de morb. Nerv. p. 690.

3) E. N. C. Dec. II. A. IX. obs. 46.

4) Ibid. A. VI. obs. 12.

5) Geschichte periodischer Krankheiten. §. 22.

6) Abhandl. der Kön. Schwed. Acad. der Wissensch. A. 1760. v. VOGEL neue medicin. Biblioth. B. VI. p. 122.

7) MEDICUS lib. cit. §. 66.

8) A. N. C. Vol. I. obs. 63.



nitates, quas ambibat, suppresserat, uti refert CARL<sup>9)</sup>. Consensuales quoque fuerunt sternutationes, quas ex retropulsa ad viscera abdominis scabie in puero sequi vidit IOERDENS<sup>10)</sup>, sternutationum enim insultus semper doloris in abdomine sensus praecedebat. Tandem etiam illae sympathicae sternutationes notatu dignae sint, quas tempore fluxus menstrui obseruauit GARNANNUS<sup>11)</sup> et LANZONUS<sup>12)</sup>; post suppressionem eiusdem clar. DELTUS<sup>13)</sup>; singulis diebus per totam grauiditatem PEZOLD<sup>14)</sup>; ex pulchrae puellae aspectu AMATUS LUSITANUS<sup>15)</sup>; inter amplexus ueneros BARTHOLINUS<sup>16)</sup> et BONETUS<sup>17)</sup>.

### §. XVIII.

Pergimus, ut etiam *Haemorrhagiae Narium* ex vitiis praecordiorum originem ostendamus. Omnino nempe veritati consentaneum est, quod dicit WILLIS<sup>1)</sup>, solam plethoram, siue sanguinis acrimoniam raro per se haemorrhagiam facere, sed spasmodicos insuper motus plerumque accedere, qui sanguinis impetum ad caput dirigunt. Originem vero horum spasmodicorum saepissime in praecordiis esse, eorumque causam ibidem latere, extra dubium est. Sollicite iam HIPPOCRATES ad mutationes, quae in praecordiis contingunt, dum haemorrhagia narium instat, attendit, et praecipua signa futuri fluxus ex hoc fonte petit; qualia sunt palpitationes ventris cum hypochondriorum tumore sublongo; dolores, tensiones in praecordiorum dextra vel sinistra parte; urinae pallores, et similia, quae ex diui senis scriptis collegit, suis et aliorum obseruationibus vindicauit ill. van SWIETEN<sup>2)</sup>, quae omnia spasmodicorum abdominalium manifesta signa sunt; et saepe noxias haemorrhagias praecauere contingit, modo ad causas, quae spasmos illos excitant, attendatur. Non raro neglecta in febrium principiis et decursu alui obstructio sanguinis ex naribus fluxus non leuantes et noxios producit, promouet, profusiores reddit, qui aperta aluo statim minuuntur. Etiam acris saburra intestinalis, biliosa praesertim, inultum conferre potest, ut excitatis in abdomine strictionibus spasmodicis sanguis ex reforescente bile iam turgidus ad caput congeratur, haemorrhagia excitetur, et augeatur, quare purgantibus egregie tales sanguinis fluxus sistuntur. Sic SYDENHAMUS<sup>3)</sup> in haemorrhagiis narium, quae frequentes in febrem quantam epidemicam incidebant, diligenter esse aduertendum monet, quod, quamprimum illae quomodocunque sedatae fuerint, facile reciduae fiant, nisi leniens aliqua purgatio celebretur, et proinde purgandum sit, quamuis, si febris tempora spectentur, ferius id fieri soleat et debeat, nisi symptoma

hoc

9) ibid. Vol. VI. p. 80.

10) ibid. Vol. IX. obs. 43.

11) E. N. C. Dec. II. A. VIII. obs. 152.

12) ibid. Dec. III. A. III. obs. 32.

13) A. N. C. Vol. VIII. obs. 108. Etiam in haemorrhoidariis frequentes sternutationes saepe obseruauit summe uenerandus Praeceptor illustri SCHROEDER.

14) E. N. C. Dec. III. A. V. VI. obs. 183.

15) Cent. IV. Curat. 4.

16) Cent. V. hist. 99.

17) Sepulcr. anat. L. I. S. XX. p. 450.

1) Pharmac. ration. P. II. S. II. C. 2.

2) Comment. in aphor. T. II. p. 461. 463. conf. quoque CLASS. Comment. XII. de febribus p. 27 sq.

3) Opera T. I. p. 42.

hoc accefferit. Et cl. STRACK <sup>4)</sup> plures febre petechiali epidemica laborantes vidit, qui quamplurimum sanguinis e naribus et aliis partibus profuderunt, absque alia manifesta causa, quam quod in infimo ventre impura colluies erat, neque his vel venaesectionem, vel sedantia refrigerantiaue remedia profuisse, sed sola purgantia pharmaca auxilium tulisse, et nouas fluxus reciduias praecauisse. Etiam apud HIPPOCRATEM verba leguntur, quae connexionem hanc haemorrhagiae narium cum cacochylia ventrali suadere videntur; dicit enim, magnas in principiis haemorrhagias circa resectionem aluum humectare <sup>5)</sup>; iis, quibus sanguinis eruptiones plures, temporis progressu aluum male affici, nisi urina cocta prodierit <sup>6)</sup> (quae nempe criticam fuisse haemorrhagiam denotet); et alibi iis, quibus ex lumborum dolore recursus ad caput et manus torpidae, et cardialgiae, tinnitusque aurium sint, sanguinem largiter profluere praedicat, sed et aluum deorsum erumpere et mentem turbatam esse <sup>7)</sup>. Evidentissime haec haemorrhagiae narium origo etiam confirmatur exemplo, quod narrat MAYER <sup>8)</sup>, iuuenis qui frequentibus et uberibus narium haemorrhagiis erat obnoxius, quae tandem in haemoptysin desinebant, cui frustra quaecunque laudata remedia adhibebantur, cum vero spontaneis vomitibus incredibilis pituitae et bilis quantitas reiciebatur, ab eo die familiaribus ipsi sanguinis excretionibus liber erat; ex qua observatione merito concludit auctor, inter haemorrhagiarum causas eas in stomacho latitantes non friuole esse negligendas. Vulgaris quoque est observatio, verminosos saepe sanguinem naribus effundere; quare BAGLIVI <sup>9)</sup> stillas ex naribus, in febribus acutis apparentes, nonnunquam vermium latentium signa esse dicit; quod pluribus observationibus confirmat cl. van den BOSCH <sup>10)</sup>; et cl. v. PHELSUM <sup>11)</sup> virginem vidit ascaridofam, quae, quoties menstruus fluxus cessare incipiebat, praeter alia ascaridum symptomata (quae post sanguinis iacturam semper fere augentur) larga narium haemorrhagia afficiebatur per plures dies protracta, et tandem oborta diarrhoea soluta, spasmis quoque abdominalibus sine dubio originem debent illae haemorrhagiae periodicae <sup>12)</sup>, quae similibus remediis, ac alia sanguinis profluvia morbosa intermittentes febres, aemulancia, tolluntur, nimirum cortice peruuiano.

Grauiores vero omnino sunt illae narium haemorrhagiae, quae ex obstructis hypochondriorum visceribus originem sumunt. Saepe occurrunt homines, qui ne minima plethorae signa neque in facie, neque in pulsu caeteroue corporis habitu gerunt, pallidi, flauescetes, subuirides <sup>13)</sup>, qui tamen naribus et crebro et copiose sanguinem fundunt, ubi ex reliquis signis, digestionis inprimis vitiis, probabiliter viscerum abdominis, hepatis praesertim, obstructionem in suspicionem ducere licet, quae non spasmis solum et cruditatibus ansam praebet, sed simul sanguini obicem ponit, unde in vasis abdominalibus praeter modum colligitur, eademque tandem per vasa capitis oborta

5) Observ. de morbo c. petech. pagina 165—168.

6) Coac. 335.

7) ibid. 309.

8) ibid. 334.

9) E. N. C. Cent. VI. obs. 57.

9) Operum p. 341.

10) Hist. const. epid. vermin. p. 293.

11) Hist. ascarid. pathol. p. 198.

12) MEDICUS Geschichte period. Krankheiten. §. 23.

13) Epidem. VI. Text. 27.



aborta plenitudine, qua parte minimus renifus est, exundat. Ob hanc particularem capitis plethoram fit, quod in quibusdam, dum laudabilis adhuc conditionis cruor est, roseo colore facies obducatur, ut ipsos athletica sanitate gaudere tibi persuaderes, et laudares haemorrhagiam euenientem, graues ex plethora morbos praemunientem; at memor sis Hippocratici edicti, eos, quibus sanguis saepius ex naribus fluat, caeteroquin sanos videri, his autem splenem in tumorem eleuatum esse <sup>14)</sup>. Ex quibus patet, cur mala ex narium haemorrhagiis in quibusdam acutis et plurimis chronicis morbis prognosis formari debeat; cur malas HIPPOCRATES <sup>15)</sup> dixerit haemorrhagias, quae quarto febris die accidunt, tunc enim non criticum et salutare naturae opus sunt, sed grauium imi ventris vitiorum effectus, quare ex iis lienteriam et crurum tumores praefagit; cur eadem oracula damnent <sup>16)</sup> febriles haemorrhagias, quas deiectiones rubicundae, aeruginosae, splendidae, acres, foetidae comitantur, perturbatae nimium bilis secretionis, corruptorum imi ventris viscerum manifesta signa. Talem haemorrhagiam enormem cuni atrae bilis deiectionibus puerum, graui febre laborantem atque alias haemorrhagiis obnoxium, expertum, et aegre a se curatum fuisse narrat Ill. MORGAGNUS <sup>17)</sup>. Culpandi ex eadem causa sunt sanguinis fluxus post superatas febres, plerumque enim relictas viscerum obstructions indicant; hinc frequentes narium haemorrhagias post epidemiam quandam, qua omnes fere febres in depositiones ad hypochondriaca viscera desinebant, obseruauit BIANCHI <sup>18)</sup>. Malae ideoque etiam sunt haemorrhagiae, quae in febribus intermittentibus, praesertim quartanis, contingunt, has enim non soluunt, uti neque alios morbos, qui per alui egestionem sanari solent <sup>19)</sup>; et quanta prudentia aegris his febribus decumbentibus, antea vero et in ipso harum decursu haemorrhagiis obnoxiiis, peruuianus cortex propinari debeat, ne diuino alias remedio praesentes viscerum obstructions augeamus, grauiore morbos accersamus, docet obseruatio, quam MATERNUS DE CILANO <sup>20)</sup> fecit in iuvene, qui in pueritia fere quotidie narium haemorrhagias experiebatur, et nunc febre tertiana prehendebatur, quae nullis aliis praemissis statim cortice fugabatur, adeo infausto euentu, ut mox oedematosus, capitis tumor monstrosus oriretur, aluus nigricantia et cadauerosa deiiceret, mens alienaretur, accedente tandem morte. Malae ex eadem ratione sunt narium cruentationes in scorbuticis, hydropicis <sup>21)</sup>, rachiticis <sup>22)</sup>, tunc enim ob ingentia in visceribus obstacula difficilem curationem, et plerumque ineuitabilem mortem praefagiunt. Memorabile vero est phaenomenon, veterum et recentiorum obseruationibus confirmatum, sanguineum plerumque e directo visceris affecti effluere, ut in adfecto iccore ex dextra nare, in vitiis lienis ex

laeua

14) Praedict. L. II. C. 16.

15) Coac. 433.

16) Coac. 330.

17) De sed. et caus. morb. Epist. 31. art. 7.

18) Histor. hepat. P. I. p. 44.

19) HIPPOCRATES de iudic. n. 10.

20) Nov. A. N. C. Vol. III. obs. 3.

21) Rarissimae sunt obseruationes hydropum superueniente narium haemorrhagia solutorum, quales referunt HILDANUS Cent. I. obs. 50. SCHULZIUS E. N. C. Dec. II. A. III. obs. 170. BRENDÉL progr. de hydropse haemorrhagia narium leuato. in Opusc. T. I. p. 163. seqq.

22) E. N. C. Cent. III. obs. 11.

laeua<sup>23)</sup>; qua obseruatione ducti veteres vicissim haemorrhagias narium, per medicamenta hypochondriorum lateri e directo naris sanguinem fundentis applicata, felici euentu sistere tentarunt. Sic in puero quodam dextrae naris haemorrhagiam, quae neque spongiae frigidae fronti applicatae, neque poscae frigidae naribus haustae, nec artuum ligaturae cedebat, cucurbitula in dextris praefixa praecordiis statim sisti vidit GALENUS<sup>24)</sup>, et ZACUTUS LUSITANUS<sup>25)</sup> de nobili viro narrat, cui repente sanguis e sinistra nare ita copiose effluebat, ut de funere potius quam de curatione cogitarent adstantes, cucurbitula tamen splenis regioni adhibita haemorrhagia cohibebatur; similia exempla narrant FORESTUS<sup>26)</sup>, WINCKLERUS<sup>27)</sup> et plures horum phaenomenorum explicationem nemo haecenus tradidit, et difficile omnino est perspicere, quomodo aequali existente sanguinis totum corpus singulasque partes diluuiio suo rigantis conatu, communi omnium vasorum utriusque lateris origine, innumeris ubique anastomosibus, in nonnullas duntaxat partes sanguinis directio fiat, nisi ab aequa nervorum in utrumque latus diuisione singulare in adiacentia vasa imperium exercentium eam deducere liceat. Plura interim similia huius consensus inter partes eiusdem lateris phaenomena rerum usus ostendit; exemplo ruboris dimidia linguae<sup>28)</sup>, et meningum<sup>29)</sup> e directo pulmonis inflammati; siccitatis cutis dextrae corporis superficiei in femina scirrhusa hepatis duritie laborante<sup>30)</sup>; icteri dextri praesertim brachii ex calculis felleis<sup>31)</sup>; pulsus plenioris et frequentioris in brachio a latere affecti splenis<sup>32)</sup>; quae apparitiones aequae difficiles explicandae sunt, ac vera causa indicari potest, quod uniuersali praegrediente febre ad unam parotidem, ad unam coxam, ad unum brachium pedemue tota vis et materies morbi deferatur; quod unum saltem latus frigeat vel aestuet altero naturali calore praedito<sup>33)</sup>; quod dimidia saltem corporis superficies aliquando fudet<sup>34)</sup>; vel ictero<sup>35)</sup>, maculis pustulisue<sup>36)</sup> foedetur; quod erysipelas interdum dimidiam duntaxat faciem, alterutrum abdominis latus ita exacte occupet, ut

23) VAN SWIETEN Comment. in aph. BOERH. T. II. ad §. 741. T. III. ad §. 923. Exempla etiam refert DE HAEN Rat. med. T. XI. p. 6. et 12. Et CLEGHORN dolores viscerum in febre tertiana epidemica contingentes ut plurimum haemorrhagia e directo leuatos fuisse narrat. Observ. on the epidem. diseases in Minorca. p. 209.

24) Method. med. L. V. C. 3.

25) Centur. II. curat. 100.

26) Observ. med. L. XIII. obs. 10.

27) E. N. C. Dec. I. A. VI. VII. obs. 90.

28) HIPPOCRATES Coac. 400.

29) MORGAGNI de sed. et caus. morb. Ep. VII. art. 12.

30) E. N. C. Dec. II. A. X. obs. 194.

31) ROSEN diff. de calcul. fell. vel VOGEL neue med. Bibl. B. VIII. p. 127.

32) HIPPOCRATES Epid. L. II. S. 2. Edit. Lind. p. 693.

33) PECHLIN obs. phys. med. L. II. obs. 54. Journal de Medecine. T. XXIV. p. 60.

34) PECHLIN l. c. E. N. C. Dec. I. A. IV. V. obs. 100. Dec. II. A. II. obs. 126. Commerce. Nor. A. 1732. p. 43. HARTMANN Diss. inaug. de sudore unius lateris. Halae 1751. Memorabile sudoris huius particularis exemplum mihi narrauit III. SCHROEDER, quod obseruauit in viro, qui in uno tantum corporis latere sudorem experiebat, consultus ill. Praeceptor nil in corpore detegebat vitiosi, praeter multas primarum viarum sordes, quibus emollitis et eductis sudor ille morbosus euanescebat.

35) in hemiplectico E. N. C. Cent. III. obs. 64.

36) PECHLIN l. c.



ut lineam illam, quae corporis superficiem aequabiliter diuidit, non transcendat <sup>37)</sup>; quod ab inunctione mercuriali, capitis, membrorum dolor, dentium vacillatio, salivae effluxus in dextro duntaxat latere apparuerint, cum tamen venae bibulae cutis utriusque lateris hauserint mercurium <sup>38)</sup>. Restant inter consensuales narium haemorrhagias illae, quae ex suppressis menstruis vel haemorrhoidibus non raro observantur, et quae plerumque, uti etiam aliae haemorrhagiae, quae ex his causis proveniunt, non ex uniiversali plethora suppressis fluxibus inducta, sed potius ex spasmodicis abdominalibus, auctis per consensum oscillationibus vasorum huius vel illius partis, oriuntur; cum saepissime non cessent, licet plethora minuatur, nisi redeunte fluxu naturali nervorum abdominalium irritamentum tollatur, quales observationes refert clar. WHYTT <sup>39)</sup>.

Ex his omnibus satis patet, haemorrhagias narium consensuales non raro occurrere, varias ipsarum in abdomine haerere posse causas, quas sollicite inquirere oportet, si aegrotis auxilium ferre optamus; iustam esse BALLONII <sup>40)</sup> de quibusdam medicis querelam, qui, si induxerint in animam venam referare, et guttulae sanguinis e naribus fluant, tunc quasi trophaeum reportantes clamant legitima oblatam phlebotomiae occasionem; si luculenta sit haemorrhagia, adhuc audacius secant, quia naturam quasi grauari aiunt; vel si infra modum sanguis fluat, compensandum istum defectum apertione venae contendunt. In his saltem consensualibus haemorrhagiis venae sectionem inutilem plerumque et noxiam esse, quis non praevidet? Opiatorum contra narium haemorrhagias inutilitatem egregie demonstravit cl. TRALLES <sup>41)</sup>, et sane fere semper nocebunt, si consensuales fluxus fuerint; licet enim stricturae illae abdominales citissime per opiata tollantur, multo securius tamen eas sedabimus, ubi ad causas ipsarum respexerimus, aluum emolliendo, subducendo, sordes remouendo, viscera obstructa referando, ac si opiatis spasmos quidem leniamus, sed aucto sanguinis orgasmo, retardatis alui utilibus egestionibus causis morbi incrementum addamus; in eo tantum casu forte iuuabunt, quando spasmi ex sola hysterica sensibilitate originem duxerunt, vel ob similem nimiam irritabilitatem spasmi a materia quadam irritante excitati vehementiores fiunt, ac alias contingere solet, uti in valde teneris femellis, quibus menstruus fluxus ob spasmodicas vasorum uteri stricturas difficulter et parcius erumpit, et ex hac causa sanguis ex aliis partibus erumpit, tunc enim iustis cautionibus adhibita opiata saepius naturalem fluxum promouebunt et faciliorem reddent, atque eo ipso praeternaturales aliarum partium haemorrhagias prae-cauebunt. Quid ab internis adstringentibus expectandum sit, quiuis perspiciet; retardabunt aluum, retinebunt sordes, augebunt obstructions, spasmos, nunquam ergo non nocebunt.

O o 2

§. XIX.

<sup>37)</sup> DE HAEN Thes. de febr. divis. pag. 112.

<sup>39)</sup> Observations on the nervous disorders. p. 179.

<sup>38)</sup> Commenc. Nor. A. 1743. p. 17.

<sup>40)</sup> Oper. T. I.

<sup>41)</sup> Tractatus de opio S. II. p. 15. sqq.

## §. XIX.

Progredimur ad *Grauedines* et *Coryzar*, nam etiam hi affectus interdum per consensum producantur. Qualicunque nunc modo secretio illa muci in glandulis membranæ Schneiderianæ perturbetur, effectum tamen quotidie videmus in pueris verminosis, qui muco narium semper abundant; quin etiam in adulto ascaridoso copiosum et molestissimum quotidie vespertino tempore recurrentem narium serosum fluxum obseruauit, et nullis nisi anthelminthicis remediis tollere potuit cl. VAN PHELSUM<sup>1)</sup>; etiam cl. VAN DEN BOSCH<sup>2)</sup> in constitutione epidemica verminosa saepissime vidit, febres catarrhales a vermibus intestinalibus augmentum capere et pertinaciores reddi, ita ut caput et pectus aliquando non, nisi post copiosas putridas et ramentosas alui deiectiones liberarentur: et in genere notandum est, raro catarrhos occurrere, nisi mitissimi sint, quin simul sordium primarum viarum signa, anorexia, alienus in ore sapor, nausea, angustia praecordiorum, conatus vomendi adsint; vel ad finem accedant; siue quod similis stasis muci in glandulis ventriculi adsit, siue quod per frequentem tussim maior bilis copia in intestina exprimatur; siue quod ob suppressam perspirationem, quae frequentissima catarrhorum occasio est, maior humorum copia ad primas vias confluat; quicquid causae sit, id experientia quotidiana docet, febres catarrhos comitantes plerumque non inflammatoriae solum, sed biliosae simul indolis esse<sup>3)</sup>; symptomata quibus aegri grauiori catarrho laborantes vexantur, capitis dolorem, lassitudinem, artuum grauitatem et dolores, praecordiorum oppressionem, sordium intestinalium copiae plerumque respondere, ita ut si multarum febrium catarrhalium, quibus ob symptomatum grauitatem malignitatis nomen impositum fuit, descriptiones perlegamus, statim pateat, saepissime omnem malitiam ex colluue ista dependisse. Quare ars multum conferre potest, ut citius catarrhi ad coctionem et finem perducantur, si remoueat sordes ex primis viis; et ipsa natura saepissime aegros vomitus biliosi, vel diarrhoeae biliosae ope aegros liberat<sup>4)</sup>; ita ut nefanda praxis eorum sit, qui audito catarrhi nomine, siue adsit febris, siue non, sudoriferis perspirationi restituendae statim et unice incumbunt; non ego diaphoretica incipientem catarrhum, ubi nulla adest febris, nulla inflammatio, sine detrimento sanare posse; sed saepissime febris adest, maior leuiorue; saepissime et fere semper maior vel minor adest inflammatio in pulmonibus, faucibus, membrana narium<sup>5)</sup>; saepe adsunt, uti diximus, sordes primarum viarum; nonne vero tunc nocebunt sudorifera? febrem, quae mitis erat, incitabunt; inflammationes, quae aberant aut mitissimae erant, accersent et augebunt, sordes intercludent, generabunt, corrumpent, ad sanguinem pellent; augebunt aestum, inquietudinem, reliqua symptomata; producent pleuritidem vel peripneumoniam forte lethales; vel protrahent catarrhum, unde toties insanabilis phthisis et mors originem duxerunt. Sed naturam se imitari dicunt,

1) Hist. ascarid. pathol. p. 200.

2) Hist. constit. epid. vermin. p. 243.

3) Ill. SCHROEDER et MAY diss. de amplitud. generis febr. bilios. Goettingae 1766.  
§. 12.

4) BAKER de catharrho et dysenteria Londinensi. London 1764. p. 11.

5) TISSOT Avis au peuple sur sa santé.  
§. 125.



dicunt, quae toties catarrhos per sudores soluit; sed nonne eadem saepissime diarrhoea, vomitibus ipsis finem imposuit? et an semper certa signa habemus quamnam viam natura selectura sit? nonne per diuersas vias simul natura saepissime iuuat, et eodem die salutarem diarrhoeam et sudorem producit? at illam retardari, impediri necesse est, dum sudoriferis hunc pellimus; nescit porro ars quo pacto materia ad expulsionem subeundam rite sit praeparanda, nec si hoc sciat, certa ulla habet indicia; quibus de huiusmodi praeparatione absoluta possit moneri, unde etiam tempus ciendo sudori opportunissimum ignorari necesse est, non minus ac quamdiu in iisdem sollicitandis perseverandum sit, uti egregie monet SYDENHAM<sup>6)</sup>; ponamus incipientis leuantis vel critici sudoris signa iam in cute apparere, sed eo minus nunc medicamentis illum exprimere opus est; praecauere sufficit, ne retrocedat, regimine, potu diluente tepido; imitantes medicorum optimum HIPPOCRATEM, qui ad prouocandos sudores singulare praesidium rarissime usurpauit, sed artificiose curationes dirigens, donec ii sponte sua erumperent, ut plurimum exspectauit; sed si forte natura nimis debilis est ut sudorem producat; si forte impedimentum adest, quod auxilianti naturae sese opponit, nonne incitanda tunc est natura? Remoueamus illa obstacula, promoueamus coctionem noxiorum humorum, quae forte nondum est peracta; saepe irritamentum in primis viis est, quod coctiones et crises retardat, quae citius peraguntur, illo sublato<sup>7)</sup>. Qui vero sordes intestinales per sudores expellendi fine diaphoretica propinat, sciat rem esse vesanam sane et periculosam admodum, cacochyliam abdominis ad vasa deriuare, ut colatoriis corporis minimis fecernatur<sup>8)</sup>. Longe tamen abest, ut credam, diaphoretica nunquam cum successu optimo in febribus catarrhalibus adhiberi, vel mihi persuadeam, catarrhales febres biliosae semper indolis esse, euacuantibus tractandas; quippe non nescio eas aliquando mere inflammatorias esse, et tunc antiphlogisticam medelam, repetitas interdum venesectiones postulare, purgantibus non indigere<sup>9)</sup>; alias complicatum adesse statum, prudens antiphlogisticae et euacuantis medelae connubium requirentem<sup>10)</sup>; interdum putridam adesse sanguinis diathesin, eadem, ac reliquae putridae simplices vel biliosae simul, auxilia exigentem<sup>11)</sup>; aliquando febrem neruosa lentae speciem induere, et tunc praeter mites primarum viarum per emetica et purgantia euacuationes, neruina, cardiaca, diaphoretica, praesertim corticem peruianum conducere, ut nimiae debilitati succurratur, vis arteriis et toti corpori adiiciatur, sudor aegros plerumque subleuans promo-

O o 3

veatur

6) Operum T. I. p. 369. 370. cf. etiam GLASS egregium commentarium de sudorum euacuatione. p. 163. sqq. FREIND Comment. de febribus. BARKER Essay sur la conformité de la medecine des anciens et des modernes. p. 158.

7) BRENDEN diff. de feriori euacuantium usu in quibusdam acutis p. 26. 27. VAN DEN BOSCH l. c. p. 57. sqq. STRACK l. c. p. 146. sqq.

8) TISSOT diff. de febr. bil. opusc. T. I. p. 125.

9) TISSOT Avis au peuple. §. 128. HILLARY'S Observ. on the epid. diseas. of Barbados. p. 30. 80. 120.

10) BAKER de catarrho et dysent. Lond. p. 10 — 12. HUXHAM Oper. T. I. p. 102. sqq.

11) HUXHAM Oper. T. I. pag. 315. sqq. MOUCET in Journal de medecine. T. XI. p. 57. seq. ELLER de cogn. et cur. morb. p. 112.

veatur <sup>12)</sup>; ita ut diuersa admodum catarrhorum facies sit, diuersam postulans medelam.

Sed sunt etiam spurii catarrhi, qui, quod spasmo quodam secretio glandularum mucosarum narium perturbari in his videtur, spasmodici dici possent: Frequentissime in hypochondriacis occurrunt <sup>13)</sup>, qui interdum grauatiuum dolorem in fronte, pressionem supra nares, nifus ad sternutationes crebras sentiunt, naribus mucum nunc tenuiorem, nunc spissiore destillant, ita ut grauedine sese correptos credant, ptarmica ad leuandum pituitae fluxum adhibeant, ex quibus vero ne minimum leuamen sentiunt, usque dum aut sponte aut adhibitis antispasmodicis spasmodica illa muciferorum meatuum constrictio tollitur. Interdum tales grauedines et coryzae periodicum decursum habent; quales quotidie matutino tempore accedentes et usque ad meridiem durantes in viro quodam obseruauit, et cortice chinae cum purgantibus mixto sanauit cl. VANDERMONDE <sup>14)</sup>; aliquando periodicam hemicraniam coryzae antecedunt <sup>15)</sup>, et aegros fallunt, ut hanc pro illius causa habeant, cum tamen spastica utriusque sit origo. Similia catarrhorum simulacra, at maiori cum periculo, in febribus nervosis, phrenitide <sup>16)</sup>, paraphrenitide apparent; nimirum in initio harum febrium, dum adhuc mitia omnia sunt, grauitatem capitis, dolores faucium, colli, pectoris, manuum, surarum fugaces, aegri queruntur; in larynge stimulum sentiunt, sreatum et tussiculam laceissentem; naribus, alterutra potissimum, stillicidii quid mucosi vel sanguinolenti apparet; crebro sternutant; oculi lacrymantur; usque dum ex leuioribus his principiis, catarrhum quandam aemulantibus, ad incrementa vigoremque praeceps morbus ruit; ista vero symptomata spasticae et consensualis originis non minus habenda sunt, ac reliqua illorum morborum phaenomena.

### *Aurium affectus consensuales.*

#### §. XX.

Cum non solum membrana tubae Eustachianae continua sit internae membranae oesophagi, ventriculi et intestinorum <sup>1)</sup>; sed nobilis etiam anastomosis neruum intercostalem et quintum cum neruo septimi paris duro coniungat <sup>2)</sup>, communis insuper neruorum externi meatus auditorii et intercostalis a quinto pare sit origo <sup>3)</sup>, facile perspicere possumus, quomodo ex viscerum abdominis laesione interdum auditus vitia producantur; cur adeo frequentes sint aurium tinnitus et susurri, ubi cruditatibus ventriculus repletus est, vel vermes ipsum et intestina obsident; tantos aurium susurros, ut eos cum maris agitatione summa tempestate inducta compararet aeger, expulsus lum.

12) BAKER l. c. p. 13. BISSET'S Essay on the Medical Constitution of Great Britain. London 1762. p. 163. sqq.

13) BRENDDEL diff. de valetudine ex hypochondriis. §. 6.

14) Recueil period. T. VI. p. 197.

15) Journal de medec. T. XXV. p. 442.

16) BRENDDEL diff. de phrenitide. p. 8. de cognatione paraphrenit. et febr. malignarum. p. 8. 9. 15.

1) LANGHANS diff. de consensu partium C. H. §. 103.

2) MECKEL diff. cit. §. 64.

3) ibid. §. 104.



lumbricis breui sedauit cl. van den BOSCH <sup>4)</sup>; similes tinnitus frequentissimum hypochondriacorum et hysteriarum symptoma esse, notissimum est. Consensuales etiam fuerunt vehementes illi dolores ab aure sinistra in sinistrum hypochondrium sagittae adinstar delabentes, quos experiebatur aeger apostemate in fundo ventriculi laborans. <sup>5)</sup> Ipsae etiam otalgiae, quae a stasi sanguinis vel feri producuntur, uti aliae inflammationes et rheumatismi, saepe ab acri biliosa primarum viarum colluue foventur, ubi multum omnino ad leniendos atroces illos dolores conferre possumus, si aluum apertam seruamus, acres sordes educimus, caetera interim auxilia non negligentes. Sed surditates quoque aliquando per spasmos abdominales producuntur: Frequentissime aegros petechiali epidemica febre laborantes surdos factos esse, narrat cl. STRACK <sup>6)</sup>; ea semper ratione, ut, qui multa impura in imo ventre gerebant, grauius audierint, quam qui pauca diutius surditas remanserit iis, quibus sordes relinquebantur; omnes auditum recuperauerint, quamprimum pharmaco perfecte erant purgati; etiam ab ascaridibus surditatem per vices recurrentem obseruauit, et expulsis istis animalculis sanauit cl. v. PHELSUM <sup>7)</sup>. Non minus ex spasmis abdominalibus originem duxisse videntur surditates, quae febrium intermittentium paroxysmos comitabantur, et cum ipsis cessabant, quales obseruauit LANZONUS <sup>8)</sup> et MOLITOR <sup>9)</sup>; vel quae sine febre quidem, sed periodice tamen reuertebantur, et cortice peruuiano sanabantur <sup>10)</sup>. Uti etiam illae, quae tempore grauiditatis feminas quasdam vexant, et certissimum conceptionis signum praebent <sup>11)</sup>: Sympathica quoque fuit auditus et visus hebetudo, quae nephriticos paroxysmos semper praecedebat <sup>12)</sup>. Dictus aurium cum visceribus abdominis consensus etiam apparet exemplo illius, qui ex sola meatus auditorii externi contrectatione vehementi vomitu corripiebatur <sup>13)</sup>; viri, qui vomuit quamprimum musicam audierat <sup>14)</sup>; pueri, cui tonitru sonus indubitato vomitus excitauerat <sup>15)</sup>; et illorum, quos phormingis et lyrae sonus inuicibiliter urinam reddere cogebat <sup>16)</sup>.

### *Affectus faciei consensuales.*

#### §. XXI.

Inter hos praecipui sunt conuulsiones musculorum faciei, et speciatim risus sardonius. Vetusta obseruatio est, cynicum hunc spasmus laesi diaphragmatis symptoma

4) Hist. const. epid. vermin. p. 291.

5) SAND diss. de raro ventriculi abscessu. in de HALLER Collect. dissert. pathol. Vol. III. p. 128.

6) Obseruat. de morbo c. petech. p. 144. egregie ergo confirmabatur dictum HIPPOCRATIS in Aphor. 28. S. IV. surditatem nempe deiectionibus biliosis superuenientibus finiri.

7) Hist. ascarid. pathol. p. 203.

8) A. N. C. Vol. I. obs. 32.

9) De HALLER Collect. Diss. Patholog. Vol. V. p. 270.

10) Nov. A. N. C. Vol. II. p. 362.

11) A. N. C. Vol. II. p. 179.

12) RICHA constitut. epidem. Taurin. An. 1720. §. 58.

13) PECHLIN obseruat. phys. med. L. II. obs. 45.

14) E. N. C. Dec. III. A. III. obs. 182.

15) A. N. C. Vol. II. obs. 200.

16) E. N. C. Dec. I. A. I. obs. 194.

toma esse; et iam HIPPOCRATES <sup>1)</sup> ex risu tumultuario, in quem Tycho vulneratus inciderat, conclusit, spiculae partem in septo transverso relictam fuisse; et inter recentiores RAU <sup>2)</sup> idem symptoma cum scindente et lancinante in partibus musculosis faciei dolore ex grauiori dextri hypochondrii contusione, qua diaphragma laesionem accepisse conuulsiua insequens respiratio suadebat, ortum obseruauit. Quod vero idem risus diaphragmatis inflammationem ex interna causa ortam comitatus sit, plurima sunt exempla; neque difficilem explicationem hoc phaenomenon admittit, cum aperta sit via ex intercostalis nerui ramis diaphragmati prospicientibus, in neruos musculorum faciei a quinto pare oriundos, et insuper communicatio sit inter neruum phrenicum, secundum ceruicalem, et portionem duram nerui acustici, cuius ramus zygomaticus variis faciei musculis neruos mittit. Falluntur vero, qui credunt cynicum spasmus pathognomonicum inflammati diaphragmatis symptoma esse; bina vulnerati diaphragmatis exempla refert ill. MORGAGNUS <sup>3)</sup>, quae aperte ostendunt, illud symptoma vulnera septi non semper sequi. Ill. DE HAEN <sup>4)</sup> exemplum refert hominis, qui die febris acutae quinto, pleuritidis saeculae altero die mortuus, diaphragma habuit adeo vehementer inflammatum, ut iniectione non potuisset rubicundius reddi, idque tum in musculosa tum in tendinea parte, neque tamen risus sardonius in uiuo aegro obseruabatur, etiam cl. WENDT <sup>5)</sup> diaphragma totum inflammatum inuenit, licet mortem nullus sardonius risus praecesserit; plura similia exempla septi inflammati, suppurati, exulcerati absente illo symptomate in cl. LIEUTAUD <sup>6)</sup> sepulcreto inueniuntur. Etiam ad aliorum simi ventris viscerum affectiones hic spasmus interdum accedit, sic illum ex ranunculi scelerati esu obseruauit SCHARFFIUS <sup>7)</sup> et alii; ex belladonnae usu SAINT MARTIN <sup>8)</sup>; a spina piscis deglutita ventriculum velli-  
cante LE TUAL <sup>9)</sup>; ex deglutita acicula cl. WIEDENFELD <sup>10)</sup>; non rarum etiam est symptoma in infantibus ex acida ventriculi saburra, et in verminosis; vidit cl. van DOEVEREN <sup>11)</sup>, risum sardonium in febris intermittentis paroxysmis, qui post datum emeticum, quod cum copiosa biliosa et mucosa colluue insignem lumbricum expulerat, euanescebat; eundem in puero ascaridoso obseruauit cl. van PHELSUM <sup>12)</sup>; et in petechiali febre multos risu sardonico exanimatos vidit cl. STRACK <sup>13)</sup> in quorum infimo ventre modo hoc modo illud, nempe aliud atque aliud viscus corruptum inuenit, cum eorum cadauera inciderat; idem symptoma in hysterica quadam femina obseruauit, et emetico, castoreo et cortice chinae curauit OLIVIER <sup>14)</sup>. Ex quibus patet, non ex diaphragmatis solum, sed ex cuiuslibet visceris, quod a neruo intercostali ramos habet, vitiis, spasmus illum per consensum produci posse.

Memo.

1) Epid. L. V. text. 50. CHARTER. T. IX. p. 351.

2) Nov. A. N. C. Vol. III. obf. 38.

3) De sed. et caus. morb. Epist. LIII. art. 3. et 6.

4) Rat med. T. IX. C. II. p. 66.

5) Diss. sistens observ. de pleurit. et peripneum. Goetting. 1762. Sect. I. 2. 5.

6) Hist. anat. med. sistens cadav. extispicia. Paris 1768. P. II. obf. 774-778.

7) E. N. C. Dec. III. A. II. obf. 87.

8) Journal de Medecine. T. XVIII. p. 144.

9) Journal de Medecine T. XXV. p. 359.

10) Observ. med. triga. Goetting. 1768. obf. 3.

11) Dissert. de vermibus intestin. p. 62.

12) Historia ascarid. patholog. p. 201.

13) Observat. de morb. c. petech. p. 175.

14) Journal de Medecine T. XI. p. 312.



Memorabilis quoque est tremor ille labiorum, praesertim inferioris, qui a variis quidem causis, quae nervos abdominales irritant, plerumque vero a cruditatibus et colluie acri primarum viarum producitur; quare ex labiis contractis alui biliosae eruptionem praedixit HIPPOCRATES<sup>15)</sup>; et ex eodem in febribus acutis post signa coctionis apparente, intra semihorium futurum vomitum praesagit BOERHAAVIUS<sup>16)</sup>; eundem tremorem inferioris labii, cum quondam in puero epilepticos insultus praegredi observavit cel. VAN SWIETEN<sup>17)</sup>, conclusit epilepsiae sedem in primis viis esse, et vomitoriis, interpositis roborantibus, tum tremorem illum, tum ipsam epilepsiam funditus sanavit.

## §. XXII.

Sunt adhuc aliae faciei affectiones, quae qualicunque modo producantur, certa tamen praecordiorum vitiosorum signa sunt. Huc pertinent circuli illi liuidi circa palpebras, superius iam notati; faciei rubores in iis, quibus aluus dura et viscera obstructa<sup>1)</sup>; rubor narium, alui humescentis index<sup>2)</sup>; maculae omnium colorum in facie lientericorum<sup>3)</sup>; rubor alterius genae in quibusdam feminis tempore fluxus menstrui<sup>4)</sup>; pallor genarum, ubi pituita et vermes primas vias obsident; observatum est de quibusdam, dicit BALLONIUS<sup>5)</sup>, quibus facies primum nitorem exuerat, imo aut virore, aut flauitie, aut pallore erat deturpata, in quorum prima regione viridantium omnisque generis humorum erat cumulus, et copiosa sursum deorsumque facta euacuatione primo nitore splendorique faciei sunt restituti — et si facies contaminata est naevis, lentigine, baronibus, latet aliquod in praecordiis vitium; et nonne HIPPOCRATES<sup>6)</sup> iam dixerat, perturbatam aluum, ut pauca saepissime educat, delere faciei exanthemata, et exinanitam aluum expurgare oculos et aures, ipsamque faciem clariorem reddere et nitidiorem, laetari hinc Medicos iubet BAGLIVI<sup>7)</sup>, si in chronicis morbis facies naturalis sit et boni coloris, nunquam enim tunc viscerum obstructions adesse adfirmat, et in genere verissimum est, quod cl. LIEUTAUD<sup>8)</sup> docet, raro sub grauioribus et diuturnis cutis vitiis hepar illaesum reperiri, et magnum huius visceris cum cute esse commercium, praesertim de erysipelate tum faciei tum aliarum partium constat; quod eius fomes plerumque circa vesiculam felleam resideat<sup>9)</sup>, colluies nempe acris, biliosa, verminosa nec melius exterminetur, quam emeticis aut catharticis<sup>10)</sup>; ita ut si in erysipelate faciei, cerebro tentato, oboritur coma,

15) Coac. 241.

16) Praelectiones academicae. Tom. VI. p. 298.

17) Commentar. in aphor. BOERHAAVII T. III. p. 439.

1) BAGLIVI Oper. p. 79.

2) Coac. 216.

3) CELSUS L. II. C. 8.

4) E. N. C. Cent. III. obs. 73.

5) Opera. T. I. p. 83.

6) Lib. de diaeta.

Ludwig script. neur. min. T. IV.

7) Opera p. 69.

8) Synopsis uniuersae prax. med. p. 422.

9) TISSOT diss. de febr. bilios. Lauf. opusc. T. I. p. 125.

10) GALENUS de purgant. facult. C. 5. BAGLIVI Oper. p. 142. BIANCHI hist. hepat. P. III. p. 432. FREIND Comment. VII. in libr. epid. Hippocrat. p. m. 51. 52. MEAD monita et praec. med. p. 17. Journal de medecine T. VII. p. 55. T. XXVI. pag. 297. BROCKLESBY Oeconom. and medic. observ.

coma, delirium, neruorum distentio, aut nulla sublit salutis spes, aut purgantia maxime profectura sint; refrigerantibus vero unice contra febrem pugnare, topica ad-mouere, nihil aliud sit, quam nugas agere, donec in medio curationis cursu aeger intercidat<sup>1)</sup>). Sed fusius et doctius de febrium erysipelacearum causis differere, lubenter Praenobiliss. D. DE ZIEGLER amico meo integerrimo, relinquo.

### *Dentium morbi sympathici.*

#### §. XXIII.

Est etiam inter dentes et imi ventris viscera mutuum commercium, quod non euidentius apparet, ac in pusionibus dentientibus. Saepissime enim ex tensione et inflammatione, quas erupturus dens in gingiuis producit, per neruorum consensum spasmus in visceribus abdominis oriuntur, et inde vomitus, tormina, tenesmi, obstructio alui vel diarrhoeae, dysenteriae, stranguriae<sup>2)</sup>), et ex his conuulsiones cum aliis terribilibus symptomatibus excitantur, cautissimam medelam requirentia. Raro enim ista symptomata a sola dentium irritatione dependent, cum eos in tot infantibus sanis sine ullo incommodo erumpere videamus, sed plerumque morbosi humores simul accusandi sunt, qui per illam irritationem in motum ducuntur, et neruos ex tensione illa sensiliores redditos irritant; plerumque adest aerimonia in primis viis collecta, quae nisi sponte per aluum vel vomitum exit, aut per artem ex corpore eliminatur, ista symptomata producit et auget, febrem accendit, ipsius dentis eruptionem retardat, impedit; quare HIPPOCRATES<sup>3)</sup> iam dixit, infantes, quibus ex dentitione aluus multoties subducatur, minus conuelli, quam quibus ita paucies; et expertissimi Medici aluum strictam aperire iubent; laxam adstringentibus roborantibus cohibere vetant; lenioribus euacuantibus, absorbentibus, emeticis, clysteribus primarum viarum sordes corrigere, euacuare suadent<sup>3)</sup>); his remediis certe saepissime dira illa symptomata euanescere, et dentem adhuc sub gingiuis latentem sine molestia erumpere videbis. Attamen aliquando contingit, quod vomitus illi, tormina, diarrhoeae, nonnisi spasmorum effectus sint; a nulla acri materia in primis viis, sed ex sola dentium irritatione per consensum producantur, inanes sint, vires emungant, summam debilitatem et ex inanitione conuulsiones accersant, ubi unicum auxilium in eo consistit, ut nimia neruorum sensibilitas sopiatur, et alleuata dentis eruptione tensionis causa tollatur; vidit ill. TRALLES<sup>4)</sup> puerulum 26 hebdomadarum, dentientem et diarrhoea viridescencia copiose profundentem, nil proficiebant absorbentia, neque gummi arabicum, neque clysmata oleosa, neque unguenta et emplastra

aro-

P. II. p. 138. VAN DEN BOSCH loc. cit. p. 179. sq.

II) FREIND I. c.

1) Tantas sphincteris vesicae constrictiones ex dentitione obseruauit HELWICH, ut pueri calculo laborare viderentur. E. N. C. Cent. VIII. obs. 61.

2) De dentitione. n. 7. Charter. T. VII. p. 871.

3) HOFFMANN Med. syst. suppl. C. III. TISSOT Avis au peuple §. 387. ROSEN DE ROSENSTEIN Anweisung zur Kenntniss und Cur der Kinderkrankh. verf. cel. Prof. MURRAY, Praeceptoris mei aeternum venerandi. p. 33. 2ter Ausg. Young's treatise on opium. ch. 5. ARMSTRONG Versuch von den Kinderkrankh. Zelle 1769. p. 42. sqq.

4) Tractatus de opio. Sect. IV. p. 147.



aromatica abdomini applicata, sed emaciatus pusio 20 sedibus per 24 horas summe debilis reddebatur, exhibito vero laudano, quod spasmos sopiebat, deiectiones flebant, et infans praeter spem adstantium seruabatur.

#### §. XXIV.

At adutorum quoque *odontalgiae* saepius ex abdomine originem ducunt. Quod enim supra de otalgiis notauimus, nimirum quod siue inflammatoriae sint, siue a rheumatica stasi producantur, saepissime ab acri primarum viarum colluue foueantur, idem etiam de odontalgiis valet, ita ut quae venae sectionibus, scarificationibus, antiphlogisticis, resoluentibus, sudoriferis, emollientibus, discutientibus, irritantibus, non vel parum cedebant, interdum statim leniantur, tollantur, ubi primas vias repurgaueris; dein uti in aliis partibus dolores consensuales sine stasi sanguinis vel feri ex acrimonia ventriculo contenta oriuntur; sic etiam per consensum dentium nerui ex quinto pare oriundi dolore affici possunt, si intercostalis rami in abdomine irritantur, et dolor statim euanesceat, quam primum illud irritamentum tollitur; neque rarae sunt obseruationes odontalgiarum, quas unicum emeticum, unicum purgans, mitigauit, sustulit, praecauit. RIVERIUS <sup>1)</sup> se ipsum acerbissima odontalgia afflictum fuisse narrat, cum vero frustulum tabaci diu masticauerit, donec vomitus excitatus fuit, quo cum alimentis multa pituita eiciebatur, intra bihorium dolorem euauisse. NEUHOLD <sup>2)</sup> de comite scribit, qui vesperi versus somnum in dolorem dentium fere intolerabilem incidit, cum vero circa mediam noctem deiectione aluina laxior, dein copiosior cruditis biliosae vomitus superuenerat, dolor uti accessit prius, sic subito iterum recessit, nulla neque minima relicta sensatione dolorosa. Et GREULICH <sup>3)</sup> in muliere odontalgiam per plures hebdomadas incertis periodis affligentem obseruauit, quae mox sopiebat, postquam cum insolitis urgentibus secessibus et vomitibus amarissimus humor reiectus fuerat. Ex lumbricis intestinalibus saepissime dentium dolores obseruauit cl. VAN DEN BOSCH <sup>4)</sup>, aduersus quos catharsis primarum viarum summum remedium erat; et clar. VAN PHELSUM <sup>5)</sup> virum vidit, qui per duas hebdomadas odontalgiam pertulerat, plurima remedia post euulsos binos dentes incassum tentauerat, expulsis vero innumeris ascaridibus statim leuabatur.

Neque ubi forte cariosos dentes, vitiatas gingiuas videas, statim haec vitia localia ut doloris causam accuses; eadem enim in multis reperies, de dentium doloribus non querentibus; et ubi adsunt, frequentissime simul digestionis laesae signa deprehendes, si enim de digestionis cuiusvis optime differere velis, inspicere dentes, nitor et elegancia ipsorum bonam, inquinatio et labes malam significant chylicationem; laxatis dentibus, laxantur chylosoe officinae <sup>6)</sup>; quoties in febribus biliosis dentes spurcos, flauis, brunis, nigris sordibus obductos videmus, et sensim pristinum ni-

Pp 2

to rem

1) Obseruat. Cent. IV. obs. 31.

2) Obseruat. patholog. therap. obs. 5.

3) BIANCHI Histor. hepat. P. III. p. 513.

4) Histor. constit. epid. verm. p. 156.

5) Histor. ascarid. pathol. p. 202.

6) BAGLIVI Oper. p. 476. 477. BRENDEL Diff. de valetud. ex hypoch. p. 16.

torem recuperare, prouti colluue vitiosa prima regio purgatur? nonne gingivae facillime vitiantur in iis, qui verimibus intestinalibus scatent, ita ut earum carnem fere depastam ex hac causa observavit HILDANUS<sup>7)</sup> et VAN DEN BOSCH<sup>8)</sup>? et nonne gingivae vitiatæ et ora graveolentia iis sunt, quibus splenes magni<sup>9)</sup>? Patet ergo ad stomachum præcipue respiciendum esse, et si hunc cruditatibus repurgaveris, sæpius tibi continget, dolores tollere, licet dentis cariei nulla adhibueris remedia; uti in virgine illa graui odontalgia vexata, quæ cum conspexisset pilulas, quas PAULINI<sup>10)</sup> cariosi dentis cavitati immittendas parauerat, horruit, nauseavit, vomuit, et finito vomitu omni dolore libera erat, ita ut pilulis illis non indigeret.

Minime tamen quævis odontalgia, quæ ex ventriculo originem ducunt, emeticis et purgantibus tolluntur, sunt etiam, quæ his remediis facile exacerbantur; illas puto, quæ ex debilitato primarum viarum tono, aucta ipsarum sensibilitate oriuntur<sup>11)</sup>; non raro hystericae feminae talibus doloribus excruciantur<sup>12)</sup>, qui, licet neque vel minima cautitas dentis, neque humoris alicuius defluxus, doloris siue ansam præbuerit, siue vehiculum, nihilominus nec mitiores sunt, nec contractiores, et nullis aliis remediis cedunt, quam antispasmodicis, stomachicis, roborantibus; refert ill. TISSOT<sup>13)</sup> casum dominae cuiusdam, quæ singulis noctibus et sæpe diebus acerba odontalgia sexdecim mensibus torquebatur, non incassum, sed in damnum utebatur venæsectionibus, purgantibus, balneis, aquis mineralibus, vesicatoriis, omni-genis refrigerantibus, suavit ill. Vir, ut bis de die et lectum ineundo aromatica et tonica stomachica vino infusa usurparet; mox remiserunt, et mense nondum elapso prorsus deseruerunt dolores redeunte somno; similes dolores, suadendo ut aegrae vinum biberent, curavit; in aliis chinae corticem præstantissimum auxilium tulisse vidit<sup>14)</sup>, præsertim si dolores certo tempore recurrebant; quo remedio etiam TORTI<sup>15)</sup> odontalgia, quæ quotidie stata hora reuertebatur, neque repetitis venæsectionibus, purgationibus, reuulsionibus cedebat, monialem quandam liberavit.

Ad consensuales odontalgias illae etiam pertinent, quas stases sanguinis in visceribus abdominis et exinde orti spasmi producant. Tales dolores dentium ex haemorrhoidum suppressione in se ipso expertus est SCHWERDTNER<sup>16)</sup>; et ex fluxus lochiorum suppressione puerperam fauissima odontalgia afflictam vidit MAURIT. HOFFMANNUS<sup>17)</sup>, quæ tamen vix suscepto clystere etiam ante excretionem per aluum, lenitis nempe spasmodicis stricturis, quasi per incantationem evanescebat. Ex eadem causa grauidas quoque acerbis aliquando odontalgias pati, notum est.

*Glandu-*

7) *Observ. chirurg. Cent. I. obs. 59.*

8) *lib. cit. p. 135.*

9) *HIPPOCRATES Coac. 826.*

10) *E. N. C. Dec. II. A. V. App. p. 21.*

11) *TISSOT Avis au peuple. §. 142.*

12) *SYDENHAM Oper. T. I. p. 258.*

13) *Diff. de febr. bil. Lauf. opusc. T. I. pag. 87.*

14) *Avis au peuple. §. 142.*

15) *Therapeut. special. p. 438.*

16) *Commerc. Nor. A. 1735. p. 174.*

17) *E. N. C. Dec. X. App. obs. 460.*



*Glandularum salivalium affectus consensualis.*

## §. XXV.

Huc pertinent *salivationes* sympathicae, quae ex stimulo quodam nervi intercostalis ramis abdominalibus applicato, ad nervum quinti paris et eius ramos glandulis salivalibus prospicientes propagato, humorum in ipsis circuitum et secretionem accelerante, oriri videntur. Consensualis huiusmodi salivationis exempla quemcumque in se ipso observasse credo; raro enim acre quid in ventriculo haeret, et nauseam excitat, quin os saliva repleatur, et illis, qui emeticum assumerunt, aquosi humoris ex ore effluxus instantis vomitus certissimum signum est. Sed copiosam quoque salivam spuunt verminosi, quod HIPPOCRATES <sup>1)</sup> iam notavit, dicens, ubi ad hepatis vehementer prorumpunt vermes, vocis defectionem inducere, et ex ore sputa admodum multa fluere, quae paulo post sistuntur, subindeque tormina multa in ventre excitari; et in febribus catarrhalibus verminosae constitutionis, cl. VAN DEN BOSCH <sup>2)</sup> enormes saepe diuque protractas salivationes observavit, ita ut aliquando dubium excitarent, an criticae vel symptomatice ex solis vermibus fuerint; etiam cl. VAN PHELSUM rusticum ascaridosum vidit, qui semper salivatione laborabat, quoties ascarides violentiore pruritu molesti erant; uti etiam in infantibus ascaridibus vexatis tumentes glandulas salivales saepissime observavit <sup>3)</sup>. Et nonne salivatio illa in variolis contingens ceteris paribus uberius et molestior est, ubi magna adest in primis viis humorum acrimia, biliositas <sup>4)</sup>, vermium <sup>5)</sup>, colluvies? Nonne in hoc morbo manifestus est salivationis et alui fluxus consensus? Non raro enim in adultis salivationis vicem defectiones subeunt, et in infantibus diarrhoeam salivationi adulatorum substituit natura, quin etiam infantes sine diarrhoea sed cum leviore salivatione integre convaluerunt <sup>6)</sup>. In chronicis quoque morbis, ex viscerum hypochondriacorum obstructionibus ortis, non raro symptomatice salivatio accedit, siue nunc ex spasmodicis contingant, siue ob imminutas dictorum viscerum secretiones et excretiones illae in glandulis salivalibus, ob vasorum consensum, fabricae et officii similitudinem, augeantur. Sic cl. LANGGUTH <sup>7)</sup> praeter alia symptomata salivae abundantiam et perpetuum stillicidium observavit in femina pylori scirrhi laborante. Similis observabatur in aegro ex pancreatis obstructione hectico, et in scorbutico <sup>8)</sup>; ex eodem etiam fonte deduci potest, quod quartanarii ad salivationem adeo sint proclives <sup>9)</sup>. Sed etiam in infantibus, quibus mesenterii glandulae induratae sunt, facile simul salivales glandulae intumescunt, et raro scrophulosorum infantum cadauera secabis, nisi simul mesenterii glandulas simili modo affectas invenias <sup>10)</sup>; neque curationem

Pp 3

admit-

1) De morbis L. IV. c. 15. CHARTER. T. VII. p. 624.

2) Hist. constit. epid. verm. p. 242.

3) Hist. ascarid. patholog. p. 187. et 192.

4) SCHROEDER et FELLINGER diss. de variol. distribut. ratione febr. cum ipsis coniunct. Goetting. 1770. p. 11.

5) HOFFMANN Opera T. III. p. 483.

6) DE HAEN theses sist. febr. diuis. p. 97.

7) Progr. de tabe sicca lethali ex callosa pylori angustia. Vitemb. 1750.

8) DE HALLER Elementa physiol. T. VI. p. 58. 60.

9) HOFFMANN Opera. T. II. p. 29.

10) BONET sepulcr. anat. L. I. S. XXI. obs. 17.

admittunt; antequam pituita illa tenax in visceribus haerens resoluta, ex corpore educata, digestio efficacioribus tonicis, cortice peruiano imprimis, restituta est<sup>11)</sup>. Ex solis vero spasminis abdominalibus provenire videntur frequentia hypochondriacorum et hystericae sputa, adeo aliquando copiosa, ac si mercuriali unguento usi fuissent<sup>12)</sup>; minime critica, uti quidam putant<sup>13)</sup>, sed ex spasticis vasorum contractionibus aequae ac fluxus ille pallidae et copiosae urinae originem ducentia; et si aliquando his aegris ex salivatione mercuriali levamen accedit<sup>14)</sup>, id non adeo huic fluxui adscribendum est, quam quod per mercurium viscera abdominalia morbi diuturnitate obstructa, stasibus liberata fuerunt; et certe noceret, qui generali consilio hypochondriacis et hysterics salivationem per mercurium excitandam suaderet; quoties enim in his aegris ne minima obstructionum viscerum signa adsunt, sanguis nimis tenuis est, quam quod resolutione indigeret, solida nimis irritabilia ad perferendum mercurii stimulum? Sunt tandem quoque consensuales ptyalismi illi, qui colicis spasmodicis quibusdam sese adiungunt, easque solvunt, uti in colica illa Laponum<sup>15)</sup>; sicut et isti, quos in virginibus, quibus menstrua primis vicibus fluunt<sup>16)</sup>, et in femina ex suppressis menstruis<sup>17)</sup> observavit MATERNUS DE CILANO; quique feminis per totum graviditatis tempus molesti sunt, quales describunt REUSNERUS<sup>18)</sup>, GOEZZIUS<sup>19)</sup>, HOYERUS<sup>20)</sup>. Eidem consensui etiam nititur nimiae salivationis imminutio per purgantia; uti etiam vis emeticorum salivationem, quae ab inunctione mercuriali prodire recusat, promouendi; breui enim post datum emeticum tempore, sputationem erumpere, plurimis experimentis edoctus fuit cl. GRAINGER<sup>21)</sup>; etiam ad languidum et cessantem ptyalinum in secunda variolarum febre resuscitandum infusum croci metallorum laudat SYDENHAM<sup>22)</sup>, et vinum ipecacuanhae cl. BROCKLESBY<sup>23)</sup>.

### *Linguae affectiones sympathicae.*

#### §. XXVI.

Vix manifestiorem in corpore consensum observamus, ac illum, qui inter linguam et ventriculum est; neque ex alia parte, quam ex lingua, certiora depromuntur depravatae digestionis signa; quare ne unquam ab aegro discedas, antequam linguam

11) Corticem peruianum in scrophulosis affectibus extollunt cl. FOTHERGILL et FORDYCE in med. obs. and inquir. Vol. I. et BOND ibid. Vol. II. p. 265. conf. quae ad §. XI. dicta sunt.

12) SYDENHAM Oper. T. I. pag. 264. WHYTT Observ. on the nerv. disorders. p. 253.

13) CHEYNE English malady. p. 212.

14) GRAINGER Monita sphylica. Edit. Altenburg. p. 9.

15) DE SAUVAGES Nosol. meth. T. II. p. 103. ed. ult. Salutarem quoque saliva-

tionis effectum in colica nervosa (dry belly-ach) observavit BISSET Medical Essays and observ. p. 92. sq.

16) A. N. C. Vol. X. obs. 31.

17) ibid. obs. 30.

18) E. N. C. Dec. III. A. III. obs. 50.

19) A. N. C. Vol. I. obs. 47.

20) A. N. C. Vol. II. obs. 204.

21) Monita sphylica. p. 17.

22) Opera T. I. p. 96. 97.

23) Oeconom. and medic. observations. p. 239.



quam inspexeris, sapiens BAGLIVI<sup>1)</sup> monet. Cui enim latet, alienum oris saporem, fordes linguae superficiem obducentes primarum viarum impuritates indicare, harumque copiam et indolem ex sola lingua plerumque determinari posse; ita ut, ubi viscidus oris sapor est, spumosa tenuiorue saliva linguae marginibus adhaeret, vel mucus subalbus linguae papillas cingit aut obducit, maiorem vel minorem pituitae copiam ventriculo contineri probabile sit, si vero sapor amarus, flava puncta hinc inde per linguae dorsum dispersa sint, vel lutea aut castanei coloris pellicula linguam obtegat, biliosam colluuiem aut meram aut pituita aliisque humoribus mitificatam in primis viis haerere, concludere possis; quam corruptam et putridam simul esse, puniceus, fuscus nigerue illius pelliculae aut crustae color, ructus putridi et nidorosi indicant; utramque colluuiem mobilem esse et turgere crustae illius mollietates, crudam vero et immobilem tenax sordium ad linguam adhaesio praefagiunt; et semper diffidendum est ventriculo, quamdiu lingua pristinam puritatem nondum recuperavit, eius color, sapor et reliqua accidentia a naturali statu adhuc discedunt. Ad reliqua interim signa simul est respiciendum, ne fallaris; fusca enim et nigra lingua etiam in peripneumoniciis, et ingratus oris sapor in phthisicis occurrunt.

#### §. XXVII.

Ipsos etiam linguam mouentes musculos per consensum spasmi et paralyssi aliquando affici videmus; hinc *tremores linguae, balbuties, aphoniae* consensuales. De tremoribus linguae HIPPOCRATES<sup>1)</sup> iam observavit, quod aluum liquidum quibusdam faciant, neque adeo raro in febribus biliosis ex acri ventriculi colluui obueniunt, minori omnino cum periculo ac si in febribus nervosis, phrenitide, paraphrenitide, occurrant, in quibus mentis emotionem<sup>2)</sup>, grauiore conuulsiones et plerumque mortem praefagiunt; iidem aliquando ex similibus spasmi abdominalibus oriuntur in hypochondriacis et hysteriacis; sic in femina quadam hysterica rauedine molesta et loquela difficultate vexata, dextram dimidiam linguae partem tremantem, sinistram paralyticam et quasi emortuam observavit HENNIKE<sup>3)</sup>; et HAGEDORN<sup>4)</sup> ex febre intermittente suppressa in puero per consensum adeo vehementem linguae tremorem observavit, ut viperam lingua velociter vibrantem imitari dixisset, subsultantibus simul faciei musculis. Non minus balbuties aliquando sympathicae originis est, uti illa, quam ex clystere opiato ortam et sponte iterum cessantem in sene nephritico observavit PLATERUS<sup>5)</sup>; et MOLLERUS<sup>6)</sup> puerum vidit, qui semper circa nouilunium difficulter, aliis temporibus recte loquebatur, expulsis vero lumbricis hoc affectu liberabatur. De iecinorosis AETIUS<sup>7)</sup> iam notavit, quod difficulter loquantur, et HIPPOCRATES<sup>8)</sup> balbos valde atrabiliarios esse, et longo alui profluvio maxime corripit dicit. Phthiseos quoque praenuncias balbutiem et vocis interceptiones crebras esse,

ex

1) Opera pag. 425.

1) Coac. 234. 645.

2) Praedict. I. 3. 2.

3) Nov. A. N. C. Vol. II. ob. 58.

4) E. N. C. Dec. I. A. VI. VII. obf. 15.

5) Observat. L. I. p. 136.

6) E. N. C. Dec. II. A. V. obf. 27. schol.

7) Libr. VI. C. 9.

8) Epid. II. §. V. 6. Aphor. S. VI. 32.

ex iisdem oraculis <sup>9)</sup> scimus; nonne vero etiam hae ex praecordiis consensuales sunt? Sane nulla fere phthisis sine vitiis viscerum est, quae chyli officinam componunt, et maxima illius symptomatum pars spasmodicos ex uno ventre sympathicos natales habet. <sup>10)</sup> *Aphoniae* consensuales frequenter abmodum sunt obseruatae; et in his modo lingua paralyti affecta, modo naturali quidem mouendi facultate praedita est, neque ullum in lingua vitium deprehenditur, sed ex neruorum laryngis affectione, qua ligamenta huius partis tensionem suam amiserunt, oriri videntur. Ratione vero causarum, quae has consensuales vocis defectiones producant, eae prorsus similes sunt illis, quae alios consensuales spasmos excitant. Sic ex ebrietate, comestis quibusdam venenis, femine daturae, baccis belladonnae, radicibus hyoscyami aphoniae sunt obseruatae, quae soluebantur expulsiis venenis, vel solutis, siue sponte, siue per artem crapulis. <sup>11)</sup> Eaedem ex alia acri primarum viarum colluue oriri possunt, uti non raro in febribus et cholera ex acri bile raucitates et aphoniae obseruauit BAGLIVI <sup>12)</sup>; quare etiam HIPPOCRATES <sup>13)</sup> in febre continua voce destitutis, vomitum salutarem esse iudicauit; et EGGERDES <sup>14)</sup> plures milites eodem tempore aphonia prehenso, relictis omnibus aliis fartis et intactis, venae sectione et emeticis curauit. Frequenter imprimis vermes intestinales vocis priuationem producant; sic FORESTUS <sup>15)</sup> graui febre verminosa laborantem et per quatuordecim dies mutum, innumeris expulsiis vermibus loquelam cum reliqua sanitate recuperare vidit; similia verminosae aphoniae, tum continuae, tum periodicae, exempla narrant HEINTKE <sup>16)</sup>, SCHROETER <sup>17)</sup>, BUCHNER <sup>18)</sup>, ADOLPHI <sup>19)</sup>, DE SAUVAGES <sup>20)</sup>. Ulcerosa etiam metastasis ad ventriculum et intestina facta mutam reddidit puellam, cui sponte capitis ulcera excidebantur, vocem vero vomitorio, quod per superiora et inferiora copiose operabatur, recuperauit. <sup>21)</sup> Inter consensuales aphoniae etiam referri debent, illae, quae saturninae colicae non raro superueniunt <sup>22)</sup>; et subitaneae illae linguae imbecillitates in atrabiliaris <sup>23)</sup>, nimirum inueterato malo hypochondriaco laborantibus <sup>24)</sup>; tandem et istae, quae grauidas aliquando paucis a conceptione hebdomadis inuadunt, et post partum protinus sua sponte cessant, qualem vidit THEMEL <sup>25)</sup>. Quomodo vero loquelae vitia per consensum oriri possint, rationem in arctissimo neruorum linguae et laryngis cum intercostali et vago vinculo facile quis inueniet.

## §. XXVIII.

9) De crisib. V. 10. 12.

10) BRENDL Diff. de phthiseos hecticae-que discrimine. Goett. 1754. p. 11 et 31.

11) HIPPOCRATES aphor. S. V. 5. A. N. C. Vol. VI. obs. I. SAUVAGES Nosolog. meth. T. I. p. 777. MORGAGNI de sed. et caus. morb. Ep. XIV. art. 35. Ep. LXIII. art. 13.

12) Opera p. 99 et 207.

13) Coac. 80. conf. PROSPER ALPINUS de praefagienda vita et morte p. 220.

14) E. N. C. Dec. III. A. IV. obs. 8. etiam KÖELICHEN duobus aegris loquelam subito interceptam vomitorio restituit.

BARTHOLINI Act. Hafn. A. 1671. obs. 86. 87.

15) Obseruat. medic. L. VI. obs. 38.

16) E. N. C. Dec. II. A. X. obs. 47.

17) E. N. C. Dec. III. A. IV. obs. 47.

18) A. N. C. Vol. II. obs. 62.

19) A. N. C. Vol. II. obs. 16c.

20) Nosolog. method. T. I. p. 779.

21) E. N. C. Dec. II. A. VI. obs. 25.

22) DE HAEN Diff. de Colica Pictorum. p. 35. 36. Rat. medendi P. X. p. 91.

23) Aph. 40. S. VII.

24) BRENDL prog. de paresi atrabiliar. HIPPOCR. in opusc. T. I. p. 184.

25) Commenc. Nor. A. 1736. p. 363.



## §. XXVIII.

Etiam *Sitis* interdum consensualis affectio est. Contingit nimirum aliquando in febribus, quod sitis intensa aegros excruciet, licet in sanguine et reliquis humoribus nulla acrimonia, nulla corruptela adsit, neque magnae siccitatis et liquorum immedietatis signa deprehendantur, sed ex sola acri primarum viarum colluie, similium nervis ventriculi, faucium, linguae molestum sensum imprimente, quem alias defectus humorum mucosorum et salivarium has partes illinentium producant; et per unicum vomitorium, excussis sordibus, brevis tollitur talis sitis<sup>1)</sup>; mirum est videre, dicit GORTERUS<sup>2)</sup>, aluum ducentia aliquando unica vice tollere sitim, quam multus placare non potuit potus. Etiam vermes oris fauciumque siccitatem producant, hinc in quibusdam verminosis perpetua sitis<sup>3)</sup>. Alia consensualis sitis est, quae a spastica constrictione in emissariis glandularum et vasorum laticem suum in oris cavitatem fundentium oriri videtur, uti illa, quae in rigore febrium intermittentium, quartanarum praesertim, aegros vexat, neque plenis cyathis extinguere potest, statim vero imminuitur, prouti horror in aestum transit, et spasmi, ex abdomine certe oriundi, solvuntur. Egregie spastica et consensualis haec sitis origo dilucidatur observatione, quam fecit GRASSIUS<sup>4)</sup> in viro, qui pertinaci quartana laborabat. et paroxysmo licet versus vespertinum finito siti vix extinguibili adeo torquebatur, ut totas noctes potando, et frigida oris elotione consumeret, simulac vero diluculum apparebat, siti incantamenti instar uno momento liberabatur, quae vero constanter, et prorsus etiam curata febre, cum crepusculo vespertino recurrebat; periodicis ergo spasmodicis similis, cum quibus etiam in eo conveniebat, quod cum spasmodicis aliarum partium alternabat; non apparebat enim, quando tempore suae accessionis dolor in hypochondriis intrabat, quem vero solutum mox iterum excipiebat. Similem spasmodicam sympathicam sitim ex febre intermittente suppressa ortam, et per totum annum perseverantem observavit cl. HEUERMANN<sup>5)</sup>. Etiam hystericae feminae saepe siti molesta vexantur sine ullo febris indicio, quae non copioso potu, temperantibusque, sed antispasmodicis, citissime opio tollitur. Hinc recte dixit ALEXANDER TRALLIANUS<sup>6)</sup>, non semper, ubi sitis est, refrigerantibus humectantibusque utendum esse, sed ubi causam accurate distinxeris, tunc tandem congruam adhibendam esse curationem.

*Spasmus Maxillae inferioris consensualis.*

## §. XXIX.

Dirus hic morbus maxime solennis est in infantibus recens natis, frequentior in calidioribus terrae regionibus, neque tamen in nostris locis inauditus. Praenunciis  
ni-

1) VAN SWIETEN Comment. in Aphor. BOERH. T. II. p. 209.

2) Exercitat. medic. IV. §. 23. 24.

3) V. PHELSEM Hist. ascariid. path. p. 187.

4) E. N. C. Dec. II. A. V. obs. 44.

5) Vermischte Bemerkungen und Untersuchungen d. Arzneyw. I. B. p. 28.

6) Lib. VII. Cap. 8.

nimirum variis spasticis pathematibus, paucioribus, inquietudine, torminibus, difficultate sugendi et deglutendi, fugace insolitoque faciei rubore, spasticis oscillationibus in musculis faciei, immisso in os digito maxilla difficulter cedere incipit, dolorem sentiunt dum masseter aut temporalis musculus contangitur; sensim respiratio anihela, spastica, singultuosa fit; tandem adeo maxilla adstringitur, ut vix immitti cochlearis manubrium queat, superiora sudant, collum immobile fit, iuncturae incuruantur et contrahuntur, totumque corpus, praesertim sub exacerbationibus, quae nunc quotidianae sunt, in aliis alternis diebus inuadunt, rigidius fit; tandem miseri aut sub convulsionis cuiusdam paroxysmo suffocantur, aut inter lenta respirationis cum fletore decremenda, et spasticos pectoris motus peripneumonico modo afflictam vitam in ipso limine decimo quarto die, aut citius ponunt. In primas vias morbi sedem ponendam esse, fere omnes consentiunt, qui hunc morbum descripserunt. Partum enim difficiliorem, vitia capitis frustra accusari, docet observatio, quod post partum expeditum, naturalem, maturum, morbus non minus obseruetur, quam post laboriosum et peruersum, neque dissectum cerebrum vitia ostenderit. Tumor vero et dolores abdominis, vomitus foetidae materiae, deiectiones excrementorum viridium, rutilorum, spumosorum, horribilem spirantium mephitim, detecta post mortem hepatis et bilis vitia, acrem materiam primas vias irritantem suspicari suadent; an forte ex lacte materno, vitioso, vel debili infantis digestionem corrupto? non videtur, cum morbus assumpto lacte recentiori, adultiori, imo interdum ne praeuia quidem suctione ulla; matribus sanis, languidulis, nobilibus, plebeiis; infantibus debilibus, robustis, aequae accesserit. Comparatis omnibus, causa videtur inesse meconio, aut medicamenti educi neglecto, aut a regimine nimis frigido, cibis crudis imo spirituosius citius ingestis retento; quare unice aluum laxantia, emetica citius adhibita auxiliandi spem fouent <sup>1)</sup>. Similis trismus consensualis adultos aliquando et ex variis quidem causis inuadit; uti ex ingestis quibusdam venenis, qualem ab oenanthe observauit cl. VACHER <sup>2)</sup>; etiam verminosis non raro inter dormiendum aut vigilandum strident dentes, et maxillae spasmu clauduntur <sup>3)</sup>, qualem viginti horis durantem in aegris febre putrida verminosa epidemica laborantibus, observauit cl. COLLIN <sup>4)</sup>. Horrendus in primis ille est, qui febrium intermittentium paroxysmis sese adiungit, qualem ex acris bilis in primis viis contentae et irritantis copia ortum observauit, descripsit et curare docuit cl. MEDICUS <sup>5)</sup>. Etiam phreniticos similibusque neruosis febribus laborantes dentium stridor subinde impetit. Neque raro hypochondriaci

1) Conuenire dicta inuenies obseruationibus, quas de hoc morbo tradiderunt, cel. WERLHOF in *Comm. Nor. A.* 1734. p. 42. BRENDEN progr. de spasmu maxill. infer. in *Opusc. T. I.* p. 189. Praeceptor summe venerandus Magnif. VOGEL *Diff. de vomitor. usu in opusc.* p. 184. HOFER *Aët. Heluet. Vol. I.* p. 64. CHALMER in *Medical observat. and inquir. Vol. I.* pag. 106. HILLARY on the Epidemical diseases in the

Island of Barbados. p. 219. sqq. CLEHORN observat. on the Epidemical diseases in Minorca. p. 73. GRAINGER an *Essay on the more common West-India diseases.* p. 15.

2) *Journal de medecine T. XVIII.* p. 236.

3) *A. N. C. Vol. X.* obs. 54. VAN DEN BOSCH l. c. p. 99. VAN PHELSUM lib. cit. p. 201.

4) *Journal de medecine. T. XIX.* p. 216.

5) *Brief an H. ZIMMERMANN* p. 5. sqq.



driacis et hysteriis subito maxillae clauduntur, et inopinato sponte iterum solvuntur<sup>6)</sup>, licet etiam difficiliore esse possint; uti cl. MACULAY<sup>7)</sup> vidit in hysterica virgine, cui, praecedente linguae sine ullis inflammationis signis dolore, subito tetano maxillae constringebantur, una cum musculationum oris, colli, cervicis convulsionibus, calidis demum balneis et largioribus opii dosibus soluto; etiam ALBRECHT<sup>8)</sup> Ministrum ecclesiae vidit, optime quoad reliquas actiones valentem, sed periodica glossagra cum spastica contractione maxillarum vexatum; et cel. DE SAUVAGES<sup>9)</sup> melancholicum hominem novit, qui, etiam dormiens, a pueritia dentibus stridebat, ita ut dentes admodum detriti essent, nullo alio sequente a multis annis incommodo; constringebantur etiam ad noctem maxillae in Harpali filio apud HIPPOCRATEM<sup>10)</sup>. Consensualibus trismis adiungendi quoque sunt illi; qui herniotomias interdum citius vel tardius sequuntur, plerumque lethales, nisi efficacissimis antispasmodicis mature succurratur<sup>11)</sup>.

## §. XXX.

Absolvimus nunc tractationem morborum ex imo ventre consensualium, qui externas capitis partes afficiunt, et progredimur ut etiam ostendamus, quomodo ipsae cerebri functiones laesae ex vitiis viscerum abdominalium oriri possint, licet in his maiori, ac rei dignitas requireret, brevitati studere, incremens plagularum numerus iubeat. Incipiamus a levisis cerebri morbis sympathicis, inter quos primus est

*Vertigo consensualis.*

## §. XXXI.

Notissimum nimirum est, vertiginis causas saepissime in abdomine sedem habere, praesertim in ventriculo, neque facile hunc siue ingestis siue inquilinis acris irritari, quin molesta haec sensatio oriatur. Exempla cuique quotidie sese offerunt. Copiosi vini assumti in ventriculo distento et extremitatibus suis constricto inclusi vapores, quoties hallucinationem hanc, omnia in gyrum versari, producant? Vertiginosi omnes homines et animalia evadunt, qui maiorem opii dosin assumunt<sup>1)</sup>; et ille, qui maiorem eius copiam deuorauerat, se cum lecto in aere suspensum fuisse ad sensum, et quasi volitasse, omniaque cum ipso in gyrum acta fuisse, retulerat<sup>2)</sup>. Mulier quoque illa, sumto iusculo, in quo folium hyoscyami albi fuerat incotum, patiebatur vertiginem, in qua caput collo minime adhaerens videbatur, corpus vero in aere suspensum existimabatur, sine delirio, quippe ratio hanc hallucinationem apprime corrigebat<sup>3)</sup>. Si homo sanissimus ventriculum nimia ciborum copia distende-

Qq 2

rit,

6) DELIUS Abhandl. von den Dünsten. §. 15.

7) Medic. observ. and inquir. Vol. II. p. 130.

8) Commenc. Nor. A. 1736. p. 202.

9) Nosolog. method. T. I. p. 532.

10) Epidem. VII. 20.

11) E. N. C. Dec. III. A. IV. obs. 37. 38. WEPFER de cicut. aquat. p. 91.

1) TRALLES tract. de opio S. I. p. 88.

2) E. N. C. Dec. II. A. V. obs. 12.

3) DE SAUVAGES Nosolog. method. T. II. p. 174.

rit, intolerabilem vertiginem patitur, vix sibi constat, euomit omnia, et hoc facto caput statim est liberum. Saepissime infantes, dum lac coagulatum acidum in ventriculo haeret, oculos aperientes lucem refugiunt, et vertiginosi, imo epileptici euadunt; in horum cadaueribus apertis ventriculus colostro compacto et acido plenus inventus fuit <sup>4)</sup>). Quoties non febre correpti molestant vertiginem queruntur, quae statim evanescit, quamprimum acres sordes aluo subducuntur, aut vomitu euacuantur. Narrat PLATERUS <sup>5)</sup> de viro quodam subito interdum vertigine correpto, ita ut in terram concidere cogeretur, quam epileptici instar, sui tamen conscius et se retinere studens, unguibus radebat pedibusque pulsabat, et quovis paroxysmo soluto lentam pituitam euomebat, vomitorijs et purgantibus sanabatur; similem periodicam vertiginem ex sordibus primarum viarum productam, ultra viginti annos virum vexantem, per pilulas cholagogas aliquoties pridie ante nouilunium et plenilunium sumtas, quae bilem per epicrasin educebant, curavit HELLWIG <sup>6)</sup>; et BOETTICHER <sup>7)</sup> gravem vertiginem observavit, ultra semihorium quidem non extensam, sed saepe recurrentem, cum cardialgia, vomitibus enormibus serosae, mucosae, biliosae, acidae, corrosivae materiae, et diarrhoea iunctam, quam remedijs, quae stomacho prospiciebant, superavit. Non minus ex vermibus intestinalibus vertigines saepissime originem ducunt. BENVENIUS <sup>8)</sup> puerum, qui semper hinc inde temerario motu et impetu ferebatur, ut etiam stare volens iterum titubaret et caderet, expulsis multis lumbricis restituit. Similem pertinacem vertiginem ex lumbricis describit cl. ROZIERE <sup>9)</sup>; et ab ascaridibus factus quidam adeo vertiginosus factus erat, ut per plures septimanas ebrii instar per plateas incedere cogeretur, expulsis animalculis statim sanatus <sup>10)</sup>). Frequenter etiam hypochondriaci et hystericae vertigine vexantur; ob spasmos enim abdominales, ventriculi debilitatem, facile omnis generis sordes in illorum prima regione colliguntur; hinc hysterica illa femina, quam periodica vertigine admodum vexatam fuisse BIANCHI <sup>11)</sup> narrat, post exhibita laxantia et sequentes copiosissimas sedes, quibus insignem acerrimae, crassae bilis copiam foras amandabat, veluti ex incantamento molesta hac affectione liberabatur; et VATER <sup>12)</sup> hypochondriacum virum, gravi et apoplexiae proxime instantis metum iniiciente vertigine per biennium afflictum, per salina blande laxantia et stomachica breui sanavit. Aliquando tamen in his aegris nulla sordium sunt indicia, et vertiginem certe augeres, repetitis euacuantibus; tunc nimirum ubi sola nimia ventriculi debilitas et sensibilitas peccat, roborantia stomachica, martialia et, si periodicum decursum habent <sup>13)</sup>, cortex peruuvianus, certissima tunc sunt remedia. Possunt quoque alia obstacula extra ventriculum et intestina posita, quae sanguinis per abdomen circuitum difficiliorem reddunt et nervos irritant,

con-

4) BOERHAAVE Praelect. de morbis nervorum. p. 497.

5) Observat. med. L. I. p. 100.

6) Observat. phys. med. obs. 40.

7) A. N. C. Vol. VIII. obs. 51.

8) De abditis rerum causis. C. 92.

9) Journal de Medecine T. XXVI. p. 430.

10) VAN PHELSUM Histor. ascarid. patholog. p. 205.

11) Historia hepatica. P. III. p. 513.

12) Dissert. de consensu partium C. H. in HALLERI Collect. diss. anatom. Vol. II. p. 960.

13) Journal de Medecine. T. XV. p. 33.



consensuales vertigines producere. Hinc oriuntur si haemorrhoides aut menstrua incipiunt apparere vel supprimuntur, et cessant leuatis et restitutis fluxibus; hinc etiam illa vertigo frequens in mercatore quodam vomica hepatis laborante <sup>14)</sup>; et quaecunque tandem causae grauiore cerebri affectus, conuulsiones, epilepsias, apoplexias consensuales producant, simul vertiginis causae sunt, raro enim illi inuadunt, nisi hoc praenuncio. Id adhuc mouemus; non quamuis vertiginem, quam forte nausea, vomitus, alia spasmodicorum abdominalium signa comitantur, consensualem censendam esse, cum etiam consensus sit, qui ex capite ad abdomen tendit, et omnis grauis capitis affectus non raro vomitionem excitet, etiam si stomachus prius bene se habeat, vel, ut ill. TISSOT <sup>15)</sup> verbis utar, plethora cerebri, sordes ventriculi saepe mentiatur.

### *Agrypnia consensualis.*

#### §. XXVII.

Non rara sunt agrypnae consensualis exempla, et facilem explicationem ipsius origo admittere videtur, cum omnia irritamenta, quae spirituum nervosorum motum augment, sanguinis versus caput motum incitant, iustam ipsius in encephalo circuitus temperiem tollunt, somni praecipuas causas impediunt. Hinc videmus eos, qui se in coena ingurgitant, ut plurimum post primas somni horas euigilare et vix somnum iterum capere posse. Saepissime aegros acutis febribus laborantes, licet nullae sensationes praeualidae, corporis siue animi dolores somnum auertant, neque grauiora symptomata incipientis cerebri inflammationis suspicionem iniiciant, plures tamen noctes insomnes se transigere, vel ubi somnus accedit, interruptum eum esse, phantasmatibus horridis ac insomniis perturbatum, queri audimus; soluimus alium, quae antea stricta erat, mobiles reddimus et euacuamus primarum viarum cruditates, coluuias, et tunc non raro eodem die placidiorem somnum redire videmus. Nonne haec peruigilia consensualia erant, ex sordibus intestinalibus orta? sane ex eadem causa pertinacibus vigiliis vexatos aegros biliosa febre Lausannensi correptos obseruauit ill. TISSOT <sup>1)</sup>, quae unice euacuantibus remediis cedebant, et a narcoticis, ad quae confugiebat inscia plebs, adeo non fugabantur, ut potius obstinatiores redderentur, in deliria, animi deliquia, grauiora alia symptomata transfirent. Ex iisdem sordibus in intestinis retentis non raro febribus iam solutis peruigilia remanent, virium recuperationem retardantia, et post unicum emeticum aut purgans redeunt somnus et artuum vires; sic cl. VALCARENGHI <sup>2)</sup> de aegro narrat, qui febre biliosa petechiali detentus fuerat, et licet nunc immunis ab omni febre esset, tamen adhuc noctu vigilabat, nil propemodum cibi appetens, statim vero perfecte sanus reddebatur, postquam bilis sinceræ, amaræ, glutinosæ tres fere libras euomuerat. Vermes quoque aliquando somnum arcent, uti VELSCHIUS <sup>3)</sup> in puero vidit, qui per longum tempus

Qq 3

singu-

14) BOERHAAVE de morbis nervorum. p. 494.

15) Epist. ad ill. DE HALLER de variol. apoplex. et hydr. in Epist. med. pract. p. 169.

1) Diss. de febr. bil. Laus. in Opusc. T. I. p. 131.

2) Medicina rationalis. Tom. I. p. 168.

3) E. N. C. Dec. I. A. VIII. obs. 36.

singulis noctibus vigiliis molestissimis affligebatur, et eiulatu totam viciniam complebat, expulsis vero lumbricis somnum iterum recuperabat; et cl. VAN DEN BOSCH <sup>4)</sup> de rustico narrat, qui in febre lenta verminosa pertinacia per septimanas aliquot successivas sustinuerat, quibus tandem in furorem agebatur, donec diarrhoea accedebat, putrida ramentosa, verminosa educens, somnum et sanitatem restituens. Non minus stases in visceribus abdominis molestas aliquando vigilias pariunt, uti in viro quodam haemorrhoidario ex biliosa febre conualescente vidit ill. TISSOT <sup>5)</sup>, in hoc enim somnus non redibat, usque dum largiter nigrum piceumque sanguinem, qui antea meseraica vasa repleuisse videtur, deiecerat; similem agrypniam per biennium cum aliis symptomatibus durantem in viro atrabiliario et duro iecoris tumore affecto observavit, quam, non quidem anodynis, paregoricis, soporiferis, narcoticis, primis et unicus symptomatum medicorum refugiis, sed remediis causae morbi, hepatis nimirum obstructioni oppositis aggrediebatur, extractis amaris, saponibus vegetabilibus, sero lactis, quae horrendam materiam per aluum euacuabant, mitigabat et una cum principe morbo tollebat <sup>6)</sup>. Ex simili causa etiam oriebatur agrypnia viri illius, de quo BONNET <sup>7)</sup> narrat, qui quoties dormire conabatur in lipothymiam et totius faciei frigidum sudorem incidebat, et tandem, cum nil profus dormire poterat, interibat, in huius enim cadauere ne minimum cerebri vitium, sed pancreas abscessu putrefactum inuentum fuit. Aliquando vero dictarum causarum nulla accusari potest, sed ex sola primarum viarum debilitate vigiliae proveniunt, hinc purgantibus, resolventibus, temperantibus non tolluntur, opiatis pertinaciores redduntur vel in somnum inquietum mutantur, uti toties in aegris ex febre Lausannensi conualescentibus notavit ill. TISSOT <sup>8)</sup>, illis enim remediis ventriculi tonus adhuc magis debilitatur, sola stomachica, reborantia reddunt somnum, illumque quietum, placidum. Ex eodem fonte oritur etiam agrypnia, quae hypochondriacos et hystericas vexat, qualem nonnisi post emissos ructus cessantem observavit WILLIS <sup>9)</sup>.

### *Asthenia consensualis.*

#### §. XXXIII.

Neminem latere credo, praecipuum virium corporis fontem in cerebro esse, ab eius integritate vigorem omnium functionum maxima ex parte dependere, orta vero undecunque praeter naturam illius pressione lassitudinem artuum, sensuum externorum hebetudinem, ac omnem plane debilitatis formam oriri. At causam illam, quae cerebrum afficiendo debilitates producit, non semper in ipso encephalo haerere, sed ex remotioribus locis, praesertim ex abdomine per consensum illud afficere, res est Medico scitu perquam necessaria, multis occulta. Incipiamus, ut consensualis haec imbecillitatis origo pateat, a lassitudine artuum, ad summum dein debilitatis gradum, qui

4) Hist. constit. epid. vermin. p. 316.

5) Epist. ad ill. ZIMMERMANN de morbo nigro cet. in Epist. med. pract. p. 56.

6) Diff. de febr. bil. in opusc. T. I. p. 73.

7) Sepulc. anat. L. I. S. VI. obs. 8.

8) Diff. de febr. bil. l. c. p. 85.

9) De anima brut. P. II. C. 2.



qui in apoplexia est, progredientes. Quantum enim quotidie observamus consensum inter robur artuum et sensum cum viribus digestionis? Geometra, qui ante prandium difficillimae quaestioni resolvendae idoneus erat, a larga cibatione totus hebescit, somnolentus fit; miror, dicit cel. BOERHAVE <sup>1)</sup>, quando scripta video et colloquia sapientum, qui putant, pendere a se ipsis, quid cogitent, nam solus cibus potest submergere illam diuinæ particulam auras. Videatis feminas sensilioribus ptaeditas nervis protracto paulo longius cibandi tempore toto corpore languere, imo aliquando animo delinqui, restaurantur vires eo ipso momento, quo minima iusculi portio vel generosi vini haustus ventriculi parietes alluit; relabuntur in eandem lassitudinem, quamprimum ingesta ventriculum deferunt <sup>2)</sup>. Assumat sanus mediocrem opii dosin, mox sentiet temulentam capitis gravitatem, artuum languorem, inertiam, titubabit, pedes proferre impotens, licet opium ventriculi limites nondum transgressum sit. Quenam anxietates et impotentiae oriuntur, si humor alienus, biliosus, in ventriculum effusus fuerit <sup>3)</sup>? Saepissime reuera in febribus virium prostratio nonnisi ex acri primarum colluie dependet. Haeret aliquando, dicit ill. van SWIETEN <sup>4)</sup>, in morbis aliquid circa praecordia, quod venenata quasi vi omnes vires uno momento prosternit, et quamdiu ibi haeret summam debilitatem facit, quamvis nulla iactura fluidorum praegressa fuerit, neque observabilis ulla mutatio in liquidis solidisque; et recte hinc BALLONIUS <sup>5)</sup> monet, in magna cacoehymia non ita diffidendum esse viribus, neque animi defectione, virium languore Medicum auocari debere ab euacuationibus, vires enim reuerti, prouti de saburra detractum fuerit; mirabatur SYDENHAM <sup>6)</sup> in febribus continuis epidemicis, praeter alia mala symptomata, anxietates, iactationes, suspiria luctuosa, ingentem ac subitam adesse virium prostrationem, emetico vero dato omnia saeva illa symptomata, quae et aegros excruciarunt, et adstantes perterrefecerant, illico mitigari ac solui, quodque morbi reliquum erat, *εὐδυνως* tolerari. Vidit RIVERIUS <sup>7)</sup> aegrum, qui per sex septimanas febre laborabat, cum tanta virium deiectione, ut breui moriturus videretur, audiens eum parum purgatum fuisse toto morbi decursu, ab humorum sarcina vires opprimi coniecit, hinc per epicrasin ipsum purgavit, quo facto sensum vires et sanitas redibant. Ex sola putrida biliosa primarum viarum colluie dependebat asthenia illa aegrorum Lausannensium, neque melior cardiaca medicina his parari poterat, nisi quae biliosae materiae congruam euacuationem facilitabant <sup>8)</sup>. Semper intestinali putrilagini imbecillitatem aegrorum febre petechiali laborantium respondisse affirmat cl. STRACK <sup>9)</sup>, ita ut vires vigerent in iis, quibus venter purus erat, etiamsi petechiae in cute existerent. Et quoties ver-

mes

1) Praelect. academ. Vol. IV. pag. 488. ZIMMERMANN von der Erfahrung. II. Th. p. 291.

2) WHYT observ. on the nervous disorders p. 255.

3) HIPPOCRATES de prisca Medicina. 16. Edit. Foef. p. 518.

4) Comment. in aphor. BOERHAV. T. II. p. 271. 272.

5) Opera. T. I. p. 153. 157. T. IV. p. 130.

6) Opera T. I. p. 32.

7) Observat. Centur. II. obs. 87.

8) De febr. bil. Lauf. h. c. p. 128 sqq.

9) De morbo c. petech. p. 142. conf. GRAINGER de febr. anom. Batava. p. 30.

mes intestinales, uti nulla non graua symptomata in febribus excitare possunt, vires febricitantium prosternunt? Vidit RIVERIUS<sup>10)</sup> puerum febrientem adeo debilitatum, ut pulsus in carpo non perciperetur, oculi concaui essent spiritibusque orbat, qualia in moribundis apparere solent, medicamento vero purgatus, excreuit materiam viscidam glutinosam putridam cum duobus lumbricis, et post paucos dies convaluit. De viro narrat LEDELIUS<sup>11)</sup>, qui derepente subita virium prostratione tam grauitur afficiebatur, ut iaceret quasi moribundus, tandem omnibus collectis viribus et unico satis forti vomitu exturbabat saburram pituitosam una cum verine, et hoc exantlato labore vires redibant. Adeo leuibus ergo ex causis musculorum virtus opprimi potest. Neque credas, artuum tantum viribus talia contingere; licet enim consensualem hanc lassitudinem vitalium functionum robur aliquando comitetur, non raro tamen occurrit, quod etiam hoc ex eadem causa prosternatur, cor tremat, pulsus paruus, rarus, inaequalis, intermittens reddatur, faciei rubor pereat, calor deficiat, exanthemata euanescent, respiratio parua, rara, anxiosa reddatur. Narrat, ut exemplis rem confirmemus, RIVERIUS<sup>12)</sup> de femina septimo pleuritidis die tremore et palpitatione cordis correpta adeo graui, ut Medicus extremos adesse naturae conatus arbitraretur, feminamque breui morituram palam profiteretur, at post duas horas aegra bis aluo foetida deiecerat. hisce peractis symptomata illa euanescebant, et GALENUS<sup>13)</sup> pulsus obscurum et male ordinatum inter ipsa signa ventriculi et crudis humoribus male affecti ponit, et post vomitum naturalem fieri dicit; memini, verba sunt ill. MORGAGNI<sup>14)</sup>, cum virgini febricitanti mederer, et ad caetera intermissio pulsuum accessisset, minime me esse absterritum ab eo exhibendo, quod constitueram, medicamento, quod abstergeret ventriculum et intestina, imo eo fidentius dedisse, eodemque die pulsus prior normae restitutum fuisse. In aegrotis febre petechiali detentis, pulsus exilis et celer statim post lenia euacuantia maior et lentus euadebat.<sup>15)</sup> In puero tussi conuulsiva grauitur affecto pulsus per viginti quatuor horas euanescebat, post sumtum vero bolus purgantem mox iterum eleuari vidit MONRO<sup>16)</sup>. Pulsus quarto quouis ictu intermittentem post febrem intermittentem omnis purgantibus cortice peruiano sublatam obseruauit et salinis remediis in ordinem redegit BERNERUS<sup>17)</sup>. Pulsus debiles, deficientes, intermittentes in verminosis saepissime notauit cl. van den BOSCH<sup>18)</sup>; et nonne ipsae lipothymiae saepe ab acri viscido tenaci humore ventriculum irritante producuntur, ex quibus aegri non cardiacis, sed purgantibus citissime excitantur<sup>19)</sup>? Vidit TULPIUS<sup>20)</sup> feminam, quae quauis febris exacerbatione adeo vehementi animi deliquio corripiebatur, ut videretur actutum e vita discessura, sed asari succo et oxymelle assum-

10) Observ. Centur. V. obs. 5.

11) E. N. C. Dec. III. A. VII. VIII. obs. 61.

12) Observ. Centur. I. obs. 72.

13) De febribus. L. I. Describibus. L. III. C. 2. De causis puls. L. IV. c. 27. CHAR-TER. T. VII. p. 118. T. VIII. p. 235. 448.

14) De sed. et caus. morb. Epist. XXIV. art. 20.

15) STRACK de morbo c. petech. p. 41, 46. 119.

16) Medical Essays by a Society in Edimb. Vol. III. p. 348.

17) A. N. C. Vol. III. obs. 31.

18) Hist. constit. epid. vermin. p. 337.

19) BAGLIVI Opera p. 58. 142.

20) Observ. med. L. IV. c. 47.



assumpto, aeruginosa ac porracea eiecta bile, breui conualuerat. Cautemur ergo, ne temere initio morborum siue adsit febris, siue non adsit, obseruata aut inaequalitate, aut intermissione quadam pulsus, lipothymis, ad venenum aut *Δειον τ.* recurramus, magnum aliquid nos dicturos rati, si diuinitatem quandam in morbo hoc aut illo dixerimus esse <sup>21)</sup>, antequam in causam huius anomaliae inquisuerimus. Certe si attentius malignarum febrium descriptiones perlegas, multas inuenies, quae omnem malitiam, cuius characterem plurimi in singulari debilitate, viriumque praesertim vitalium prostratione ponunt, a colluue acri primarum viarum contraxerunt. Legamus sectiones aegrorum, quos malignis febribus extinctos fuisse scribunt, et quoties ventriculum, intestina, vesiculam felleam bile foetida, viridi, fusca, nigra repleta, hepar et reliqua imi ventris viscera inflammata, gangraenosa, reperta fuisse inueniemus? Non raro enim in febribus biliosis, si nimis acris est colluies, aut educi negligitur, viscerum inflammationes accedunt, quae siue congestiones ad caput excitando, siue irritando nervos non solum debilitatem augent, sed innumera alia spastica symptomata accersunt, quale exemplum habemus in Rothomagensi illa febre, a cl. MALOUIN <sup>22)</sup> descripta, quae magnam virium prostrationem, vehementem capitis dolorem, deliria, et breui tempore mortem induxerat, oborta ex acri colluue, uti cadauera ostendebant, viscerum inflammatione; quare etiam sapienter et utiliter collegium medicorum statuebat, in curatione ad euacuationem materiae acerrimae ex primis viis potius esse respiciendum, ac ad inflammationes illas et morbi symptomata, quippe haec nonnisi eius effectus essent. Quanta ergo circumspectione debilitatis febrilis curatio eget? et nomine damnanda praxis eorum, qui simul ac labuntur vires ad stimulantia, iuscula nutrientia, multa inania, ridicula, geminas, pulveres vitales, bezoardica, essentias dulces, terreorumque omnem apparatus confugiunt, nescientes, non alia dari cardiaca, quam quae debilitatis causam tollunt? Sane si debilitas ex sordibus intestinalibus oritur, praeter corrigentia, euacuantia, nulla erunt cardiaca; nocebunt calida spirituosa, nisi lenissima sint, excretiones iuuandi scopo adhibita, stimulum enim et calorem augebunt, morbidam materiam visceribus impingent. Vires magis destruet venaesectio, certissimum alias debilitatis remedium, quae a sanguinis copia producit. Venenorum instar nocebunt omnia nutrientia, nisi enim vomitu reiciantur, nouum grauamen ventriculo, nouum colluiei, febris, pabulum praebunt, augebunt ergo debilitatis causam <sup>23)</sup>. Neque minorem cautionem debilitas illa, quam febres superatae relinquunt, requirit, licet enim saepius ex defectu nutritionis, solidorum laxitate unice proueniat, et pleniori diaeta, roborantibus egregie tollatur, non raro tamen sordes in primis viis ex morbo retentae, vel nouae cruditates debili ventriculo cibis nimis obruto generatae, virium refectionem retardant, quae mox redeunt repurgatis et postea demum roboratis primis viis; sic

RIVE-

21) BALLONIUS Opera. T. II. pag. 271. cl. MARCARD diss. inaug. de malignitate febrili. Goett. 1770.

22) Mem. de l'Acad. R. des Sc. A. 1753.

Ludwig script. neur. min. T. IV.

23) Decies legi merentur, quae de cardiacorum usu monuerunt cl. TRALLÉS de remed. terreis, c. 12. TISSOT diss. de febr. bil. l. c. p. 128. sqq.

R r

RIVERIUS <sup>24)</sup> de viro narrat ex tertiana febre conualefciente, qui per plures adhuc dies admodum debilis remanebat, anxius, cum pulſu intermittente, poſt deiectiones vero praeter fordes inteſtinales lumbricum educentes, ſtatim priſtinum ſanitatſis vigorem recuperabat.

*Affectus ſoporofi conſenſuales.*

§. XXXIV.

Quod ſopores per conſenſum produci poſſint, nemo dubitabit, cui modo effectus illi venenorum, quae narcotica dicuntur, ex materia medica noti ſunt. Haec enim, dum adhuc in ventriculo ſunt, externos et internos ſenſus, omnes motus delere poſſe ſcimus. Horrendos et cito mortiferos narcoticorum effectus obſervauit WEPFERUS <sup>1)</sup>, licet nullam cerebri mutationem, nullam humorum alterationem cadaverum ſectio oſtenderat, et vomitorium mature datum omnia mala tulit. Opii maior doſis profundiffimum ſoporem excitat, ſed quod mirabile eſt, ſaepe ſequenti mane eius nondum diſſoluti pilula vomitu excutitur. Quatuor illos infantes, qui ſemen hyoſciami loco auellandarum comederant, in deliria et ſopores inciderant, exhibitio purgante, quod vomitum et aluum mouebat, omnes reſtituit SLOANE <sup>2)</sup>; et iuvenula, cui effoetus ſcortator daturae ſemen in cyathum immiſſum propinauerat, conuulſionibus et profundo ſopore exinde correpta, data ipecacuanhae doſi paulo poſt euigilabat, in ſe redux et mente conſtans <sup>3)</sup>. Imo apoplecticum inſultum ab eſu fungorum proſectum, eiecta per vomitum cauſa, illico ſanatum vidit el. LUPIN <sup>4)</sup>; ex ipſo vino, quod copioſius ingurgitauerant, nonnulli apoplectici ceciderunt, et ex his quosdam reddito per vomitum vino mox ſanatos vidit cel. BOERHAAVE <sup>5)</sup>; narrat ill. VAN SWIETEN <sup>6)</sup> de celeberrimo viro, qui in conſortio amicorum ſubito inceperat oculos hinc inde conuertere, paulo poſt obmutefcens et apoplecticus cadens, poſt quadrantem vero horae magna aſſumptorum ciborum et pituitae copia vomitu eiecta ſtatim ſenſus et motus recuperauerat, ſequente die omnino ſanus ridensque futuros heredes, qui nuncio miſſo aduolauerant quantocys. Alios ex ebrietate attonitos artificiali vomitu reſtituerunt FORESTUS <sup>7)</sup> et LEDELIUS <sup>8)</sup>. At vermes quoque inteſtinales non minores interdum exercent effectus; et ubi infantes profundiore ſopore corripiuntur, fere ſemper animalcula illa in ſuſpicionem ducenda ſunt; hinc nouennis illa puella, quae poſt morbillos in coma et linguae paralyſin inciderat, ſtatim ad ſe rediit, poſtquam lumbricus ore prodierat <sup>9)</sup>; et adoleſcentem verminofum per totum morbi decur-

24) Obſerv. Cent. III. obſ. 3. conf. el. KLOEKHOFF egregiam diſſertationem de morbis acutis recidiuis. in opuſc. med. p. 225. ſqq.

1) Hiſtor. cicut. aquat. p. 5. ſq.

2) Philoſoph. Tranſact. A. 1733. N. 429. pag. 99.

3) ABR. KAU BOERHAAVE impetum faciens dictum Hippocrat. p. 282. ſq.

4) Hiſt. morb. difficil. Ratisbon. 1768. pag. 17.

5) De morbis neruor. p. 563.

6) Comment. in aph. Boerhaave. T. III. p. 286.

7) Obſervat. lib. X. obſ. 34.

8) E. N. C.

9) HELWICH obſ. med. obſ. 94.



decursum; ob spasmodum miram varietatem memorabilem, uno et continuo sopore detentum fuisse, narrat PECHLIN<sup>10)</sup>. Cl. van den BOSCH<sup>11)</sup> refert exemplum iuuenis, ab initio febris acutae comate vigili prehensi, contra quod frustra medici venaesectionem, antiphlogistica, epispastica in usum vocarunt, quod statim tollebatur paucis propinatis acidi mineralis guttulis, quibus magna vermiculorum copia aluo fusiore expellebatur; ab ipsis ascaridibus profundos sopores obseruarunt HOFFMANN<sup>12)</sup> et van PHELSUM<sup>13)</sup>; imo veros lethargos et apoplexias verminosas viderunt cl. MARTEAU<sup>14)</sup> et van den BOSCH<sup>15)</sup>. A quacunque insuper alia intestinali colluue soporosi affectus excitari et foueri possunt; hinc Pythonis filius, qui confestim febricitare inceperat cum magna in somnum propensitate, et vocis defectione, statim sopore excitabatur, postquam glande ex felle et internis medicamentis sollicitata aluus eruperat<sup>16)</sup>. RIVERIUS<sup>17)</sup> puellam comate et conuulsionibus detentam, quibus frustra clysteres, frictiones, cucurbitulae, vesicatoria, sternutamenta opponebantur, vitriolo albo, quod copiosos vomitus excitauerat, statim sanauit; et RIEDLINUS<sup>18)</sup> aegrum febre et profundo sopore correptum, non prius ac post praescriptum vomitorium, quod duas porraceae et vitellinae bilis libras eduxerat, vigilem reddere potuit. Multos, qui febre petechiali laborabant, soporosos decumbere vidit cl. STRACK<sup>19)</sup>, qui excitabantur per lenia purgantia. Merito hinc cel. FREIND<sup>20)</sup> eos culpat, qui in febre variolosa ex sopore contraindicans purgantium depromunt, cum tamen, assentiente etiam ill. TISSOT<sup>21)</sup> ipsa haec somnolentia cacochyliae intestinalis signum, et toties per diarrhoeam spontaneam vel artificialem sublata sit; et memorabilis valde est, quam ille narrat, historia aegri variolis cohaerentibus laborantis, qui per sexdecim dies morbo maximo implicitus quasi lethargicus decubuerat, venaesectionibus, vesicatoriis minime leuabatur, purgantibus vero et a veterno et a febre liberabatur<sup>22)</sup>. Ex eadem colluue intestinali solennes sunt sopores modo grauiore modo leuiore in paroxysmis febrium intermittentium, in his enim febribus primarum viarum sordes fere nunquam absunt; vidit cel. BOERHAAVE<sup>23)</sup> infantem in paroxysmo febris tertianae sic obdormiscentem, ut omnes praedicerent mortem, sed cum audax praescripsisset purgans rhabarbarinum, simulac illud operationem suam absoluerat, omnis metus erat sublatus; et FRID. HOFFMANN<sup>24)</sup> de aegro narrat duplici tertiana febre laborante, cuius accessiones profundo semper incipiebant sopore, duodecim horis durante, nullis remediis hactenus adhibitis tollendo, propinato vero tribus ante instantem paroxysmum horis emetico, viscidae pituitae et vitellinae bilis enormis copia euacuabatur, adeo felici euentu, ut proximus paroxysmus longe mitior fuerit, & so-

R r 2

pore

10) Obs. phys. med. lib. II. obs. 29.  
11) Hist. Confit. epid. vermin. p. 316.  
12) Oper. T. III. p. 42.  
13) Hist. ascarid. patholog. p. 229.  
14) Journal de medecine. T. VII. pag. 34. seq.  
15) lib. cit. p. 79.  
16) HIPPOCRATES Epidem. Lib. VII. aegr. 132.

17) Obseruat. pag. 329.  
18) Observ. Cent. I. obs. 40.  
19) De morbo cum petech. p. 41.  
20) Comment. de febr. VII. p. m. 31.  
21) Epist. ad ill. ALB de HALLER de variolis etc. in Epist. med. pract. p. 136.  
22) De purgantibus hist. 2. p. m. 73.  
23) De morbis neruorum. p. 566.  
24) Opera. T. III. p. 215.

pore caruerit. Et quod perniciosas illas intermittentes febres attinet, quarum paroxysmis soporosi affectus, stupores, lethargi, parapoplexiae, apoplexiae, cito lethales iunguntur, nostris temporibus de sympathica dictorum capitis affectuum ex hypochondriis origine nemo facile dubitabit; quid enim aliud indicant, nausea, oris amaror, hypochondriorum dolor, vomitus, diarrhoeae biliosae leuantes, urina turbida, viride sanguinis emissi serum; occasiones, ex quibus illae plerumque ortum ducunt, ex neglecta primarum viarum euacuatione, vel abusu vehementiorum vomitoriorum, spirituosorum; curatio, quae minime alicui causae cerebrum per idiopathiam afficienti respondet, sed cauta primarum viarum euacuatione, et certissime cortice peruuiano iuste adhibito perficitur; ipsae cadauerum sectiones, quae viscera abdominis inflammata, stomachum et intestina biliosa materia repleta, vesiculam felleam bile crasi sua varie mutatam, cerebrum plerumque innoxium ostenderunt<sup>25)</sup>? At primariae quoque apoplexiae ex primarum viarum sordibus, viscerum hypochondriacorum functionibus perturbatis et spasticis inde illatis pathematibus; certe saepissime oriuntur; et forsitan frequentius quam ex inquilino cerebri vitio<sup>26)</sup>. HIPPOCRATES<sup>27)</sup> iam enigmata, quae bilem vehementer ducant, purgantia, vomitoria in curatione attoniti morbi suavit. Post adhibitam venaesectionem, emetica et purgantia dedit SYDENHAM<sup>28)</sup>, et BAGLIVI<sup>29)</sup> multos ab apoplexiae recidiis praemuniuit, propinando singulis mensibus vomitorium; et si optimos quosque Medicos consulas, nullum facile inuenies, qui vomitoriorum purgantiumue usum in quibusdam apoplexiis interdican; licet pauci ex sordibus intestinalibus illorum remediorum indicantia depromant, sed potius ad cerebri idiopathicam affectionem, ex serosa nimirum vel pituitosa colluue, respiciant. Non ad me pertinet, de usu vel noxa vomitoriorum in apoplexiis ab idiopathica causa productis differere, vel fusius demonstrare, quod incerta sit, quae a sanguinis vel feri in cerebro stasi vel extrauasionem sumitur emeticorum indicatio aut contraindicatio, exemplisque ex BONETI, MORGAGNI, LIEUTAUD, aduersariis ostendere, in multis, quos sanguinea apoplexia demortuos fuisse credidisses, pellucidum serum vel pituitam sine ulla sanguinis extrauasionem inter cerebri membranas, anfractus, cavitates, repertum fuisse, et contraria in oppositis, in aliis unum ventriculum ferro turgidum, alterum cruore repletum apparuisse: sed id monemus, vomitoria, purgantia, clysteres, tunc semper et egregie conuenire, ubi certa signa adfunt vitiosorum acrium in primis viis contentorum humorum, qui non minus ac venena, cruditates ex cibis, vermes, uti quoscunque capitis morbos, sic apoplecticos insultus excitare

25) SYDENHAM Opera T. I. pag. 191. MORTON Opera medica, T. II. p. 145. 146. Edit. Lugd. in 8vo. CLEGHORN observ. on the epidem. diseases in Minorca. pag. 192 — 199. GALEATIUS in Comment. Bonon. T. V. P. II. pag. 217. sq. TORTI therapeut. spec. p. 292 — 309. SENAC de febr. intermitt. natur. C. XIV. XVII. RICHARD in Journal de medecine. T. XIV.

p. 39. WERLHOF observ. de febr. p. 24 — 29. MEDICUS Samml. von Beobacht. 2. B. p. 396 — 397.

26) III. SCHROEDER et KOCH diss. de apoplexiae et praetordiorum vitior. origine. Goettingae 1767.

27) De morb. L. III. c. 3. 7.

28) Opera. T. I. pag. 507.

29) Opera. pag. 111.



citare valent<sup>30)</sup>; neque tunc illa ad eos tantum casus restringenda esse, in quibus sanguineae congestionis ad caput signa desunt, sed etiam in iis locum habere, quibus facies rubet, extrema calent, totus corporis habitus viget, cum ipsum illum calorem, turgorem, saepissime ex intestinali colluvie produci et foveri videamus; licet in hisce negligi nunquam oporteat, praesentem plethoram, congestiones, efficacissime et citissime ante et iuxta primarum viarum euacuationem tollere, minuere, ne, vel antequam veram causam removere licuerit, sponte, vel per auctam illam vasorum agitationem et congestiones, quas vomitoria producant, consensualis morbus idiopathicus fiat; non satis quidem inculcari potest, non quamvis nauscam, ventriculi labem, vomitus, ventriculum primario sordibus affectum significare, cum dicta symptomata saepissime iis, qui idiopathice cerebri vitiis laborant, contingant, ideoque etiam apoplexiæ idiopathicae comites esse possint, uti pluribus exemplis adeo egregie demonstravit ill. TISSOT<sup>31)</sup>. Leuamina ergo potissimum respicienda sunt, quae aegri ex vomitibus illis, et remediis, quae sordes intestinales euacuant, viscerum hypochondriacorum functiones corrigunt, sentiunt, ut morbi origo vel idiopathica vel sympathica innotescat, et multos tunc reperies, qui solis remediis, quae hypochondriis prospiciunt, non solum ex ipsis paroxysmis excitantur, sed etiam a morbi recidiuis tuti redduntur. Legimus de virgine quadam, quae ab aliquo tempore suppressione menstruum et variis hypochondriorum molestiis laborans, subito apoplexia prehendebatur, sat abundanti vero, post trium clysterum applicationem, deiectione facta, statim sensus recuperabat, et sumto dein purgante post quartum diem sanissima erat<sup>32)</sup>. Maxime memorabilis quoque est historia, quam cl. NICOLAI<sup>33)</sup> refert, de sene quodam alias vegeto, cholericò, qui in publicis constitutus negotiis, plenaria corripiebatur fideratione; misso sanguine, data fuit largior tartari emetici dosi, unde insignem pituitae crassae, et porraceae bilis copiam euomit, atque hinc sensim sensimque sui compos factus, post unum alterumque diem suam recuperavit sanitatem; redeuntibus vero post aliquot menses similis mali prodromis, una cum exundantis primarum viarum saburrae indiciis, inprimis emetico iterum restitutus est. Multum etiam morbi origo illustrabitur, ubi ad occasiones eiusdem attenderis, at etiam in his caue ne fallaris. Multae enim ex causis illis, quas apoplexiæ frequentissimam occasionem praeberè scimus, utrique apoplexiæ speciei producendo pares sunt. Plethoram a leuissimis interdum causis commotam, vasorum cerebri rupturam, saepissime apoplexiam produxisse scimus, ita ut fortior nixus, conatus in exoneranda aluo, sternutatio fortior, nixus parturientium, inclinatio capitis, decubitus supinus post largiorem coenam, exaestuatio siue per motus corporis, siue per diaetam, non raro sanissimos homines subita morte extinguere suffecerint, quam ex idiopathica apoplexia factam fuisse, cadauerum se-

Rr 3

cio-

30) VAN SWIETEN. Comment. in aphor. Boerh. T. III. p. 256.

31) Epist. ad ill. de HALLER de apoplexia etc. in Epist. med. pract. p. 159. 160. Etiam hepatis abscessus in apoplecticorum cadaueribus aequè ac in illis qui capite vul-

nerati fuere, sunt obseruati. BERTRANDI Memoires de l'Academie R. de Chirurgie. Vol. III. p. 485.

32) Commerc. Nor. A. 1739. p. 369.

33) Diff. de direct. vasor. in HALLERI coll. diff. anat. T. II. p. 549.

atio ostendit <sup>34)</sup>. At ne credas morbum in hominibus dictae plethoricae temperiei semper idiopathicum esse, iidem enim homines non raro diathesin ad bilis exsuperantiam produnt, facillime ex perturbatione animi, refrigerio, vitiis diaetae, sordes in primis viis colligunt, frequentissime stasibus in visceribus abdominis afficiuntur, quae sensim sensimque, uti multos alios sympathicos ex hoc fonte affectus, sic etiam apoplexias stomachicas excitare et fouere possunt, uti vidimus in illo sene vegeto, bilioso. Idem valet de obesitas. Quantum grauiiores animi affectus in producendis apoplexiis possint, quotidiana docent exempla, et cum ipsum cor mariti cuiusdam ruptum inventum fuerit, ob vim sanguinis, cui iter per pulmones praecludebat grauis ex uxore demortua moeror <sup>35)</sup>, cur non sub iisdem conditionibus quoddam cerebri vasculum disrupti posset? sane haec fuisse videtur causa apoplexiae mariti illius, qua ob vehemens ex felici uxoris puerperio gaudium moriebatur <sup>36)</sup>. At iisdem animi motibus etiam consensuales apoplexias produci posse, facile videbit, cui notum est, quantam vim habeant in praecordia, bilis secretionem, excretionem, crasin, perturbandi, spasmos abdominales excitandi. Frequenter in primis animi affectus calculis felleis ansam praebere scimus, hos vero tensione ac irritatione sua varias spasmodicas affectiones saepe excitare notum est; nonne et ipsam apoplexiam producere valebunt? Sane si apoplecticorum et sopororum cadauerum sectiones attentius perlegas, in multis repertos illos fuisse inuenies. Sic apud SCHENCKIUM <sup>37)</sup> legimus in illustrissimi Principis lethargo extincti cadauere choledochum ductum ventriculi instar inflatum et calculis undiquaque refertum inuentum fuisse. In podagrico comite apoplectico calculos felleos tres drachmas coniunctim pendentes, et in alio L. calculos inuenerunt HELD et NEBEL <sup>38)</sup>; in aliis decem repererunt BORELLUS <sup>39)</sup> et WEITBRECHT <sup>40)</sup>; quatuor et in duobus aliis unum ill. MORGAGNUS <sup>41)</sup>, duos BAGLIVI <sup>42)</sup> et HOECHSTETTER <sup>43)</sup>; licet in omnibus hisce calculos illos veram et unicam morbi causam fuisse, asseuerare nollem; interim ex simili irritamento etiam in iis, qui vesicae et renum calculis laborant, soporosos affectus interdum oriri observationes docent, nisi forsitan hos ex retento et ad cerebrum delato acri sero potius, ac ex calculorum irritatione et excitatis spasmis deducere velis. Sic vertiginem, visus in uno oculo orbitatem, palpitationes cordis et omnes instantis apoplexiae prodromos, ipsam sensus in altero latere iacturam, nephritidis calculosae paroxysmos comitari vidit PECHLINUS <sup>44)</sup>, quae vero sponte cessabant excluso ex corpore calculo, toties recrudescebant, quoties denuo alius ex renibus per ureteres exitum moliebatur. TULPIUS <sup>45)</sup> ex calculo renum ureteris principium

34) MORGAGNI de sed. et caus. morb. Epist. III. 12. 28. LX. 13.

35) TISSOT Epist. de apoplexia. I. c. p. 143.

36) HANNES Brief an H. Baldinger von dem Friesel. p. 29. plura exempla inuenies in ill. ZIMMERMANN von der Erfahrung. II. Th. Cap. 11.

37) Observat. med. p. 422.

38) E. N. C. Centur. III. IV. obs. 169.

39) Observat. Cent. III. obs. 22.

40) Commerce, Nor. A. 1743. p. 65.

41) De sed. et caus. morb. Epist. IV. n. 13. V. n. 6. 19.

42) Opera p. 434.

43) Observ. Dec. X. cas. 6. cf. HOFFMANN Med. rat. syst. T. IV. P. II. S. I. c. 7. §. 10.

44) Observat. phys. med. obs. 15.

45) LIEUTAUD Hist. anatom. med. P. I. obs. 1158. cf. ibid. obs. 429. 1174. 1243.



pium occludente affectum soporofum conuulsivis motibus mixtum ortum observavit; etiam WELSCH<sup>45)</sup> sopores profundos nephritidi calculosae accedere vidit. Praeterea fluxus menstrui et haemorrhoidalis suppressio non inter rarissimas apoplexiarum occasiones pertinent, quinimo ipsas catalepsis ex difficili menstruorum fluxu et subita eorundum suppressione observaverint cl. PEFFAULT<sup>47)</sup> et MICHEL<sup>48)</sup>, de quibus vero verisimile est, quod ex spasmodicis abdominalibus stasi sanguinis circa sensibilia huius cavitationis viscera productis originem consensualem duxerint, soluebantur enim apparente menstruo fluxu, licet omnino quoque ex eadem causa idiopathicos sopores produci posse, non negemus. Hystericae quoque feminae interdum soporibus et apoplexiis corripiuntur<sup>49)</sup>; an forte ex spasmodicis vasorum constrictionibus, quae nimiam plenitudinem vasorum cerebri, sanguinis tandem extravasationes efficiunt? licet contingere hoc possit, non semper tamen idiopathicas hystericas apoplexias esse, satis patet ex sectionibus cadaverum talium aegrorum, quibus saepius cerebrum fanissimum inventum fuit<sup>50)</sup>; an ergo eadem huius apoplexiae speciei origo ac reliquarum illius morbi affectionum, nimirum consensualis ex abdomine? sane si tolli potest, non tollitur nisi remediis, quibus illas aggredimur, epithematibus aromaticis, medicamentis antihysterics, roborantibus<sup>51)</sup>; nonne etiam opium conveniret, quod alias quidem somnum promouet, sopores, apoplexias producit, sed in hoc casu, dum causas soporis tollit, spasmos nimirum, aegros forte excitaret? exempla utilis effectus non desunt. Sic RIVERIUS<sup>52)</sup> in virgine, quae quotidie fere paroxysmis hystericis vexabatur, sopore semper stipatis, soporem cum ceteris symptomatibus laudano ante paroxysmum propinato sustulit. Vidit ill. DE HAEN<sup>53)</sup> puerum epilepticum, cui vigili paroxysmi nunquam fiebant, accedebant vero, dum stertorosus somnus eum capiebat, videbantur igitur nervi somni tempore aptiores ad conuulsiones, quam vigiliarum et sensibilitatem hanc nimiam opio sopire primaria erat indicatio, sed incertitudo, annon opium soporem illum augere posset, minima dosi experimentum incipere suadebat, haec quidem somnum non augebat, et tamen boni praestabat quicquam, augebatur dosis prudenter, et ecce, omnis paroxysmus auertruncabatur, opium soporem in somnum naturalem mutabat, puerum agilem, alacrem, sanum reddebat. Utiliter saepe ill. TISSOT<sup>54)</sup> adhibuit opium, quando in debili aegro spasmodicus somnus variolarum eruptionem praecedebat, et intra horam fecit, quod tardius vesicatoria. Confirmatur ergo dictum HIPPOCRATIS<sup>55)</sup>, sopores interdum aliquid conuulsivi habere, et antispasmodicis tunc tolli, etiam iis, quae alias somnum produciunt. Sed e diuerticulo ad viam. Sunt etiam podagrici, arthritici, qui frequenter apoplexiis corripiuntur; an semper hoc contingit ob materiam illorum morborum ex articulis ad cerebrum repulsa, nonne eadem nervorum mala excitare poterit, si ad ventriculum vel

46) Observ. med. obs. 64.

47) Recueil period. T. V. p. 41 sqq.

48) Ibid. T. XI. p. 119 seqq.

49) SYDENHAM Opera, T. I. p. 257.

50) TISSOT Epist. de apoplexia. l. c. p.

169. 170.

51) TISSOT ibid.

52) Observ. Cent. II. obs. 26.

53) Ratio medendi. T. V. p. 126.

54) Epist. de variol. apopl. etc. l. c. p.

115.

55) Coac. 186.

vel intestina defertur? certe si ex aliis sordibus intestinalibus apoplexias oriri posse certum est, similis vis huic colluiei deneganda non erit, cum adeo acris interdum fit, ut vehementes cardialgias, colicas, animi deliquia, convulsiones excitet, quae non sistuntur, nisi vomitu deiectionibusue expulsa aut ad artus iterum translata acrimonia; recte hinc distinxit cl. MUSGRAVE<sup>56)</sup> inter illam apoplexiam arthriticam, quae a cerebro oppresso fit, venaesectionibus, reuellentibus, vesicatoriis, epispasticis tollendam; et illam, cuius materia committens in ventriculo et intestinis sita est, caput et genus nervosum non nisi sympathice afficit, emeticis, purgantibus, subiunctis remediis arthritidem expellentibus, sanandam. Et cum viscerum hypochondriacorum obstructions, bilis, reliquorum intestinalium humorum vitiosa conditio, adeo multum producendis apoplexiis faueant, eo magis etiam dicti aegri ad illas proclives reddentur. Arthritis enim non facile nisi per hypochondriaca atria occurrit<sup>57)</sup>, et fere in omnibus articulari morbo affectis laesae digestionis signa inuenies. Nonne in plurimis praesertim tempore paroxysmorum prostratus est appetitus, vel enormis et interdum caninae nomen mereatur<sup>58)</sup>? Nonne alui egestio inordinata, nunc tardior, nunc laxior et frequentior? Nonne frequentes ipsis sunt vomitus pituitae, bilis flavae, aeruginosae, spermatis ranarum interdum similis<sup>59)</sup>, humoris pellucidi aquei fortissimo minerali acido interdum non cedentis<sup>60)</sup>. Nonne frequentior arthritis illis est, qui aerumnosi viuunt, ac siccam aluum habent<sup>61)</sup>, quibus in pueritia et iuuentute sanguis ex naribus fluere solebat, et quibus haemorrhoides fiunt<sup>62)</sup>? Sub his vero conditionibus viscera hypochondriaca nunquam vigent. Nonne frequentissime arthritici dolores ex morbis biliosis male curatis, ex diarrhoeis, dysenteris, adstringentibus tractatis oriuntur<sup>63)</sup>; et euacuatis primarum viarum sordibus, per redeuntem dysenteriam vel alias eliquationes, quae ad infernos locos repunt<sup>64)</sup>, saepissime licet etiam per menses et annos saeuierint<sup>65)</sup>, soluantur? Estne alia specificis illis antipodagricis vis, quam ea, qua sordes sensim educunt, viscera aperiunt, digestionis organa roborant<sup>66)</sup>? Patet ergo ex his et ex antea dictis, causarum disponentium apoplexiae multas sympathicam huic morbo originem praebere posse, eadem vero in aliis idiopathicam.

Qualis

56) De Arthritide anomala. Genevae. 1757. p. 129 sqq.

57) BRENDÉL Diff. de valetud. ex hypoch. p. 6. Conf. ill. SCHROEDER et DUGEND Diff. de arthritide vaga. Goettingae. 1768.

58) DE HAHN Hist. podagrae Emin. Card. Com. a Sinzendorf.

59) A. N. C. Vol. III. obs. 100.

60) Medical Observations and Inquir. Vol. I. p. 41.

61) HIPPOCRATES Praedict. L. II. c. 7. CHARTER. T. VIII. p. 815.

62) Idem. ibid. l. c. 13.

63) Exempla inuenies, A. N. C. Vol. I.

obs. 27. Journal de Medecine T. XII. Juin. 1760. ZIMMERMANN von der Ruhr unter dem Volke. VII. Cap. STRACK de morbo cum petech. p. 155 sqq.

64) HIPPOCRATES Praedict. l. c. CELSUS L. II. C. 8.

65) Memorabilia exempla referunt RIVIERUS obs. Cent. III. obs. 22. BAGLIVI Opera p. 117. MORGAGNUS de sed. et caus. morb. Epist. LVII. art. 6.

66) WERLHOF cautiones medicae de limitandis laudibus et vituperiis morborum et remediorum. p. 27 seqq. CLEPHANE an inquiry into the origin of the Gout Powder in Medic. obs. and Inq. V. I. p. 126 sqq.



Qualis vero est modus, quo sympathici soporosi affectus excitantur? an colluvies intestinales sanguinem viscidum reddunt, ut facilius in vasis cerebri haereat <sup>67)</sup>, an eadem et ceterae causae, quas allegauimus, spasmi excitatis congestionem noxiam ad caput producant? forte in quibusdam, tamen non in omnibus; supra enim diximus, in iis, qui ob ingesta venena apoplectici demortui sint, sanissimum interdum cerebrum fuisse inuentum; neque hysteriarum apoplecticarum cerebra vitia ostendisse; neque illorum qui perniciosi febribus intermittentibus soporosis enecati fuerunt; neque in illis ex crapula subita apoplexia correptis, post mortem ullum in cerebro vitium inuenit BAUZZMANN <sup>68)</sup>. Num ergo potius a nimio liquoris neruei per irritamenta illa abdominalia aliorum deriuato flumine; vel ex praepedito ex eadem causa turbatoque saltem sanguinis versus cerebrum adfluxu <sup>69)</sup>; vel ex communicato neruorum consensu minimis medullae cerebri fistulis spasmis, qui spirituum per illos motum difficiliorem reddit, deriuandi sunt <sup>70)</sup>? Nimis manca adhuc est neruorum morborum theoria, quam ut cum aliqua certitudine de ultima ipsorum causa iudicare possemus.

### *Paralyses consensuales.*

#### §. XXXV.

Pauca de his dixisse sufficiet, causae enim, quae consensuales paralyses producant, iis prorsus sunt similes, ex quibus apoplexiae sympathicae oriuntur. Hinc eadem venena, quae alios subita apoplexia exstinxerunt, in aliis paralyses, easque modo uniuersales, modo particulares reliquerunt. Memorabiles praesertim sunt illae paralyses, quas saturnina venena, praemissis et comitantibus horrendis colicis, excitant, difficillime curandae, nisi noxia materia inuoluta, crispae contractique viscerum abdominalium nerui relaxati, nudi tecti defensionique reddantur, causa ipsarum ideoque citissime tollatur <sup>1)</sup>. Neque minorem ac in apoplexia producenda, paralyses excitandi efficaciam vermes intestinales habent. FRIBE <sup>2)</sup> de puero narrat, qui hactenus bona valetudine usus erat, nunc febre et ventris tumore prehendebatur, quae sequebatur brachiorum et pedum contractura, ita ut neque stare, neque ambulare posset, expulsis vero ultra quadraginta verminibus breui tempore et stare et ambulare incipiebat. LAEGERSCHMIDT <sup>3)</sup> de puero narrat, qui cum sociis ludens subito lateris sinistri resolutione tangebatur, ascaridum vero copia per aluum expurgata mox restituebatur.

Sumi-

67) LAZERME de morbis capitis. pag. 47. 72.

68) E. N. C. A. IX. X. obs. 236. 237.

69) Sic apoplexias verminosas explicat cl. van PHELSUM hist. ascarid. path. p. 229.

70) conf. MEDICUS Brief an H. ZIMMERMANN über einige Erfahr. a. der Arzneyw. p. 17. sqq.

1) DE HAEN Diss. de colica pictonum. Rat. Med. T. III. C. 2. T. X. C. 1. 2. TISSOT observ. de colica saturn. in Epist. med. pract. p. 220. sqq. HILLARY observ. on the epid. diseases in Barbados.

2) E. N. C. Dec. I. A. III. obs. 63.

3) E. N. C. Dec. III. A. III. obs. 104.

Similia exempla narrant PAULLINI <sup>4)</sup>, cl. VAN DEN BOSCH <sup>5)</sup>, VAN PHELSUM <sup>6)</sup>. Neque raro alia acris intestinalis colluies retenta, paralyfes producit. Vidit FERNELIUS <sup>7)</sup> virum, qui ex febre et paralyfi peribat, cum biliofus familiaris ipsi vomitus fisteretur. FABRICIUS <sup>8)</sup> dysenteriam epidemicam obseruauit, qua multi aegrotorum, qui ab initio euacuantia incurii omiserunt, vel adstringentibus fluxum cohibuerunt, paralyfi brachii in uno et pedis in opposito latere corripiebantur; similia mala ex eadem causa obseruauit ill. ZIMMERMANN <sup>9)</sup>. Hinc etiam exempla leguntur paralyfium, quae nullis aliis remediis perfecte soluebantur, quam talibus quae primas vias sordibus expurgarunt visceraque chylopoetica obstructionibus liberarunt. Vidit PRUGGMAYER <sup>10)</sup> feminam ex febre tertiana paralyticam, quae educta per superiora et inferiora magna humorum bilioforum copia intra tres hebdomadas fuit sanata, ita ut, cum antea neque calorem, neque frigus sentiret, neque minimus motus superesset, nunc absque ullo impedimento ambulare posset. De caupone narrat ELLERUS <sup>11)</sup>, qui ex dissoluto vitae genere in uniuersalem paralyfin inciderat, oborta vero ex diaetae errore diarrhoea copiosa salutare consilio aptis remediis per decem dies sustentata, motus in artubus sensim redibant, et pristinam aeger recuperabat sanitatem; alium per tres iam annos quotidianis vomitibus amari biliosi interdum nigricantis humoris, et paralyfi extremitatum inferiorum vexatum, nullis aliis remediis quam salibus medicis, laxantibus, stomachicis, intra sex hebdomadas integre restituit <sup>12)</sup>. Etiam hypochondriacis et hystericeis interdum paralyfes contingunt <sup>13)</sup>; uti ADOLPHI <sup>14)</sup> vidit in femina melancholica hysterica, quae posteaquam aliquoties ira commota esset, de nocte derepente manuum pedumque paralyfi corripiebatur, sub qua pristina incommoda remittebant, uti etiam alios spasmos huius vel illius partis accedente alius partis spasmis solui videmus. Praefertim vero paralyfes accedent, ubi hypochondriacum et hystericum malum iam inueteratum, frequentia spasmodorum viscera abdominalia obstrueta, varie vitata sunt, quas putauit HIPPOCRATES <sup>15)</sup>, atrabiliarium esse dicens, si lingua subito imbecillis fiat, aut pars quaedam corporis fiderata; ex quo fonte etiam oriri videntur mixtae illae ex paralyfi et spasmo brachii crurisque alterutrius affectiones, quae sympathicae phrenitidi, aliis neruosis febribus propinquante morte superueniunt <sup>16)</sup>. Consensuales tandem sunt illae paralyfes, quae ex subita mensium suppressione <sup>17)</sup>, vehementia spasmodorum abdominalium in parturientibus <sup>18)</sup> ortae sunt; et notissimi illi erurum stupores e latere renis inflammati, calculis, tumoribus, ulce-

4) E. N. C. Dec. I. A. VI. VII. obs. 236. Dec. II. A. V. App. p. 15.

5) Hist. constit. epid. vermin. p. 42. 149.

6) Hist. ascar. path. p. 218.

7) Patholog. L. IV.

8) Diff. de paralyfi dysentericis famil. in DE HALLER Coll. Diff. Pathol. Vol. I. p. 97. sqq.

9) Von der Ruhr unter dem Volke. pag. 142. sqq.

10) E. N. C. Dec. III. A. I. obs. I.

11) De cognosc. et curand morb. praefertim acut. p. 303.

12) Medicinische und chirurgische Anmerkungen. p. 3. sq.

13) SYDENHAM Opera. T. I. p. 257.

14) A. N. C. Vol. I. obs. 238.

15) Aphor. 40. S. VII. conf. BRENDÉE progr. de paresi atrabil. Hippocr. l. c.

16) BRENDÉE Diff. de Phrenitide. p. 25.

17) E. N. C. Dec. II. A. II. obs. 116.

18) Nov. A. N. C. Vol. III. obs. 59.



ulceribus affecti. Ex quibus patet, etiam in paralytibus semper ad statum viscerum abdominalium esse respiciendum, et frequentem earum ex his partibus esse originem, siue nunc ob communicationem inter nervum intercostalem et illos extremitatum contingant<sup>19)</sup>, siue in aliis sensorium commune vel medulla spinalis primum afficiatur<sup>20)</sup>.

### *Deliria consensualia.*

#### §. XXXVI.

Nullius fere morbi adeo frequens ex praecordiis est origo, ac deliriorum, et quotidiana experientia confirmatur effatum ill. TISSOT<sup>1)</sup>, inter viginti deliria, tum acuta tum chronica, octodecim ex hypochondriis esse; ita ut deridenda eorum praxis sit, quibus dum ad deliros vocantur aegros, capiti mederi unicum studium est, sanguinis missioni, deriuantibus, temperantibus, irritantibus, multis ineptis inalignitati cuidam oppositis remediis, unice inquiescunt. Quoties enim mentem turbari videmus, licet ne minimum idiopathicum cerebri vitium adsit, et in solo ventriculo causa contineatur? Videatis homines, qui inscii venena quaedam ingesserunt, feroces, stultos reddi, et post aliquot vomitus paucis momentis rationem et pristinam mentis placiditatem recuperare. Caussidicum illum, qui binas seminis hyosciami drachmas loco anethi, quod contra colicam praescriptum ipsi erat, deuorauerat, confestim insanum, dementem et stolidum reddi, dato vero vomitorio intra semihorium conualescere vidit HELMONT<sup>2)</sup>. Qui eiusdem plantae decoctum sumebant, et post tres horas in delirium incidebant, omnes statim liberabantur, quotquot assumpta ipecacuanha vomebant<sup>3)</sup>. Feminam vidit LORRY hysterica, quae cum duo pilularum de cynoglossio sumisset grana, vehementi delirio corripiebatur, quod statim cessabat eiecta per vomitum pilula argenti lamina adhuc inuoluta<sup>4)</sup>; et quae solani baccas deuorauerat puella, in vehementem inde furorem incidens, illico quieta et sanissima reddebatur, quamprimum emeticus tartarus ventriculum veneno expurgauerat<sup>5)</sup>. Euoluatis expertissimorum Medicorum scripta, et innumera deliriorum acutorum et chronicorum exempla inuenietis, a nulla alia causa, quam acris primarum viarum sordibus productorum.

Optime iam GALENUS<sup>6)</sup> sciuit deliria, quae in febrium vigore accedant, non propria cerebri affectione, sed per consensum fieri; et BAGLIVI<sup>7)</sup> deliros anxios aegros saepissime ex unica pulueris cornachini dosi, vel ex spontanea diarrhoea sequenti die mentem sanam recuperare vidit. Saepe sordes ventriculi deliria in morbis acutis

§§ 2

produ-

19) CAMPER in not. ad MONRO anat. nerv. contr. p. 158. 159. Eiusd. Demonstr. anatom. pag. 8. sq. DE HAEN Rat. med. T. III. C. 2.

20) WHITT observ. on nervous disorders p. 59. 60.

1) Diff. de febr. bil. Lauf. in opusc. T. I. pag. 77.

2) Ius duumviratus §. 22.

3) STEDMANN Epist. ad PRINGLE in Philos. Transact. A. 1752.

4) Recueil period. T. IV. p. 75.

5) Journal de Medecine T. XI. p. 119.

6) De loc. affect. CHARTER. T. VII.

p. 438.

7) Opera. p. 102.

producunt, dicit immortalis BOERHAAVE<sup>8)</sup>, quaecunque remedia hic applicentur, non leuabitur morbus, nisi agatur in has sordes; si mittis sanguinem, ut debilitentur vires, aegri pro momento quidem leuantur, sed recrefcentibus viribus, mox eadem redeunt mala; sed si ingenti copia aquae simplicis sordes ita diluantur, ut incipiant abluui de hoc loco, vel si aquis non cedant, emetico expurgentur, omnia pacata sunt, febris quidem manet, sed absunt haec terribilia symptomata. Gratus recordatur haec Praeceptoris monita ill. VAN SWIETEN, et plurimos deliros unico vomitorio, excussa saburra respiscere se vidisse affirmat. Hinc adeo frequentia sunt deliria in febribus, quarum praecipua causa acris primarum viarum colluuius est, nimirum in biliosis, adeo interdum vehementia et continua, ut phrenitica dici possint, sed facile tollenda; modo acris colluuius mature expurgetur; neque ulla fere febrilis morbi species est, cui non deliria ex hac causa se adiungere possunt. De aegro narrat cl. BARKER<sup>9)</sup> graui angina laborante, et simul delirante, nil venaesectio, nihil nitrosa, vesicatoria, iuuabant ad sedanda deliria, sed postquam infusum laxans quatuor sedes excitauerat et excrementorum biliosorum copiam eduxerat, aeger in somnum incidebat quietum, et intra tres dies restituebatur. Peripneumonias biliosas epidemicas obseruarunt ill. TISSOT<sup>10)</sup> et MARTEAU<sup>11)</sup>, quibus phrenitides non raro accedebant, praesertim si venaesectiones adhibebantur, emeticis, enematis, acidis tollebantur. Variolas epidemicas obseruauit cl. HUXHAM<sup>12)</sup> cum biliosa putrida febre stipatas, et valde phreniticas a retenta in visceribus biliosa colluui, commodissime vero lenibus purgantibus eiecta copiosa corrupta bile fugabantur deliria. Narrat FREIND<sup>13)</sup> historiam variolosi, qui in febre secundaria saeva phrenesi corripiebatur, sanguinis copiosa detractio, cortice peruuiano frustra adhibitis, purgatione rediit, quem omnes, qui intererant, morti adiudicauerant. Petechiales biliosas febres describunt cl. VALGARENGHI<sup>14)</sup> et STRACK<sup>15)</sup>, et multos his laborantes aegros mente alienari viderunt; qui solis purgantibus perfecte restituebantur. Continua deliria febri biliosae Lausannensi, praesertim si incongruis remediis biliosas sordes in corpus includentibus tractabatur, saepissime iungebantur, morbi vero causae medendo, nimirum corruptam acrem putridam bilem educendo, delirio simul medebatur<sup>16)</sup>. Non ergo statim cerebrum inflammatum accusandum est, si deliria in febribus urgent; vomitoria enim et purgantia aliquando ipsam phrenitidem cito tollunt<sup>17)</sup>. Non raro etiam vermes intestinales in febrium decursu deliria producunt; vocabatur cl. ROHN<sup>18)</sup> ad febricitantem et phreniticum, repetitae venaesectiones, maiores temperantium doses, pediluua, adeo non vehementia deliriorum minuebant; ut potius aegrotus infe-

8) Praelect. de morbis neruorum. pag. 360. 361.

9) Essais sur la conformité de la médecine. p. 353.

10) Diff. de febr. bil. Laus. I. c. p. 103.

11) Recueil period. T. VI. p. 463.

12) Opera T. I. p. 260.

13) De purgantibus. p. m. 115.

14) Medicina Rationalis. T. I. p. 165. 168.

15) De morbo cum petech. p. 53.

16) Diff. de febr. bil. I. c. p. 49. conf. PRINGLE observ. on the diseases of the army. ed. Vtae. p. 301. sqq. et BISSET Medical Essays and obs. p. 47. cas. 1.

17) LAZERME de morb. cap. p. 123.

18) Diff. Praef. Magnif. VOGEL, de vomitor. usu ad eiiciend. verm. p. 13.



infestis telis adstantes incurfare pergeret, vomitorio vero exhibito, et expulsis sex lumbricis, e vestigio deliria cessabant. Imo infantem quendam ex lumbricis valde delirare vidit WOLFF<sup>19)</sup>. At grauiore interdum deliriorum febrilium sunt causae, viscerum abdominalium puto inflammationes, et superuacaneum prorsus esset, exemplis confirmare, quoties inflammationes ventriculi, intestinorum, hepatis, vesicae, uteri, cum deliriis nunc leuioribus nunc vehementioribus iunctae sint. Etiam paraphrenitidem vulgo inflammationi diaphragmatis tribui notum est; licet minus recte; ex obseruationibus quippe per plurimis constat, septi transuersi inflammationes saepius sine ulla mentis alienatione, vel in viuis pathognomonicis suis signis, vel post mortem inuentas fuisse; et deliria quae paraphrenitidis caracteribus in omnibus respondent, saepe sine omni in diaphragmate vitio obseruata fuisse<sup>20)</sup>; ita ut verosimile sit, ex iisdem causis, quae phrenitidem producant, gradu tantum ab hac diuersam paraphrenitidem oriri; ergo etiam paraphrenitis saepissime consensualis affectio erit, uti phrenitis. Non ignoro quidem receptam sententiam, phrenitidem ab inflammatione cerebri ortum ducere; sed ex supra enarratis exemplis iam patet, interdum illam unice ex acerbis intestinalibus sordibus dependere, et vomitorio vel purgante unico tolli; attendamus insuper ad causas occasionales, quae producendae phrenitidi fauent, et tales eas esse videbimus, ut non minus et longe saepius vitia in praecordiis ac in cerebro producant, quales sunt protractae nimis vigiliae, animi affectus, fluxuum naturalium et utilium suppressiones, febrium biliosarum peruersae curationes; consideremus potissimum symptomata quae hunc morbum comitantur, adeo egregie secundum Hippocraticam et propriam experientiam a cl. BRENDelio<sup>21)</sup> depictum, et nonne ea omnia saepissime ex variis hypochondriorum vitiis originem ducunt? nonne animi abiectio et incuria, tremores artuum et linguae, pauores, dolores occipitis, bregmatis, lumborum, manuum, surarum, crebra suspiria, catarrhorum simulacra, subitae illae mutationes caloris in frigus, sudorum in siccitates, ruboris in pallorem, ceterique phrenitidis praecursores frequentissime in hypochondriacis et hysteriis non ex cerebri affectione, sed ex abdominalibus spasmodis oriuntur? Quid dolores illi, tumores, aestus, pulsationes, introuersiones praecordiorum, vomitus illi biliosi, aeruginosi, nigri, cardialgiae, singultus, urina alba, aquosa, alui excrementa liquida, viridia, spumosa, ramentosa, rubicunda, atrabiliaria, foetida, cum tenesmo impetuque elisa, aliud indicant, quam viscera hypochondriaca vel ab acri contenta materia vel grauiori obstructione, inflammatione, spasmice affecta? Certe haec confirmantur ipsa curatione, quae felicissime non raro mature adhibitis vomitoriis, clysmatibus, fomentis, cucurbitulis, vesicatoriis praecordiis applicatis, et per ipsam naturam diarrhoeis spontaneis, fluxu haemorrhoidum peragitur; quae certe remedia tanta utilitate destituerentur, si per idiopathiam cerebrum laboraret. Non raro quidem tum in vivis tum

Ss 3

in

19) Comm. Nor. A. 1741. p. 315.

med. T. IX. p. 66. WENDT diff. de pleur. et peripneum. Sect. I. II. V. X.

20) MORGAGNUS de sed. et caus. morb. Epist. VII. n. 14. Ep. X. n. 13. Epist. XXII. n. 36. Epist. XXXVI. n. 4. DE HAEN Rat.

21) Diff. de phrenitide. cf. ill. SCHROEDER et FEIN Diff. de indole ac sede Phrenit. et Paraphren. Goetting. 1765.

in mortuis inflammati cerebri signa inueniuntur, sed attentius perlegamus horum aegrorum historias, et saepe ne minimam delirii mentionem inueniemus, saltem non phrenitici; neque enim deliria inter symptomata morbi, quem sub sphacelismi cerebri nomine, qui vera cerebri inflammatio fuisse videtur. describit, enarrauit HIPPOCRATES<sup>22)</sup>; neque phrenitici erant aegri illi grauibz neruosis febribz laborantes; in quorum cerebro atque cerebello magnos abscessus post mortem inuenerunt cl. PRINGLE<sup>23)</sup> et HOME<sup>24)</sup>, sed stupidi potius, sensuumque hebetudine detenti, interrogati interim prudenter respondentes; et per totum fere tempus, quo inflammatione cerebri laborabat cl. HOME<sup>25)</sup> mentis compos erat, ita ut ad omnia symptomata, quae accurate adeo ipse descriperat, attendere posset; ex quibus, ut alia exempla praetermittam, patet inflammationem cerebri et phrenitidem non semper sibi socias esse. Nonne etiam vasorum cerebri turgor ipsius phrenitidis effectus esse potest, frequenter quippe huic peripneumonia symptomata accedit, at nullum fere peripneumonicum secuit cl. MORGAGNUS<sup>26)</sup>, quin cerebrum sanguine turgidum inuenerit? Sed insuper phreniticorum cadauera aperta non semper cerebrum inflammatum monstrarunt, qualia exempla plura apud BONETUM<sup>27)</sup> et MORGAGNUM<sup>28)</sup> inueniuntur; in multis vero vitia imi ventris manifeste apparuerunt. HARTMANN<sup>29)</sup> sectionem phrenitici refert, et nullam prorsus meningum vel cerebri inflammationem, sed hepaticam, lienem, pancreas, mesenterium obstructa, corrupta, vesiculam felleam bile multa, viscosa, crassa repletam inuenta fuisse dicit. Neque praeter polyposas sinuum meningis concretiones ullam cerebri phlogosin in phrenitici cadauere inuenit BLASIUS<sup>30)</sup>, inflammationem vero imae hepatis superficiei ad diaphragma extensam. Nullum ad sensum vitium in cerebro inuenit WEPFER<sup>31)</sup> in puero ex graui cephalalgia phrenitide et tandem sopore lethali correpto, sed vesiculam felleam bile subfusca distentam. Et in febribz biliosis putridis, quas describunt cl. MALOUIN<sup>32)</sup> et BERTHONIE<sup>33)</sup>, licet graui deliria per totum illarum decursum aegros vexauerant, sanissimum cerebrum, ventriculus vero et intestina humore bilioso repleta, viscera abdominis inflammata, gangraenosa reperiuntur. Ex vomica hepatis moriebatur, qui biennii spatio validissimam phrenitidem aliquoties passus erat<sup>34)</sup>; et in alio phrenitico ductum hepaticum et cysticum in loco suae coniunctionis indurata glandula auellanae magnitudinis, bilis ad duodenum transitum penitus denegante obstructos inuenit ill. SCHROEDER<sup>35)</sup>. Ex quibus omnibus satis patet, ipsa phrenitica deliria saepissime per consensum

22) De morbis. L. II. III.

23) Observ. on the disease of the army. edit. V. P. III. c. 7. p. 301. sqq.

24) Medical Facts and Experiments. P. I. S. I.

25) lib. cit. P. II. S. XVI.

26) De sed. et caus. morb. Epist. VII.

27) Sepulcr. anat. L. I. S. VII. obs. 13. 14. 16. add.

28) De sed. et caus. morb. Ep. VII. art. 2. 3. 4. 6. 8.

29) E. N. C. Dec. II. A. V. obs. 62.

30) Observ. med. obs. 2. p. 6.

31) Exercit. de apoplexia. p. 435.

32) Memoires de l'Acad. Roy. des Sc. A. 1753.

33) Journal de Medecine. Tom. XIV. pag. 270.

34) VAN SWIETEN Comment. in Aphor. Boerh. T. II. p. 604.

35) Diss. de alienata bilis qualitate. Goettingae 1767. p. 20.



sensum produci, neque necessario cum cerebri inflammatione coniungi; licet minime dubitemus, quin interdum cerebri inflammatio phrenitidem aequae ac paraphrenitidem producere possit, quales idiopathicae post metastases inflammationum, puris, insolationem, violentias externas capiti illatas, contingere possunt, et cadauerum sectionibus satis confirmantur. Interim etiam illae phrenitides, quae insolationem, vulnera et contusiones capitis sequuntur, licet his occasionebus caput proximè afficiatur, non semper pro idiopathicis habendae sunt. Notum enim est, quam facile abdominalia viscera perturbentur, si caput violentiam accipit. Nihil enim solennius est in iis, quibus caput vulneratur, quam vomitus biliosus, cardialgiae, quin non raro icteri, abscessus hepatis, ex hac causa oriantur. Nonne ergo saepius deliria illa, aliaque grauius symptomata, quae capite vulneratis accidunt, potius huic perturbationi in abdomine, quam localibus capitis vitiis adscribenda essent? Egregie hoc confirmant observationes, quas refert cl. ANDOUILLE<sup>36)</sup>, aegrorum, qui post contusiones et fracturas cranii stupore, deliriis, conuulsionibus non liberabantur, licet incisiones, eleuationes depressi cranii, ceteraque quae externa affectio requirebat, minime negligerentur, usque dum emetico vel purgante copiosae biliosae fordes aluo euacuatae erant. Narrauit mihi ill. SCHROEDER, se quondam ad militem fuisse vocatum, qui non leuem ad caput ictum acceperat, ita ut sensibus obnubilatus protinus in terram concideret, breui tamen ad se rediens, post aliquot vero dies delirio prehebatur, fugillatim cutim incidi et omnia ad terebrationem capitis parari iubebat venerandus Praeceptor, antea vero, eum obstructam esse aluum audiret, maiores cathartici salis doses propinabat, et ecce soluta aluo et sequentibus copiosis deiectionibus, delirium statim cessabat, et sine trepanatione aeger restituebatur. Vidit cl. BONDON<sup>37)</sup> puerum ex alto in caput delapsum et statim lethargo correptum, frustra sexies vena secabatur, quam primum vero clysteribus et purgantibus aluus sollicitata multa deiecerat, mens redibat et breui aeger restituebatur. Quod si hunc emeticorum, purgantium, clysterum, efficaciam ex eo potius deducas, quod quiescentem in vasis cerebri sanguinem soluant, mobilemque reddant, non quidem contradico, quod in quibusdam hac ratione iuuent; sed sunt etiam aegri obseruati, qui sub iisdem plane conditionibus stupidi, lethargici, deliri, conuulsi mortui sunt, remediis illis deserviti, in quorum tamen capite dissecto staseos vel extrauasati sanguinei ne minimum occurrebat indicium. Sic MERMANNUS<sup>38)</sup> de viro narrat, qui post inflictum graue capitis vulnus nonnullis ab integra curatione elapsis mensibus, ictericus et delirus fiebat, lenta tandem febre exstinguebatur, in cuius dissecto capite nullum prorsus vitium, sed in abdomine hepar fere totum consumtum et in putrilaginem mutatum apparuit. Iuuenem robustum post ter institutam terebrationem conuulsum tandem perire vidit cl. BERTRANDI<sup>39)</sup>, et praeter piaie matris leuem necrosin nil in capite vitii, sed magna vomica hepar obsessum inuenit; in aliis caput prorsus insens, solum hepar suppuratum detexit. Idem quod de deliriis ex capitis vulneribus diximus, etiam valet de illis

36) *Memoires de l'Acad. Roy. de Chirurgie. Tome III. p. 510.*

38) *SCHENK Obseruat. med. p. 411.*

39) *Memoires de l'Acad. Roy. de Chirurgie. Tome III. p. 485. sqq.*

37) *Ibid. Tome I. p. 199.*

illis aliusue symptomatibus, quae insolationem sequuntur; licet enim ex hac facillime cerebri inflammatio, ex hac deliria, sopores oriri possint, quod sectionibus cadauerum satis confirmatur <sup>40)</sup>, semper tamen dubitandi locus erit, num forte consensualis originis sint, quippe ab HIPPOCRATE <sup>41)</sup> iam annotatum legamus, insolationem bilem mouere et choleram excitare, et experientia doceat, diuturnam in sole vel loco calido moram, vomitus ciere, fortassis, quod caput primo rarefacto sanguine dolere incipiat, ipse autem capitis dolor per consensum neruorum vomitum moueat.

At non minus saepe etiam chronica deliria, *paranoiae*, *maniae*, *melancholiae*, *enthusiasmi*, consensualem ex imo ventre ducunt originem. Quoties non in his morbis deprauatae digestionis manifestissima signa apparent, quoties aegri de sensu ponderis, grauitatis, tensionis, tumoris circa praecordia queruntur, cibum aut non appetunt, aut voraces satiari nequeunt, varias sordes euomunt aut aluo deiciunt? Quoties audimus mala illa ex animi affectibus grauioribus, praua diaeta, peruerse curatis morbis biliosis, febribus praesertim intermittentibus, aliisue causis, quae sordes intestinales generant, viscera hypochondriaca obstruunt, ortum duxisse. Imo quod saepe contingat, solis remediis, quae cacochyliam ventralem euacuant, sanam et quietam mentem redire. Furem quandam virginem, emetico sumto, non aliter quam propinato opiato quiescere vidit APINUS <sup>42)</sup>, et solis emeticis manias curarunt GRUNDELTIUS <sup>43)</sup> et HÜNERWOLF <sup>44)</sup>. Nullis aliis remediis, quam digestiuis salibus melancholicum sanauit LEDELIUS <sup>45)</sup>, et iuuenem ex terrore mania correptum, spontaneam diarrhoeam sanum reddidisse, affirmat HOFFMANN <sup>46)</sup>. Plura melancholiae solis purgantibus sanatae inuenies apud SCHENCKIUM <sup>47)</sup>. De virgine narrat HOYERUS <sup>48)</sup>, veneficam se simulante ultro sese incarcerationam et extremo supplicio puniendam offerente, quae vero purgata veratro, mentem statim mutabat et sana euadebat. De maniaco refert FORESTUS <sup>49)</sup>, qui furibundus per domum vagans, sero lactis repletum vas reperiēbat, illudque copiose ingurgitauerat, ita ut ultra duodecies aluum deponere cogeretur, at hoc facto quietus obdormibat et sana mente euigilabat. Pictorem vidit TULPIUS <sup>50)</sup>, qui imaginabatur, cuncta sui corporis ossa adeo mollia ac flexilia esse, ut instar sequacis cerae facillime in se complicarentur, si vel minime his inniteretur, continuo hinc lecto affixus manebat, atra bile vero expulsa ossa intra triiduum pristinum stabilimentum recuperabant. RIEDLINUS <sup>51)</sup> feminam vidit maniaco delirio subito correptam, quoad tres iam septimanas erat detenta, quae post exhibitum purgans et excretam insignem bilis aeruginosae quantitatem insequente nocte quiete dormibat, post somnum sanissima. Sed etiam vermes intestinales non tantum corpus excruciant, sed animi quoque habitum corrumpunt. Hinc ex morum subito ac impro-

40) Tissot Avis au peuple. §. 154.

41) Epidem. VII. 40. conf. BRENDL  
Diff. de cholera humida. §. 6. in Opusc.  
T. II. p. 135.

42) E. N. C. Dec. III. A. V. VI. obs. 116.

43) E. N. C. Dec. II. A. IV. obs. 166.

44) E. N. C. Dec. II. A. VI. obs. 92.

45) E. N. C. Dec. III. A. I. obs. 97.

46) Opera T. III. p. 257.

47) Observat. med. p. 135. et 396.

48) E. N. C. Cent. VII. obs. 78.

49) Observat. med. L. X. obs. 1.

50) Observ. med. L. I. obs. 18.

51) Observ. med. Cent. III. obs. 95.



improvisis mutatorum scena de vermibus coniecturam fecit PECHLIN<sup>52)</sup>. Continua deliria inter alia terribilia symptomata a taenia excitata in virgine observavit GEOFFROY<sup>53)</sup> et MOLLERUS<sup>54)</sup> iuvenem vidit, qui quotidie circa horam pomeridianam tertiam anxietate, inquietudine et insigni melancholia prehendebatur; desperans de gratia Dei et vita aeterna, eiectionis vero copiosissimi lumbricis periodica hac athymia liberabatur. Narrat cl. VAN DEN BOSCH<sup>55)</sup> de femina ex febre intermittente valetudinaria, quae citra aegritudinis speciem mente capta erat, sub continuato vero anthelminticorum usu sanata; et alium furiosam virum brevi tempore anthelminticis et roborantibus sanavit. Ipsae ascarides aliquando dementiam producunt, et memorabilis est historia, quam narrat cl. WHYTT<sup>56)</sup> pueri capitis ventrisque dolore et breui post delirio correpti, adloquentibus eum nil respondebat, expectatus in furiosos clamores erumpebat verbis parum cohaerentibus, expulsi vero ascaridibus cum magna pituitae copia statim mentis compos erat; etiam cl. VAN PHELSUM<sup>57)</sup> deliria, passiones melancholicorum, hypochondriacorum, hysteriarum aemulas ab ascaridibus frequenter produci observavit. Et quis crederet ipsas fatuitates, amentias, quas toties incurabiles esse predicant Medici, interdum nonnisi sordium intestinalium effectus fuisse. BENIVENIUS<sup>58)</sup> narrat de viro, qui ex morbo quodam tantam stupiditatem et obliuionem sibi contraxerat, ut ne rerum quidem nomina memoria tenere posset, alui fluxu vero, quo multa viridia pituitosa educebantur, integras mentis functiones recuperauerat. Acta Parisina narrant exemplum pueri, qui post largiorem coenam febre corripiebatur; in qua memoria simul penitus delebatur, quae tamen restituebatur, quamprimum cruditates per vomitum exierant. GAHLRIEP<sup>59)</sup> virum vidit, qui aliquot ab annis amentissimus erat, omnis generis cibos instar belluae deuorabat, excrementa sua sedens cubansue emittebat, grunniebat instar porci, nec quicquam loquebatur nisi mutilate et absque ratione, sapa vero vomitoria repetitis vicibus exhibita sapiens reddebatur. WEPFERUS<sup>60)</sup> de femina refert, per triennium iam fatua, quae statim rationem recuperabat, postquam latus quidem vermis aluo exierat. Et cl. VAN PHELSUM<sup>61)</sup> de femina narrat, quae post quascunque menstruationes fatua fiebat, hereditariam labem suspicabantur Medici, ex periodico vero mali decursu, praesertim ex exacerbatione post sanguinis fluxum, aliisque symptomatibus concludebat cl. Vir, ascarides forte adesse, et datis anthelminticis expulsi- que illis, fatuitatem integre sanauerat. Quid quod ex aduerso ex iisdem causis praeternaturalis ingenii sublimitas originem duxerit; vidit PECHLINUS<sup>62)</sup> puerum verminosum, fame canina misere excruciatum, totum emaciatum, tanta valentem memoria, ut semel perfectum sermonem sine mora et haesitatione totidem expressis verbis

repe-

52) Obs. phys. med. L. III. Obs. 42.

53) Recueil period. T. IV. p. 341.

54) E. N. C. Dec II. A. V. obs. 27.

55) Hist. constit. epid. vermin. p. 208.

56) Observations on the nervous disorders p. 196.

57) Hist. ascarid. patholog. p. 208.

58) De abditis rerum causis C. 47.

59) E. N. C. Dec. II. A. VI. obs. 18.

60) E. N. C. Dec. III. A. II.

61) lib. cit. p. 209.

62) Observ. phys. med. L. III. obs. 4.

repetere posset, idque ne minimo studio vel meditatione, sed obiter et velut alia agendo; et cl. VAN PHELSUM <sup>63)</sup> puerum vidit sanum antea corpore, sed tardi iudicii, qui vero undecimo aetatis anno vermibus vexatus mira ingenii alacritatis monumenta exhibuit, conuulsionibus licet et continuis doloribus fere perpetuo cruciatus, copiosis vero vermibus teretibus euacuatis, in pristinam stupiditatem relabebatur.

Sed sunt quoque deliriorum chronicorum consensualium alia, quae non adeo a colluue acri ventriculi et intestinorum fouentur, sed ex sola harum partium debilitate et nimia sensibilitate proueniunt; hinc maniae et melancholiae illae hypochondriacorum et feminarum hystericarum, quo tempore vaporibus uterinis dictis vexantur; tristes enim hoc tempore non raro sunt, timidi, despondent animum et indignantur, quoties aliquis vel minimam de sanitate recuperanda spem iniecerit, tristissima quaeque sibi ominantes, ab omni gaudio, spe, laetitia abhorrentes, quae si forte occurrant, velocissime auolant et animum non minus vehementer exagitant, ac moestiora illa pathemata, ita ut nullibi mediocritatem seruent, nunc amant praeter modum, mox odio eosdem sine causa prosequuntur, nunc hoc illud sibi agendum proponunt, inox a proposito resiliunt, et quod cum eo pugnat, aggrediuntur, sed neque hoc peragunt, ita animi pendentes, ut nunquam liceat quietam mentem consistere <sup>64)</sup>, quin interdum haec inquietudo in desipientiam et furores transeat, praesertim si spasmodorum paroxysmi vehementiores sint et sensiliores abdominis partes corripiant. Vidit KAU BOERHAVE <sup>65)</sup> hystericam feminam, quae, quando cardialgia ipsi solennis accedebat, per totum hoc interuallum donec illa cessabat, in vehemens delirium et furem incidere, quam primum vero dolor cessabat, mens constabat, turbata illico ad affectum iterum ventriculum. De hoc genere deliriorum omnino etiam sunt illa, quae SYDENHAM <sup>66)</sup> post febres intermittentes sanguinis missionibus, repetitis alui purgationibus tractatas facpius oriri obseruauit; et quae puerperas interdum inuadunt <sup>67)</sup>, nunquam enim sensiliores sunt nerui, praesertim abdominis, ac post partum, et ex minima causa spasmos concipiunt; et quam male curaret, qui dicta deliria sanguinis missionibus, euacuantibus, resoluentibus aggredi sibi proponeret; ne minimum enim interdum plethorae cerebri, obstructorum viscerum, sordium intestinalium adest indicium, et non tolluntur nisi illis remediis, quae neruorum nimiam sensibilitatem sopiunt, debiles roborant, efficacissimis antihysterics, stomachicis amaris, cortice chinae, marte <sup>68)</sup>. Eadem origo videtur fuisse deliriorum illorum, quae certis periodis recurrebant, et frustra adhibitis aliis remediis, breui tempore, cortice peruuiano tollebantur <sup>69)</sup>.

Frequentem quoque ob excitatos spasmos deliriis consensualibus originem praebet plethora abdominalis, a quacunque nunc causa producat. Hinc infaniae in illis,

63) Lib. cit. praefat. p. 14.

64) SYDENHAM Opera T. I. p. 260.

65) Impetum faciens dictum HIPPOCRATI. p. 288.

66) Opera T. I. p. 49. 60. 61.

67) VAN SWIETEN Comment. in Aphor. BOERH. T. III. p. 528.

68) VAN SWIETEN l. c. p. 530. WHYTT observ. on the nerv. disorders. p. 517. n. 1.

69) Recueil period. T. VI. p. 195. MEDICUS Samml. von Beobacht. 2. B. p. 372.



lis, quibus fluxus menstruus difficulter fluit, aut supprimitur. Sic BAUZMANN <sup>70)</sup> furorem obseruauit quouis mense redeuntem, et per nouem dies durantem, larga tandem menstruatione finitum; simile delirium periodicum in virgine obseruauit cl. MAJAUULT <sup>71)</sup>, et hirudinum ad genitalia fluxus tempore applicatione tulit; et LANZONIUS <sup>72)</sup> de femina quadragenaria narrat, quae nunquam menstruas viderat purgationes, sed quouis plenilunio insaniebat, post biduum rationem recuperans. Eadem plethora abdominalis causa videtur fuisse dementiae mulieris cuiusdam, quae cum quavis grauiditate redibat, et puerperio soluebatur <sup>73)</sup>; licet etiam ex fordibus primarum viarum, quas grauidae facillime prae aliis in ventre colligunt, haec deliria oriri possint, hinc HAGEDORN <sup>74)</sup> unico emetico, quod putridam colluiem eduxerat, sanauit melancholiam, qua femina quaedam, quoties uterum ferebat, vexabatur. Effocatae quoque mulieres, quibus fluxus menstruus cessauit, ob eandem sanguinis in vasis imi ventris stagnationem, uti in innumera alia neruosa symptomata, sic interdum in manias et melancholias incidunt, qualem maniam quae per septennium mulierem vexauerat, tandem haemorrhagia uteri sublatam fuisse legimus <sup>75)</sup>. Eadem viris contingere possunt ex suppressione fluxus haemorrhoidalis, uti in Alcippo, qui haemorrhoidibus curatus, mania corripiebatur <sup>76)</sup>. Hinc etiam maniae haemorrhoidum fluxu interdum soluuntur <sup>77)</sup>. Omnium vero frequentissime haec plethora abdominalis in maniacis et melancholicis ex obstructione viscerum hypochondriacorum originem ducit, siue nunc haec ex modo enarratis causis, suppressione nimirum fluxuum naturalium, siue ex animi affectibus praesertim tristioribus, aliusue mentis exercitationibus nimis, siue ex vita sedentaria, cibis austeris duris, glutinosis, potuum spirituosorum abusu, vel ex morbis praegressis, malo hypochondriaco et hysterico inueterato, febribus intermittentibus, biliosis, peruerse curatis, anomaliis arthriticis originem duxerit, quae omnes causae, uti cuius notum est, chronicis deliriis occasionem praebendi aptissimae sunt. Et leuis modo ad functiones viscerum naturalium in his aegris attentio statum vitia in hisce visceribus cuius ostendet; quid enim aliud indicant graue illud, quod queruntur pondus circa hypochondria, frequentia illa suspiria, lingua plerumque fordida, sputationes frequentes, ructus, flatus, praecordia tumida, voracitas vel pertinax cibi fallidium, vomitus materiae acidae, biliosae, atrae <sup>78)</sup>, aluus ad plures dies imo ad menses adstricta; vel sicca, rotunda, flauo viridi atroue humore circumfusa reddens; pulsus tardus; pallor flauescens faciei? Et nonne saepius vomitus nigri et deiectiones similes, dysenteria <sup>79)</sup>, manias et melancholias soluerunt, dum liberabant vasa abdominalia a sanguine quo erant obruta? Annon hac potissimum ratione quartanae febres et hydro-

T t 2

pes

70) E. N. C. Dec. II. A. VIII. obs. 43.

71) Journal de Medecine. T. X. p. 1. sqq.

72) E. N. C. Cent. IX. obs. 12.

73) E. N. C. Dec. III. A. II. obs. 4.

74) E. N. C. Dec. I. A. IX. X. obs. 73.

75) LIEUTAUD Histor. anat. med. P. I. obs. 1369.

76) HIPPOCRATES Epidem. L. IV. text. 51.

77) Idem Aphor. 21. S. VI.

78) TRISSOT Epist. ad ill. ZIMMERMANN de morbo nigro, cet. l. c. p. 40. 41.

79) HIPPOCRATES Aphorism. L. VII. 5.

pes maniacis utiles sunt, quod illis per vehementes quas inducunt concussiones, flaves viscerum resoluuntur, vasa peruia redduntur, his solida laxantur, fluida resolvuntur, stagnantia mobilia redduntur? Varices et crurum ulcera insanos subinde leuare, HIPPOCRATES <sup>80)</sup> iam notauit, et memorabilem casum refert SCHENCK <sup>81)</sup> de fabro aerario, qui per aliquot menses adeo vehementi mania detinebatur, ut catenis vinciri debuerit, obortis vero varicibus in cruribus, nigro sanguine multum distentis, ad sanam mentem mox rediit; nonne vero varices et ulcera crurum his maxime solennes sunt, quibus viscera hypochondriaca sunt obstructa <sup>82)</sup>, et nonne ideo leuant, quod atrabilia faece ad extremitates deducta, illa viscera grauante hac saburra liberantur? Et si ad curationem attendamus, quam ars perficit, nonne multi maniaci et melancholici perfecte fuere curati solis remediis, quae viscerum abdominis obstructions referabant, circuitum sanguinis per illa liberum restituebant; hoc suo helleborismo praestabant veteres, aliis similibus idem peragunt recentiores. Resolventissimo mercurio ad saluationem usque exhibito maniacum restituit WEPFERUS <sup>83)</sup>. Largo usu cucumerum melancholias pertinacissimas sanauit HOFFMANNUS <sup>84)</sup>; furentissimos ex melancholia maniacos quietos reddi vidit ill. VAN SWIETEN <sup>85)</sup>, solis fructibus horaeis et quidem cerasis aut fragis ad viginti et ultra libras quotidie per aliquot septimanas assumtis, incidebant enim a tam largo fructuum usu in diarrhoeam, sed per aluum exibat faex atrabilia, et breui totus ille furor pacabatur. Pertinacissimas diuturnas melancholias, manias, amentias, tartaro tartarifato cum extractis amariorum et melle iuncto, curauerunt cll. MUZELL <sup>86)</sup> et HANNES <sup>87)</sup>. Et tandem, quid frequentius insanorum cadauera ostendunt, vitiis imi ventris, quod exempla vasorum ventriculi, intestinorum, mesenterii varicosorum; scirrhorum, vomicarum, concretionum lapidearum in hepate, liene, mesenterio, utero; vesiculae felleae bile acerrima, lutea, viridi, nigra, instar picis tenace, in calculos concreta in illis aegris reperiuntur, in scriptis BONETI, MORGAGNI, LIEUTAUD, aliorumque occurrunt? Licet non negemus, quod ipsa haec vitia viscerum in aliis effectus potius morbi quam causae sint <sup>88)</sup>. Neque tamen multum soliditatis illorum obiectioni videtur inesse, qui dicunt, eadem viscerum obstructionis signa in multis aegris, eadem vitia in multis cadaueribus fuere reperta, quibus sanissima mens ad mortem usque fuit. Hi enim non perpendunt, diuersam materiae obstruentis, irritantis, naturam, quam raro sensus detegunt, diuersos producere effectus; idem irritamentum non eodem modo agere, si diuersa

80) Aphorism. L. VI. 21.

81) Obseruat. L. I. p. 142. conf. VAN SWIETEN Comment. in Aphor. Boerh. T. III. p. 509.

82) Hinc maxime familiares sunt incolis Minorcae ulcera crurum, inter sporadicos enim morbos his viscerum obstructions frequentissimi sunt. CLEGGHORN observ. on the epid. diseas. in Minorca. p. 70.

83) De affectionibus capitis. pag. 323. 324.

84) Medicin. ration. system. Tom. IV. P. IV. C. 8.

85) Comment. in Aphor. Boerh. T. III. pag. 480.

86) Medic. und chirurg. Wahrnehmungen. I. Samml. cas. 8. et 13. II. Samml. cas. 11.

87) Brief an H. BALDINGER von dem Friesel. p. 70. sqq.

88) uti exemplis illustravit WHYT observ. on nervous disorders. p. 203. sqq.



diuersa est neruorum sensibilitas, alio modo in hydropico, alio in sensili hysterica virgine, et in maniacis et melancholicis; in his enim sensile est systema neruosum, maxime irritabilia sunt solida; et hinc contingit interdum, quod, licet efficacissimis remediis viscerum obstructio sublata et causa morbi ex corpore euacuata sit, cito tamen redeat malum, nisi in curatione simul ad praedisponentem mali causam respexeris, mobili reddita et euacuata obstruente materia, roborantibus neruinis neruis robur, vasis tonum restitueris, cortice chinae, marte, balneis frigidis<sup>89)</sup>.

Tandem consensualia deliria oriri poterunt, si acris quaedam materia sanguini admixta ad viscera abdominis sensiliora transfertur et neruos irritat. Hinc adeo frequens arthritidis symptoma est deiectio animi, quae eius paroxysmos fere omnes, et quo maiores eo maior, antecedit, usque dum materia morbosa ad artus desertur; recte enim notauit cl. WHYTT<sup>90)</sup> symptomata neruosa, quae anomalas arthritides et rheumatismos comitantur, plerumque non a materia ipsas partes spasmus affectas obsidente, sed potius ab eadem ventriculi et intestinorum neruos irritante per sympathiam oriri; hinc etiam melancholia arthritica plerumque cum incommodis circa ventriculum, cardialgiis, vomitibus biliosis, interdum inanibus, borborygmis, colicis iuncta est, et una cum his augetur vel minuitur, vel in alias spasmodicas affectiones transit, prouti materia acris locum suum mutat<sup>91)</sup>.

### *Conuulsiones consensuales.*

#### §. XXXVII.

Restat ut etiam de conuulsionum consensuali origine pauca afferamus. Nullibi nimirum, ipsum cerebrum si exceperis, illarum causae frequentiore sedem habent, ac in visceribus abdominis, praesertim ventriculo et intestinis variis stimulis irritatis. Incipiamus a venenis et quoties haec lethales conuulsiones produxerunt, non quod circulationis lege ad cerebrum deferebantur, sed quia in ventriculo inclusa eius neruos et per hos totum neruorum systema afficiebant? quippe non solum in animalibus, in quibus experimenta instituebantur, sed et in hominibus eisdem venenis trucidatis nil mutatum in cerebro inuentum fuit, et mature datum emeticum statim conuulsiones ceteraque mala sustulit<sup>1)</sup>. Vidit cl. BOERHAAVE<sup>2)</sup> octo pueros cicutam deuorasse, angebantur, delirabant, vomituriabant, conuellebantur omnes, propinato vitriolo albo seruati sunt, qui vomuerunt omnes. Quot infantes lethalibus conuulsionibus corripiuntur, non alia forte ex causa, quam quod syrupum violarum stanneis vasis confectum et asseruatum linxerint<sup>3)</sup>? Et quam drae interdum conuulsiones colicam illam saturninis venenis excitatam comitantur<sup>4)</sup>? Horrende inprimis membra con-

T t 3

velli

89) Conf. LORRY de melancholia et morbis melancholicis. T. II. p. 164. sqq.

90) lib. cit. p. 169. 170. not.

91) MUSGRAVE diss. de arthritide symptomat. C. V. hist. 7.

1) De cicuta aquatica p. 5. sq.

2) Praelect. academ. Vol. VI. p. 388.

3) vti monet Exp. SCHINZ, fautor meus aestumatissimus, in diss. de stanni et eius miscelae cum plumbo in re oeconomica usu. Tiguri 1770. p. 22.

4) DE HAEN Rat. med. Tom. III. C. 2 T. X. C. 1.

velli visa sunt, cum mechanica venena ventriculum et intestina obsefferunt. Quae aciculam deglutierat ancilla non furioso solum delirio, sed horrendis quoque colli, brachiorum, crurum conuulsionibus corripiebatur, omnia symptomata cessabant, reddita per aluum acicula <sup>5)</sup>; neque ab epilepticis insultibus breuia per interualla recurrentibus liberabatur puer quidam, usque dum deglutitus ex improviso denarius per anum excretus fuisset <sup>6)</sup>. At non mitiores quandoque sunt effectus irritamentorum in ipso corpore natorum et primas vias irritantium, uti toties videmus in infantibus, qui saepissime nonnisi ob intestinales sordes conuelluntur. Nulla enim fere aetate primae viae facilius sordibus varii generis replentur, maioriq[ue] sensibilitate gaudent; recens nimirum natorum infantum ventriculus et intestina multa pituita et tenaci meconio sunt repleta, quae si aut ob nimiam tenacitatem, aut languentes tenellorum vires diutius retineantur, acres fiunt, irritant, inquietudinem, vomitus, tormina, varios spasmos producant; imo ex unica hac causa epilepticos insultus frequenter obseruauit PECHLINUS <sup>7)</sup>, quibus chemicorum arcana frustra opponebantur, quos unicum suppositorium, vel clyster, aliudue purgans statim sustulit. Neque etiam diri illius maxillae et quandoque uniuersalis tetani, quo recens nati crudeli modo interdum eneantur, aliam causam esse quam meconium acre retentum supra (§. XXIX.) notauimus. Quoties lac diaeta aut animi affectibus nutricis venenatum redditum sub iisdem torturis innocua corpuscula morti tradit. Vidit WOLFF <sup>8)</sup> ex sola diaeta matris, quae carnem suillam et brassicam auide ingurgitauerat, filiulam lactantem aliquot a prandio horis vehementibus conuulsionibus correptam; alium infantem, qui ira furentis matris ubera eduxerat, paulo post epilepsia correptum et octo elapsis horis iisdem suffocatum fuisse narrat SOMMER <sup>9)</sup> et intra viginti quatuor horas conuulsionibus exstinguebatur pusio, ex vehementi, quo lactans mater ob improvisum absentis mariti aduentum commouebatur gaudio <sup>10)</sup>. Quot infantes nulla alia ex causa, quam ob acidum ex quacunque causa lactis colostrum ventriculum et intestina replens, acidam eadem obducentem ex cibis farinosis, glutinosis, paratam pastam, conuulsionibus corripiuntur? Vidit, dum illorum cadauera secaret ill. VAN SWIETEN <sup>11)</sup> nullum in toto corpore vitium, praeter ventriculum colostro acidum redolente repletum, quod in quibusdam cunei instar pyloro intrusum omnem exitum ex ventriculo impediabat. Atque in talibus conuulsionibus quamplurima pro specificis vulgo habita remedia Medici et muliercularum de se expectationem vix ac ne vix quidem explent, sed quae acidum illud obtundunt, contemperant, infringunt, idque sine nouo corporis aestu, quaeque aciditatem hanc infractam per superiora vel inferiora educunt, post alia infinita tentata, veras continent vires, huic symptomati debellando pares, solis his remediis innumeros conuulsos infantes morte liberauit HARRIS <sup>12)</sup>; imo infantem, qui

ex

5) HILDBANUS obs. chir. Cent. I. obs. 34. App. p. 30. simile exemplum refert WIEDENFELD obs. med. triga obs. 3.

6) LAZERME de morb. capitis p. 253.

7) Obs. phys. med. L. II. obs. 29.

8) A. N. C. Vol. VII. obs. 7.

9) E. N. C. Dec. II. A. II. obs. 172.

10) ARMSTRONG Versuch von den Kinderkrankheiten. p. 41.

11) Comment. in Aph. Boerh. Tom. IV. pag. 686.

12) De morbis infantum p. 36.



ex simili causa per quadriduum conuulsionibus detinebatur, unico clystere, quod obstructam soluebat aluum, acres educebat fordes, sanum reddidit RIEDLINUS<sup>13)</sup>, ita ut recte omnino doceat BAGLIVI<sup>14)</sup> omnes fere infantum conuulsiones ex stomacho fieri, et per lenia purgantia soluendas esse. Excipies illas, quibus dentientes ex gingivarum sensilium tensione afficiuntur et quae variolarum eruptionem praecedunt. At de illis supra iam notauimus (§. XXIII.), quod non raro ab intestinalibus fordibus excitentur, foueantur, exacerbentur, et quod in illarum curatione non minus repurgandis primis viis quam alleuandae dentis eruptioni incumbere oporteat Medicum; et neque in istis, quae in primo variolarum stadio occurrere solent, primis viis prospicere negligi umquam debet<sup>15)</sup>. Licet enim frequentius peculiarem medelam non requirant; ex sola plerumque veneni variolosi irriatione produci videantur, initium et boni moris variolarum eruptionem praedicant, et eruptione facta sponte cessent, ne minimum reditus metum relinquentes, itaque stultum omnino esset, eas magno studio praecauere aut debilitare, euacuationibus illas aggredi, quae variolarum eruptionem retardarent, ipsas ergo conuulsiones potius fouerent et augerent; contingit tamen interdum, quod alia quaedam causa simul adsit, quae conuulsionum paroxysmos vehementiores et frequentiores non sine aegrorum periculo reddit, non raro inter alias causas neglecta alui obstructio, verminosa, aliaue acris intestinalis colluuius, uti tot alias in variolarum decursu anomalias, sic etiam symptoma illud augere possunt; hinc FÜRSTENAU<sup>16)</sup> grauiore conuulsionum insultus in puero quodam variolarum eruptionem praecedentes, propinato antimonii aurato sulphure, quo pituitae copia vomitu eiiciebatur, mox fustulit. At etiam in adultis non raro occurrunt conuulsiones, quae unice ex acris primarum viarum fordibus producuntur. In febribus, dicit GALENUS<sup>17)</sup> quosdam derepente conuulsionibus prehendi vidimus, qui vero, bilioso superueniente vomitu, statim ab illis liberabantur; et saepe vomitorium, affirmat ill. VAN SWIETEN<sup>18)</sup>, dum fluctuantem circa praecordia acrem et copiosam bilem actiones cerebri turbantem euacuat, uno momento febriles conuulsiones tollit. Quare recte SYDENHAM<sup>19)</sup> monuit, non semper deterrendum esse Medicum a purgatione, si forte membrorum subsultus vel motus conuulsiuos in aegrorum corpore perlentiscat, quandoquidem in quibusdam generis nervosi affectibus tam venaesectiones quam purgationes etiam saepius repetitae non tantum non noceant, sed et necessariae sint. Petechialem epidemicam febrem describit cl. GLASS<sup>20)</sup>, in qua lenis alui ductio subsultus tendinum, tremores, deliria, alia spasmodica symptomata mox profligabat, quae iterum tamen breui redibant, nisi aluus sponte perstabat tenera, aut subinde per medicinam emolliebatur. Purgantia tollebant facillime manuum tremores, quos subinde petechiali febre accedere vidit cl. STRACK<sup>21)</sup>. Nullam specialem medelam require-

13) Obs. med. Cent. III. obs. 100.

14) Opera p. 114. 336.

15) Medicus Samml. von Beobachtung. II. B. p. 419.

16) A. N. C. Vol. VIII. obs. 73.

17) De loc. affect. L. III. C. II. Comment. in Aphor. I. L. V.

18) Comment. in Aphor. Boerh. T. II. pag. 359.

19) Opera T. I. p. 360.

20) Comment. de febribus p. 143.

21) De morbo cum petech. p. 58.

quirebant conuulsiui motus, qui febris biliosae Lausannensi interdum iungebantur, et pessime nonnullis successit usus antispasmodicorum, utut aliquoties spasmodica symptomata princeps viderentur morbus, sed qui biliosam expugnabat cacochyliam, emesi, purgantibus, acidis, facillime illa tollebat <sup>22)</sup>). Biliosas putridas febres describunt cll. DARLUC <sup>23)</sup> et BOUCHER <sup>24)</sup>, quibus deliria, tendinum subfultus, artuum tremores, dentium stridores, conuulsiones, imo tetani accedebant, si ulla remedia, emetica et cathartica grauius illa symptomata tollebant; et quorum demortuorum cadauera secabantur, bile aeruginosa repletam vesiculam et intestina, gangraenosae viscerum abdominalium inflammationes ostendebant, manifesto illorum symptomatum originis indicio. Non deerat quidem vasorum meningum et cerebri turgescencia, quae vero consensualem illorum spasmodorum originem non dubiam reddet, cui notum est, eandem effectum illorum saepius esse quam causam; et quod sine omni cerebri culpa grauissimi neruorum affectus unice per neruorum consensum oriri possint, egregie ostendunt observationes cl. MEDICI <sup>25)</sup> de perniciose illa intermittente febre, cum uniuersali tetano stipata; in iis enim, qui in paroxysmis moriebantur, et secabantur, ne minimum cerebri vitium detegatur, sed ventriculus et intestina bile viridi, nigra, tenaci repleta; hinc nonnisi vomitoria, purgantia, clysteres, paroxysmos mitigabant, instantes leniebant, cortice peruiano tandem penitus sublato. Sed qui etiam extra febres adultos vexant conuulsiui affectus, tremores, epilepsiae, choreae, tetani, aliaeque conuulsionum species, saepissime ex iisdem acerbis sordibus excitantur, et quae per fat longum tempus aegros iam excruciant, unice euacuantibus non raro sunt sublatae. HIPPOCRATES <sup>26)</sup> iam notauit, repentinas conuulsiones interdum alui fluxu tolli, et CELSUS <sup>27)</sup> comitiali morbo oppressis vomitu necessarium esse, eaque maxime prodesse, quae per deiectiones excernuntur, dicit; non nescio quidem, multos nimis praecoces esse, ut fere omnis epilepsiae, et conuulsionum originem in primas vias ponant, ex signis laesae digestionis, quae non raro quidem in hisce aegris apparent, nimis cito ad consensualem morbi ortum concludant, minime perpendentes, quod viscerum abdominis functiones etiam idiopathica cerebri affectione laedi possint, quod per ipsam morbi idiopathici diuturnitatem, spasmodorum illorum frequentiam, secretiones et excretiones, uti in toto corpore, sic etiam et praesertim in organo digestionis, quae prae omnibus aliis partibus ad sui vigorem cerebri functionum integritatem requirunt, sensim sensimque labefactentur; neque ideo tamen minime in dubium voco, quin frequentissime ex sordibus intestinalibus, acidis, pituitosis, biliosis, verminosis, conuulsiui morbi produci, exacerbari, foueri possint, et forte frequentius ex hoc fonte ac ex ipso cerebro oriantur, saepissime non alia ex causa incurabiles fiant, quod ad hanc ipsorum causam non in mature attendatur. Quod in infantibus saepe conuulsiones ex acido primarum viarum originem ducant, supra exempla adduximus; at eadem causa similia mala etiam in adultis produxit; vehementem cardialgiam cum horren-

22) Tissot diss. de febr. bil. Laus. 1. c. pag. 113.

23) Recueil period. T. VI. p. 64. sq.

24) ibid. Tom. X.

25) Samml. von Beobachtungen. B. I. p. 106. sqq.

26) Coac. 358.

27) Lib. II. Cap. 8. 13.



horrendis totius corporis conuulsionibus, et vomitu pituitae acidae, fauces erodentis, et canina fame in iuvene obseruauit, et absorbentibus curauit cl. MARTEAU <sup>28)</sup>; similibus conuulsionibus vexatam feminam sola magnesia liberauit cl. WATSON <sup>29)</sup>. Neque rara chronicarum quoque conuulsionum causa est acris corrupta bilis circa praecordia stagnans. Hinc adeo frequens ipsarum ex animi affectibus origo; licet enim animi affectus interdum conuulsiones producant, sine ulla obseruabili materiali causa, quae remediis oppugnari posset, sed proxime functiones animales perturbando, non raro tamen contingit, quod ob eandem neruorum perturbationem, praesertim in nervis abdominalibus, materialis causa in corpore, acris nimirum biliosa colluies gignatur, et omnia dira symptomata unice ab hac dependeant, quae non ut in priori casu quiete animi, pharmacis moralibus, antispasmodicis radicitus tolli possunt, sed euacuationem biliosarum fordium praemissam postulant. Sic militem quendam ob immerita verbera a centurione accepta summo taedio affectum in vehementes totius corporis conuulsiones incidisse legimus, quae non cessabant usque dum biliosorum humorum copiam emeticum eduxerat <sup>30)</sup>; LEDELIUS <sup>31)</sup> ex terrore epilepsia sed foetidissimo alui fluxu stipata puerum corripit vidit; et illa quam ex nimis strenua educatione et inde nata tinniditate in puero oriri vidit CHEVALIER <sup>32)</sup> semper dolore hypochondrii sinistri incipiebat, et emeticis, purgantibus, subiunctis roborantibus tollebat. Sed ex quacunque insuper alia occasione siue biliosae, siue aliae acres sordes oriantur, exinde conuulsiui affectus ortum trahere possunt, et euacuatis illis tolluntur. Hinc ex salutari crudis vomitu suppresso statim epilepsiam sequi vidit SELIGER <sup>33)</sup>, et virum quendam, cui contra cardialgiam, nauseam, lassitudinem, sudorifera dedit rudis balneator, paulo post epilepsia grauissima afflictum, feliciter tamen emeticis curatum fuisse narrat LEDELIUS <sup>34)</sup>. Virum, qui diarrhoeam metu subsequens dysenteriae tunc grassantis adstringentibus sistebat, quotidie vel decies in vehementissimos morbi comitialis insultus incidere vidit CUMMIUS <sup>35)</sup>. Ex aduerso spontanea diarrhoea saepe conuulsionum paroxysmos leniuit, rariores reddidit, imo extirpauit. Sic in milite quodam insultus epilepticos per aliquot menses quotidie duodecim vicibus recurrentes, diarrhoea obuiente ad longum tempus euanescere vidit cl. MONRO <sup>36)</sup>; et choream in iuvene quodam, quae medicamentis haecenus non cedebat, alui fluxu spontaneo, quo glutinosi humores copia euacuabatur, penitus sublata obseruauit cl. WHYT <sup>37)</sup>. Emeto-cathartico tollebat ill. DE SAUVAGES <sup>38)</sup> uniuersalem tremorem subito sine febre, sed cum linguae sorditie virum quendam corripientem. Solis purgantibus cedebat epilepsia per VI menses singulis fere horis ingruens

28) Recueil period. T. XIII. p. 142.

29) Medical Observations and Inquiries. Vol. III. p. 335.

30) Journal de Medecine. T. XIII. p. 139.

31) E. N. C. Dec. III. A. V. VI. obs. 263.

32) Journal de Medecine T. XII. p. 329.

33) E. N. C. Dec. II. A. I. obs. 137.

34) E. N. C. Dec. III. A. II. obs. 46.

35) E. N. C. Dec. I. A. I. obs. 85.

36) Account of the Disease in Brit. Militar. Hosp. in Germany. Chap. on Epilepsy. not. e.

37) Observ. on nervous disorders p. 195.

38) Nosolog. meth. Vol. I. p. 559.

gruens, et dementiam in intervallis relinquens, ita ut post quartum assumptum purgans inter desidendum ad se rediret aegra, ab eo tempore malo suo libera <sup>39)</sup>. Solis emeticis opisthotonum asthma convulsuum sequentem curavit CAMERARIUS <sup>40)</sup>; emeticis et catharticis choream sanavit RYAMPS <sup>41)</sup>. Imo solis clysteribus tremorem totius corporis suppressos cruditatus vomitus sequentem sustulit LEDELIUS <sup>41)</sup>; neque aliis remediis quam clysteribus epilepsias perfecte curarunt WEPFER <sup>43)</sup>, HANNE-MANN <sup>44)</sup>, MEDICUS <sup>45)</sup>.

Quoties vero vermes intestinales tum vellicatione sua tum sordium generatione convulsivos morbos producant, ipsis mulierculis notissimum est. Totius corporis tremorem cum horrendis anxietatibus, alui fluxu solutum, sed nono vel decimo quoque die recurrentem observavit, et anthelminticis, quae ingentem vermium cateruam expellebant, sanavit SCHWERTNER <sup>46)</sup>. Similem dextri praesertim lateris tremorem expulso per aluum ingenti lumbrico evanescere vidit FÜRSTENAU <sup>47)</sup>, etiam in ascaridosis frequenter artuum tremores observavit cl. VAN PHELSUM <sup>48)</sup>. Horrendas membrorum convulsiones ultra tres menses ad incantationis usque suspicionem vexantes, vomitorio taeniam expellente sanatas vidit MARCUS <sup>49)</sup>. Lethales convulsiones homini febre tertiana duplici laboranti mortem inferebant, et post mortem intestinum ieiunum infinito lumbricorum numero repletum inuentum fuit <sup>50)</sup>; et in puero bienni, optimo corporis habitu praedito, convulsionibus extincto duodenum perforatum inveniebatur a lumbrico, qui vivus adhuc inde extractus fuit <sup>51)</sup>. Choream St. Viri anthelminticis curarunt IAEGERSCHMIDT <sup>52)</sup>, PAULINI <sup>53)</sup>, GAUBIUS <sup>54)</sup>. Epilepsiam ex taenia observarunt CONSOLIN <sup>55)</sup>, ANDREAE <sup>56)</sup>, ROEDERER <sup>57)</sup>; ex lumbricis plurimi; ex ascaridibus HOFFMANN <sup>58)</sup> et VAN PHELSUM <sup>59)</sup>. Tetanum in iuvene quodam febre laborante oborientem, anthelminticis curavit COULANUANN <sup>60)</sup>, et in cadauere ancillae subita cardialgia, convulsionibus et universali tandem tetano correptae, in intestino duodeno atque in cardia numerosi et magni lumbrici reperiuntur <sup>61)</sup>. Opisthotonum quinque paroxysmos quotidie facientem in puero ex lumbricis ortum et anthelminticis curatum refert RUCKERUS <sup>62)</sup>. Emprosthotonum in grauida saepius recurrentem post multos expulsos vermes sanavit HARDER <sup>63)</sup>. Catalepsi

39) SCHENCK obs. med. p. 115.

40) E. N. C. Cent. IX. obs. 98.

41) Recueil period. T. VIII. p. 241.

42) E. N. C. Dec. III. A. IX. X. obs. 115.

43) Hist. Cicut. aquat. p. 97.

44) E. N. C. Dec. II. A. III. obs. 51.

45) Geschichte period. Krankh. p. 330.

46) Comm. Nor. A. 1735. p. 314.

47) A. N. C. Vol. IX. obs. 28.

48) Hist. ascar. path. p. 212 sqq.

49) E. N. C. Dec. II. A. I. p. 308.

50) Journal de Medecine. T. XX. p. 378.

51) LIEUTAUD Histor. anat. med. T. I. obs. 104.

52) E. N. C. Dec. III. A. III. obs. 99.

53) E. N. C. Dec. II. A. V. App. p. 10.

54) VAN DOEVEREN Diss. de verm. intestin. p. 63.

55) Journal de Medecine. T. XX. p. 445.

56) Diss. de Taenia. Groeningae 1768.

57) Progr. de Taenia. Goettingae 1759.

p. 4 sq.

58) Opera T. III. p. 42. T. IV. p. 351.

59) Histor. ascarid. path. p. 232 sq.

60) Journal de Medecine. Tom. XVIII. p. 443.

61) HEISTER Medic. u. chirurg. Wahrnehm. obs. 372.

62) Comm. Nor. A. 1731. p. 385.

63) E. N. C. Dec. III. A. II. obs. 103.



lepsi subito correptam vidit ill. VAN SWIETEN <sup>64</sup>) feminam, dum nuces castaneas in sartagine torrebat, illico ad se redeuntem et in opere incepto pergentem, postquam binos vermes teretes viuos euomuerat; et de puella narrat DODONAEUS <sup>65</sup>), quae sex iam diebus catocho correpta iacebat, unico vero suppositoio, quod aluum irritabat et lumbricorum copiam educebat, restituebatur. Nulla itaque fere concipi possunt corporis agitationes, gesticulationes, nullae conuulsionum species, quas interdum vermes non producere possint. Probe interim cauendum est, ne quascunque conuulsiones, quas forte vermium signa comitantur, pro verminosis habeamus, et statim et unice vermifugis remediis aggrediamur, omnia enim fere vermium symptomata, recte notante, cl. ANDREE <sup>66</sup>) etiam ab aliis causis provenire possunt; neque si ipsos vermes siue per superiora siue per inferiora exire videamus, semper cum certitudine affirmare licet, quod hi morbi auctores sint; alia enim forte adest acris materia in primis viis, quae vermes exire cogit, uti toties in febrilibus morbis videmus, in quibus saepe vermium copia ob acrimoniam intestinalium humorum aluo excernitur, licet etiam his expulsis vehementia febris minime minuatur; quin per ipsum morbum, spasmodicas nimirum ventriculum et intestina non minus ac externa membra afficientes contractiones, vermium nidus destrui ipsique ad exitum impelli possunt; aequali ratione ac in animi affectibus contingit, nullo enim tempore facilius vel sponte vel post propinata anthelmintica vermes expelli, quam quo corpus vehementioribus animi affectibus excitatur, plurimae experientiae docuerunt cl. VAN DEN BOSCH <sup>67</sup>); praeterea verminosa colluies saepe, uti egregie monuit ill. ZIMMERMANN <sup>68</sup>), effectus conuulsionum praesertim epilepsiae sunt, sensim enim vehementia et diuturnitate morbi debilitatur gastricum systema, deficiunt coctionis vires, bilis iners redditur, hinc pituitosae cruditates, vermium pabulum. Sed si etiam certissima morbi ex vermibus originis indicia aessent, errant tamen et saepe nocent, qui omne medelae punctum in illorum expulsionem ponunt, et hoc sine fortioribus purgantibus abutuntur; sedatis enim licet paroxysmis, cito tamen redibunt, nisi praecipua verminosae colluiei causa, depravata et debilitata nimirum digestio, corrigatur; neque raro contingit, quod morbus remaneat licet vermes sint expulsi, exacerbetur, ubi ulterius purgantibus insistitur, dum nimirum neglectum fuit, diutius aliquando generi nervoso impressae manentes turbas efficacioribus nervinis compescere, sopire, nimiam eius sensibilitatem roborantibus minuere; sic HOFFMANNUS <sup>69</sup>) de puero narrat conuulsivis motibus et aphoniam ex vermibus prehensum, expulsa vermium copia plurima symptomata cessabant, sed aponia pertinax remanebat, usque dum anthelminticorum cum nervinis conuulsiuum institutum fuerat. Potest vero etiam in eo medicus falli, ut morbum aliae causae adscribat, qui verminosus est; quia forte vel antea vel in praesenti nullis vermes

V v 2

sefe

64) Comment. in Aphor. BOERH. T. III. p. 316.

65) Curat. exempla rara. p. 19.

66) Cases of the Epilepsie, hysteric Fits and St. Vitus Dance. London 1746. p. 22.

67) Hist. constit. epid. vermin. p. 180. schol.

68) Von der Erfahrung. Th. 2. p. 137. 138.

69) Opera. T. III. p. 250.

fese prodiderint signis; at per multos saepe annos vermes quieti in corpore habitant, nullaque symptomata excitant, usque dum occasionalis causa accedat, quae aut ipsorum domicilium destruit, aut nutrimento ipsos priuat, vocabatur cl. ANDRY <sup>70)</sup>, ut curaret epilepsiam infantis ex terrore natam, omnibus rite perpenſis, anthelmintica praescribat, ridebant adstantes et reiiciebant hoc consilium aliis omnino remediis morbum ex terrore natum oppugnandum existimantes, tandem persuasi illud accipiebant, et dato medicamento, eiectione vermium multitudine, infans sanabatur. Simili remedio epilepsiam ex eadem causa ortam, expulsis vermibus, fustulit THOMASIVS <sup>71)</sup>.

Sed ad alias consensualium conuulsuorum affectuum causas progredimur; quod enim de aliis affectionibus capitis sympathicis notauimus, eas nimirum interdum a nulla acri primarum viarum colluue, sed a sola ipsarum nimia irritabilitate et sensibilitate dependere, idem etiam de conuulsionibus quibusdam valet. Ex hoc fonte oriuntur plerumque conuulsiones hysteriarum, et non tolluntur emeticis, purgantibus, nisi forte causarum complicatio adsit, sed remediis, quae spasmos abdominales citissime sopiunt, primarium morbum tollunt <sup>72)</sup>; grauissimas tales hystericas conuulsiones obseruauit HUCKELIUS <sup>73)</sup> in femina quadam, diu noctuque frequentissime recurrentes, et per quatuor fere hebdomadas uno tenore continentes, quae semper ex dolore in hypochondriis initium sumebant; similes conuulsiones GALENUS <sup>74)</sup> obseruauit in iuvene quoties seueriora cogitabat, aut inedium patiebatur, aut irascebatur, et remediis stomacho robur conciliantibus sanauit. Ex eadem causa etiam oriuntur periodicae illae conuulsiones, epilepsiae, tetani, quae aut febrium intermittentium paroxysmis accedunt <sup>75)</sup>, aut illas suppressas excipiunt <sup>76)</sup>, aut sine ulla praecedente vel comitante febre periodice decurrunt <sup>77)</sup>; licet enim interdum simul ab acris foridibus dependant, ex his expulsis aut mitigentur aut soluantur, saepius tamen illis licet expurgatis, persistunt, et nullis remediis, nisi specifico suo cortici peruuiano cedunt. — Etiam plethora vasorum abdominalium, indeque nata neruorum tensio, frequens conuulsionum causa est. Hinc interdum oriuntur conuulsiones ex suppressione fluxus menstrui; sic virginem ex cessatione fluxus menstrui epilepticam factam fuisse narrat HELWICH, et ex subita eiusdem per refrigerium pedum suppressione ex instante tetano oriri vidit MAILHOS <sup>78)</sup>; similem tetanum ex suppressione fluxus lochiorum in sensili femina obseruauit ill. HIRZEL <sup>79)</sup>, Fautor et Praeceptor meus aeternum colendus. Non minor tamen cautio, ac supra de verminosos diximus, in iis conuulsionibus, quas ex suppressione mensium ortum duxisse audimus, adhibenda est.

Nam

70) Unterricht von Erzeugung d. Würmer im M. C. p. 104.

71) E. N. C. Dec. III. A. III. obs. 191.

72) SYDENHAM opera. T. I. pag. 257.

BOERHAAVE Praelect. de morbis neruorum. pag. 666. 660. WHYTT l. c. p. 231.

TISSOT de valetud. Litterat. p. 14.

73) Commenc. Nor. A. 1737. p. 386.

74) De loc. affect. L. V. C. 5.

75) MEDICUS Gesch. period. Kr. p. 203. Sammlung von Beobacht. II. B. p. 66. sqq.

76) Eiusdem Geschichte period. Kr. p. 212. sqq.

77) Ibid. Eiusdem Brief an H. ZIMMERMANN p. 50. 51.

78) Journal de Med. T. XVIII. p. 350.

79) ZIMMERMANN von d. Erfahr. II. Th. p. 425.



Nam etiam hic causarum plurium complicatio saepe occurrit, et non raro epilepsiae, quae illi causae adscribuntur, potius intestinalium sordium effectus sunt. Quibus enim fluxus ille supprimitur, non raro secretiones humorum perturbantur, hinc et ob solennes in his abdominales spasmos, sordes in primis viis facile generantur, digestio laeditur, spasmodorum causa noua producit. Non raro quoque ipsa fluxus menstrui suppressio cruditarum intestinalium effectus est, et illis expulsis, tum euacuatio haec redit, tum symptomata cetera, quae huic adscribebantur, cessant; quare recte monuit CHEYNE<sup>80)</sup>, ut antequam in harum conuulsionum curatione fluxus restitutioni studeamus, sordes intestinales remoueamus, et tum demum, si opus sit, emmenagogis utamur. Etiam vermes, praecipue ascarides, iis feminis frequentiores sunt, quibus fluxus menstruus est suppressus, ergo etiam ad illorum praesentiam est attendendum<sup>81)</sup>, vidit cl. HIRSCHL<sup>82)</sup> feminam pertinaci vexatam epilepsia, quam ex menstruorum suppressione prouenire ipse crediderat, sed cum clysteribus et purgantibus multa colluies cum vermibus aluo expellebatur, eo facto epilepsia euanescebat, et menstruus fluxus restituebatur. Ex plethora abdominali una cum aucta neruorum abdominalium sensibilitate etiam oriri videntur conuulsionum illae, quae grauidis interdum molestae sunt, puerperio vero sponte soluuntur, atque his certissimum grauiditatis signum prebent<sup>83)</sup>; licet omnino etiam ceterae conuulsionum consensualium causae in grauidis locum habere possint; sic emprosthotonum et clonicas conuulsionum in grauida quadam saepius recurrentes, anthelminticis vermium copiam expellentibus sanatas vidit HARDERUS<sup>84)</sup>. Ob eandem plethoram abdominalem haemorrhoidales colicae interdum epilepsias excitant<sup>85)</sup>. Frequentissima quoque conuulsionum chronicarum origo est ex obstructionibus viscerum abdominis, praesertim hepatis, his enim digestio laeditur, sordes producantur, sanguinis circulatio per abdominis vasa difficilior redditur, nerui tenduntur, irritantur. Hinc epilepsiae, quae ex ante dictis causis initium duxerunt, toties incurabiles fiunt, ubi ex neglecta ad illas causas attentione spasmodorum vehementia viscerum illorum secretio perturbata, varia ipsis vitia, tumores duri, scirrhi inducti fuerunt, difficillime postea tollenda. Hinc si mitiores fuerint obstructiones, solis remediis, quae illas tollebant, mobiles sordes educebant, viscerum functiones integras restituebant, epilepsiae aliaeue conuulsionum sunt sublatae; neque enim aliunde venire videntur miri illi effectus, quos contra chronicas epilepsias interdum praeslitterunt, serum lactis<sup>86)</sup>, sapo hispanicus<sup>87)</sup>, venetus<sup>88)</sup>, fel caninum<sup>89)</sup>, bouinum, urinum<sup>90)</sup>, specificum illud WEIS-

V v 3

MAN-

80) English Malady. p. 422.

81) observante BISSSET Essay on the Epidemical constitution of Great-Britain. p. 332. 333.

82) Von der fallenden Sucht. pag. 49. sqq.

83) SCHENCK obs. med. p. 112. E. N. C. Dec. II. A. VIII. p. 229. A. X. p. 160.

84) E. N. C. Dec. III. A. II. obs. 103.

85) A. N. C. Vol. X. obs. 58.

86) quo se ipsum diuturna epilepsia curauit D. TAYLOR. vid. CHEYNE English Malady. p. 253.

87) CRANZ Mat. med. T. II. p. 77.

88) COHAUSEN in N. A. N. C. Vol. II. pag. 36.

89) MARTIUS observ. med. obs. 45.

90) HOFFBERG et WAENERBERG Schwed.

MANNI<sup>91)</sup>, pulvis digestivus UNZERI<sup>92)</sup>. Hinc forte est, quod solo rutae succo cum oxynelle scillitico epilepsias tollere contigerit VALLERIOLOAE<sup>93)</sup> salivatione mercuriali ACOLOUTHO<sup>94)</sup>, pilulis balsamicis STAHLII Pastori cuidam<sup>95)</sup>, minoribus sed saepe repetitis ipecuanhae dosibus MAYERO<sup>96)</sup>, (nisi forte rationibus cl. AIKEN-SIDE<sup>97)</sup>, non convincentibus quidem, ductus, huic plantae nervinam antispasmodicam specificam vim attribuire velis). Hinc etiam tanta utilitas, quam ex sanguinis e venis, quae ad anum sunt, detractio in epileptico quodam expertus fuit cel. MORGAGNUS<sup>98)</sup>, qua quippe plethora vasorum meseraicorum minuebatur. Hinc tandem forte est, quod ipsa natura diuturnas interdum epilepsias sanaverit, dum huius morbi vehementiorem produxit paroxysmum; vehementibus enim sub illo contingentibus omnium partium concussibus; quod stagnauerat solutum, mobile reddidit; sic TULPIUS<sup>99)</sup> gravissimum paroxysmum epilepticum ultra quinque dies perseverantem, morbum per plures annos quotidie affligentem sustulisse vidit; simili modo etiam quartanae febres epilepsias sanasse visae sunt, quale exemplum refert LANZONUS<sup>100)</sup>.

Tandem quaecunque alia irritamenta nervis abdominalibus applicentur, exinde convulsivi motus oriri poterunt. Hinc convulsiones, epilepsiae, tetani, ex calculis vesiculae felleae, renum, vesicae, non raro sunt observatae. Sic in femina, saepius epilepsia vexata, subito tandem mortua, ne minimum in cerebro vitium, sed ultra CC. calculos in vesicula fellea, et totum systema vasorum abdominalium atro sanguine turgidum inuenit FABRICIUS<sup>101)</sup>. DE LA MOTTE<sup>102)</sup> refert exemplum epilepsiae post calculorum quinque cum urina exitum sanatae; et in alius, qui convulsionibus epilepticis exstinguebatur, cadavere nil praeternaturale in capite, sed in pelvi renis dextri triangularem calculum quinque drachmas pendentem inuenit<sup>103)</sup>. Similes epilepsias et convulsiones calculosas describunt HELLWICH<sup>104)</sup>, PECHLIN<sup>105)</sup> et alii. Immo tetano crudeli corripiebatur puer vesicae torminibus ex cruciatus, quoties in pulvinar reclinabat, in huius vero cadavere calculum, quo vesica urinaria adeo detrita et pure consumpta erat, ut lotium receptaculo destitutum in abdominis cavitate libere fluctuasset, reperit TULPIUS<sup>106)</sup>. Cauendum vero est, ne in diagnosi convulsionum calculosarum fallamur neque unice ad calculos in curatione respiciamus; saepe enim ex irrita-

Schwed. Abhandl. A. 1765. Trimestr. IV. art. 8.

91) Nov. A. N. C. Vol. I. obs. 67.

92) Der Arzt, eine medicinische Wochenschrift. Th. VIII. p. 77.

93) SCHENCK Observat. med. 118.

94) E. N. C. Dec. II. A. IX. obs. 166.

95) HANNERMANN Diss. de specifico antiepilept. nouo.

96) E. N. C. Centur. VI. obs. 58.

97) Commentar. de dysenteria. Lond.

1764. et Medical Transactions. Vol. I. p. 93. sqq.

98) De sed. et caus. morb. Epist. IX. art. 7.

99) Observ. med. L. I. c. 9.

100) E. N. C. Dec. III. A. III. obs. 3.

101) A. N. C. Vol. X. obs. 36.

102) Traité complet de chirurgie. Tom. II. p. 20.

103) Ibid. p. 416.

104) Observ. phys. med. p. 108.

105) Observ. phys. med. L. II. obs. 29.

106) Observ. med. L. III. c. 2.



irritamento quod in primis viis est, fordibus, vermibus; ob consensum harum partium cum renibus et vesica, alibi enarrandum, urinae ardor, stillicidium, retentio, lumborum dolor, priapismi, aliaque symptomata, quae calculosis solennia sunt, oriuntur et cum epilepticiis et conuulsivis motibus coniunguntur. Tales conuulsiones cum dictis symptomatibus iunctas, quas frustra antinephriticis remediis tractauerant alii Medici, expulsis lumbricis ascaridibusue curarunt PECHLIN<sup>107)</sup> et cl. VAN PHELSUM<sup>108)</sup>. Iplis etiam spasminis, quos calculi excitant, non raro systema biliarium in consensum ducitur, maior bilis copia in intestina effunditur, quae ibidem stagnans, corrupta, calculorum symptomata augere, fouere, noua producere potest, quae non perfecte tolluntur remediis calculis oppositis, nisi simul ad fordes illas attendatur; hinc femina quaedam, quae nephriticis doloribus vehementibus excruciabatur, assumpto opio adeo non leuabatur, ut potius in conuulsiones epilepticas inciderit, omnia cessabant dato vomitorio<sup>109)</sup>. Ad illa irritamenta etiam pertinent metastases acris materiae ad viscera abdominis; sanies exulceratarum earundem partium; sic in nobili femina, quae annos retro plures epilepsia et passione hysterica laborauerat, praeter pancreatis ulcus nil vitiosi in corpore inuenit HIGHMORUS<sup>110)</sup>; simile pancreatis ulcus in aegrae per plures annos ad conuulsivos affectus procliuis cadauere inuenit BLASIUS<sup>111)</sup>. Multae ergo sunt et diuersissimae conuulsionum consensualium causae, in quibus omnia remedia, vitiis capitis idiopathicis opposita, inutilia, omnia specifica, et methodi, quae inanis iactantia contra conuulsiones quascunque laudat, inania esse, aperte patet.

Utinam ergo, (hoc BAGLIVI<sup>112)</sup> voto tractationi nostrae finem imponere liceat), Medici omnium aegrorum hypochondria statim attenderent in morbis! pauciores certe committerent errores, quam non faciunt, sprete hypochondriorum observatione. Qui bene nouerit hypochondriorum statum in morbis, quam bene curare nouerit, quam bene praefagire.


107) l. c. Lib. I. obs. 65. L. II. obs. 29.

108) Hist. ascar. path. p. 162 — 175.

109) BECKER de submerforum morte  
sine pota aqua. Append. obs. 4.110) LIEUTAUD Hist. anat. med. P. I.  
obs. 1053.

111) ibid. obs. 1054.

112) Opera pag. 62.



## XVII.

CHRISTI. GUILIELM. HENR. DE MARÉES  
DE  
ANIMI PERTURBATIONUM IN CORPUS  
POTENTIA.

G O T T I N G A E 1775.

## §. I.

## PROOEMIUM.

**S**i doctrinae cuiusdam dignitas ex eorum numero aestimanda est, quae ipsius cognitionem postulant, vel inde ceu consequentiae fluunt, maxima sane erit illius de animi affectibus, quae in omni medicinae ambitu latissime patet. Siue enim effectus consideres, qui naturae eorum debentur, quibus, quotquot sint corporis sani functiones, immutare valent, et ad modum agendi mentem aduertas, quantum fieri possit, exponendum, eos haud leue fateberis atque perplexum sistere medicae theoriae momentum; siue ad morborum historiam respicias, grauius adhuc iudicabis, cum vix ullus reperiatur, cui in praedispositis erumpendo non praebeant occasionem. Verum et eorum, quorum prima fundamenta struunt, haud paucis numeris circumscripta est series, sunt, iique dirissimi, quibus non alia causa subest. Qui sicuti omnem medelam respuunt, nisi latentem illam mentis affectionem, et obscure plerumque vitae insidias parantem detegeris atque remoueris, ita hac sublata vix alio saepius remedio indigent. Quod quamquam arduum sit, summamque perspicaciam non minus, quam profundam animi corporisque functionum notitiam requirat, haud aliud tamen magis medici famam diuulgat, nomenque posteritati tradit. Sic ex tantis immortalis Boerhauii factis vix ullum frequentius in medicorum scriptis celebratum leges, quam Harlemensium illam orphanorum historiam, et lateret forte adhuc ERASISTRATI nomen<sup>1)</sup> nisi ipsius in Antiochi detegendo amore sagacitas digna existimata fuisset, quae a tot veterum memoriae proderetur. Ac cum et ab his abstrahis, solumque aegri statum perpendis, ubi animus, viribus iam fractis, eo magis pathematum tyrannidi pateat, vide sis, quis sit, quae ad morbum propellendum propinuas, remediorum effectus, quam imbecillis, si illorum potentiae comparètur! Quid spe atque fiducia magis sanguinis neruorumque tumultus sopit, vel quid iam excitantia iuuabunt, ubi profundus moeror vitales motus sufflammat, ne opii quidem virtute superandus? Quare et veteribus familiare est, eorum mentionem facere, quae beneficio animae in corpus agunt. Inde HIPPOCRATIS huc et illuc data consilia, mouere frigidis

1) Multum nomen cum facto conuenit, *Ἐραστὶς* et *σπασμὸς*?



frigidis iram, vel diligentiam adhibere, ut commotio animo inducatur, quae polleret ad opposita corporis vitia oppugnanda. Inde frequens in morbis musices commendatio et eorum, quibus potestas est animum exhilarandi. Quos qui hodie imitaretur, ac incautius ab eiusmodi remediis subsidia peteret, quoniam multum periclitaretur, ut, ne dicam sana eius phantasia, minimum scientia in dubium vocaretur, ea id circo spernuntur a plerisque, ac extra quasi artis limites posita spectantur. Verum, qui non in lucri gratiam, vel in gloriolam aut ostentationem, artem exercet, sed qui cogitat, de hominis hic vita agi, neque indigna attentione sua arbitratur, quae ad individuum faciunt, non ex corporis solummodo constitutione, sed et ex mentis facultatibus atque curis, petita; qui demum reputat, quantum hic valeat medici auctoritas, qui animi ipsius elateres ad suam voluntatem flectere inque morbi auxilium vocare callet, haec profecto non adeo leuia putabit. Hic enim, ut eo sensu magni viri verbis utar, plus saepe valebit paullo subtilior observatio, quam peregrinorum, conquisitorum, et multa arte compositorum medicamentorum usus, et prudenter haec usurpata prae omnibus valebit ad aegrorum sibi amorem atque fiduciam conciliandam. Id quod et voluisse puto, quem principem poetam non minus quam medicum omne aeuum mirabitur, cum virum laudaret, cuius in conspectu iam aeger subleuetur, quocum et spes redeat et sanguinis turbae compescantur. Sed quare plura de materiae dignitate, de qua nemo dubitat, quae potius extenuanda foret, ne nimium confidentis videretur, illam sibi proponendam fuisse? Bene multa de illa scripta sunt, quorum bonam partem legi. Placuit tamen meis verbis cogitationum mearum seriem prosequi potius, quam aliorum elocutionibus congerendis lectorem fatigare. Quod et in causa fuit, quare minus arriserit argumentum, ubi propria experientia destitutum undique colligere necesse est, et ex undeuiginti, ut aiunt, libris vicesimum constare. Quae vero non ita intelligi vellem, quasi in alterius culpationem dicerentur. His etenim et suum haud leue meritum esse, et maximam difficultatem, non ignoro, modo ne quae iam melius et pulcre dicta sunt, confusius, ut plurimum fit, et crudo negotio, sed ita pertractentur, ut sibi ipso ordine documento sint, lucemque sibi inuicem positae affundant, quam singula non habuissent.

## §. II.

### *Differentia inter ideas mouentes et affectus.*

Nullibi vero magis philosophiae medicina conterminat, quam ubi de affectibus agitur. Altera in alterius regiones quasi excurrat, petatque notiones, oportet, ut suas inde illustret. Quippe illa, dum, quae affectu quodam regnante eueniunt, explanare cupit, haud minus corporis motuum notitia opus habet, quam haec, si, quae in tantos cieat tumultus organa vitalia, velit cognoscere. Verum cum psychologia hic sensum a placentium ac displicentium notionibus ad illas affectuum transeat, crederet, qui scripta medicorum peruoluit, medium vix esse ideas inter, qui sanguinis motus intactos plane relinquunt, et, qui summas excitant commotiones, affectus. Neque minus tamen cuius idearum generi sui motus respondent, neque parum hic

faciunt, ut morborum immutetur decursus. Ex altera parte magna earum est vis ad permulcendas animi perturbationes, aegrumque a funesta quadam idea auocandum. Ipsum enim affectum excitare vel praesentem quemdam contrario expellere, neque facile in medicorum potestate est, neque, si esset, ingens, quo comitaretur, periculum permetteret. Itaque liceat rem quam paucissimis altius repetere.

## §. III.

*Harum idearum effectus in corpore.*

Cogitationem quemuis comitem in cerebro habere mutationem quandam, dum inter omnes constitit. Quae, quoad indifferentia circum versatur, aut simplicem tantum rationis assensum sibi vindicat, non videtur influere in sanguinis motum, nisi quod eum versus cerebrum magis congerat, vel accedente quadam causa externa, vel irritationis cuiusdam vi, quae ibi locorum obtinet. Sed pone iam, inter meditandum te vel legendum veritatem offendere, nouitatis specie fulgentem, grauiumque confectariorum numero uno quasi intuitu mentem tuam ferientem, iam multum diuerse se cuncta habent, calore uniuersum corpus perfunditur, facies efflorescit, oculi splendent, quietis quaedam impatientia sentitur, adeo, ut loco affixus permanere vix possis. Idem, paulatius tantum, percipies, si libri alicuius lectioni voluptate quadam inhaeres, perspiratio cum sanguinis motu sensim increfcit, digestio promouetur, omnium sensuum alacritatem experiris. Verum cum in locum incidis, ubi frigesceat opus, minimeque temporis longitudinem fallit, quam contraria nunc cuncta eueniunt! Rubor genas calorque deserit, facies marcescit, lento humores gradu promouentur, ipse tandem, si perduras, somnus obrepit. Quis esset hic, quem proprie affectum diceremus? attamen adsunt motus, iique similitudine haud parum ad illos pathematum accedentes. Si vero in istius vis rationem inquiramus, si eruere velimus, quid illis insit, quare talem praestent effectum, ea ut plurimum reperiemus ita comparata ac disposita, quae vel splendidam utilitatis speciem vel novam rerum faciem ostendant, quae veluti depingant artificis ingenium, virtutem effigiei instar ob oculos ponant, aut quasi tabulas sistant rerum narratarum; quae, ut verbo dicam, viuudas excitent ideas. Harum enim solummodo est sensum internum ciere, et mediante hoc mouere imaginationem, qua et ad nos ea referimus, nostras, in illis aliorum, qualitates agnoscimus, vel grata imagine ad concupiscendum inducimur. Hinc igitur illa, quoad circulationem humorum, differentia inter ideas, quae animum non afficiunt, easque, quae placent displicentiae. Saltum vero cum natura non faciat, singulisque perceptionibus debeatur, qui in toto magis tantum animaduertitur, effectus, absque erroris exprobratione concludi posse spero, viuuda quauis repraesentatione alienari cordis arteriarumque motum, quanquam ita leuis sit saepius mutatio, ut vix, ac ne vix quidem, apperipiatur.

## §. IV.



## §. IV.

*Ex illis origo affectus, eius et pathematis notio.*

Multum vicissim discriminis hic obtinet, inter quae sola tantum forma vel rationali quadam perfectione admirationem sui iniiciunt, vel quae desideriis nostris blandiuntur, atque ut bona a nobis spectantur. Illa enim, quavis vice qua iterum occurrunt, nouitatis iam gratia exuta, sua animum mouendi virtute magis spoliantur, cum horum contra ea sensus nunquam redeat, quin flagrantius illud reddat. Id quod non minus in oppositis deprehenditur, iis quippe, quae sua tantum deformitate laedunt, in dies magis oculus adfuescit, verum quae mala nobis sentimus, si ulla saltem potestas auertendi supersit, nunquam non impatientius feruntur. Utrumque igitur, cum ipsius, quotiescunque reuertitur, diuersitas magis, cumque aliis congenientia, attendatur, inclinationem sui vel fugam creat, quae tandem et in absentia obiecti perdurat, et ad congeneres species extenditur. Quae, dum, pro subiecti indole, alias sensim sensimque exsuperat, atque omnem in se cogitationem vertit, in affectum euehitur. Hic vero a pathemate, ut generis ab individui notione, differt<sup>2)</sup>, ad plures enim cognatas formas spectat, quarum quoad nulla alteri praeualet, in aequilibrio animus persistit. Verum cum indiuiduum eius generis iam propius se animo intuendum praebet, totumque in se conuertit; tum, tenendi cupidine vel fugiendi raptus, ad actionem propellitur, inque pathos transit affectus.

## §. V.

*Quid temperamentum conferat.*

Pro subiecti tamen varia conditione multum discrepant affectus ratione formae, facilitatis concipiendi, roboris atque durationis. Magna hic vulgo vis adscribitur temperamento, quod pro diuersitate sua ad diuersos quoque disponat; et ex quatuor illis, quae pro veterum diuisione assumebantur, cuius fere proprium pathematum genus tribuebatur. Sic, quod sanguine diues fluidiori *sanguini* nomine veniebat, voluptati et laetis in genere affectibus propitium, quorum vero biliosis partibus abundarent humores, et qui *cholericis* inde dicebantur, eos irae potissimum obnoxios putabant. *Phlegmaticum* ex aquearum partium ubertate, indolentia prae caeteris conspicuum, ab omni affectu liberum credebatur. Tristitiae autem praecipuae opportunum statuerant, quod melancholici cognomine distinctum fuit, quasi ad illud tantum pertineret morbus, cuius in atrabile causam ponebant. Quod vero cum alii viderent tantum abesse, ut tristi solummodo cogitatione seduceretur, ut eorum numerus haud exiguus reperiatur, qui, laetis phantasmatibus indulgentes, extra sanae mentis cancellos vagarentur, illi quidem fibrarum praeterea rigiditatem quandam adscribere. Quae de causa, quae afficiat istos, iam grauioris momenti res esse oporteret, qui vero, cum semel obiecti alicuius cupidine tenerentur, vix nisi satiati desistant, adeo ut et, cum

X x 2

citra

2) Ita quoque distinguit ill. ZIMMERMANN *Erfahrungen* 2ter Th. p. 431. citatur (A

citra illorum vires, vel omnem denique consequendi possibilitatem sit positum, delirant potius, imaginando possessionem illius, quod votis erant prosequuti. Hanc vero desumptam a sanguinis qualitate diuisionem Perill. von HALLER<sup>3)</sup> merito reiecit, cum temperamento saepius diuersissimi essent, quibus tamen eadem sit sanguinis indoles, et vicissim magna in eodem homine, quoad mixtionem humorum, discrepantia, quae aliis atque aliis temporibus haud raro obtineret, istud nequaquam simul subuerteret. Igitur illa, pro modo irritabilitatis solidarum partium atque roboris, dispartitus est, ita ut *cholericum* vocaret, quod et fortibus fibris gauderet et apprime irritabilibus; cui autem cum his debilitas esset coniuncta, *melancholicum*. Robur autem absque irritabilitate constituere *boeoticum* temperamentum, simile illi veterum melancholico<sup>4)</sup>, *phlegmatico* denique conuenire naturam haud irritabilem partium solidarum, una cum ipsarum debilitate. Quae certe pulcherrima diuisio haud tamen omnes numeros implere mihi ad minimum videtur, cum peculiaris quaedam hominum classis illa excludatur, ac digna, quae proprium locum occupet, ea nempe quam veteres sub *sanguineo* temperamento comprehenderent; leue caeteroquin genus, ad omnem impressionem mobile, nullius tamen tenax, verum in eo felix, ut raro de commotionibus, quibus pateant, valetudo eorum detrimenti quid capiat. Hoc autem temperamentum licet et debiles sibi fibras et sensiles vindicet, toto coelo a *melancholico* differt, cui proprius paene est profundus cuiuscunque mouentis obiecti sensus, atque ea plerumque sanguinis partiumque solidarum conditio, quae facilius ad morbos disponat, qui moestitiam fere semper comitem habent. Istius vero affectus et ex sua natura subiecta huius capacissima sunt, et in hoc plane a sanguineis diuersa. Sit enim quod in universum mixtis hoc sensibus, qui nec sua dulcedine carent, competat, ut mentem pertinacius affixam sibi teneant, siue quod nihil humani alienum sibi putent, aliorumque calamitate ut sua afficiantur, quodque mens conscia recti altius iniuria hominum affligatur tristitiae saepenumero praeda, irreparabilem sanitatis cladem contrahunt. *Cholerici* caeterum ac *Phlegmatici* nunc quoque, quae olim, qualitates manent, illi, quanquam leuia plerumque spernant, attamen, ubicunque commouentur, ceu fulgure tacti, in flammam erumpunt, sanguineque moimento in vehementes fluctus concitato, maximum sanitatis periculum subeunt, nullius tandem rei temperaturam adhibentes, siue in voluptatem seu dolores, siue in vitia, seu virtutes ferantur. Hi vero, ob lentos humores internique sensus hebetudinem, nec frequenter animi perturbationibus obnoxii, neque magnam illarum potestatem experiuntur. *Boeoticum* vero gentem sistit, quae nullius nobilioris perceptionis compos, ac omni ideo socia affectione destituta, nil nisi sui commodi causa facit, sensuumque pinguium lenociniis ducta, sordidis ut plurimum libidinibus curisque obtemperat. Id autem vix necesse est ut commemorem, rarius inueniri homines, cui hoc vel illud temperamentum peculiare sit et quod a nullo alio participet, sed plurimam partem, inter quae affinitas intercedit, sibi inuicem vario modo ac proportionem misceri. Deinde ea potius

3) Elem. phys. Tom. II. p. 147.

4) Proprie quidem boeoticum ab ipsis cum vero melancholico confundebatur.



tius ad affectuum in genere capacitatem conferre, ut celerius illi suscipiant, hi violentius exardeant, aut susceptum foueant magis ab omni studio tueantur.

## §. VI.

*Aetas, valetudo, vitae genus, sexus.*

Aetas, quoad animi impetus, ac, qua illis patent, facilitatem, multum cum temperamento conuenit, vel potius illud pro mutatione sua quodammodo variat. Quanquam enim et in infante pueroque iam proprium agnoscas, ex humorum tamen abundantia et fluiditate, neruisque ac fibris sensilissimis et ad omnia mobilibus, licet cholericum fore praeuideas, usque dum ad sanguineum magis accedit. Idem, cum prouecta nunc aetas fibris rigiditatem, spissitudinem sanguini, conciliat, pro debilitate illarum aut robore, melancholico vel boeotico propior, nonnunquam adeo in extrema senectute, stupentibus neruis musculisque ceu paralyticis, ad omnia indifferenter se commonstrans, phlegmaticus dici certo respectu potest. Tunc vero iam morbus adest, et horum, ut sanitatis, summa fane potestas est, ad varias animum disponendi commotiones. Sunt enim qui plenarie temperamentum euertant, tardum hunc in viuacem mutantes; stupidum contra reddentes, qui superato morbo summam ingenii alacritatem ostendit; qualia praesertim in rachitide infantum, vermibusque, animaduertuntur. Generatim vero, ubi valetudo floret, corporisque robur sentitur, ad laetitiam procliuis animus, in oppositos vicissim affectus summa facilitate ruit, cum aegritudo urget, viresque percipiuntur fractae. Cuius quidem in aperto est ratio; quippe cum perpetua fere opus sit contentione, ut aequa mente ferantur molesti illi sensus, quibus corporis imperfectio afficiat, levis tantummodo sit, quae accedat, externa offensus, ut patientiae exsuperet modum, vixque iam tolerata frena excutiantur. Ubi si nulla amplius proportio obtineat in tam futilis causae effectum, id communi humanae mentis tribues errori, quae in alterius iniuria quaerat, cuius in se ipso latitet ratio. Quo etiam referes suum infantum, qui statim a natiuitate valetudinarii, iracundiam, morumque prauitatem; tantum ut consuetudini suum vitaeque conditioni adscribas, qua, superato saepius taedio, et in aduersis tandem mens tranquilla persistit, vel stimulo iterum iterumque cedens effraena tandem, omnisque modi impatiens, ad leuissima quaeque exasperatur. Denique et sexus, dum hanc vel illam sibi magis constitutionem crasque appropriat, sanguine particulis fluidioribus diti fibrisque debilibus et laxis, vel summa sensibilitate dotatis, frequens, sed in mitiores, fertur affectus, qui pertinaciores in altero et efferri, quod robore musculorum praecellit, sanguineque, ob resistentiam vasorum, ad maximam impetus vehementiam apto.

## §. VII.

*Quae affectuum in motu humorum diuersitas.*

Superius iam mentio facta est motuum, qui ideas comitantur viuidas et mouentes, qui diuersi scilicet, sibi contrarii, pro differentia illa, qua vel allubescunt animo afficientes rerum imagines, vel aegre ab eo feruntur. Ab his haud discrepant

illi, quibus animi pathemata stipantur, nisi gradu; ceu aura, quae crispatur modo superficie maris, a turbine, qui in summos attollit fluctus. Horum vero duplex tantum forma est, quanquam varient in causa et diuersimode modificentur; vel enim ad superficiem accumulatur sanguis, et plerumque simul velociori cursu properat: vel praecordia magis premit, et segniter ut plurimum vasa perrepat. Illud laetis in genere affectibus conuenit, attamen non solum his; sunt enim, qui oppositis adnuenerantur et tamen id sibi vindicant: hoc tristibus tantummodo proprium est. In quo adeo quidem sibi constans natura reperitur; ut qui ab exteris, vel corpori modo inhaerentibus, similes procreentur motus, vicissim et sensus comites habeant ad illorum similitudinem accedentes.

## §. VIII.

*Signa externa in genere. Physiognomia.*

Exterius nunc quoque se, suamque diuersitatem, manifestant animi affectus, dum pro illa vi, qua in corpus et organa inprimis vitalia praepolleant, humorum, ut dictum est, immutant cursum, in consortium tamen quodammodo et musculorum actionem trahant. Quo quidem efficitur, ut sanguis, nunc ad externum ruens habitum, vasaque expandens, ipsum reddat turgidiorem, cutimque, capillaribus tubis repletis, ubi transparentior est, altiori colore tingat; nunc in penetralia refugiens, collapsis vasis, marcorem corpori, cuti pallorem, inducat. Iisdem vicibus oculi, iam humoribus scatentes, ceu in maiorem orbem distensi, grato nitent splendore, vel prominentes scintillant quasi; iam, succis et sanguine orbat, in caua sua se magis abscondunt, corneaeque laxiori veluti nubecula obducta, languidi apparent. Respiratio itentidem hic oppressa et suspiriis se tantum prodens, vel citatis motibus quasi aera captans, liberior illic et profundior conspicitur. Ad quae cuncta haud minus diuerse se muscoli gerunt, inquieti et alacritate sua conspicui, cum per superficiem corporis sanguis vagatur et functiones intendit; cum vero ad praecordia reuoluitur, quasi impotentes motus et emortui: vel rigidi aut tremore concussi. Potiorem tamen partem ad designandum affectus characterem sibi vindicant, qui in facie, cuti maximam partem inserti et ad omne punctum mobiles, dum sanguine, ipsaque, sed moderata, actione tument, insuper quod cutim ad quamuis directionem explanent, gratioribus lineis ambitum suum circumscribunt, et iucundum faciunt aspectum; dum vero sanguine vacui et flaccidi, seu violentius contracti, cutim rugis asperisque lineis deuenustant, tristem vultum aut formidolosum reddunt. Quae simul sumta adeo ad scopum suum consentiunt, ut nulla non animi commotio certissimis signis in facie legatur, quae nec infantes quidem fallant, qui, quamuis nihil adhuc ab ira hominum perpassi sint, ad irati tamen conspectum gestibus lacrymisque formidinem ostendunt, exhilarata rursus fronte placantur. Cum vero saepius recurrant affectus, et in eadem semper plicas cutim contrahunt, eosdem musculos conuellunt, horum intumescencia, et incisuris epidermidi quasi inscriptis, quamuis absentis, si dominatur, notitiam praebent.

## §. IX.



## §. IX.

*Mutationes in Cerebro.*

Considerandae hic iam veniunt vires, quarum auxilio tantas in corpore turbas animi pathemata excitant. Eas nervis et encephalo tribui in genere debere vix est qui commemorem, cum nullum fugiat, quod animam inter et corpus intercedit commercium, his mediantibus solum obtinere. Sed quaeritant praesertim, quaenam in illis mutationes eveniant, et quomodo eiusmodi effectus ab ipsis perpetrentur. Motum in encephalo cum quavis cogitatione adesse, et, ubi vividior illa est, intendi, iam commemoratum est, quod quidem et ipse occupationis in cerebro sensus, et sanguis inter meditandum versus illud congestus, et lassitudo a longius protracta attentione, et huius vel illius animae facultatis dispendium pro varia cerebri laesione, certissime suadent. Verum quemadmodum potius comparatus sit, quae illius varietates, num in iisdem communibus, an in propriis cuicunque perceptionum generi fibris canalibusue, locum habeat: id latere me plane fateor. Non desunt quidem horum explicationes, a medicis aequae ac philosophis attentatae, et nervorum praesertim a fluido petitae; in his tamen, quanquam maximopere caeterum suspiciam auctores, ingenii magis florem ac imaginationis quam naturam, inveni. Neque possum quin confitear, fluidi huius nervi quaquaersum fluxum; modo hac in parte accumulati, cum aliam deferat; modo impetu simul in quandam quasi antea praecusam, ruentis, minime naturae simplicitati et ipsi nervorum fabricae convenire, mihi ad minimum, videri. Et miror, qui ipsius existentiae argumentum a naturae analogia repetiunt, quae velocissimos motus fluidorum ope perficiat, quare eam non minus in modo, quo peragatur, admiserint, elasticitatem quippe minimarum partium, qua concussae proxime attingentibus tremorem communicent, absque quod ex uno in alium transfluere locum necesse habeant; quod phaenomenis utique, illi praesertim celerrimae defectarum virium restorationi, magis respondet, et ideo ab aliis assumitur. Hic igitur liceat Summi Viri <sup>5)</sup> modestiam, quam ubique admiratus sum, sibi exemplo proponere, qui, dum de sensuum in cerebro propagatione loquitur, inquit, neque enim hic quidquam novimus, neque ultra id ipsum quidquam licet, vel ex coniectura, adfirmare.

## §. X.

*Inde sanguinis motus vario modo alienatur.*

Quaecunque autem sit mutationum in encephalo qualitas, quaevis tamen earum, etiam simplex a cogitatione, licet non viuida, modo ad eam magis attendat animus, profecta, videtur sanguinis motum quodam modo, et ita quidem, alienare, ut versus cerebrum fiat congestio. Quae si a corporis modo situ penderet, hoc mutato non amplius haberet locum, quocum tamen experientia non consentit. Num  
vero

5) Perill. v. HALLER Elem. Phys. Tom. V. p. 531.

vero, quod huic occupationi intentae magis fibrae sensoriae in aliis magis ab actione sua remittunt, unde languidior cordis motus, et humorum, qui per remota magis ac resistentia vasa, et inprimis superficiei, non adeo liberi mouentur, in illis, quae facilius cedunt, coaceruatio? Frigus quidem extremorum et musculorum quies, qui sanguinis alias in illis motum adiuuant, suadent, aliquam minimum partem huic momento competere. An, quae in omni mentis contentione obseruatur, respiratio magis neglecta et retenta, facit, ut minus euacuentur venae sanguinem a capite reuehentes? Id quod et suum contribuere a vero haud abhorret. An a stimulo inde excitato, qui ad locum quem habitat, ubicunque demum sit, humores magis allicit? Qui vero effectus cum ultimo tandem a neruis videtur dependere, hic difficilior fortasse posset, quam in alia quauis corporis parte, intelligi.

Verum cum viuida idea agitur animus, verissime iam cordis motus alteratur. Quippe dum laetae commotionis simile quid habet, neruorum actio in cor magis intenditur, qua hoc, consueti stimuli impatientius redditum, violentius contrahitur. Dum vero a tristitia potius participat, neruis viribus quasi defectis, cor languidius mouetur, ac minorem undae profilienti vigorem impertit. Quod quidem cum obtinet, vis sanguinis, qui insequitur, resistentiae antecedentis superandae impotentior, euadit, quo fit, ut inania cutis vasa remaneant. Prius vero cum locum habet, sanguis velocius ad superficiem properans vasa illius extendit, et copia maiori implet, hinc efflorescit habitus, facies rubet, saltem ubi alio contrario motu id non impeditur. Qualia vero in terrore ac perturbationibus, cognatione quadam cum illo coniunctis, omnino reperiuntur, in his enim sanguis ad praecordia retropellitur. Ipsius vero huius phaenomeni explicatio multis certe laborat difficultatibus. Ex principis enim viri <sup>6)</sup> auctoritate, arteriae, quarum diameter sextam lineae partem non exsuperat, dilatare se et contrahi non amplius conspiciuntur. Neruos quoque, qui vere in substantiam vasorum penetrent, si ea excipis, quae cordi quam proxima sunt, nemo adhuc ostendit; quanquam plerique marginem arteriarum legant, secundum earum longitudinem procedentes. Sunt tamen, quae nihilominus hoc verisimile reddant; et primo quidem neruorum in sua diuisione summa subtilitas, quae oculum aequae ac cultrum secantis fugit. Quorum quidem in cute ramulos si eo usque prosequaris, ubi compactioris eius texturae circulo illi annexi, ni rumpi velis, procedere te ulterius non sinunt, et omne, quod eorum plexus repleant, spatium computes, multum adhuc ab illis vacuum deprehendes, cum tamen ne punctum quidem inuenias, quod acu tangi possit, nec sentiat. Quis vero est, qui asserere auderet, in tam frequenti cellulosa, quae neruos ubique fere cum vasis coniungit, ne furculum quidem, qui oculorum aciem effugiat, ab illis ad haec transire. Vi demum vere irritabili arteriae contrahuntur, quae nusquam non ope neruorum indiget, et silent in membro, cuius omnes nerui periere, et sphacelo cum isto simul corripuntur. Quare et Perill. v. HALLER <sup>7)</sup> fibris earum carneis mobile illud principium a neruis impertiri admittit.

6) v. HALLER. *Experim. de motu sang. in Comm. Soc. R. Goett. T. IV. p. 286.*

7) *El. Physf. Tom. II. p. 206.*



admittit. Ipse ille summus machinae corporis scrutator minima vasa oscillare, motumque sanguinis varie turbare, vidit<sup>8)</sup>, et cum nullum inter vasorum systema animique perceptiones commercium, nisi mediantibus nervis, existat, horum utique potentiae, ab ideis excitatae, inuērsus ille motus attribui debere videtur.

## §. XI.

*Unde diuersitas actionis musculorum in facie? Quis anastomoseos nervorum extra cranium finis?*

Quomodo tandem, ab illa in encephalo mutatione, nervi, qui faciei musculos adeunt, iique in aliis commotionibus alii, in consortium trahantur, id, nisi a voluntate et hic dependeat, variis ultimarum fibrillarum sensilium combinationibus, ipsique motus in cerebro diuersitati, tribui oportet, quae vero latent aeternumque latebunt. Haud enim credo, anastomoses, duri videlicet et quinti, hic sibi quidquam appropriare, quae et plurimis sibi contrariis musculis communes sint, et in genere, ubicunque etiam in corpore reperiuntur, vix quidquam videntur ad illum motus aut dolorum consensum facere. Neque enim, ullibi sibi reuera patere nervos, certum est, et quae inter partes, ope eorum connexas, offenditur societas sensuum ac mutationum, ea et inter diuersissimas, respectu illorum, saepe obtinet, sique vinculi huius effectus cum veritatis quadam specie dici meretur, certissime solummodo in cerebro locum habet<sup>9)</sup>. Quo quidem pertinet, qui cum sonis quibusdam observatur, dentium stridor et maxillae inferioris spasmus, cum nulla mollis cum duro, nisi in communi origine, sit communicatio. Neque, ob summam motus in nervis celeritatem, hoc sibi viae compendium quaerere naturam oportebat. Quod vero uni eidemque parti a duobus vel pluribus nervorum, a se inuicem plerumque remotis, truncis ramos impertiuit, in eo fecit quod in variis visceribus sensuumque organis, nempe ut ab utroque latere prospiceret, et ne, uno fortasse illorum destructo, functio partium, quas adibat, periret. In ipso autem vario eorum nexu multum natura lusit, in illum, ceu videtur, finem instituto, ut minus dispersis nervis tutior facilius via inueniretur.

## §. XII.

8) Experim. de motu sang. in Comm. Soc. R. Goetting. T. IV. pag. 301. 316. seq. In Elem. Physiol. Tom. I. p. 442 — 446. multum sibi prospicit Vir Summus, ne nimium ex hac oscillatione concludatur. et negat, illam sanguinis communi motui promouendo inferuire, quem potius retardaret. Deinde ex eo quod in languente ac dolore affecto animali locum habeat, contendi non posse credit, vasa illa etiam in statu sano sic moueri. Id vero non impedit, quo minus in terrore talis assumatur oscillatio vel constrictio, perturbatione

quippe tam forti, quae et vitam adimere valeat et Ipse Perill. vir talem a nervis pendentem in affectu aut conuulsionibus verisimilem esse dicit. Vid. prim. lin. Phys. §. 73. 839. Conf. Tom. IV. Comment. Soc. R. Goetting. p. 347.

9) Quocum et Perill. von HALLER consentit. Vid. Elem. Physiol. Tom. IV. pag. 321 — 22. Id vero pluribus enunciat Cel. WYTT, vid. in versione Germ. sämtliche zur praktischen Arzneykunst gehörige Schriften p. 272 — 306.

Ludwig script. neur. min. T. IV.

Y y

## §. XII.

*Affectus quomodo ex ipsa natura hominis fluant, et in quem usum?*

Quis sit finis affectuum, quare ita institutum sit a natura, ut illorum essemus capaces, credo paucis adhuc absolui et posse et debere. Haec enim quaestio ad illam mihi tota redire videtur, quare viuidae ideae hominibus concessae sint, ex quibus, ceu ex radicibus germina, propullulare istos, iam supra vidimus. Quis vero est, quem fugiat, animam unius tantum distincti conceptus simul esse compotem, ideoque, si plures eodem momento illam ingrediuntur, eos non nisi confusos euadere. Hi vero simul percepti sensum plerumque excitant, plane ab unoquoque singulorum diuersum; id quod quidem in omni, quod sensibus externis internisque appercepitur, sic se habere, in aperto est. Hoc igitur modo viuidae ideae in ipsa hominis natura fundatae sunt, et, sicut cuius sensui, sic etiam illis maior potentia est animum commouendi. Quamobrem circa eas omne voluptatis ac fastidii negotium versari, nullum latebit, qui vel a limine tantum illas scientias salutauit. His itaque natura, citius ac fortius quam ratiocinando, ad agendum compellere nos voluit, quod nimis tarde plerumque vim suam exfereret, et penes quem non ea potestas est, adeo, ut et, ubi deliberatione praegressa, quid faciendum sit, decreuimus, eas adhuc ideas et imagines bonorum vel malorum in auxilium vocemus, quae vel inde consequimur, vel euitamus. His ut porro suppetias ferret natura, gratum sensum excitandi facultatem impertiuit plerisque, quae saluti sunt; quae noxam afferent, contrarium, ut magis alliciant illa, haec deterreant. Pertinet huc quoque illa naturae mentis humanae lex, qua sensus, cuius pars sit communis cum praeterita olim perceptione, istam totam refuscitet, et imaginatio sic quoque subsidio veniat; tandem, et facilis plerumque de illis, quae possent funesta esse, experientia, et quae se quam potentissime memoriae imprimat, ut traditione in posteros adeo propagetur, ac ita unius exemplum multis millibus ad dehortandum inferuiat. Quod vero ipsa in perfruendo dulcedine ad immoderatum saepius usum seducamur, quod timor, quem pedibus addere alas oporteret, interdum, cum nimius sit, impotentes fugae nos reddat, in his nequaquam natura in culpa est, quae neutiquam absoluta necessitate inde sequuntur; et ipse metus, cum saepius recurrit, atque facile periculo adfuescat homines, ut animi praesentia non destituantur. Vicissim, ut ad animalia quoque veniamus, et capreae, quae utique, cum improvisus nimiumque iam propinquus superuenit inimicus, perterritae saltibus aufugere tentant, qui de earum velocitate detrahunt: cum longinquum iam conspiciunt, citissimo cursu se oculis subducunt; et ipse ille metus, ex quo nonnunquam hostis, quem et haud facile amplius euitassent, praeda celerius deueniunt; eo magis ad circumspiciendum sibi illas incidat. In uniuersa autem natura obseruabimus, vergere nonnunquam in perniciem, quae summae alias utilitatis sunt. Sic et flumina, quae irrigant campos, illisque conciliant fertilitatem, cum super ripas increscunt, aggeresque perumpunt, illam ipsam messem, quae secundis eorum humoribus debebatur, secum abripiunt et deuastant; sic ignis, sine quo miserrime ac ne vix quidem viueremus, aliquando incendio destruit habitacula ac copias depascitur, quibus sustentare

vitam



vitam sperabamus. In hunc vero finem facta ea esse ac disposita; nemo sane erit qui dicat.

### §. XIII.

#### *Formarum differentium notiones.*

Iam vero, ut porro seorsim perpendamus affectus, liceat eorum notiones praemittere. In id autem tantum non omnes consentiunt, eos in duas potissimum classes distribui posse, quarum sicuti dictum est, qui uni adnumerantur, laeti, qui alteri, tristes dicuntur. Hanc tamen diuisionem caue credas omnibus sic numeris esse absolutam, quin ullum ex contrariis sensum immixtum sibi habeant, qui huic vel illi potissimum adscribuntur. Varie enim sibi inuicem miscentur plerique, et vel ex oppositis simul participant, vel huius modi perceptio alteram diuersae indolis ita insequitur, ut dubites fere, ad quem praecipue ordinem referas. Quo equidem fit; si consideres adhuc differentiam obiecti, quod siue praesens, seu futurum, vel concupiscat animus, vel respuat; ut summo iure aliud aliudque sibi nomen adsciscant; quod equidem agmen illud affectuum parit. Horum qui caput veluti constituunt, purumque sistunt fontem, ex quo reliqui plus minusue hauriant, vel boni, quod euenit, praesentia, vel mali excitati, hic *luctus*, illud *gaudii* nomen accipiunt, cum minori autem gradu percipiuntur, vel ad insequentia inde vertitur animus, *moeror* et *laetitia* dicuntur. Ast ubi futurum est, quod cupitur, si certius expectatur, *fiduciam*, sin minus *spem*, et e contrario, malum, quod apprehenditur, *timorem* creat. Timor contemptus *pudor* est, proprior sexui, qui cupiditate placendi prae altero agitur. Si maius, quod auersatur, et propinquius, *horror* menti iniicitur, si plane inopinatum, *terror*, cum maximum et certissimum sit, quod instat, *desperatio*. *Ira* autem movetur; ubi alterius iniuriae tribuitur offensa, et repellendi superest potestas; haec ubi locum non habet, (ut plurimi verbum sumunt) *indignatio*. Subiecti vero, quod laesionis metum incutit, *odium* est, contra ea, ubi grata sunt, quae inde speramus, *amor*. Hinc *desiderium* huius, prioris *fuga*. Sunt repetitae horum diuisiones, vel, quae mitiores tantum experiuntur, commotiones, quas licitum sit omittere, qualis e. g. cum alicuius calamitate afficimur, *commiseratio*; vel *inuidia*, quae ex illius, quem odimus, fortuna concipitur, praesertim si ipsius aderat cupido, et quae ad tristitiam in genere pertinet. Verum cum summa inter affectus, inprimis tristes, intercedat cognatio, et alter in alterum facillime transeat, ira metusque in tristitiam, terror in timorem vel vice versa: multa hic opus est attentione, ne uni tribuatur, qui alteri tantum competit, effectus; id quod factum esse nonnunquam arbitror, ubi de noxis sermo est, quas ab hoc vel illo pathemate passa sit sanitas.

### §. XIV.

#### *Laetitiae signa. Quae ad illam disponant.*

Ad singulas nunc transimus animi perturbationes, et primo quidem ex communi exemplo ad *laetitiam*. Haec vero dum modum tenet, quoad se sensibus manifestat,

comitatur pulsu magno ac frequenti, respiratione citiori sed libera, leuitatis quodam sensu, agilitate musculorum ad quemuis motum procliuum, perspiratione intensiori et quae corporis pondus, teste SANCTORIO <sup>10)</sup>, multum imminuit. Oculi conspiciuntur pleniores grataque luce radiantes, facies florida et rotundior, cutis splendens; ad quae faciunt frons explicata, muscoli, qui superiori maxillae inferiorem apprimunt, paululum tumentes, leuatores labiorum et anguli oris ac zygomatici parumper adducti, quo et inferior palpebra oculo tantillum obducitur, dum superior arcui ossium frontis, sub quo habitat, magis alliditur, et anguli oris leniter diducuntur, labiaque ad dentes vix obseruabili modo attrahuntur, ipsi denique rubicundi humores, dum vasa minora implent et turgida reddunt. Multum simile habet vultus cum illo subridentis, vel quo beneplacitum nostrum et obstrictam mentem illis declaramus, qui grati quid nobis praestiterunt. Cum vero calamitas quaedam his, quae prospera euenerunt, superata sit, memoria illius lacrimas proclit, intima cum voluptate effusas. Harum autem mutationum quae similes corpori inducunt, sensum quoque in animo excitant, qui multum ad laetitiam appropinquat, ad eamque disponit. Cuiusmodi in genere sunt, quae moderata actione neruis veluti robur, liberiores sanguini fluxum, conciliant, et perspirationem augent: deambulatio, saltatio, potus spirituosus, opium, musica demum ars, ubi, gratis ac pulcra proportionemodoque sese insequentibus sonis, neruos leniter occupatos tenet et, ex consensu, eorum actionem, qui cordi motibusque prospiciunt vitalibus, intendit. Ab iis enim hic abstraho, qui dum artificis admirationem iniiciunt, vel similem exprimere sensum tentant, menti iam ipsi veram commotionem impertiunt.

## §. XV.

*Tristes immodici gaudii effectus, horumque causae.*

Distinguitur autem inter noxios gaudii et salutares effectus, quorum illi nimium immoderato et inopinante inuadenti attribuuntur. Inter hos referuntur, cordis palpitationes <sup>11)</sup>, lypothymiae <sup>12)</sup>, febris acuta <sup>13)</sup> delirium, quin perdurans infania, epilepsia <sup>14)</sup>, ipsa demum mors. Huius varia narrantur exempla, quae, quod in omnium libris repetita fastidium moueant, infra tantum subieci <sup>15)</sup>. In quibus diuersae

10) Aphorism. de med. stat. Sect. VII. Aph. 1. 11. 27.

11) KEMPER de valuiis p. 25. (ex HAL-  
LER. citatione). Id vero omni laetitiae  
maiori conuenit.

12) HORSTII Op. P. I. pag. 377.

13) RHODII obs. lib. I. obs. 4.

14) VAN SWIETEN Tom. III. pag. 414:  
A gaudio subito epilepsiam contigisse, vidi  
saepius. Conf. BOERHAVE de morbis ner-  
vor. p. 804.

15) VALER. MAX. Lib. IX. Cap. 12. de  
mort. non vulgar. matres memorat, qua-  
rum post pugnam ad lac. Thrasim. altera  
fospiti filio obuam veniens in ipso ample-  
xu prae gaudio expirauit; altera mortuum  
lugens ad primum filii conspectum. Idem  
LIVIUS lib. XXII. de clade ad Cannas.  
VALERIUS MAX. ibid. simile fatum M. Iu-  
VENTII Thalnae, cum supplicationes de-  
cretae sacrificanti nuntiarentur. Vid. PLIN.  
Hist. Mund. L. VII. Cap. 53. Hic ut VAL.  
MAX.



versae causae ad eundem videntur effectum conspirasse. In nonnullis manifestum una cum gaudio terror fuit illatus, qualem experimur verbisque significamus, cum subito obuiam se nobis offert amicus, quem longinquum putassemus. Dum vero ex hoc sanguis eodem momento repulsus, quo ex illo ad superficiem esset proturbatus, mirum non est, tantis tumultibus non restitisse vasa, atque cor, et rupta vel esse, vel nimium extensa, resistentiae superandae impotentia, conticuisse. Id quod haud minus iterum iis accidisse puto, quibus, ob longum et profundum moerorem, cor et systema vasorum viribus defecta, in turbis humorum sanguine quasi momento obruta, succubuerunt. Qui vero, cum sanitatis flore corporisque robore essent gauisi, eodem fato corruerunt, horum vasa, abundantia humorum turgescientium expansa, fluidum summa vi concitatum, per tubos exhalantes aut ruptos canales, in alia atque alia caua transmississe, verisimile est, cum et haemorrhagias ex gaudio recrudescere compertum sit, et pericardium plenum sanguine repertum in illo, qui virgine amata positurus occubuit. Quanquam et prope absit a vero, nervos ipsos et inprimis cordis, vel ob vitium latitans nunc exasperatum, vel quod officio suo, ad enormem actionem prouocati, pares non existerint, defecisse, cum in simili illorum commotione, in venereis amplexibus, alii attonito morbo correpti sunt, alii derepente extincti.

Ast delirium, in summa laetitia interdum obseruari, non est, quod mireris. Communis est formula loquendi et naturae admodum conueniens, prae gaudio insanire. Illa enim idearum atque imaginum cohors, quae uno quasi impetu animum irrui, quarumque aliam alia fugat, et frequens ex ipsius naturae instinctu consuetudo,

Y y 3

cum

MAX. et SOPHOCLIS et DIONYSII Tyranni, eadem morte defunctorum, mentionem facit, quod Victores in Tragoedia essent pronuntiati. Cap. 32. eod. loc. Chilo, cuius filius Victor Olympiae proclamatus; et GELL. Noct. Att. Libr. III. Cap. 15. DIAGORAS RHODIUS in amplexibus trium filiorum, in diuersis ludis Olympicis victorum et Philippides, praeter spem in certamine poetarum victor, et Polycrata e Naxo Insula inter laudes ciuium suorum, prae gaudio extincti. MARCELL. DONAT. de Hist. med. mirabil. lib. III. cap. 13. Sinamus Cessurus Pirata, accepto nuntio filii ex libertate redempti, et septem triremibus praefecti: PECHLIN. lib. III. obs. 27. Fouquetus ex carcere improviso liberatus inter primos suorum amplexus, derepente mortui. Quod et de Nepte LEIBNITZII constat, quae haeres illius diuitias non opinatas inueniebat. BOERHAV. de morb. nerv. p. 553. Ex familia spectabili sed ad angustias redacta, filia, a fratre, in India Orientali uno ex primariis, ad se vocata,

donaque sibi destinata videns, immobilis prae laetitia moritur. VATER in Miscell. Cur. Dec. III. ann. 9—10. p. 293. narrat: Militem robustum, virginis diu optatis frui-  
turum amplexibus, gaudio mortuum corruisse. ROBINSON of the Spleen. p. 92. et LOUBERT. du ris p. 29. (ex HALLERI citat.) habent ex hoc itidem affectu extinctos, ob filium filiamque, quae mortui credebantur, redditos. THORESBY Topography of Leedes, Lond. 1715. p. 625. Virginem, quae iuuenis ex nobiliori gente nati amore deperibat, et, de felici successu desperans, illum celabat, eo tandem reuelato, cum ipsum ad se venientem conspiceret ac summa cum urbanitate sibi declarantem; quod ipsam in matrimonium ducere cuperet, in eius amplexu extinctam. BONNET. Medicin. septentr. L. II. S. XXIII. Cap. 10. Foemina, ob rixas cum focu a marito seiuncta, cum uterque prae moerore languesceret, ad ipsum reuocata, ambo se mutuo amplectentes mortui reperti sunt.

cum aliis communicandi, in quibus felices nos putamus, simile quid in omni non moderata laetitia producant, multo magis ubi plurima calamitate viribus eneruatis, summo atque certissimo paene periculo momento quis liberatur. Qualia huc et illuc in nauigantium historiis memoriae prodita leguntur, cum vel tempestate ab itineris via abrepti, coeli terrarumque regionis, qua vagarentur, penitus ignari, inopinato terram conspexerint, vel, ob irreparabilem aluei naus fissuram aut cunctarum rerum inopiam, vita periclitati, portum aut alias naues offenderint; omnes insaniae formas ostendentes, sensim tamen ad sanam mentem reuocati. Quos vero mente captos, ex Halei testimonio illustris MEAD<sup>16)</sup>, refert, anno huius saeculi vicesimo inperato fortunae favore ad immensas opes euectos, illis non aliam credo causam insaniae subfuisse, quam quae maniae in genere sit, summam scilicet animi contentionem ad unum idemque obiectum dies noctesque conuersam. Etenim, qui iucundis atque fictae potentiae somniis nimium inhaerent, si adeo frequenter insaniunt, quanto facilius hoc eueniet illis, quos nimis breui intervallo accumulatae diuitiae verius inducunt, eiusmodi laetis animum imaginibus atque vitae felicissimae umbris pascere. Tanto citius vero sanitati corporis mentisque eorum, qui gaudio, quam qui tristitia affecti, noxae parantur, cum nimia perspiratione, quam comitem habent, ac circulo sanguinis velociori, natura et Sanctorio auctore<sup>17)</sup>; fluidior et utilis pars sanguinis euacuetur, et somnus impediatur, et vires dissoluantur. Quo equidem fit, quod in mania plerumque animaduertitur, ut spissescat sanguis, fibraeque rigidiores et exsuccae euadant, ideae vero, adeo consuetae menti et inueteratae, ex quauis, quae minima tantum cognatione attingat, perceptione resuscitentur.

## §. XVI.

### *Salutares laetitiae effectus.*

Salui vero sunt quam maxime laetitiae effectus, si bono fiat modo. Facit, ut paululum intensiori actione sua obeant negotia nerui, haud tamen illa, quam, mentita prius momentanea felicitate, maior valetudinis labes quasi vestigio premat. Verum neruis, nec ultra facultatem, robur impertit; inde cunctae sani corporis functiones ita promouentur, ut ad integritatem illius conspirent, captaque inde commoda persistant, quanquam, ex qua initium duxerant, causa remiserit. Igitur illo celeriori cursu, ad quem sanguis auctis cordis atque vasorum viribus incitatur, partes illius constituentes melius sibi permiscetur, inutilia perspiratione abducuntur caeterisque excretioni inferuentibus organis; quae ad nutritionem, ad neruorum officia, faciunt, expedite ac pura secedunt, stases, quae visceribus obstructions intentabant, soluantur, quo, quae semper ab iis patitur, digestio, ipsa iam a vigore neruorum adiuta, maiora sibi subsidia comparat, et succos corpori, optima temperamentura gaudentes, adornat. Porro agilitas musculorum ad motum allicit omnium tardissime fatigantem<sup>18)</sup>.

Hic

16) Monita et praec. med. p. 45.

17) Medicin. Stat. Sect. VII. §. 24. 27.

35. 38. 41.

18) Sanctior. Med. Stat. Sect. V. aphor. 5.

Sect. VII. aphor. 4. cuius quoque fidem sal-  
tantes faciunt, ac quisque in se ipso ex-  
periri potest.



Hic vero salutare illas mutationes sustentans, diutius sensum, quo vix iucundior alter, menti percipiendum praebet, leuitatis corporis et vigentis sanitatis. Quibus omnibus quanta, quae iam minantur valetudini, mala saepe caueantur, quae iam facta sit iactura, quam breui temporis spatio reparetur, cuius melius apparebit, si, quae longus aut profundus moeror inferat, damna considerabimus<sup>19)</sup>. Lubet tamen adhuc commemorare, illi ipsi et admirationi, qui ad laetitiae genus pertinet, esse tribuendum, quicquid valetudo eorum, qui in litteris tempus suum vitamque degunt, detrimenti exinde caperet, non alia ex re ab ipsis prohiberi, quam quae in causa sit, quod in tantis deliciis ipsae habeantur. Quae enim ex sedentaria vita, ex motus defectu, ex summa animi contentione propullulant incommoda, in digestionem laesa et sanguinis praua mixtura potissimum appercipienda, iterum gratissimis illis sensibus renouentur. Itaque non sum, qui credam, multum quoque studium adeo facile integritati corporis cladem asserre, si modo et concoctioni aliquantum temporis concedatur, et victus ratio seruetur, et conueniens laborum distributio, ne nimis seria vesperi agantur. Ex eo quoque, potius quam ex constitutione non ita confirmata, provenire puto, ut facilius ex hypochondriis laborent iuvenes et qui mediam aetatem nondum transgressi sunt, quippe qui minus diaetae praeceptis se adstringunt. Necesse tamen insuper est, ea conditione esse res, in quarum cognitione versantur, ut sua dulcedine captent, quibus enim reluctante quasi animo atque taedio quodam opera nauatur, ea, praeter quod multo minus in ipsis proficitur, nec diu, sine graui minimum noxa, feruntur. In quibus asserendis si opus foret auctoritate, iterum ad SANCTORIUM<sup>20)</sup> prouocare, subtilem hercule et assiduam sui observatorem, ex quo tutius, existimo, et certius, quae salubri regimini, quae sanitati conseruandae, opportuna sunt, peti posse, quam ex tot voluminibus, quae easdem res pertractarunt.

## §. XVII.

*Fiducia potentia.*

*Fiducia* plane singularem videtur ac summam habere in nervos potestatem, robur illorum videlicet augendi, viresque amissas restituendi. Veruntamen ut huc et illam eius speciem referamus, qua homines, difficultum bonorum cupidi, illa ex firma animi confusione annituntur, animositatem dicunt; veram heroum ac tutelarem virtutem.

19) Ut quibusdam exemplis laetitiae salutaris potentia melius innotescat, leges in PECHLINI Libr. III. Obs. 27. PEYRESKII aponia et paralyti laborantem solis THUANI litteris lectis conualuisse, et CORNINGIUM Tertianam liberatum ob gaudium ex MEIBOMII sermonibus conceptum. Alium Tertianam, Ictero et hectica iam febri comitata, aegrum, nuntius filii, post plurimum annorum sterile coniugium nati, alium a podagrae doloribus consulatus obla-

tus, sanitati restituerunt. Aliud de puero exemplum vide in ETTMULLER. Oper. T. II. P. 2. pag. 95. febris quartanae, laetitiae beneficio solutae. Arthritidem ex gaudio sanatam FABR. HILDANUS Obs. Medico-Chir. Cent. I Obs. 79. et Pylori constrictionem cum continuo vomitu laetitiae sublatam: LORRY de Melanch. Tom. I. pag. 37.

20) Loc. cit. Sect. VII. Aph. 44. 45.

tutem, qui, cum summa pericula adiissent, ab instanti et certa fere morte sola illius ope euaserunt. Ea etiam freti, temerarii homines, periculosissima quaeque tentati sunt, felici cum euentu, nisi quos repente timor occupasset. Qualem audiui iuuenem, qui in academia, quae Halae ad Salam est, commoratus erat, praeruptam et recta ad perpendicularum descendentem rupem ad Giebichensteiu scansurum, cum dextere admodum ad summam fere altitudinem peruenisset, respiciens, subito perterritus ac tremebundus, vix tenere se potuit, haud sine multo labore liberatus. Quae quanta possit, illa quoque noctambulatorum paene ultra fidem dexteritas ac fortuna testatur, per praecipitia deambulantium, quae legendo iam imaginatio horret, quam huic tribuendam esse ego quidem opinor, utpote qui omnino conscii essent locorum, in quibus versarentur, sed periculi non memores, ad quod expergefacti, animum aduertentes, sortem duxere, quam plerique temeritatis rei, cum eiusmodi cogitatio animum subiisset. Inde quoque summa musculorum vis, ubi praesertim necessitas urget, ut si ignis prorumpit domosque vastat, ubi haud rarum est, moles sustineri et absque negotio deportari, quae ne moueri quidem ab iisdem altero die possunt, cuius ipse in patria urbe testis fui. Eadem etiam comitem se addit aliis quibusdam animi affectibus, irae plerumque, terrori interdum ac desperationi, quae omnino fiduciam sui creat. An non igitur in societatem quodammodo et auxilii reciperetur, quod ab his membris, paralyti affectis, praestitum legimus? quorum infra, ubi de illis sermo erit, exempla quaedam memorabuntur. Certe non apud omnes eadem violentia in his perturbationibus inuenitur, ut in ipsis iis adeo, qui summa quidem vindictae cupiditate flagrant, sed abiecti caeterum homines et pusillanimes, indolentiam vultu simulent et tranquillitatem; cum contra ea, qui magno animo sunt et forti, nequaquam sibi temperent, licet ultimi discriminis periculum faciant. Qua quoque ex causa imperare mihi vix possum, ut credam, omnem fidem esse denegandam factis, quibus, miraculo ut putabatur, sanitas his illisque restituta commemoratur; perpetrata quippe ab hominibus, feruenti sua imaginatione delusis, et summa illa plebis superstitione adiutis, qui cum maximam fiduciam postularent aegrorum, leuamen ab eorum virtute sperantium, semper famae suae auctoritatem seruabant, siue responderet, siue spem falleret, euentus. Horum, ut exemplum tantum proponam, tres memorat PECHLINUS<sup>21)</sup>, haud sane credulus vir, et testimoniis medicorum suffultus, qui ipsi eorum ope sanatos viderant, paralyti laborantes, vel morbo neruorum beneficio solvendo; quorum tamen plurimos spes frustrata est, passim quoque iam liberati in malum reciderunt, cum ab aliis eorum credulitas derideretur. Hos vero fiduciae efficacia ad sanitatem esse reductos a vero propius abest. Quis enim est, qui dicat, quantus

21) Lib. III. Obs. 31. 32. VAL. GREAT-  
RAKES ex libr. edito 1666. qui titulum  
habet: VALENT. GREATRAKES Esq. of  
Asane in y Comty of Waterford in Ire-  
land, famous for curing several diseases  
and distempers by the stroak of his hand  
only. Addit testimonia Faireclouii et Aste-

lii, medicorum; quorum litterae extant  
apud GLANVILLE in sceps. scientif. FRAN-  
CISCI BAGNONE de quo epist. legit CONER-  
DINGII iunioris ad B. KRISTENIUM exa-  
ratas. RUPIS in Cimbria nati ex pii, nec  
creduli, viri litteris.



tus huius in illis sit modus! quae neruorum et motus sanguinis incitatio! qui spe recuperandae salutis iam antea rapti, magis adhuc praemissa ac fanatica concione accensi, sacro quodam horrore ac omni animi confidentia, illud graui cum supercilio elocutum imperium acciperent. Motum vero cordis esse magis validum, ac impetum sanguinis fortio-rem, cum fiduciae plenus sit animus, et ex eo apparet, quod haec utique crescat ac fuscitetur, ubi corporis motus, vel alia excitantia, vim vitalem et humorum circulum intendunt.

## §. XVIII.

*Quae spei competant vires!*

*Spem*, quae forma laetitiae est, sed leuioris, et, quod circa incertius versatur, nunquam non metu quodam stipata, ob moderatam ideo potentiam valetudini inimicam esse non posse, ex ipsa illius notione apparet. Neque tamen flocci habenda est, quasi quae nullius frugis foret, quod ea sit mentis humanae conditio, ut plerumque bona, ob id ipsum quod dubia et futura sint, et maiora fingantur imaginatione, et fortius appetantur, et diutius in illis considerandis animus sibi placeat, quam in ipsa saepius possessione, quae facile satietatem parit. Ea igitur maximum et fere unicum remedium est in morbis, quae moestitiae debentur, ex infelici amore, vel exsuperante patriae desiderio, conceptae, quibus saepe iam in praecipiti positos sanitati restituit. Iterum multam illius fore virtutem in morbis, qui simulac inuadunt, aegri animo abiecto summum periculum minantur, quemcumque mecum consensurum esse, quem illius agendi modus non fugit, confido. Etenim quamquam latitanti morbi causae tribuendum esse non ignorem, siue de salute recuperanda desperet aeger, siue curam illius non habeat, quod plerumque in tristitia futura quaeque sibi transfiguret: attamen si ad illius spem vitaeque felicioris sensim reuocari possit, vim, quae neruis inde impertitur, posse ad illud quod ipsos obruit, vitium propellendum, a vero minime abhorret. Hic vero, ne in aliam sollicitudinem transeat, summam medici fiduciam teneat oportet. De hac enim, quod praetereundum non est, optatum medicamentorum effectum quam maxime pendere, multa et notissima experientia constat; ut tamen illius mentionem faciam, quam, veritatis huius probandae causa, proponit PECHLINUS <sup>22)</sup> iuuenis scilicet, qui aluum ducturus, ex errore pillulas de Cynoglossio sumserat, quae minime eius expectationem fefellerunt, licet ex ingredientium, Opii praesertim, efficacia, istaque quantitate, illam penitus sistere debuissent. Quod, si ad finem, in quem adduxit, reliquaue momenta respicias, minime nauseae potestati adscribes; verum cuicumque demum causae tribuendum crederes, id certe ubique testabitur, efficacissimam quoque remediorum virtutem ab illa idearum potentia superari.

## §. XIX.

22) Lib. III. Obs. XIII. Scrupulum unum M. Pil. de cynoglossio. Ibique quoque foeminam narrat, quae pilul. ex succ. Liquir. extr. Angelic. et Laudan. opiat., purgandi scopo sibi praescriptas putans, quinquies

aluum deposuit. Et iuuenem hypochondriacum, qui vomitorium ex vitriol. alb. ad diaphoresin promouendum datum sibi persuadens, felici successu sudorem expertus est.

Ludwig script. neur. min. T. IV.

## §. XIX.

## De cupidine et amore.

Pauca adhuc de *cupiditate* dicenda sunt. Ea vero, si spei innititur, quae illam explendi potestatem pollicetur, pertinet ad laetitiae genus, cui maiorem addit cumulum<sup>23)</sup>; si vero ne vestigium quidem illius adsit, tristitiam augeat oportet. Verum hic de illa tantum sermo est, quae, ut ita dicam, per se subsistit, cum de euentu in utramque partem nihil adhuc certi exploratum habetur. Quae autem, cum imaginationem accendit, et ab illa vicissim inflammatur, nervos occupatos tenens, et vires vitales ad maiorem actionem compellens, absque quod verum illis robur largiatur, omnino functiones corporis alienare, eiusque incolumitatem offendere potest.<sup>24)</sup> Inde enim nervis debilitas contrahitur, et multa perspiratione utilia diffantur; hinc laeditur digestio et quies corpori adeo necessaria impeditur, inprimis cum facillime nimium protrahatur, ac ne in somno quidem deficiat, quem concupitae rei imagines turbant. Id praesertim de illa cupidinis specie valet, quae in alterius sexus personam fertur, *libidinis* tunc proprium nomen accipiens, quanquam saepius sub profanato illo amoris veniat. Ea vero, in obiecti praecipue, quod appetitur, praesentia plurimum se vultu prodit, et cum saepius recurrit, more reliquorum vehementium commotionum, permanentem adeo sui characterem inprimit, ut et in se ne voluptuosum iuvenem facile agnoscas. Oculos distentis palpebris prominere facit, multumque splendere; faciem sanguine perfusam accendit; os magis diducit, quo plicae ad illius angulos oriuntur; caro vero circa malarum ossa tumet et cumulatur, cum alteram genae partem deserit inferiori maxillae proximam, eamque quodammodo excauat. *Amor* contra ea, sub quo nomine illum, stricte sic dictum, tantum intelligo, affectus est, ex admiratione alterius diuersi sexus, eiusque in consortium obtinendi voto, compositus, quod vero non istam unice libidinofam voluptatem petat, sed veram ac utriusque communem vitae felicitatem, ex arctissimo dulcioris amicitiae vinculo capiendam; quare enim alias in unum solumque ex omnibus obiectum intentum esset? Hic quoad fiducia comitatur, responsurum esse optatiseuentum, omnium suauissimo vereque ecstatico gaudio imbuat; at si iam omnis spes destituat ac ne leuissima illius aura desiderio blandiatur, tunc in tristissimum, pertinacem ac sanitati infestissimum sensum transit.

## §. XX.

*Differentes tristitiae formae, causae, subiecta.*

*Tristitiae* id prae reliquis affectibus proprium est, ut per longissimum tempus perduret. Interdum a tenui initio ipso progrediendo incrementa sumit, ac omni studio, animique contentione, nutrita, altas adeo radices agit, ut laud, nisi cum morte, finiatur. Est tamen et illius species, quae, more vehementium pathematum, statim cum

23) Inde paralytici sanati sunt, LORRY de Melanch. T. II. p. 101.

24) Vide pulcherrimam descriptionem APULEJI Metamorph. lib. X. mox ab initio.



cum summo vigore inuadit; quae vero plerumque et hoc cum istis commune habet, ut currente tempore sensim sensimque a robore suo deficiat, et quasi tabescendo tandem extinguatur. Ea vero et luctus nomine distinguitur.

Hanc autem animi commotionem creat iactura quaecunque, quam fecimus, cuiuscunque tandem generis sit bonum atque forinae; quo spoliati sumus; vel, quod idem est, praefens malum. Siue itaque de opibus atque fortuna detractum sit, siue de fama aut fauore hominum; siue de multum dilecta spe deciderimus; siue patriae exules absentiam amicorum lugeamus, ac illam natalis soli dulcedinem; siue infelix amor omnibus deliciis orbatam vitam portendit, ac sempiternum taedium minatur; siue tandem admissa culpa verum ac diuturnum poenitentiae sensum post se relinquit, ubique tristitia nascitur; ubique eadem perceptio, idem effectus, nisi quod gradu differant, atque diuerfas, quae sociae vocantur, ideas sibi comites adiungant.

Nullibi autem maior differentia offenditur, quam circa subiecta, quae caeteris perturbationibus obnoxia deprehenduntur, et quae tristitiam suscipiendi facultatem habent. Illud plurimorum est; pauci sunt, quos non ira interdum flagrantior occupat, laetitia, metus, terror maximae parti familiares sunt; verum haec plane particulare sibi hominum genus vindicat, ut, qui affinis sit huius in reliquis sensus, vix mereatur, qui tristitiae nomen accipiat. Hoc autem, ut verbo dicam, sub ista classe comprehenditur, quae fibras apprime irritabiles sibi appropriat, siue, ex Perill. von HALLER pulchra distinctione, robur partium solidarum cum ipsis, siue debilitas, coniuncta sint, quibus itaque vel *cholericum* temperamentum, vel *melancholicum*, attribuit. Ab hoc tamen iterum oportet ut illud excipias, cui sensibilitas utique cum debilitate est, veterum illud *sanguineum*, de quo iam supra suspicio allata est, quod sibi proprium adhuc locum adsciscere videretur. Hoc vero nequaquam multae tristitiae capax est. Discrepare vero istud, praeter ea, quae iam memorata sunt, sicut et caetera, a melancholico puto, ut quibus hoc convenit, iudicium sensitium, (sit barbarae voci venia) latius pateat, vel ut distinctius, quid velim, explicem, quae caeteri intellectu ac ratiociniis assequuntur, his quasi sensus sit; deinde ut viuidior sit imaginatio, et cui prae omnibus indulgere cupiant.

## §. XXI.

### *Quae tristitiae opportunitatem praebent.*

Neque tamen illius sentiendi facultatis, etiam uni eidemque homini, idem semper modus est, neque pari is semper ratione afficitur. Multum differt illa pro corporis conditione, aut earum rerum statu, quae proxime ad nos attinent. Interdum cogitabundi nos ipsos contristare amamus, absque quod ulla adsit moestitiae causa manifesta; tunc vero et leuia acriter sentimus, interdum contra ea etiam grauiora aequo ferimus animo. Nempe debilitati illi fibrarum, et irritabilitati, nouum augmentum accedit, id quod in genere sit, ubi nerui intensiori, ac nimis protracta, actione viribus exhausti sunt. Quod vero experimur, cum in labore quodam motuue ultra potestatem perseuerauimus; cum voluptatum usui, cuiuscunque demum generis sint,

nimum indulsumus, etiam earum, quae mentem solummodo distinent, cum studii amore nos intemperantius abripi passi sumus; vel vigilia, calidiori regimine, aut ipsa ex aduerso requie et otio, si modum non tenent, corporis robur animique labefactavimus; denique cum coeli temperies aërisque illa sit, quae fibras reddat laxiores. Tunc vero, quae nos circumdant, profundius se animo imprimunt, illamque, (ut poëtae utar elocutione,) reconditam mentem conciunt: eorum quippe, quae faustiora alias, vel tristia, euenerunt, memoria redit, ac somniorum inuitamentis imaginationem exerceat. Etenim huius ope praeterita ubique cum praesentibus conferimus, tamen ut hic fallacia quaedam obtineat ex ipsius naturae lege proficiscens, quae nempe fortior sensus imbecilliorum obscurat; ut illius tantum recordamur, si, quae passa sunt, in mentem reuocamus. Ita vero fit, ut minutias, quae multum instanti voluptati demebant, aut imminuebant dolorem, omittamus, atque ultra verum nos felices iis temporibus censeamus, aut infaustos. Qui vero inde pendet effectus, ratione praesentis aerumnae, ad idem reuenit. Siue enim eorum modo reminiscimur, in quibus beatos nos aliquando putabamus, acerbiorum adhuc sensum infortunii, quo cum conflictamur, reddimus, siue vulnus vulneri addimus, dum calamitatem, quam in praesentia accepimus, earum, quibus olim afflicti eramus, cumulo augemus.

Verum cum reuera iam morbus adsit, corpusque defatigat, mirum non est, acutiori tunc sensui patere nervos, ac cuncta ea maiori adhuc observari gradu. Quod quidem praesertim locum habet, ubi non tam aperto quodam dolore ac distincto aeger vexatur, sed cum occulta potius sedes molestiae affectionis sit; quae veluti absque conscientia percipiatur. Requiritur autem, ne ea sit mali conditio, quae ipsas sensibiles fibras relaxat, atque ad quamvis impressiorem hebetes reddit, qui fons esse putatur, quare hydropicis vulgaris sit patientia. Ast si digestionem dicata viscera, ventriculum prae caeteris, labes premit; si chylus, qui parum nutriat, neque bonus, praeparatur; si lenta febris vires eneruat; tunc multa tristitiae opportunitas deprehenditur. Cumque tantillum modo superueniat necesse sit, ut viuide sentiamus, facilius, et nostris curis, et alterius miseria, commouemur, et quae in nobis quaerenda esset causa maioris sensibilitatis, in ipsa calamitatis mole ac ratione positam arbitramur.

## §. XXII.

### *Lucius vehementioris descriptio et effectus.*

Multum tamen interest, quonam potissimum modo nobis eueniant, quae polent ad tristem affectum excitandum. Etenim quae quasi ex longinquo appropinquare; videntur vel fortiori nos et confirmato animo inueniunt, vel in silentem illam molestiam pronos, quae quasi studiosa sit, se ipsam ex continua mali contemplatione enutriendi. Quae vero improuisum inuadunt huius indolis hominem, ac qui minus didicit eiusmodi superare affectum, id quod familiarius est alterius sexus personis, ea in omnem plerumque doloris vehementiam abripunt. Qualem vidi inopinato ac tristi nuntio oppressam, ceu fulgure percussam absque motu sedere, rigentibus membris oculisque defixis, nullius, ut apparebat, quae in ipsius praesentia fierent, consciam, sed



sed quam unice cladis acceptae sensus absorbuerat. Excitata vero ab adstantibus cum violento ac spastico clamore exsiliit, quasi gula constricta strangularetur, motibus totam conuulsuorum naturam prodentibus, nisi quod conscientia quadam fierent. In his ad lassitudinem usque perseverans iterum in priorem statum relapsa est; sed, intempestivius praesentium consolationibus concitata, eandem denuo scenam spectandam praebuit; sic alternis quibusdam vicibus continuans, donec veluti resoluta in lacrymas tandem prorumperet. Ex ipsa vero prima commotionis violentia causatur, quominus illa diutius persistat, nisi, quae quotidie ante oculos versantur obiecta, continuo iacturae factae admoneant. Omnis enim animae contentio profundiores sensum producere haud valet, et iste, qui insequitur, comparatus cum illo eo ipso de potentia sua amittit. Deinde memoria adeo tam acerbae ac desperatae conditionis molesta est, et ab ea cogitationem auertere cogit ac extra se solatium quaerere, quod sane ambientis expectationem haud facile frustrabitur. Interim tamen funesta esse saepius haec affectus violentia potest, et in ardentem febrem<sup>25)</sup> phrenitidemque<sup>26)</sup> coniecit, et una nocte amaurosin<sup>27)</sup> produxit, et syncope<sup>28)</sup> atque epilepsia<sup>29)</sup> excepta fuit, et celeri adeo morte<sup>30)</sup> enecavit.

## §. XXIII.

*Diuturnus moeror.*

Longe autem differenti modo se cuncta habent, si quis diu praevidet cladem quam accepturus sit, aut quodvis, quod illum circumdat, inflictum et gravius vulnus haud interrupta memoria exasperat, ac quasi aeternum sub pectore servare compellit. Tunc solitudine uti flagrans totumque se contemplationi tradere gestiens, ac omnes imaginationi habenas remittere, in ea loca confugit, quae silentio ac infrequentia hominum, aut umbrosa quadam opacitate, nullo externo sensu illum distrahere promittunt. Ibi, nisi interdum vehementia doloris ipsum circumagit, alta quiete se tenet, ac ceu nimis laboriosa iam esset respiratio, obscure vixque observabilis aera trahit,

Lz 3

nisi

25) Acuta febris HIPPOCR. Epidem. lib. III. Aegrot. XI. XV. ardens MORGAGN. de sed. et caus. morb. Ep. IV. 26. COITER. Observat. anatom. et chirurg. p. 110.

26) Phrenitis SCHENCK. Observ. medic. rar. libr. I. p. 63. MORGAGN. de sed. et caus. morb. Ep. VIII. 2. 9. Febres perniciosae CARDAN. de subtilit. libr. XII. (Oper. Tom. III. p. 563.) Ileum MORGAGN. l. c. Ep. XXXV. 2. Huc pertinet et LORRY de Melanch. P. I. p. 231. ex infelici nuncio color statim in luridum mutatus, prostratus appetitus, vomitus nigri, subserum delirium, quinta die mors.

27) SCHNEIDER de catarrh. lib. I. p. 428.

HOFEMANN Med. System. Tom. IV. P. IV. pag. 146.

28) Syncope WOODWARD Select. Cases in Physic p. 3. frequens WHYTTE prakt. Schrift p. 397. Epilepsia excepta AMAT. LUSIT. Cent. II. Cur. 100.

29) AMAT. LUSIT. Cent. II. Cur. 9.

30) CARDAN. de subtil. Tom. III. p. 563. MARCELL. DONAT. de med. hist. mirab. p. 282. 283. FABR. HILDAN. Observ. med. chirurg. Cent. VI. obs. 12. BOERHAAVE de morb. neru. p. 413. THORESBY Topography of Leeds p. 625. MORGAGN. l. c. Ep. XLVIII. 44. ROBINSON of the spleen, vapours etc. p. 91.

nisi cum prementi sanguini vias patefacere profundo suspirio cogatur. Insuper penitus animo insidentes curas produnt, pallor faciei ac marcor; oculi omni splendore orbati, veluti emortui, magisque in cauis suis absconditi, supercilium super illa propendens, ac inferior palpebra paululum obducta, ipsi denique contenti et ad idem obiectum semper conuersi, quo ipsius tandem perceptio obfuscata haud amplius turbet; in omnibus ceteroquin motibus languor apparet. Sic totus damni perpeffi sensui inhaerens, circa quamlibet amissi praestantiam commoratur, utque crude scat adhuc malum, cuncta memoria reuocat, in quibus illius beneficio felix quondam fuit; nec adeo fidus in reminiscendo, ut haud exaggeret bona, aut incommoda obliuiscatur. Neque quid deficiat, quod praesentem valeat aerumnam augere, imaginatione ad ea insuper vitae momenta transit, quae maxime infausta expertus est, et quaecunque circum se siue futura prospicit, ceu per caliginem atque nebulas contemplatur, quae sinistra amplificat, lucidis atrum colorem impertiuntur. Quibus addas adhuc oportet; ut, cum omni opus sit annisu, tam fortem sensum remouere, ac, quibus abstrahendi ab illo facultas foret, negotia subire, ea, quae non amplius delectant et parum plerumque multo cum labore protrahuntur, adque leuissimam et quam saepe alienissimam putares, occasionem totus luctus resuscitatur, non nisi cum summa molestia in illis perseveret, ac plerumque statim ab initio defatigatus, ab omni porro conatu desistat. Et hoc quidem animae vires magis adhuc fraugit, ac ultimum veluti adminiculum eripit, cuius ope reluctari ultra serpenti aegritudini possent. Si quoque in libri cuiusdam lectionem incumbant, is eius plerumque qualitatis est, qui similem aliorum fortem depingat; quibus noua continuo alimenta sumit affectus, ac communis quasi miseriae humanae fidem facit. Denique, quae illis minus grata accidunt, et quae incolumes certe spreuissent, nunc in monstra transfigurant, vel ultra fas minimum illis afficiuntur.

Iam vero sanitatis dispendium, quod inde causatur, nouum calamitatis fontem aperit, vel crudum potius vulnus suo veneno temerat. Etenim, quae modo dicta sunt corporis mala, quae ex sua iam indole moestitiam sibi comitem adiungunt, pro illa, quae inter corpus animamque intercedit, harmonia, vicissim ex ea quoque scaturiunt; et rursus conferunt additamenta doloris. Ille enim artum corporisque languor, qui in omni tristitia sentitur, et eneruis humorum, neque ad superficiem penetrans, motus, et, quae disperit, cibi appetentia, nonne neruos suo robore defectos testantur? Sanguis autem, circa praecordia accumulatus, ea ac intestina distendit, et, vocibus ex sensus natura desuuntis, pungit, vellicat, lacerat, anxietate quadam accedente, quae ex intercepta respiratione, et corde, vasisque mole humorum obrutis, prouenit. Hi porro, impetus vigore destituti, facillime stagnant, praesertim ubi iam vis, a corde proficiens, transitu per fines arteriarum infracta, ac ipsi ex oleosis particulis glutinosiores, rectaque adscendentes, similes permeare angustias necesse habeant. Ita vero digestio grauius adhuc laesa eo minus nutrientes succos corpori parat, et humores ad acredinem vergentes, mox ab initio iam febris speciem gignunt, ad lentarum naturam penitus accedentem.



## §. XXIV.

*Effectus lenti moeroris.*

Ex his, ad illustrandam diri verique mentis morbi historiam, praemissis facile iam cuicunque apparebit, quam inde valetudo contrahat cladem, quam saeva mala, ac pestifera propullulent. Etenim ea, quae ex vita nimium sedentaria ac otiosa, ex summa animi contentione, qui continuo et undiquaque nouam tristi meditationi materiam quaerit, omnium citissime vires exhaurienti; ex nervis debilibus et veluti resolutis; ex cessante insensibili per poros cutis exhalatione; ex idea denique una eademque menti inhaerente, singulis ortum ducunt, hic ex cunctis simul existentibus eo celerius et valentius sanitatem euertunt. Quippe quibus paullo ante commemoratis illius noxis insurgens breui moeror stipatur, istae, quotidie crescente ipso, ad summum fastigium eueclae, ulli postremum remedio insuperabiles euadunt. Itaque, qui modo stagnaret, sanguis nunc stasi et obstructione rebeli lien praesertim atque hepar infestat, et proximam ictero calculisque felleis nascendi occasionem exhibet. Quibus, bilisque secretionis negotio impedito, iam antea alienatae concoctionis vires eo consummatius fractae, ab omni latere ingrauescenti cacochymiae prospiciunt. Hoc modo, ipsaque nervorum affectione, aegrum vel lenta tandem febris depascitur, vel labe omnium, qui sub hypochondriis habitant, viscerum laborantem, atroces omnis generis afflictiones exercent, quae in foeminis hystericae magis adhuc promouentur, quod menses vel in ipso fluxu turbati, vel lentore humorum ac stasi sensim intercepti, longum secum calamitatum agmen ducunt, quae eo certius inde fluunt, quod illi non, ut in caeteris pathematibus, sequenti periodo aut remediis restitutionis spem relinquant, sed persistente causa omne auxilium spernant, quod et in viris, quibus haemorrhoides fluentes inde evanescent, accidit. Inde haud rara melancholiae origo, quam humoralem cel. Lorry appellat, et phaenomeni istius. quod veteribus atrae bilis nomine venit, sanguis nempe in vasis ventriculi et intestinorum haesitans et crassus, illa magis magisque, extendens, tandem elabitur, ibique corruptus adhuc quiete, vomitu vel deiectione niger foetidusque eiicitur. Hic vero animi morbus et ex ipsa mente primordia capit, eadem perenni cogitatione detenta, ac citius tardiusue in maniam degenerat. Nervorum vero illa debilitas, continua agitatione incrementa sumens, in veram tandem atoniam degenerat, sic paralysis, et eius species aphonia, inde orta dicuntur; aut diras spasmodicas affectiones, epilepsiam et catalepsi gignit. Quae posterior, quoad ex summorum Virorum<sup>31)</sup> opinione, tyrannicae cuidam ideae regnanti, animamque quasi totam absorbenti, tribuenda videtur, ad hunc prae aliis affectum pertineret. Porro ex suppressa perspiratione fluidum, quod illa excernitur, nisi uberiori urinae secretionem, quod rarius, educitur, vulgarem illum ex hoc affectu morbum, Cachexiam creat, vel in intestinorum canalem erumpit, ac haud cessante diar-

31) Vid. HALLER Phyf. Tom V. p. 556. et VAN SWIETEN Comm. Tom. III. pag. 312-13. 316-17

diarrhoea illum relaxans, nutrientes simul succos abripit, hominemque iugulat: frequens ex Ill. BALDINGERI <sup>32)</sup> quem praeceptorem mihi contigisse semper in deliciis habeo, auctoritate effectus, qui inter fonticas causas morborum, milites in castris degentes adorientium, animi perturbationes iure quam maximo censuit. Vel denique in caua corporis abundantes aqueae partes secedunt, et varias hydropis species generant; qui tanto facilius superuenit, cum respiratione molestiori et retenta affhinati pectus opportunum, aut, a resistentia sanguinis et copia, cor iam languidum palpitationi, ipsumque ac vasa maiora aneurysmati ac polypis obnoxia reddantur; quibus se malis aquarum in pectore accumulatio saepissime adsociat. Tandem et sphacelus, sponte in senili corpore obortus, scirrhiq; ac canceri iam extirpati ob stasim humorum et acredinem recrudescentes, obseruati sunt <sup>33)</sup>.

## §. XRV:

32) Von den Krankheiten einer Armee u. s. w. 2te Aufl. p. 105-120. p. 108. In wenig Tagen fieberten sie heftig, sie bekamen Durchfälle, sie zehrten sich langsam ab, endlich starben die Elenden. Vid. et BAGLIV. Prax. Med. Lib. I. Cap. XIV. §. 5. Moeror nil frequentius producit, quam Diarrhoeas, quae, diu persistente moeroris causa euadunt insuperabiles.

33) *Hepatis obstructio*. SCHENCKII Obs. Med. Lib. III. p. 450. *Sphacelus* DODON. Obs. med. Cap. 30. Conf. Sanct. Med. St. Sect. VII. Aph. 3.

*Itterus et Calculi fellici*. HOFFMANN Med. Syst. Tom. IV. P. II. pag. 283. (Edit. Francof.) P. IV. p. 377, 379. Conf. VAN SWIET. Comm. Tom. III. p. 131.

*Lenta febris*. LORRY de Melanch. Tom. I. p. 180; cum subseq. hydrop. BAGLIV. Prax. med. Lib. I. Cap. XIV. §. 4. cum ictero, HOFFM. I. c. p. 377.

*Hypochondr. et Hyster. Affectiones*. HOFFMANN. I. c. Tom. IV. P. II. p. 240. P. III. p. 215. 228.

*Mens. flux. enormis*. HOFFM. I. c. Tom. IV. P. IV. p. 379. *Haemoptoe* SCHENCK. I. c. p. 260.

*Melancholia*. SCHENCK. I. c. p. 145. 146. HOFFM. Med. Syst. T. IV. P. IV. p. 230. El. Consult. et Resp. Sect. I. Cap. 35. BONNET. Med. Septentr. Lib. I. Sect. XIX. Cap. 2.

*Mania*. WEPFER. Obs. med. pract. Obs. 33. BIERLING. Aduers. curios. Cent. I.

Obs. 65. VALERIOI. lib. II. Obs. 7. AMAT. LUSIT. Cent. III. Cur. 56. Cent. V. Cur. 84. MORGAGN. de sed. et caus. morb. Ep. LII. 4. VAN SWIET. Comm. Tom. II. p. 585.

*Paralysis*. ALEX. TRALLIAN. Lib. I. c. 16. *Aphonia*. BONNET. Med. Sept. Lib. II. Sect. XVIII. cap. 4. SAXOGRAMMAT. Hist. Danic. lib. 14.

*Epilepsia*. SCHENCK Obs. med. p. 157. BOERH. de morb. nerv. p. 833.

*Catalepsis*. SAUVAGES Hist. de l'Acad. Roy. des sc. 1742. p. 409. seq. Conf. l'année 1738. p. 58. RONDELET. method. curand. morb. Lib. I. Cap. XX. p. 98. DIOMIS Diss. sur la Catalepsie p. 24. HOFFM. Med. Syst. T. IV. P. III. p. 129. Conf. TULPII lib. I. Obs. 22.

*Cachexia*. HOFFM. Med. Syst. Tom. IV. P. IV. p. 202. 204. cum *hydrop. abdom. et pect.* p. 464. 469. *Scorbutus* HOFFM. I. c. T. V. p. 44.

*Palpitatio* subseq. morte. MORGAGN. de sed. et caus. morb. Ep. XXIII. 4.

*Polypus*. MORGAGN. I. c. Ep. XVIII. 30.

*Pectoris oppressio*. HOFFM. Med. Syst. Tom. IV. P. I. p. 517. cum subseq. *apoplexia*. Idem I. c. P. II. p. 182. cum *Convulsion*. HOFFM. Conf. et Resp. Sect. IV. Caf. 137.

*Cancer Mammarum*. PECHLIN. Lib. III. Obs. 21. BOERHAV. de morb. nerv. p. 70.

*Sphacelus pedis et mors* HOFFM. Med. Syst. Tom. IV. P. V. p. 85.



## §. XXV.

*Metus, an fibrae in illo constrictae sint?*

In metu cel. LORRY putat tonum fibrarum non supprimi, sed nouum potius illis impertiri. Qua in re sicuti communi illustrium virorum sententiae sua aduersatur, ita, quo minus ad ipsam accedam, faciunt et momenta, in quibus homines timori concipiendo aptissimos deprehendimus, et quae ex illo phaenomena conspiciuntur. In genere enim eos offendimus timidiore, qui nullam virium suarum fiduciam habent, qui illis vel vigilia ac laboribus diurnis exhausti, sensusque iam hebetioris sunt, vel quibus morbus illas fregit, praesertim qui praecordia male habet; horum vero nerui utique debiliores sunt. Ex illo igitur mutuo corporis animique commercio, quo semper, si similes illius, quae ex commotionibus pendet, conditio in corpore reperitur, similes quoque ideae producuntur, concludi oporteret, in metu omnino tonum neruorum fibrarumque imminui. Nec oppositum mihi fore quinquam spero, tunc et terrori eos esse magis expositos, in quo tamen vires reuera augentur. Hunc enim suscipiendi facilitas ex mala fere semper consuetudine venit, et ideo tantum in morbis attenditur frequentius, quod magnae tunc esse calamitati comperitum est. Eos enim, qui vigente sanitate nequitiam hoc vitio laborabant, neque in morbis illi magis obnoxios inueni, quamquam ob summam, qua essent afflicti, neruorum debilitatem, tristitia sibi quaeque futura prospiciebant, vanisque curis animum excruciabant. Porro, etsi faciem pallor occupat, illa tamen fibrarum constrictio minime animaduertitur, neque oculi intenti comparent ac defixi, sed qui sibi ab omni latere circumspiciunt. Etiam frigidus ille sudor, quo frons sensum madere incipit, et qui idem in mortis articulo cernitur, ubi nerui iam resoluti sunt, consentaneam quandam infirmitatem arguit. Cor denique non tam palpitatur, quam tremit. Neque ille gelidus, qui per ima currit ossa, tremor spasmi testis planum facit, qui ad terrorem, non ad metum, pertineat. Ubi enim animam formido incessit, praesertim si obuolutae tenebrae rerum faciem premant, ad leuissimum quemque strepitum patientes momentaneo terrore contremiscunt. Miasma denique, in quo morbi vis est, qui contagio serpit, quod, in corpus per poros ingressurum, nil ipso timore melius adiuuat, nonne hos apertos testatur, minimeque ex strictura fibrarum, quae praesumitur, oclusos? In animae quoque facultates extenditur illa ex timore imbecillitas, quas hebescere exinde saepius experiuntur viri, qui timidiore primum ad principum regumque praesentiam admittuntur, et quantum memoriae vis inde infringitur, vel pueros non latet, qui timefacti illa vacillant ac labantur; etsi optime ea prius memoriter tenebant. Necesse tamen est, ut a timore tunc illum statim excludamus, qui a terrore propior est, vel in quo potius is quasi continuatur, horrorem dicunt. Etenim hic utique veluti spasmum constringitur cutis, similisque illi ex gelu euadit; tunc frigidi trepidant artus, tunc comae arripiuntur.

## §. XXVI.

## Metus Effectus.

Praecipue autem ab hac perturbatione cor afficitur, atque, quae vitalia dicuntur, organa, de quorum viribus multum detrahitur. Quae igitur impotentia magis non ita in cutis vascula sanguinem propellunt, inde pallor, quem ex metu impressum per omnem adeo vitam mansisse notatum est <sup>34)</sup>. Eo ipso vero circum cor magis accumulatur sanguis, quod inde obrutum palpitatur <sup>35)</sup>, ac languida illum vi expulsum lente per vasa incedere causatur. Quo fit ut iste, ceu saepius in venae sectione occurrit, quasi gelatus sistatur, pulsus evanescat, fluidis autem partibus, relaxatis insuper vasis, maior opportunitas secedendi a massa sanguinea datur, ac per laterales poros e corpore egrediendi, id quod sudorem <sup>36)</sup> frigidum gignere non inultum a vero abest, quemadmodum etiam diarrhoeam procreare, subitum in quibusdam ex timore effectum <sup>37)</sup>. Quae vero et ex eo provenire potest, quod, ab incumbenti sanguine expansa, vasa huius ponderis inconsueta intestina vellicant, et ad contrahendum sese stimulant, quod et in vesica, quae urinam colligit, locum habere potest, nam et hoc frequenter accidit hac commotione perculsis. Inde enim libentius illa deducere, quam ex paralytica quadam sphincteris illius et recti resolutione, in qua vix sentienti ac lente excrementa elaberentur. Tardo vero sanguinis fluxu, et qui superficiem deserit, perspirationis negotia turbantur, quod facilitati addit, qua materia, cui contagii vis est, per poros in corpus suscipitur. Idem porro circa pectus magis haerens respirationem minus expeditam reddit, ac cordi vasisque resistens et angoris illum sensum producit, et lipothymiam <sup>38)</sup> causatur et aneurysinati <sup>39)</sup> ac polypis nascendis ansam dat. Diarrhoea <sup>40)</sup> vero, quae momento saepius timorem comitatur, illi nonnunquam, si diutius mentem inhabitat, superuenit, tunc vero in praecipiti esse aegros observatum est; plerumque autem in affectu, qui sic perdurat, non potest, quin ex ipso eo tristitia metui accedat ac suis noxis calamitatem augeat. Pro ea autem debilitate, qua solidas partes infestat, digestionem quoque subvertit, quae laesa iterum haud parum formidinem fouet, sic ut ex utraque causa, nervisque quasi incisis, pertinacissimae affectiones

34) PECHLIN. Lib. III. obs. 19.

35) HOFFM. Consult. et Respons. Sect. IV. cas. 142.

36) Resolutio vasorum in causa esse debet, quare sanguineus adeo sudor, in ultimo metu observatus, contigerit. Vid. THUAN. hist. f. t. lib. X. et HENR. VOGLER Comment. diæt. p. 281.

37) Huius vero, in omni metu consuetae, exemplum vid. PECHL. lib. III. obs. 18.

38) De Verulamio id memorat PECHL. lib. III. obs. 23.

39) LANCIS: de motu cord. et aneur. proposit. 44. Conf. MALPIGH. de polypo, PECHLIN. lib. III. obs. 18.

40) SPINDLER Observat. medicin. ad obs. 96. p. 172. narrat, ob metum hostis, in propinquo strage et incendiis omnia vastantis, alios diarrhoea; alios dysenteria, alios febribus acutis extinctos. BAGLIV. prax. med. lib. I. cap. XIV. §. 5. metu ob terrae motum Romae plures febre correptos periisse. Huc quoque pertinet PECHLIN. lib. III. obs. XXIII. nuntium subitae Gallorum in media Bataurorum provincia apparitionis alios morbo, alios morte luisse. Cf. et ill. BALDINGER lib. cit. pag. 105. seq. qui auctor est, metum militibus, qui in castris viuunt, morborum causam esse.



ctiones melancholicæ<sup>41)</sup> generentur; quod in iuvene quodam litterato vidi, qui omnibus diffidens, neque veneno inficeretur, continuo anxius, tandem vera insania inuaderetur. Quæ vero atque mania<sup>42)</sup> et in hac perturbatione communem causam inuenit, illam nempe infixam plenamque non interrupti timoris ideam, quæ mentem exercet atque defatigat. Cum vero terrori propior est, simili quoque potentia nervis diuturnam labem<sup>43)</sup> imprimere, atque ipsam mortem<sup>44)</sup> accelerare valet. Inque tanta commotionis violentia, ubi ultima calamitas ipsumque supplicium ante oculos versatur, longiori minoriue intervallo adeo illa nutritios succos alienauit, ut aemulans se-nectutis vim canum capillis colorem<sup>45)</sup> induxerit.

## §. XXVII.

*Quid metus et tristitia ad morborum propagationem et periculum conferat.*

Hic adhuc mentio facienda est illius, quæ penes metum atque tristitiam peculiaris fere est, potestatis, contagio propagandi morbos epidemicos, et quæ non ipsa tantum facilius recipienda materia consistit, sed ea quoque mutatione, quam nervis atque humorum masse largitur; puto, ut dispositio iam adfuerit, quam tamen forte natura superasset. In illa epidemia, quæ anno huj. Saec. LXXII. omnes fere Germaniae regiones peruagaret, diuerfos in patria noui, qui cum domos intrassent, ubi ipsis insciis alio morbo aegri iacebant, metu, ne infecti essent, continuo in ipsum morbum inciderunt. Id quoque testantur, qui ex visis tantum recentibus a variolis relictis maculis, vel ex audito morbi in vicinia nuntio, ipsis fuerunt correpti<sup>46)</sup>. Inde tristis et uberior mortis messis in peste<sup>47)</sup> ac obsessis urbibus<sup>48)</sup>. Sed periculum,

A a a 2

quod

41) Melancholiam ex metu habet BOERHAVE de morb. neruor. p. 411. van SWIET. Comm. Tom. III. p. 475.

42) *Mania*: LORRY de Melanch. T. I. p. 167. *Delirium*: Eph. Nat. Cur. Dec. II. ann. IV. obs. 29. BLANCARD. Collect. med. phys. Cent. V. obs. 17. THUAN. Hist. f. temp. lib. III.

43) *Epilepsia*: BOERH. I. c. p. 853. *temor molestissimus*: van SWIET. T. II. p. 183.

44) *Mors*: MARC. DONAT. de med. hist. mirab. p. 285. RHOD. Observ. med. Cent. I. obs. 45. BARTHOLIN. Hist. anat. rar. Cent. IV. hist. 76. THORESBY Topograph. of Leedes. p. 626. Conf. HALLER Phys. T. V. p. 585. Not. e. f.

45) *Canities subita*. Collectiones hor. casuum vid. in MARC. DON. I. c. Cap. I. et SCHENCK. obs. med. lib. I. obs. I. Conf. BORELLI Cent. I. obs. 26. ubi canus color

rursus euauerat. THUAN. hist. f. t. lib. XIII. PECHLIN. lib. III. obs. 20. BOYLE Usefulness of natural Philos. Chap. XIV.

Adolescentem ex timore quasi stupidum, postea tumoribus materia subalbida plenis ac omnes corporis partes obsidentibus mortuum, habet MORGAGN. de sed. et caus. morb. Ep. LXVIII. 12.

Sanatam ex metu arthrit. FABR. HIL-DANUS Ep. 47. 48. SCHNEIDER de catarrh. T. V. p. 648. *subultus musculor.* WHYT. pr. Schr. S. 572. *Melanchol. inde fugatas* vid. in VAN SWIETEN Comm. Tom. III. pag. 514.

46) PECHLIN. lib. III. obs. 23. BOYLE Usefulness of nat. Phil. Chap. XIV.

47) HELMONT. de tumulo pest. p. 981. DIEMERBROECK tract. de peste pag. 859. PECHLIN. lib. III. obs. 16.

48) BAGLIV. prax. med. lib. I. cap. XIV.

§. 5.

quod ipsi primum accerferunt, maius adhuc ac reuera pestiferum reddunt. Quod enim naturae viribus ad glandulas secederet miasma, vel pustulis ac pure e corpore promoveretur, siue in sanguine remanet illique dissoluto putredinem conciliat, siue nervos ac nobiliores partes funesto effectui premit. Cuius simile quid causatur, ubi morbida materia ad articulos secessit, illique haerens corpus grauioribus damnis immune sistit; illa enim ex his perturbationibus saepius reuertitur, aegroque summum periculum<sup>49)</sup> minatur. Haec autem istorum affectuum noxa in omnibus in genere morbis locum habebit, quorum solutio contrarias mutationes efflagitat. Haemorrhagia ex partibus internis inde ob frigus extremorum increscit. Inflammationes facilius in gangraenam ruunt, quae salutari crisi per diapnoën, vrinam, sputa soluerentur febres<sup>50)</sup>, ex suppressis nunc illis, vel minus coctis et saturatis, vel longa aegrum mora malisque infrequentibus vexant, vel celeriter rapiunt. Quare omnibus remediis saepe potentior fiducia medici, si comparare illam sibi medicus callet, vel ipsius dexteritas ad spem aut desiderium sanitatis aegrotum reuocandi.

## §. XXVIII.

### *Pudor.*

Pudor cum timore praeter ipsum sensum, quo quaedam huius species est, nil fere commune habet, externa enim facie totus ab illo differt. Verum tamen est, nunquam pudorem nasci, nisi ubi sententiam alterius de nobis minus propitiam vereamur, quam tamen exoptaremus; ideoque in illis tantum locum habere potest, quibus non indifferens sit aliorum de ipsis opinio, quanquam oporteat quoque, ut quaedam adhuc imperfectionis conscientia adsit, vel modesta minimum de se ipso opinio. Si commissa illum culpæ excitat, ea tamen ex consideratione tantum, quid alii de nobis iudicaturi sint, ipsum iniicit; ubi enim de aduerso alterius iudicio iam certi sumus, non tam pudorem, quam tristitiam, vel desperationem, sensu experimur. Hinc et illa in pudore confusio, qua animi facultates obfuscantur quasi, simili illi, qui in metu est, effectui. Qui vero in hoc superficiem magis deserit sanguis, in pudore per omnem cutim suffunditur, ac, ubi ipso rubore et transparentia sese haud manifestat, calore tamen sentitur, qui a facie incipiens continuo totum corpus peruat; copia vero sanguinis ad caput adscendentis facit, ut ibi primum ipsius indicium se prodatur. Id quod vero testatur, sanguinem veluti obstaculo quodam retineri, nam si ex solo incitatori cursu proveniret, sane non illum laetitiae aut irae ruborem exsuperaret; quae vero remorae causa in toto corpore obtineat necesse est. Ea igitur vel circa arteriarum fines, ubi iam in venas transeunt; vel ubi hae in comunem ex omni parte truncum confluunt, circa saccum venarum cauarum, quaerenda esse videtur; ibi

§. 5. Moeror producit malignas febres in urbium obsidione.

49) Ex arthrit. moerore repulsa conuulsiones et mors MORGAGN. de sed. et caus. morb. Ep. LVII. 10.

50) PROSP. ALPIN. de praef. vit. et mort. p. 53. Ex metu complures febres acutae et lethales inuadunt, quibus omnes fere moriuntur. Conf. SANCTOR. Med. Stat. Sect. VII. §. 10.



ibi enim tantummodo fibrae musculares reperiuntur, quae constrictione quadam ostia fluentis sanguinis angustare, ac in uniuerso simul corpore eundem valerent retinere. Huic vero causae non ita neque rubicundus ille color responderet, qui, admonente cel. WHYTT<sup>51)</sup>, magis ad illum suffocati liuidum vergeret, neque color totum corpus tam cito perambulans, qui in arteriis magis, quam venis sentitur. Quocum caeterum etiam conuenit mensium fluctus inde interceptus<sup>52)</sup>, quod quidem phaenomenon illi potius in minimis vasis vel constrictioni, vel turbac sanguinis productae faueret. Mors vero, quae ex pudore causata proditur<sup>53)</sup>, v. gr. Diodori Chroni, potius indignationi ac tristitiae, quae ipsum exceperunt, quam ei ipsi adscribi debet. Ne vero et exemplum desit, eam quoque perturbationem in remedium esse vocatam, istud GABRIELIS Arabis subiiciam, dignum sane quod memoriae traderetur, et ob subtile hominis inuentum, et ingeniosam certe causam, verique multum similem, cui ipsum morbum tribui debere putauerit<sup>54)</sup>.

## §. XXIX.

*Terror.*

De *Terrore* iam supra commemoratum est, quod saepe in tristitiam aut metum abeat, et hunc vicissim insequatur; id quod huc et illuc effectibus eorum commutandis occasionem praebuit. Si quis, ut casum ponam, noctu loca adit, quae imaginatio eius horret, coemeteria et huiusmodi, qui illum tenet affectus, metus est. Verum cum nunc improvisi quid superuenit, si in sepulchro pes haereat, terroreprehenditur. Idea magni plerumque et repentini mali hic animum occupat et, fulguris

A a a 3

instar,

51) Prakt. Schrift. S. 292.

52) SCHELHAMMER anim. affect. p. 180.

53) LIVIUS lib. VII. cap. 53

54) Quodam autem die *Al Raschidi* concubina cum inter pandiculandum manum sustulisset, mansit ea extensa, adeo ut retrahere ipsam nequiret; cui cum medici linimento et unguentis adhibendis nihil proficerent, *Al Iaasar* ipsi *Gabrielem* (filium *Bachtistuae*) eiusque peritiam laudauit; ei ergo accersito, quomodo se haberet puella, indicauit. Si mihi, inquit *Gabriel*, non succenserebit Imperator *Fidelium*, est mihi ad eam sanandam commentum. Quodnam est illud, inquit *Al Raschid*? Ille, Prodeat, inquit, huc puella in omnium conspectum, ut, quod velim, faciam; tu autem patiaris me, nec subito irascaris. Iubente ergo *Al Raschido* prodiit illa, quam conspiciatus *Gabriel* ad ipsam accurrit, ac inclinato capite simbriam ipsius prehendit, quasi ipsam denudaturus; puella vero com-

mota, prae conturbationis et pudoris vehementia membra sua demittens, manu deorsum extensa simbriam suam prehendit: *Gabriel* autem, sanata est, inquit o Imperator *Fidelium*. Dicente ergo *Al Raschido* puellae, extende dextrorsum et sinistrorsum manum tuam, cum fecisset illa, miratus ille cum adstantibus omnibus, statim *Gabrieli* (dari) iussit quingenties mille nummos, ipsumque carum habuit. Interrogatus autem de morbi causa respondit, profudit se in puellae istius membra inter venerem humor tenuis prae motu et caloris diffusionem, et cum subito e motu coitus quiesceret, congelatus est in interiori parte neruorum, adeo ut, nisi a motu consimili, solui non posset: usus sum ergo commentum, quo dilatato calore solutus est humor superfluum, ipsaque sanitati restituta. GREGOR. ABUL-PHARAJI Historiae orientalis (Dynastiarum, Oxoniae 1662. Versionis EDUARD. POCCOCK.) p. 134.

instar, extremorum quorumcunque periculo percellit. Hinc totum nervorum systema concutitur, spastica constrictio momento ferè omnes partes inuadit; inde sanguis superficiem refugit, labia liuida pallidaue tremunt, oculi contenti haerent et exsuccii, respiratio cum vehementi expiratione intercipitur, extremitates conuelluntur, totum corpus contremiscit, locoque affixum stat; perspiratio et ceterae excretiones supprimuntur. Cor, nisi sanguinis moli succumbit, id quod animi deliquia<sup>55)</sup> causatur, ad violentam contractionem incitatur, et humores per angustius spatium celerius propellit, unde pulsus citior. Ex his iam apparebit, quae et quanta inde mala imminant. Cor, vehementi actione et resistentia sanguinis eneruatum, postea tremit, palpitatur<sup>56)</sup>, quare et in hoc affectu polypus<sup>57)</sup> aut aneurysma<sup>58)</sup> sibi nascendi locum vindicant. Menfes<sup>59)</sup>, Lochia<sup>60)</sup>, et consuetae haemorrhagiae<sup>61)</sup> momento saepe cum dirissima sanitatis clade cessant, siue ex spasmo minimorum vasorum, siue, quemadmodum in plethora interdum, ob nimiam vasorum distentionem. Sed aequè facile vicissim haemorrhagiae<sup>62)</sup> inde producuntur, quod si in cerebro contingat, mortem subitanèam<sup>63)</sup> inducit, nisi et a cordis paralyfi haec procreetur. Abortus<sup>64)</sup>, siue quod tenera placenta sanguinis impetum non ferat, seu quod uterus inde ad contractionem stimuletur, inde frequentes ortum ducunt, quod et de inflammationibus, mammarum praesertim in puerperis, et uteri<sup>65)</sup> notum est. Neque minus erysipelata<sup>66)</sup>,  
variae

55) Lipothymiam morte exceptam habet LANCIS de subitan. mort. Cap. VI. Syncopep epilept. BARTHOL. Hist. rar. Cent. III. h. 41.

56) Palpitatio insequenti hydropè leth. Hoffm. Med. Syst. Tom. IV. P. III. pag. 259.

57) Polypum memorat RIVERIUS Cent. IV. obs. 21.

58) Aneurismatis causam terrificam pathemata sistere, docet LANCISIUS de motu Cord. et Aneurismat. Propos. 50.

59) Mens. intercept. vid. in SPINDLER Obs. med. 70. SCHARSCHMIDT Berliner Nachr. P. I. p. 305. Hoffm. Med. system. Tom. IV. P. II. p. 46. 86. cum orta inde cachexia Hoffm. l. c. Tom. IV. P. IV. p. 416. Hydropè: Id. ibid. p. 469. Epilepsia: Id. Tom. IV. P. III. p. 26. Hemiplegia: Idem Tom. IV. P. III. p. 31.

60) Lochia: Hoffm. l. c. Tom. IV. P. I. p. 516.

61) Haemorrhagias consuetae Hoffm. lib. citat. Tom. II. p. 160. 161. de narium haemorrh. id testatur BAGLIV. de fibr. motr. lib. I. cap. X.

62) Sanguis ex omnibus meatibus erumpens: SCHENCK. Obs. med. lib. III. pag. 458. Mentium nimius fluxus et saeva inde mala: Medical Essays and Observat. T. V. P. II. p. 471. sqq. Immanis uteri haemorrhagia: Hoffm. Med. Syst. Tom. IV. P. II. p. 125. cum conuuls. et abortu VAN SWIETEN Tom. IV. p. 497.

63) Mortis exempla vid. in MARC. DONAT. de med. hist. mirab. p. 284. BENIVEN. de abdit. cap. 63. BARTHOLIN. Hist. rarior. Cent. IV. obs. 76. PLATER. Obs. lib. I. p. 36. VAN SWIET. Comm. T. III. p. 365. Conf. et PLIN. Hist. med. lib. VII. cap. 36. RAYGER. Obs. med. 96. Misc. N. C. Dec. III. ann. 9—10. p. 114. obs. 57. MORGAGN. de sed. et caus. morb. Epist. LXXII.

64) Abortus: AMAT. LUSIT. Cent. III. Cur. 22. cum ingenti haemorrh. Hoffm. l. c. Tom. IV. P. III. p. 25. frequens: Id. ibid. p. 554. 556. Idem Consult. et Resp. Sect. III. Cap. 66.

65) Inflammatio Uteri: Hoffm. Med. Syst. Tom. IV. P. I. p. 516.

66) Erysipelas: Hoffm. ibid. p. 313.



variae febrium formae <sup>67)</sup>, tumores <sup>68)</sup> herniae <sup>69)</sup> adeo, huius perturbationis effectus leguntur. Verum et encephalum, nervique ex violenta illa concussione diras ac diuturnas lases contrahunt, hinc multa opportunitas lethargo <sup>70)</sup>, paralyfi <sup>71)</sup>, convulsionibus <sup>72)</sup>, epilepsiae <sup>73)</sup>, ex matris aut nutricis terrore adeo infanti inductae. Neque tamen negandum est, auxilio nonnullis fuisse eum ipsum terrorem, ut interdum, ceu Patrocli illa hasta, quae ipse inflixerat, vulnera sanaret <sup>74)</sup>, interdum et aliis causis producta tolleret, quo quidem pertinent, febres intermittentes <sup>75)</sup>, delirium <sup>76)</sup>, colica <sup>77)</sup>, hernia <sup>78)</sup>, arthritidis <sup>79)</sup>, paralyfis <sup>80)</sup>, quare adeo nonnulli eum, ceu remedium, suafere <sup>81)</sup>.

§. XXX.

67) Ephemera: BENIVEN. libr. de abdit. Cap. 62. maligna: BARTHOLIN. Act. Haffn. Vol. I. Obs. 75. Synocha cum purpura funesta HOFFM. Med. Syst. Tom. IV. P. I. p. 359, ex horrido insomnio morbus decretorius et lethalis. PECHLIN. lib. III. Obs. 17.

68) Scirrhus irresolubilis VAN SWIET. Comm. Tom. I. p. 190. Tumores glandul. Colli cum febr. lent. MORGAGN. de Sed. et caus. morb. Epistola XXII, 18. Icterus BOERHAV. Consult. med. Vol. I. p. 118. Cuius etiam exemplum cum cita morte vid. MORGAGN. l. c. Ep. XXXVII. 4.

69) RUYSCH Observat. Anatomico-Chir. p. 98.

70) Lethargus: HOFFM. Med. Syst. Tom. IV. P. IV. p. 72. duorum mensium, Memoires de l'Acad. d. Sc. An. 713. p. 419.

71) Paralyfis. BOYLE Exper. and Observat. Tom. I. Chap. IV. Exp. 2. (Works Vol. V. p. 89) lethalis: HOFFM. Med. Syst. Tom. IV. P. IV. p. 27. terrore producta et sanata DIEMERBROEK. Obs. et Curat. Med. Obs. 10. p. 9. terrore reuerfa HOFFM. l. c. p. 33. infantis ex terrore matris: HILDAN Obs. Medico-Chir. Cent. III. Obs. 56. Exempl. 4.

Aphonia: BARTHOLIN. act. Haffn. Vol. I. Obs. 10. SPINDLER ad Obs. 96. p. 171. RHOD. Obs. medicin. Cent. II. Obs. 29. BONNET. Medicin. Septentr. libr. I. Sect. XVIII. cap. 6. cum plenaria insensibilitate. Id. ibid. Cap. 9.

Amaurosis: SCHARSCHMIDT Berl. Nachr. P. III. p. 170.

72) Convulsionibus: BOERHAV. Consult. med. Vol. II. p. 29. HOFFM. Med. Syst. Tom. IV. P. III, pag. 67. 70. cum ingenti

anxietate praecord. Id. ibid. p. 73. conf. LORRY de Melanch. Tom. I. p. 37. Tremor eximius per XX. annos VAN SWIET. Comment. Tom. II. p. 182.

73) Epilepsia: SCHENCK. Obs. med. lib. I. p. 116. 117, 137. BINNINGER. Obs. med. Cent. I. Obs. I. SPINDLER ad Obs. 96. pag. 171. BOERHAV. de Morb. Nerv. p. 800, 801. Ephem. N. C. Ann. 1730. p. 302. SCHARSCHMIDT Berl. Nachr. Tom. I. pag. 134. VAN SWIET. Comm. Tom. III. p. 393, 415. HOFFM. Med. Syst. Tom. IV. P. III. p. 25. ex viso epileptico. BAGLIV. Prax. med. Lib. I. Cap. XIV. §. 2. Infantis ex terrore matris grauidae FABR. HILDAN. Cent. II. Obs. 8. ex terrore nutricis HOFFM. l. c. T. IV. P. III. p. 27.

74) Vid. exempl. cit. ex DIEMERBROEK Obs. et Cur. med. Obs. 10. pag. 9.

75) Quartanas habet: MARC. DONAT. de Med. Hist. mirab. p. 639. Conf. PARAEI Oper. lib. I. cap. 23. PECHLIN. libr. III. Obs. 24. HOFFM. Med. Syst. Tom. IV. P. III. p. 215.

76) VAN SWIET. Comm. Tom. II. p. 334.

77) Ephem. N. C. Dec. III. Ann. 10. obs. 243.

78) ZACUT. LUSITAN. lib. II. Obs. 65. PECHLIN. Lib. III. Obs. 27.

79) Arthritidis: SALMUTH. Cent. I. Obs. 48. PECHLIN. Lib. III. Obs. 23. BOYLE Exper. and Observat. Tom. I. Chap. 4. Exp. 3.

80) HORST. Oper. P. II. lib. XII. obs. 15. BLANCARD. Collect. medico-physic. P. I. Cent. III. Obs. 47. Conf. TULP. Obs. lib. I. cap. 41.

81) Vid. HORST. Oper. Tom. III. p. 38.

## §. XXX.

## Ira.

Quinam sint *Irae*, omnium fere violentissimae perturbationis, effectus, ex ipsius notione nunc facile patebit. Terror est ex offensa, quem vindictae cupido excipit. Hoc quidem potissimum valet de illa, quae ex improuisa iniuria excitatur; verum cum paulatim increfcit, ac inter ipsam iam altercationem aliis aliisque exprobrationibus ad summum fastigium euehitur, vix de priori quidquam obseruatur. Et in genere notari oportet, haud aliam mentis commotionem magis gradu modoque, quo se manifestant, differre, quam iram. Quae vero cum primum inuadit hominem, plurima modo commemorata terroris signa exhibet, ac suffocanti similem reddit, in viscera tamen saeuit magis, spasmo biliarios ductus vel ipsam felleam vesicam constringente; dentes strident vel labra mordent, digiti implicantur. Hoc praesertim periculo premuntur, quorum quanquam praecordia bile exaestuunt, haud tamen erumpit indignatio, sed suppressa in sinu tantum furit, tenacissimi horridi iniuriae illatae sensus, qui nulla compensatione mitigetur. Ex hoc vero dirae sanitatis clades; bilis spasmo retentâ ac vasis resorpta icterum <sup>82)</sup> producit; obstructio hepatis, calculi fellei <sup>83)</sup> tristissima mæla chronica minantur; vel effusa bilis enormes diarrhoeas <sup>84)</sup>, dolores horrendos <sup>85)</sup> inflammationes intestinorum <sup>86)</sup>, creat; neruorum interdum paralyfes <sup>87)</sup> aut vehementissimae distentiones <sup>88)</sup>, aut chronica insania <sup>89)</sup> insequuntur. Inde haemorrhoides suppressae <sup>90)</sup> leguntur, et cordis palpitationes <sup>91)</sup> pectorisque oppressio et asthma <sup>92)</sup>; vel subita morte <sup>93)</sup> extincti. Plerumque tamen citius transit hic sensus, ac in ulciscendi cogitationem mens tota vertitur. Tunc vires vitales, iam antea excitatae, nunc nouo stimulo accensae, liberiori via, spasmo in superficie sublato, patente, sanguinem in omnem ambitum profundunt, oculi turgent ac igne micantes, tumentes faciei muscoli redduntur, lingua aut vociferatur, aut minus idearum celeritati obsequens balbutit, omnia membra agitantur. Perspiratio, quae in moderata ira intenditur, in summa illius vehementia constrictis prae repletio-

82) Icterus diuturnum. HOFFM. Consult. et Resp. Sect. III. cas. 57. nigrum et lethalem. Id. Med. Syst. Tom. IV. P. IV. p. 380: hepar mortui inuentum est durum.

83) Calculos felleos: PECHLIN Lib. III. Obs. 25.

84) HOFFM. Med. Syst. Tom. IV. P. III. p. 520.

85) Immanis circa ventriculum dolor. HOFFM. l. c. T. IV. P. II. p. 255.

86) Ileum: TULP. Liber II. Caput 20. HOFFM. l. c. p. 309.

87) TULP. Obs. lib. II. Cap. 20.

88) Ex indignatione tacita multos in epilepsiam incidisse SCHNEIDER. de catarrh. Tom. V. p. 282. Conf. BOERHAY. de morb.

neru. p. 548. HOFFM. l. c. Tom. IV. P. III. p. 39.

89) Maniam ex ira suppressa: VAN SWIET. Comm. Tom. III. p. 528. furem prae vinoictae cupidine HALLER. Phys. Tom. V. p. 564.

90) HOFFM. l. c. T. IV. P. II. p. 99.

91) Ingens palpitatio cum ictero et hydropse. PECHLIN Lib. III. Obs. 25.

92) Asthma et hydrops. HELMONT Cap. de Asthm. p. 291. No. 2. HOFFM. l. c. Tom. IV. P. IV. p. 474.

93) MARC. DNNA T. de Med. hist. mirab. lib. III. cap. XIII. p. 286. LORRY de Melanch. P. I. p. 34.



pletione vasorum poris, retineri videtur; sanguis vehementi motu resolutus extra vasorum orificia vagatur, aut ipsa ex impetus vi disrumpit, hinc abortus <sup>94)</sup> et omnis generis haemorrhagiae <sup>95)</sup>; vel ex hac humorum turgescencia, ac encephali irritatione acutissimae febres <sup>96)</sup>, phrenitis <sup>97)</sup>. Vicissim irae eadem cum terrore potentia, vel certior adhuc virtus est, medendi morbis, quae ex nervorum plenaria atonia aut humorum stasi proueniunt; neque mirari id debet in tanta nervorum excitatione et tam veloci sanguinis per omnem ambitum circulo, summoque inde producto calore. Quare varia leguntur exempla eorum, qui illius beneficio membri paralyti <sup>98)</sup> affecti, aut arthritide chronica <sup>99)</sup> laborantis usum recuperare, alii diuturna febre intermittente <sup>100)</sup> liberati sunt.

## §. XXXI.

*Corollarium.*

Liceat hic aduersus celebrem huius aevi scriptorem <sup>101)</sup>, cuius nominis cultoribus me caeterum lubenter adscribo, quaedam proferre, scilicet, contra ipsius sententiam de haereditariis morbis ex animi pathematibus petita. Si quidem Vir celeberrimus id tantum voluisset, non adeo frequentes esse morbos, qui constitutioni a parentibus et natiuitate acceptae debentur, totus in suam sententiam descenderem; sed plane nullos eius generis existere, in hoc non possum imperare mihi, quin dissentiam. Cuicumque enim de generationis negotio faueamus doctrinae, semper id manebit, simillimos saepissime esse parentibus liberos, si ad faciei lineas ac externarum partium configurationem respicias; has interdum in certis familiis gentilitias esse, et ipse vidi, et haud facile futurum puto, qui neget. Haec tamen ad musculorum ac ossium conformationem pertinent, quod si in externis locum habere potest, cur nec in internis quoque, cum

94) Abortus ex rupta placenta. PEU-  
pratique des accouch. livr. I. Chap. VIII.  
p. 70. HOFFM. l. c. Tom. IV. P. III. p. 551.

95) Haemorrh. ingens ex auribus. PECH-  
LIN. Lib. III. Obs. 25, arteria paene sanata  
iterum rupta: FABR. HILDAN. Obs. Med.  
Chir. Cent. I. Obs. 18. Haemoptysis. HOFFM.  
l. c. Tom. IV. P. II. p. 47. Vomitus cruen-  
tus. Id. ibid. p. 76. Haemorrhoid. nimiae.  
Id. ibid. p. 101.

96) Febris acutissima. HILDAN. de Va-  
let. tuend. Oper. p. 643. Vlcus iterum in-  
flammat. et ruptum Id. Obs. Cent. V. p. 465.  
ad Gonorrh. febris et summi dolores. Id.  
ibid. Duplex Tertiana cum Caro: HOFFM.  
l. c. Tom. IV. P. IV. p. 69.

Morbum nigrum ex excandescencia habet  
LORRY l. c. P. I. p. 282. Vertiginem per-  
tinacem HOFFM. l. c. p. 104.

97) Phrenitis: FABR. HILDAN. Cent. I.  
Obs. 17. MORGAGN. de sed. et caus. morb.  
Ep. XXXVII. 2.

98) Paralysis sanata. VALERIOI. Lib. II.  
Obs. 4. SCHULZ. Consil. med. 50. p. 149.  
Aphonia. VALER. MAX. Lib. I. Cap. VIII.  
BARTHOLIN. Act. Haffn. Vol. I. Obs. 18.  
Apoplexia ETTMÜLLER. Prax. P. II. pag.  
314.

99) Arthritis: RIDLIN. lin. med. Ann.  
V. mens. Dec. Obs. I. contractura. BAR-  
THOLIN. Hist. rarior. Cent. VI. hist. 28.  
podagra. PECHLIN. Lib. III. Obs. 26.

100) Quartana. Misc. Nat. Cur. Dec. II.  
ann. III. Obs. 93. PARAEUS Liber I. cap.  
29.

101) MEDIKUS Sammlung von Beobach-  
tungen aus der Arzneywissenschaft 2ter  
Band Seite 743—757.

cum naturae multo conuenientius sit, hoc de omnibus in uniuersum assumere <sup>102</sup>). Quid si parens renum aut pulmonum quodam vitio et debilitate laboret, cur non eiusdem structurae similes filius aequae bene acciperet, quam certam nasi aut malarum ossium formam, cur ergo non ex his quoque calculis renum aut phthisicis ac asthmaticis affectionibus opportunus redderetur? Multum huc facere vitae genus, non nego, sed hocine, infantum praecipue plebeiorum, adeo dissimile sibi foret, ut exinde hic, puer adhuc, calculo laboraret, cum nondum ad eam aetatem venerit, ubi eadem, quae parens, vitia perpetraret? Et nonne ipsa partis cuiusdam eminens debilitas morbus est? Sed et ex nutritione, quae a matre infanti in utero praebetur, morbos, qui nullo contagio propagantur, ab illa in natos posse transplantari, a vero propius abest. Ex nutricis terrore aut ira <sup>103</sup>) epilepsiam in infante produci, notum est. Ex ALBINI Diss. de sanguinis missione, et prauitate, in perill. v. HALLER, <sup>104</sup>) Elem. Physiol. adductum lego, sanguinem in puero ex vehementi ira nutricis per os, oculos, nares, aures, anum, pudendum incitatum profluxisse. Quanta hic lactis fuit mutatio a sola neruorum commotione profecta! Quae vero illa est eorum in epilepsia concussio, et quantum valebit ad istum infanti in ipso adhuc utero haerenti affluens nutrimentum alienandum! praesertim cum eiusmodi subiecta plerumque violentis animi pathematibus obnoxia sint. An non haec, saepius recurrens, tenerrimis infantis nervis constantem inprimere naeuum valebit? Quis est, quem fugiat, quanta sit difficultas, ne dicam impossibilitas, morbos tollendi, qui ex totum deprauata sanguinis mixtione ortum suum ducunt; eorum, qui ob arthriticam illam materiam podagra vel ex hypochondriis laborant? Sanguis vero nonne omnis ex matre in foetum transfunditur, nonne, in formanda adhuc partium structura, loca, quae potissimum eiusmodi materia infestat, ita immutare potest, ut per totam vitam inde facilius afficiantur? Interim utique credo, ex medentium ignorantia saepe haereditariis vitiis tribui, quae ex illis regiminis potius forent deducenda; modo nihil earum rerum esse, de hoc mihi persuadere non possum, et ignoscet vir aetumatissimus, si minus hic suae opinioni accedam.

102) Sit hic uni modo exemplo locus, quod HOFFMANN habet Med. Syst. Tom. II. P. II. Cap. II. §. 10. SCHOL: Patris maniaci, qui paroxysmi tempore cum uxore congregiens filium genuit post exactos pubertatis annos eodem malo correptum, cum ii, quos extra paroxysmum progenuit, liberi, ab illo immunes mansere. Confer

VAN SWIETEN. Comment. Tom. III. pag. 528.

103) Vid. supra adducta exempla et VAN SWIET. Tom. III. p. 403. Summa ex candescit ira nutrix, et imprudens dat ubera infanti, conuellitur ille, ut tot obseruata docuerunt.

104) Tom. V. p. 587. not e.



## XVIII.

CAR. GEORG. THEOD. KORTUM  
DE  
A P O P L E X I A N E R V O S A.  
G O T T I N G A E 1785.

## §. I.

*Quaedam circa definitionem apoplexiae.*

Qui apoplexiam definiuerunt, auctores plerique, praeter sensuum internorum et externorum motuumque voluntariorum subitanam ablationem, functiones vitales, respirationem puta et pulsum superstitas, quia imo auctas, tanquam necessarium illius characterem considerarunt, quo attonitus morbus ab aliis, potissimum ab animi deliqui vehementiori gradu distingui possit. Sufficiat ex ingenti numero BOERHAVIUM <sup>1)</sup>, HEISTERUM <sup>2)</sup>, KANNENGIESSERUM <sup>3)</sup>, ELLERUM <sup>4)</sup>, CULLENIIUM <sup>5)</sup>, excitasse. Quid quod iam antiquissimos medicos eandem sententiam amplexos videamus. ARCHIGENES <sup>6)</sup> enim ait: *Utque absolute dixerim, qui in hanc incidunt aegritudinem, sensu omni carentes mortui viuunt i. e. actiones vitales sunt superstitas, PAULUS AEGINETA <sup>7)</sup> disertè addit suae definitioni apoplexiae, respirationem superesse debere.* Quidquid horum sit variis ex rationibus mihi videtur, actiones vitales superstitas in definitionem morbi nostri sine limitatione recipiendas non esse. Dantur enim diuersi apoplexiae gradus quoad vehementiam, tam ex sensuum internorum et externorum motuumque voluntariorum immiuatione vel plenaria abolitione, quam praepriis ex respiratione et pulsu plus minusue superstitibus, determinandi. GALENUS <sup>8)</sup> iam a respiratione permanente, vel imminuta vel plane cohibita apoplexiae in debilem, fortem et acutissimam distinctionem desumit, et simile quid faciunt F. HOFFMANN <sup>9)</sup>, KANNENGIESSER <sup>10)</sup> alique. Nec cl. NICOLAI <sup>11)</sup> in apoplecticis quandoque respirationem prorsus cessare reticet. Permultorum igitur definitiones apoplexiae in fortissimum huius morbi gradum ne quadrare quidem adeoque definito

Bbb 2

suo

1) Aphor. 1008. Instit. med. §60.

2) Diss. de apoplexia magis chirurgicis, quam aliis medicamentis curanda, Helmstadt. 1752.

3) Diss. de apoplexiaresp. SCHLICHTING. Kil. 1756. §. 5.

4) Obss. de cognoscendis et curandis morbis. p. 279.

5) First lines of the practice of physic. Vol. III. §. 1032.

6) Apud AETIUM L. VI. cap. 27.

7) Lib. III. cap. 18.

8) Lib. II. aphor. 24.

9) Med. rat. systemat. T. IV. cap. I. p. 3.

10) Diss. cit. §. 18 — 21.

11) Pathologie B. IV. p. 160.

suo esse angustiores, quis non videt? Magnum huic rei pondus addunt obseruationes hominum apoplexia correptorum, et simul vita statim defunctorum, quales e. g. WILLISIUS <sup>12)</sup> de sene quodam obeso cacoehymico, WEPFERUS <sup>13)</sup> de homine inter prandendum, MORGAGNI <sup>14)</sup> de aethiope quum tuba caneret, nobis reliquerunt; nuperque adhuc simili fato Academiae Georgiae Augustae ereptus est Professor Theologiae celeberrimus WALCHIUS. Porro mortes subitaneas a variis causis v. g. vehementioribus animi affectibus, vaporibus mephiticis etc. inductas docente post multos alios ill. CULLEN <sup>15)</sup> commode ad apoplexiam referre possumus ob insignem, quam cum illa habent, analogiam infra fusius demonstrandam. Afferit quidem VAN SWIETEN <sup>16)</sup>, eos, qui subita morte plane perierunt, minus recte dici mortuos esse apoplecticos; nihilominus tamen alio loco causis apoplexiae cum BOERHAAVIO annumerat venenatos halitus v. g. vaporem fermentantis liquidi, fumum carbonum & s. p. qui in plerisque saltem casibus non animales solum sed etiam simul vitales functiones prosternunt. Ad hanc itaque difficultatem, quam ipse satis perspexit remouendam sequenti ratione procedit SWIETENIUS <sup>17)</sup>. Prostratis dicit a vapore mephitico actionibus animalibus vitales adhuc *per momentum* superesse; virulentiam vero illius fumi efficere, ut etiam ocyssime post animales functiones abolitas vitales deleantur. Sed praeterquam, quod *momentis* hic mercari, vix satis ratum videatur atque consentaneum, haec etiam explicatio non congruit cum phaenomenis, quae in exhalationibus venenatis extinctis obseruantur <sup>18)</sup>. Subito enim saepe animales eodemque momento vitales actiones sufflaminantur. — Denique repentinas modo dictas mortes plerasque ad apoplexiam pertinere causarum probat conuenientia, et illa obseruatio, quod morbi quasi iacentes saepe in vitam reuocari possint, plane eadem medela adhibita, quae in apoplexia consueta est. Omnia igitur analoga sunt; solum illud phaenomenon respirationis perdurantis aut sublatae induxit SAUVAGESIUM <sup>19)</sup>, SAGARIUMQUE <sup>20)</sup>, ut apoplexiam traumaticam ab asphyxia traumatica, apoplexiam carbonariam ab asphyxia eiusdem nominis longe separauerint, cum tamen iis ipsis fatentibus causarum et medelae ratio una sit eademque.

Optime igitur apoplexiam appellari posse existimo *sensuum tum internorum tum externorum motuumque voluntariorum subitanee abolitionem* <sup>21)</sup>, vel saltem magnam *imminutionem* <sup>22)</sup>, actionibus vitalibus saepe, non vero semper, *superstitibus, quin auctis*.

12) De anima brutorum c. VIII. p. 143.

13) Histor. apoplect. I. p. 424.

14) De sedibus et caus. morbor. ep. V. n. 17. p. 41.

15) l. c. §. 1052.

16) Commentar. T. III. ad aph. 1008.

17) l. c. p. 278.

18) vid. cel. GMELIN, praeceptoris pereximii, Allg. Gesch. der Gifte I. pag. 170. 175. et alibi.

19) Nosol. method. Cl. VI. ord. 4. §. 5.

20) Syst. morb. p. 540. 552.

21) PECHLINUS (Diff. de apopl. Leid. 1667. recus. in ill. HALLERI collect. Diff. practicar. Vol. I. §. 2.) apoplexiam mauult interruptionem quam abolitionem actionum animalium nominare, ne ex euentu pessimo genus determinet.

22) Plenariam enim abolitionem non semper adesse praeter alios b. SCHROEDERUS diff. de apopl. ex vitiis praecordior. origine §. III. docuit, et ab actionum animalium



*autis.* Consentiant mecum definitiones antiquissimorum medicorum, CELSI<sup>23)</sup>, ARETAEI<sup>24)</sup>, GALENI<sup>25)</sup>, neque minus LUDWIGII<sup>26)</sup>, IUCHII<sup>27)</sup> aliorumque, qui omnes functionum vitalium persistentium disertam mentionem definitionibus suis non iniecerunt. Obiciat vero aliquis in exhibita definitione apoplexiam ab asphyxia non rite distingui, neque hoc primo intuitu ita videri diffiteor. Sed ut, quid hac de re sentiam, rite explicem, quas diuersi auctores adduxerunt notas, apoplexiam a syncope distinguentes, in medium proferre oportet. ARETAEUS<sup>28)</sup>, *lipothymia*, inquit, *est genium resolutio et sensuum per aliquod tempus stupor et examinatio et casus*; quae vero definitio ideo improbanda est, quia animi deliquium omnino etiam diutius durare et perimere posse constat. Alii et quidem plerique, praecunte AEGINETA<sup>29)</sup>, eo, quod in apoplexia actiones vitales supersint, illam a syncope discernunt; de quo quid sentiendum sit, modo exposuimus. KANNENGIESSER<sup>30)</sup> *lipothymici*, ait, *ad se redeunt non solum sensuum internorum et externorum exercitium recipiunt iterum, sed partes etiam corporis omnes valent mouere, id quod ex graui apoplexia excitati possunt nequitiam.* Sed quantumuis hoc certum sit, pro signo tamen diagnostico inferuire non potest, cum non nisi superato iam morbo, cuius generis et indolis ille fuerit, nos condoceat. Addit idem, *plerumque in apoplexia faciei rubedinem, in lipothymia pallorem adesse.* Illud vero nequitiam semper ita se habere, ex sequentibus patebit.

Perpensis itaque, quae hucusque proposuimus certum non dari characterem, quo a syncope dignosci possint ii ad apoplexiam referendi affectus, in quibus praeter animales etiam vitales actiones deletae sunt, facile videri posset. Magnum interim diagnosteos adminiculum subministrant causae praegressae; cum apoplexiam plerumque non nisi grauiore vel diu iam corpori inhaerentes causae proferant, animus vero a leuioribus linguatur et momentaneis. Dein etiam KANNENGIESSERI mox adducta criteria non plane flocci sunt pendenda. Porro functiones vitales superstitae auctaeque, respiratio stertorosa et f. p. egregium omnino characterem constituunt, licet non semper adsint, adeoque in definitionem cum aliqua tantum limitatione recipiendae. Denique fatendum est, in iis morbi attoniti speciebus, quarum a lipothymia distinctio praecipue difficultate premitur, infra commemorandis, medelam plerumque eandem, vel saltem similem, ac in animi deliquio conuenire; ut itaque error hic forsan in diagnosi commissus nullum in praxin influxum exferat. Plura hac de re passim in progressu tractationis proponentur.

Bbb 3

Quae

malium minori vel maiori prostratione apoplexiae in *fortem* s. *exquisitam* et *debilem* s. *parapoplexiam* diuisionem desumpsit. Consentit CULLENIUS l. c. §. 1032. aliquali saltem ratione aboleri, quia etiam affectus soporosos alios, carum nempe, comam, cataphoram et lethargum huc refert.

23) De medicina L. III. cap. 26. *Apoplexia est uniuersalis paralyfis.*

24) Diuturnor. L. I. cap. 7. *A totius quidem corporis et sensus et motus resolutio est.*

25) Defin. med. n. 244.

26) Instit. pathol. §. 218.

27) Diss. sistens aegrotum apopl. correptum et sanatum. Erford. 1749. §. I.

28) Loco cit.

29) Loco cit.

30) Diss. cit. §. VIII.

Quae quidem omnia idcirco annotare visum fuit, quia complures mortes subitaneas, vel veras vel saltem apparentes omnino ad apoplexiam et quidem potissimum illam quae dissertationis obiectum constituit, pertinere censui, in quas tamen nota a respiratione ac pulsu persistentibus vel adeo auctis petita neutiquam quadrat.

## §. II.

### *Causarum apoplexiae agendi ratio. Apoplexia nervosa.*

Quodcunque facultate instruitur systematis nervosi illam, quae sensibus motibusque voluntariis inferuit partem, saepe etiam simul fontem actionum vitalium, sensum subitaneum tam ingrate afficiendi, ut eius functio momento insigniter imminuatur, vel plane tollatur, saltem ita imminuatur, ut in cessationem proxime transeat, causa apoplexiae appellari meretur. Cuius quidem rei summam licet ab omni aetate cognitam habuerint medici, mutationem tamen, quae in apoplexia, uti in multis aliis abstrusis cerebri morbis, in intimis sensorii communis penetralibus contingit explicare, distingereque perspicere, humano impossibile est intellectui. Sufficit interim remotiores, quae hunc non explicandum in vim nervicam exferere possunt effectum, causas nosse, quaeque in apoplexia extinctis cultro anatomico perquisitis visui sese obtulerunt, et durante ipso morbi insultu externe se ostendere solent phaenomena, perspecta habere, cum his fere solis medellae ratio superstrui debeat omnis.

Crediderunt antiquiores, causas apoplexiae remotas omnes non nisi cerebrum comprimendo vel inundando, eoque spirituum nervosorum ad organa sensuum et motuum iter retardando aut plane sistendo effectum suum praestare. Praeter tumores varios in calvaria ipsius cerebro enato, praecipue sanguinem, serum aliosque humores encephalum irruentes et ibi vel effusos vel in vasis solummodo congestos et stagnantes ut causas huc retulerunt. At enim vero cum in cadaueribus apoplexia defunctorum dissectione exploratis causas cerebrum comprimentes saepe non reperirent medici, saepe etiam ab eiusmodi causis cernerent attonitum morbum produci, quae comprimendo plane non agere posse viderentur, aliud a priori valde diuersum apoplexiae genus inuadere quandoque mortales suspicati sunt. Prolixe dudum de occulta et sub cranio saepe nequaquam reperiunda et aliorum cerebri morborum et apoplexiae origine conquestus est BALLONIUS <sup>1)</sup>. Memorabilem valde historiam semis retulit WILLISIUS <sup>2)</sup> apoplexia subito enecati, in quo post mortem encephalum absque omni laebe deprehensum fuit. *Hoc in casu subiungit <sup>3)</sup>, nil aliud suspicari licuit, quam spiritus animales, intra cerebri meditullium confitos, a particulis quibusdam malignis, siue narcoticis, siue aliis infestis, subito profligatos et quasi extinctos fuisse.* De apoplexia ex debilitate et inanitione iam SYDENHAMUS <sup>4)</sup>, BOERHAVIUS <sup>5)</sup>, alique his anti-

1) Opp. ed. TRONCHINI T. III. p. 46.

2) De anim. brutor. Part. II. cap. 8. vel  
WEPFER Hist. apopl. p. 619.

3) I. c. WEPFER I. c. p. 621.

4) Opp. om. p. m. 388.

5) De morbis nervorum Tom. II. p. 643.  
652. Instit. med. §. 860. n. 4.



antiquiores, infra nominandi, locuti sunt. SEELMATTER <sup>6)</sup> dari censet, apoplexiam, in qua nullae stagnationes et humorum effusiones in cerebro reperiantur, et in qua oculi non sit protrusi vitreique, eamque ex subitanea nervorum relaxatione etc. proficisci. Apoplexiam ab ingenti cholelithorum numero excitatam vidit FABRICIUS <sup>7)</sup>, et post mortem extrauasati sanguinis ne vestigium quidem reperit, vasa potius encephali sanguine vacua et aere repleta. Ipse ill. MORGAGNUS <sup>8)</sup> alias, monet, causarum apoplexiae *sensus omnino fugere*, alias sub hos cadere. Assensum praebeuit huic sententiae b. SCHROEDERUS <sup>9)</sup>, variisque auctorum <sup>10)</sup> testimoniis comprobavit, nonnunquam absque ulla, quae comprimendo suam in encephalum proxime exfereret efficaciam, causa apoplexiam oriri; viceque versa vitia saepe post mortem intra calvariam reperiri, ex quibus facile suspiceris apoplexiam adfuisse <sup>11)</sup>, cum tamen eius nihil ante mortem observatum fuerit. Etiam DE HAEN <sup>12)</sup> apoplexiam ex defectu spirituum animalium commemorat, et ill. STOERCK <sup>13)</sup> illius, quae ex subitanea spirituum animalium paralyfi oritur, absque ullo post mortem in corpore reperiundo vitio, mentionem iniicit. Simile quid, apoplexiam nempe insigni nervorum debilitati et quasi collapsui quandoque natales debere, declarat WITHERS <sup>14)</sup>. WILL. GRANT <sup>15)</sup> ex observatione amici sui ARMSTRONG narrat casum apoplexiae in emaciato homine, quem haustus spiritus frumenti restituit, et cui, quod annotat, valde noxia fuisset venaesectio. Minimam omnium probabilitatem prae se fert sententia cl. NICOLAI <sup>16)</sup>, qui apoplexiam, cuius post mortem nullae conspicuae causae deteguntur, a spasmodica meningum, piaae praecipue et arachnoideae, contractione, cerebrum stringente forsan oriri existimat.

### §. III.

#### *Theoria apoplexiae* LE CATII et cel. WEIKARDI.

Nullus vero medicorum est, qui hanc rem (§. pr.) ita urserit, ac ante viginti quatuor fere annos clarus ille Gallorum chirurgus LE CAT <sup>1)</sup>, eiusque nuper vestigia premens cl. WEIKARD <sup>2)</sup>. Prior quidem ille nunquam ab humoribus in encephalum congestis vel effusis apoplexiam oriri censet, quia in hydrocephalo insignis humorum copia intra calvariam congesta est, et cerebrum comprimit, neque tamen ulla in apo-

6) Morbi circa Tobinum familiares. Basil. 1751. et recus. in Diff. pract. HALLER. T. VI. p. 68. §. 17.

7) in Act. Nat. curios. Vol. X. p. 117.

8) Libr. cit. Ep. II. no. 5.

9) Diff. cit. §. IV. XI.

10) v. c. MORGAGN. l. c. Ep. II. IV. V. var. loc. THIERRY med. experim. p. 142. 143.

11) v. praeter MORGAGN. TULPIUS obs. 24. 25.

12) Rat. medend. Tom. IV. p. 164. 180.

13) Med. prakt. Unterr. Th. I. p. 317.

14) Bemerkungen über die Fehler beyrn Gebrauche der Arzneymittel. pag. 209. 256.

15) Pathol. B. IV. p. 153.

16) Von den Fiebern p. 485.

1) Ad calc. libri: DONALD MONRO von der Wassersucht überf. von C. C. KRAUSE. Leipz. 1762. p. 361.

2) Verm. med. Schr. St. 1. et 2. var. loc. ill. BALDINGER N. Magazin für Aerzte B. IV. p. 243.

apoplexia alias animaduerti solita subsequuntur symptomata. Deinde refert, se in viro quodam nobili apoplexia extincto tertium inter et quartum cerebri ventriculum sanguinem effusum reperisse tam paucum, ut cochleari pro Thea capi potuerit, qui igitur comprimendo cursum spirituum vitalium sistere plane nequiverit. Sanguinis in apoplexia effusionem semper non nisi sequelam esse ac symptoma spasmodicae constrictionis durae matris, nervorum vasorumque encephali, quam a podagrica plerumque et rheumatica materia excitari et causam apoplexiae veram proximamque constituere existimat.

Sententiam hanc ambabus arripuit manibus cel. WEICKARD., eamque quam plurimis aliis rationum momentis, observationibus et auctorum testimoniis stabilire tentavit. De causa proxima apoplexiae diversis modis sententiam suam declarat. Mox dicit adesse materiam quandam, praecipue arthriticam et rheumaticam, quae encephalum irruat, spasmodice stringat, vitaeque fontem obstruat. Ipsos tumores aliaque dura corpora intra calvariam haerentia irritando tantum non comprimendo apoplexiam excitare. Alibi monet, adesse etiam aliquid posse, quod subtilissimum illud fluidum electricum s. phlogiston, vitae principium expellat, eiusque inhibeat motum. In *debilem* solummodo et *fortem* apoplexiam dirimit. Humores effusos nunquam morbi attoniti causam constituere, sed vel effectum esse spasmi illius systematis nervosi atque vasorum cum LE CATIO consentit, vel saltem per se apoplexiam producere nequuisse. Aequè parum ab effuso sanguine necatos fuisse apoplecticos, ac polyposis in corde concretionibus ii, in quibus hae post mortem reperiuntur.

#### §. IV.

#### *Quaenam illi repugnent?*

Contra hanc vero sententiam varia monuerunt viri quidam celeberrimi, quos inter praecipue cel. KRAUSE <sup>1)</sup>, ill. MEZGER <sup>2)</sup>, et Anonymus, qui in diario literario Berolinensi <sup>3)</sup> WEICKARDI scripta diiudicavit, nominandi sunt. Et negari certe nequit, nimium fere processisse cum LE CATIO ill. WEICKARDUM, dum ex compressione encephali unquam apoplexiam oriri negat pernegatque, dum ad omnes ac singulas attoniti morbi causas theoriam suam extendit seu potius contorquet. Dari quidem omnino apoplexiam, quae absque ulla cerebri compressione, sed systemate nervoso quacunque alia ratione male affecto ingruit, quamque *nervosae* nomine insignire liceat, tam certum est, quam quod certissimum, eiusque existentiam, dignitatem et amplitudinem per singulas species demonstrare, meum in hac scriptiuncula propositum est. At vero dari etiam apoplexiam ex compressione oriundam, nunquam, quantumvis intricatis conclusionum minutiis refutabitur. Cur non vehemens sanguinis versus caput congestio a suppressis suctis haemorrhagiis, motu intenso nimia spirituoso

<sup>1)</sup> in not. ad MONRO libr. cit. p. 364.

<sup>2)</sup> Verm. med. Schriften, praesertim Tom. I.

<sup>3)</sup> Allgem. deutsche Bibl. Anhang zum XXV-XXXVI. Bande Abth. I. et B. XLIII. St. 1. p. 20. XLVIII. St. 1.



tuorum ingestione etc. oriunda cerebri vasculum disrumpere et cruorem effundere posset, cum tamen narium haemorrhagiam saepissime inde fieri, quotidiana constet experientia? cur non saltem vasa insigniter dilatare et hac ratione encephalum comprimere? cur non spasmus peripheriae corporis aut inferiorum eius partium e. g. ex frigore intenso, sanguinem ad caput urgere, in cerebrum coaceruare, effundere, absque mystica illa systematis nervosi constrictione le Catio-Weikardiana? Quis hodie strangulatos, suspensosque apoplexia sanguinea plerumque perire negauerit? Observat iam RIDLEIUS 4), raro inveniri hominem suspensum, quin semper sanguis effusus sit supra cerebri superficiem. Obiicitur quidem laqueo suspensos, licet iam facie rubicunda, lingua protrusa et spuma ante os conspicuos, tamen debitis auxiliis adhibitis integre convalescere, absque paralyseos remanentis vestigio, uti historiae a GALENO 5), SWIETENIO 6), WEPFERO 7), FUCHSIO 8), cl. MOHRENHEIM 9), aliisque narratae docent. Sed quis, quaeso, ex his demonstrabit, suspensos non mori apoplectice? Ut mihi videtur, si omnia phaenomena praesentia morbi vel necis aliquod genus adesse docent, ex iis, quae remanent, vere concludi nequit, non adfuisse. Obiici porro potest respirationis interceptionem ad mortem suspensorum plurimum conferre. Attamen eam solam non sufficere ex sequenti satis nota narratiuncula iam elucet. Chirurgus quidam capitis damnatus brevi antequam ad patibulum duceretur, ab amico bronchotomiam sibi instituendam curavit, seque iam a morte ex strangulatione tutum existimans, laetus ad supplicii locum migravit et tamen animam efflavit, sine dubio apoplexia sanguinea extinctus. Ceterum de morte eorum, qui faucibus laqueo praecclusis intereunt, vide ill. GRUNERUM 10) et ab eo excitatos auctores, UNZERUM 11) et non omnino nobiscum consentientem HAENIUM 12).

Qui variis pectoris morbis, insignem respirationis difficultatem inferentibus v. g. angina, peripneumonia, catarrho suffocante, asthma vario, tussi convulsiva etc. enecantur, apoplecticos saepe magis quam suffocatos perire, communis medicorum sententia est; et haec apoplexia, annon est manifesto sanguinea? — Audacter porro quaerit WEIKARDUS 13): cui unquam collare nimis adstrictum attonitum morbum induxit? Hic iterum responderi potest vulgata quadam historiola 14). Centurio Suecus ostentationis causa subditos sibi milites collaria arcte adstringere iussit, quo facies viidae ac rubicundae redderentur; id vero effecit, ut aliquot annorum spatio dimidia cohortis militum pars apoplexia correpta prosterneretur. — Iisdem sequelis stipantur aliae causae, sanguinis a capite reditum praepedientes. Sic ill. RICHTER, Praeceptor maxima pietate colendus, in praelectionibus narrauit a se visum exemplum scirrhi collo insidentis, iugulares venas comprimentis lentaeque apoplexiam inferentis.

Ex

4) Apud BOERH. de morb. nervor. p. 31.

5) Ed. Charter. IX. p. 82.

6) Comment. III. p. 273.

7) De apoplexia p. 167.

8) Nov. Act. Acad. N. I. T. VI. p. 264.

9) Wienerische Beyträge B. I. 1781.

10) Semiotice §. 933.

11) Medicinisches Handbuch 1780. pag. 555 — 7.

12) Rat. medend. continuat. Tom. I.

13) Verm. med. Schr. St. 3.

14) Allg. d. Bibl. B. XLVIII. St. 1. p. 119.

Ex modo allatis exemplis, quorum plura impraesentiarum commemorare longum foret, iam satis patet, quid sentiendum sit de cel. WEIKARDI opinione solam cerebri compressionem veram nunquam inducere apoplexiam, quae insuper quam plurimis physiologicis et chirurgicis phaenomenis refellitur. Quot enim dantur apud auctores de capitis laesionibus, PETITUM, POTTIUM, SCHMUCKERUM aliosque, observata mortis apoplecticae a vi externa capiti illata, cranii depresso, cruoris intra calvariam effusione, subsecutae! An non notissimum illud exemplum mulieris Parisiensis <sup>15)</sup>, cui dimidia cranii olla deficiebat, clare docet ab encephali compressione sensuum obnubilationem, soporem, tandemque veram apoplexiam induci? id quod dudum pluribus probavit VAN SWIETEN <sup>16)</sup>.

## §. V.

*Controuersia continuata.*

Sed contra haec omnia specioso argumento cum LE CATIO insurgit cel. WEIKARD, supra iam notato, in hydrocephalo nempe apoplexiam oriri visam haud esse; saepe etiam non accidisse, licet post mortem intra calvariam omnis generis comprimentes causae fuerint deprehensae; pauxillum denique illud sanguinis a LE CATIO in cerebro apoplexia defuncti inuentum (§. III.) apoplexiam excitare non potuisse. Atamen haec mihi ita comparata esse videntur, ut haud adeo difficili opera dilui possint. Celeberrimi enim modo excitati viri aliquid maximi momenti hic neglexisse videntur. Primo nempe *subitaneam* atque *lentam* non nisi sensim sensimque augescentem encephali compressionem non rite distinxerunt. Illa, licet exigua valde humoris effundatur quantitas, facilius longe inducet morbum attonitum, ac si lente humor licet ingentis copiae coaceruatur cerebri compressioni assuesceri potest. Consentit mecum ill. METZGER <sup>1)</sup> dum solam compressionem *subitaneam* ac diu durantem apoplexiae inferendae sufficere contra WEIKARDUM monet. Egregie quoque nostram sententiam confirmat exemplum suppurationis in sinu frontali, ab ill. RICHTERO <sup>2)</sup> narratum. Diu suppuratio illa durauerat, et integerrima manente tabula ossis frontis externa, internam minus firmam ac resistentem profunde introrsum sensim truserat, nec tamen secuta apoplexia. Tandem vero cum pus exesa et erosa interna lamina in cranii cauitatem effunderetur, subitaneam loborum cerebri anteriorum compressionem effecit, indeque illico suborta apoplexia aegrum e medio sustulit. Similes casus duo alii ill. RICHTERO occurrerunt, quorum unius in nosocomio, quod hic floret, academico, ipse testis adfui <sup>3)</sup>. Deinde etiam locus, ubi ex vasis fusus humor haeret, insignem

15) Hist. de l'acad. des sciences année 1700. p. 57.

16) Comment. ad aphor. 267. Tom. I.

1) Verm. med. Schr. I. p. 71.

2) Obs. chirurg. Fasc. II. vel Bibl. chir. Vol. III. p. 337.

3) Liceat mihi hunc casum breuibus enarrare, cum ad rem meam probandam egregie faciat, et multiplici ratione notatu dignus sit. Puer tredecim fere annorum ad nosocomium venit, memorabili valde sinistro oculi tumore paucarum spatio hebdomadam



signem hic differentiam inferre posse videtur, consentiente illustr. VAN SWIE-

C c c 2

TEN

madum enato infestatus. Videbatur nempe totus oculi bulbus in massam magnam, sed tamen rotundam et aequalem, rubicundam et recenti carni similem intumuisse. Attentius vero inspecto oculo et disquisito tumore, ex tunica palpebrae superioris interna, tam immaniter protrusa ac tumefacta; ut totus oculus ea obtegeretur, et ne tantum quidem palpebram posset eleuare aeger, ut obiecta aliquo modo conspiceret ac dignosceret, consistere deprehensus fuit. Lucem tamen et caliginem discernere poterat, manifesto indicio oculum ipsum non amaurosi laborare nec cataracta occoecatum esse, tum quoque, aliquali ratione tumorem esse pellucidum. Causarum antecedentium nulla, data licet omni opera, explorari potuit, praeter achores capitis incaute repressos. Ceterum habitus pueri erat illi similis, ex quo medici diathesin serofulosam hariolari consueverunt. Applicabantur capiti et nuchae vesicatoria, antiserofulosa remedia varia e.g. pulvis Plummeri cum cicuta porrigebantur, sed notabili ratione vix minuebatur tumor. Illum igitur suppuratione conficere tentans ill. RICHTER, scalpello repetitis ictibus incidit (nil materiae purulentae effluxit, sed merus sanguis, et totus tumor substantia solida quasi carnea consistere visus est) et emollientia pus mouentia remedia imponi curauit. Suppuratione procedente tumor paululum subsedit. Cum autem aliquando accuratius specillo inquireretur, tabula ossis frontis externa, erosa reperiebatur ac perforata loco infra arcus superciliares, sinus vero frontalis insigniter dilatatus, ad pollicis fere ambarum tabularum distantiam, et interne exulceratus. Mox parua illa apertura ferro in maiorem diffingebatur amplitudinem, quo puri vel saniei exitus, remediis vero purificantibus et consolidantibus aditus concederetur. Calami aromatici igitur decoctum, liquori anodyno minerali nuptum parui siphonis ope per aliquod tempus iniectum est, deinde decoctum hordei cum myrrhae tinctura et melle. Liquidum fere semper per nares et choanas

exitum legit, ut itaque sinuum frontaliū in nares ducentia orificia integra esse nec coalita manifestum fieret. Quae quidem remedia eum effectum praestiterunt, ut exulceratio (quae non nisi superficialis ac levis valde erat; sed tamen, nisi maturius debitis remediis oppugnata fuisset, summum induxisset periculum) in frontali cauo in sanitatis statum rediret, foramen in tabula externa ossis clauderetur sensim, neque ulla subsequerentur mala symptomata. Tumor iste oculum tegens, qui non nisi *ectropium palpebrae superioris* (alias valde rarum) dicendus est, cum tunicae internae palpebrae incrassatione et intumescencia, neque scarificationi, ad inflammationem et suppurationem excitandam, institutae, neque escharoticis variis auscultauit. Illum igitur sectione totum tollere, videbatur conuenientissimum. Ne interim musculus leuator palpebrae superioris, cuius fibrae hic conspicuae erant et sese contrahendo tumorem paululum introrsum trahebant, ut in superiori sui parte fieret concavus, pessime multaretur, paruum prius frustulum abscindere, satius duxit ill. RICHTER; tunc emollientibus deligare, et, quod intumescenciae restabat, suppuratione conficere, iterum moliri. Sed haec omnia frustra fuerunt; neque disparuit aut valde imminutus est tumor, antequam sectione totus et quidem auspicio successu tolleretur. Breui vulnus coaluit, et ita restitutus puer, ut praeter crassitudinem palpebrae naturali paullo maiorem, haud valde notabile tumoris vestigium in oculo relinqueretur. Per sex fere menses curationi medicae et chirurgicae subiectus puer in nosocomio commoratus est, antequam perfecte restitueretur. — Ex hac breuiter recensita historia in propatulo est, tabulam caluariae internam profunde satis introrsum trudi posse, absque subsequentibus soporosis vel apoplecticis affectibus, modo fiat lente incrementum impressionis. Manifestum ceterum erat, in nostro casu, *ectropium palpebrae superioris* cum morbo in sinu frontali non ut effectus cum causa

TEN <sup>4)</sup>. Modicam effusi sanguinis quantitatem ad apoplexiam producendam sufficere, ex illa patet obseruatione, quam ex FERNELIO recenset WEFFERUS <sup>5)</sup>, sed vas ruptum per medullarem cerebri substantiam decurrebat, quam pressionis longe magis impatientem esse corticali, cuiuslibet physiologiae principis imbuto haud obscurum est. LANGHANS <sup>6)</sup> asserit, aquaeductum Sylvii, qui ex tertio cerebri ventriculo in quartum ducit, locum esse, in quo effusus sanguis pessima symptomata creet, quia pontem cerebri et cerebellum comprimat; et hic erat praecise locus, ubi LE CAT paucum istum cruorem effusum deprehendebat, in supra notata obseruatione, cui tantum tribuit. Quod ceterum ad LE CATI auctoritatem attinet, illam in huiusmodi rebus parum valere post alios ill. METZGER <sup>7)</sup> monet.

## §. VI.

### *Quomodo conciliari possint lites de natura apoplexiae.*

Neruosi systematis debilitatem variisque causis inductam nimiam mobilitatem, inter praedisponentes apoplexiae causas praecipuum occupare locum, inficias iri nequit; grauissimis omnino id argumentis infra passim commemorandis demonstrauit ill. WEIKARD <sup>1)</sup>. Sed cur sanguinis in cerebro effusionem indeque natam compressionem occasionalis saltem causae, sine qua prior illa sola attonitum morbum producere potis non est, vice saepe fungi, negare velit, equidem non perspicio. Potest omnino magna neruorum irritatio, et vasorum spasmus in apoplexia adfuisse interdum, et sanguinem illum, qui post mortem effusus reperitur, expressisse, et hic tamen sanguis comprimendo morbum produxisse. Compressio enim non potest non encephalum vehementius afficere, si iam antea valde debilitatum et irritatum, ac si sanum est. Optime mihi videtur res ita declarari posse. Si systema neruosum a quibuscunque causis male mulctatum insignem contraxit sensibilitatem, atque irritabilitatem accedente qualibet grauiori noua irritante causa, spasmus oriri possunt in variis corporis partibus, sanguinem ad caput urgentes, in vasis coaceruantes, encephali vasa iam antea satis debilia disrumpentes, cruorem effundentes, exprimentes. Ex hinc inducta cerebri per se iam satis debilis compressione demum oritur morbus attonitus, cuius vera imago ex sola irritatione et debilitate nondum erat oborta, antequam compressio accederet. Nimia itaque sensibilitas et causa noua irritans producunt spasmum, spasmus congestionem vel extrauasionem, haec encephali compressionem, compressio

causa nexum fuisse, cum inciso tumore nullum ichorem per erosum foraminulum transiisse cerneretur, et substantia tumoris solida esset. Uterque morbus erat coeffectus eiusdem causae, repulsi nempe exanthematis. Neque, quod facile expectari potuisset, stupiditatem vel facultatem cogitandi hebetatam induxit haec cerebri compressio; sed pro ratione aetatis satis prudens, et ingenii multiplici germine

conspicius fuit puerulus, satis bona ceterum sanitate gaudens.

4) Comment. III. p. 175.

5) De apopl. p. 579.

6) Diss. de consensu partium. Gotting. 1749. §. 88 — 91. recus. in HALLERI Diss. pract. T. IV. p. 641.

7) Verm. med. Schriften. I. p. 70.

1) ll. cc.



pressio demum apoplexiam. Consentit fere mecum cel. SELLE <sup>2)</sup> qui, licet WEIKARDO in multis adstipulari videatur, negari tamen non posse ait, humorum effusionem symptomata reddere posse grauiora. — Patet itaque, praeter apoplexiam sanguineam vel ab aliis causis comprimentibus absque omni spasmo inductam, aliam esse, *spasmodicam* commode vocandam, in qua itidem compressio cerebri adest, sed simul spasmus, ad quem in curatione respici debet. Ipse HIPPOCRATES <sup>3)</sup> iam perspexit, in apoplexia saepe spasmus adeste tum, *si mordeatur cerebrum*, inquit, *multamurbationem habet, et mens desipit, cerebrumque convulsionem sentit, et totum hominem trahit, neque in se vocem edit, sed suffocatur, huic affectioni apoplexiae nomen est.* Et quid aliud docent prodromi, apoplecticum insultum plerumque antecedentes, ab EL-LERO <sup>4)</sup>, TISSOTO <sup>5)</sup>, aliisque descripti, quam irritationem et spasmus. De apoplexia spasmodica, speciatim illa, cuius in abdomine latet fons, egregie tractavit cel. LENTIN <sup>6)</sup>, cl. SELLE <sup>7)</sup>, praecipuam apoplexiae causam esse ait humorum serofo- rum et pituitosorum abundantiam, *cum proclivitate ad spasmos* tum quoque plethoram *cum nisu naturae* illam imminuendi. Tertiam denique apoplexiae speciem censeo *nervosam*, quae absque omni cerebri compressione evenit, sed ex causis potius (vel materialibus vel immaterialibus) subitaneum neruorum torporem inducentibus, animalitatis fontem subito quasi obstruentibus, licet humorum effusionem, ut symptoma eiusdemque causae coeffectum quandoque accedere posse negare non aüssim. In hanc apoplexiam nervosam sequens tractatio omnis potissimum erit directa. Firmo omni- no stat talo haec causarum quarundam apoplexiae agendi ratio, et ill. WEIKARDO laus illa et gloria debetur, quod medicos recentiores in illam attentos reddiderit, licet hypo- thesi suae nimis latum tribuerit ambitum.

Magnum sententiae meae momentum affert unanimis medicorum consensio, cum, qui inter clarissimos nostri aevi viros WEIKARDO absque limitatione assensum praebuerit, sciam neminem. Fere omnes largiuntur, plurimis in casibus locum habere apoplexiam nobis dictam nervosam; ast omnes etiam non negant, fieri saepe sanguineam aut ex aliis comprimentibus oriundam causis. Praeter supra iam excita- tos auctores huc pertinent cl. viri, CULLEN <sup>8)</sup>, SELLE <sup>9)</sup>, et supra laudatus Ano- nymus <sup>10)</sup>. Ipse ill. METZGER <sup>11)</sup> grauis ille WEIKARDI aduersarius apoplexiam no- stram nervosam admittit, quam *sine materie* appellari posse censet, quorsumque prae-

C c c 3

primis

2) Med. clin. p. 367. edit. 2dae.

3) Lib. de glandulis ed. Foes. d. 272.

4) Obs. de cognosc. et cur. morb. etc. p. 288.

5) Avis au peuple 128.

6) De aere et morb. Clausthal. p. 131 sq.

7) l. c. p. 368

8) First lines l. c. praecipue §. 1038. 1052. Idem §. 1057. monet, si sanguis accumulatus vel extrahatus post mortem in apoplexia defunctis reperiatur, non statim inferri debere, illum causam morbi fuisse.

Posse omnino in tali casu vim nerveam im-  
mediate sublatam esse, cum omne id, quod  
vim nerveam tollat, etiam circulationem  
sanguinis lentiolem reddat, et accumula-  
tionem promoueat. CULLENUS igitur id  
quandoque ex vasorum paralyti oriri putat,  
quod WEIKARDUS ex spasmo eorundem  
deriuat.

9) l. c. p. 367.

10) Allgem. deutsche Bibl. II. c.

11) l. c. p. 75

primis commotionem cerebri et mortes subitaneas ex vehementioribus animi affectibus refert. Ast nomen illud: *sine materie* non satis mihi quadrare videtur, cum a causis quibusdam materialibus e. g. arthritica, psorica etc. apoplexiam etiam nervosam quandoque produci, ex rationibus infra proponendis existimem.

### §. VII.

*Quid ex analogia apoplexiae cum paralyfibus concludere liceat?*

Ex praestantioribus, uti omnis doctrinae, ita etiam solidioris pathologiae et praeceos medicae adminiculis merito habetur analogica concludendi ratio. Iam vero momentē iam CELSO apoplexia quid aliud est, quam uniuniversalis paralyfis? Depromamus igitur pauca ex aetiology earum paralyfium, quae magis particulares sunt, neque uniuerſi corporis motus animales simul prosternunt, et an ex iis quaedam in nostram rem inferri legitime queant, paucis videamus. Paralyſes ex innumeris ſere longeque a ſe inuicem diuerſis induci cauſis ex medicorum monumentis conſtat <sup>1)</sup>. Aliarum in irritamentis variis ſons latet et ſcaturigo v. c. colluue primarum viarum, exanthematibus tam acutis quam chronicis retropulſis, ulceribus vetuſtis intempeſtiue occluſis, acrimoniis ſpecificis uti venerea, arthritica et ſ. p. Hae quidem paralyſes ſaeppiſſime ſymptomata irritationis ſecum gerunt v. c. membrum paralyticum quandoque ſubitaneis conuulſionibus quatitur etc. Aliae a venenatis extrinſecus allatis cauſis oriuntur, praecipue vaporibus metallicis, aſenicalibus puta, ſaturninis et mercurialibus. Aliae ex medullae ſpinalis vel neruorum compreſſione natales ducunt; ſic vertebrarum ſpinae dorſalis luxationem paralyſin inferiorem corporis partium inducere conſtat; pariaque interdum perpetrare cyphofin, POTT <sup>2)</sup> docuit. Quid quod ab extravafatione ſanguinis intra caluariam, a cranio alicubi a vi externa impreſſo etc. non tam ſaepe ipſam apoplexiam, ac paralyſes ſingularum partium corporis obſervarint auctores de capitis laeſionibus. Ad paralyſes ex neruorum compreſſione illae quoque pertinere videntur, quae ex cauſa ſanguinea i. e. ſumma plethora, fluxu quocunque ſanguineo incaute cohibito, variis corporis exaeſtuationibus etc. originem trahunt. Aliae denique ex cauſis inſigniter debilitantibus, nimio neruorum uſu (ſic a luce ſolis viuiffima diu oculum feriente induci poteſt amauroſis) ſyſtematis neruoſi totius debilitate procedunt, quorſum etiam commotio pertinet, cum vehemens in medullam ſpinalem ictus inferiores corporis partes conſeſtim paralyſi afficiat, veluti cerebri commotio totum corpus. — Ex quibus omnibus ſatis patet non ex ſola neruorum compreſſione oriri paralyſes, ſed a permultis aliis cauſis, quas comprimendo agere vix ac ne vix quidem ſumi poteſt. Neque ullus unquam medicorum ſuſpicatus eſt, cauſas inſigniter debilitantes, nimiam neruorum actionem, irritamenta neruos irruentia (*metaſtaſes neruoſae* BRENDÉLII, TISSOTI), venena vaporum forma applicata vel ingeſta, neruos

1) CRAMER diff. de paralyſi. Gott. 1760.  
CORNEL. PEREBOOM de paral. in primis neruea. BEIREIS de paral. grauiffima femorum. Helmſt. 1762. etc.

2) Remarks on the Palsy of the lower limbs cauſed by a curvature of the ſpine etc. Lond. 1779.



neruos comprimendo fiderationem inferre; sed potius alia quadam ratione vim nerveam propius afficere, omnes perhibent, licet quo praecise modo hoc fiat humanam lateat intelligentiam. An igitur ullam inuoluit absurditatem, annon potius maxima gaudet probabilitate, aliis simul consideratis rationum momentis ad certitudinem fere euehenda, paralyfin uniuersalem i. e. attonitum morbum non ex sola compressione encephali oriri, sed ex alia etiam caufarum classe, systema nervosum immediate afficiente, eiusque subito delente energiam et actiuitatem.

## §. VIII.

### *Differentiarum apoplexiae conspectus.*

Ut sententiam meam de variis apoplexiae speciebus, deque diuersis caussarum illius remotarum agendi modis summatim declarem, sequentem tabulam subiungere placuit; et unamquamque causam effatis quibusdam auctorum praecipuis, et observationibus nonnullis in medicorum monumentis annotatis, confirmare.

Apoplexiae duo cum cel. CULLEN <sup>1)</sup> statuo summa genera. Oritur nempe

I. *Ex compressione*, quam cum cl. NICOLAI <sup>2)</sup> dispesco in illam, quae fit

A. *a fluidis*, et quidem

1) *sanguinis* in encephalum congestione vel effusione, quae excitari potest

a) *a spasmo* in inferioribus vel externis regionibus corporis. Huc refero

α) *apoplexiam febribus intermittentibus* <sup>3)</sup> sic dictis malignis iunctam.

β) *A. abdominalis* <sup>4)</sup>, biliosa nempe, verminosa <sup>5)</sup> ex cruditatibus f. in-

glu-

1) First lines Tom. III. cap. de apopl.

2) Diff. de quibusdam ad apopl. spectantibus. Ien. 1771. §. VII.

3) Apoplexia febricosa SAUVAGES No. fol. Gen. apopl. sp. 9. Praeter SYDENHAMUM, MORTONUM, BAGLIVUM, TORTIUM, WERLHOFIUM, SENACUM et ill. MEDICUM, huc pertinet exemplum luculentissimum in cl. WIRTENSOHNII diff. de opio p. 62. et in praefatione zur Münsterfchen Medicinalordnung narratum. Sustulit nempe ill. C. L. HOFFMANN Laudani liquidi guttis octoginta una vice exhibitis paroxysmum febris intermittens apoplecticae, manifesto indicio, solum spasmus in causa fuisse. Similem historiam habet ill. METZGER Aduersar. II. p. 98.

4) Hanc quidem quandoque per solum consensum absque notabili sanguinis in capite accumulatione oriri infra demonstrabitur; saepe tamen omnino per congestionem fit, eoque nomine huc pertinet. Ceterum vid. b. SCHROEDERI diff. cit. MOLL diff. de apopl. biliosa. Gott. 1780 HEINEKEN diff. de morbis nervorum etc. Gott. 1783. §. XXX. (hor. script. II.) NICOLAI diff. cit. §. XVII. RAHN mirum inter caput et cav. abdominis commerc. p. 82. (hor. script. IV.) Ill. GRUNER krit. Nachr. v. klein. med. Schr. II. p. 125. FRIZE med. Annalen I. p. 122.

5) SAUVAGES l. c. sp. 14. Journal de med. 1762. Juill. SAM. SCHAARSCHMIDT med. und chir. Nachr. T. I. no. 68. MORGAGN. l. c. p. 24. VAN DEN BOSCH constit. epid. vermin. 1779. p. 77. sq.

gluie, imprimis flatulenta <sup>6)</sup>, calculosa <sup>7)</sup>, ex obstructionibus denique aut aliis viscerum hypochondriacorum vitiis oriunda <sup>8)</sup>.

γ) ab intenso gelu peripheriam et inferiora corporis stringente, sanguinemque ad partes internas, praecipue encephalum urgente <sup>9)</sup>.

δ) Etiam acrimoniae variae <sup>10)</sup> e. g. arthritica (v. infra §. IX.) rheumatica <sup>11)</sup> psorica <sup>12)</sup> ab ulcere antiquo intempestive coalito <sup>13)</sup>, sudoribus pedum vel genitalium suppressis <sup>14)</sup>, attonitum ciere possunt morbum. An huc quoque referre liceat apoplexiam a vesicatorio magno toti capiti imposito ortam in viro cephalalgia et doloribus arthriticis diu laborante <sup>15)</sup>?

ε) A. epilepsiam aliosque morbos convulsivos insequens <sup>16)</sup>.

ζ) Venena vel in ventriculum ingesta, spasmosque in abdomine creantia, vel vapores venenati, pulmones stringendo suffocantes, et congestionem creantes <sup>17)</sup>

η) Animi affectus <sup>18)</sup>, praecipue ira, in qua facies rubicunda satis declarat, congestionem versus caput fieri.

b) *absque spasmō*; Huc spectant praecipue illae causae, quae plethoram veram vel orgasmum sanguinis caput petentem ingenerant. Ebrietas, insolatio, membri magni amputatio, nimia ciborum ingestio, difficilis

6) MORGAGN. p. 42. Potest tamen quoque plenus ventriculus vasa in abdomine, licet non aortam ipsam comprimere et hac ratione sanguinem absque concurrente spasmō ad caput urgere, et apoplexiam excitare, praecipue cum pleno ventriculo respiratio cum difficultate fiat.

7) Ex calculis felleis vel urinariis spastica pathemata creantibus. vid. HOFFMANN med. syst. cap. de apopl. Thes. path. X. WEPFER l. c. p. 445. sq. FABRICIUS in A. N. C. Vol. X. p. 117. MORG. l. c. p. 17. 18. 24.

8) Apoplexiam suspiriosam SAUV. sp. 10. et SAGAR syst. morb. sp. 11. p. 555. et gastrodynicam SAGAR l. c. p. 556. sp. 17. ad praecordialem quoque pertinere, confirmant causae, phaenomena, medela.

9) HOFFMANN med. syst. II. pag. 48. WEPFER l. c. p. 384. hist. XVI. Verosimiliter tamen non sola congestione ad encephalum frigus necare, infra monebo.

10) V. SWIETEN Comm. III. p. 275-6. Notandum interim, hanc apoplexiam metastaticam non ad spasmodicam solum, sed partim ad nervosam, partim ad idiopathicam, infra recensendam pertinere:

11) STOLL rat. med. III. p. 133.

12) WEIKARD Verm. Schr. I. p. 98.

13) WEIKARD l. c. p. 92. Eph. N. C. IV. p. 488.

14) PIQUERII Prax. med. I. p. 42. WEIKARD l. c. p. 104.

15) SCHAARSCHMIDT l. c. T. III. pag. 137.

16) Apoplexia epileptica SAUVAGES l. c. sp. 8. MARTIANUS in l. HIPPOCRATE de glandul. v. 103. iam annotavit, plerosque epilepticos apoplexia enecari, v. etiam FORESTUS obs. med. X. obs. 78. A strangulatione, dilatatione, obstructione vasorum in epilepsia varices oriri, ex HIPPOCRATE et exemplo confirmat LANCISIUS de subitaneis mortibus p. 28. et 54.

17) UNZER med. Handb. p. 511. cel. GMELIN Gesch. d. Gifte I. p. 190.

18) MANGOLD diff. apoplexiae plures praeter sanguineam et serosam dari species 1765. §. XIII. apoplexiam ex vehementiori animi commotione ad convulsivam referendam esse censet. LANCISI l. c. eosdem effectus ex vehementibus animi affectibus observavit quoad vasa encephali, ac in epilepsia (cf. not. 16.)



facilis vel suppressa haemorrhagia consuet<sup>19)</sup>, neglecta sanguinis missio, strangulatus, vitia in thorace varia sanguinis ex capite reditum retardantia<sup>20)</sup>, polyposae concretion<sup>21)</sup> in vasis maioribus, carotidibus, iugularibus ipsaque cerebri et menyngum inflammatio et mors fulmine tactorum aliqua ex parte<sup>22)</sup> huc pertinent. Neque minus varii thoracis inflammatorii morbi, peripneumonia<sup>23)</sup> angina vehementissima etc. respirationem intercipientes. Vehemens denique in caput ictus, sanguinei vasis in cerebro rupturam atque effusionem cruoris excitans<sup>24)</sup>.

- 2) a colluie alius fluidae materiae cerebrum inundante. Metastasis lactea<sup>25)</sup> purulenta<sup>26)</sup> urinosa<sup>27)</sup>, coryza, aliaeque excretion<sup>28)</sup>es serosae suppressae<sup>29)</sup> metastasis ad cerebrum in febribus malignis, putridis nervosis lentis, a variolis aliisque exanthematicis morbis, materia acris cuiuscunque generis repulsa<sup>30)</sup>, hydrops cerebri<sup>31)</sup>, suppuratio, exulceratio, erosio cerebri<sup>32)</sup> eiusque membranarum, humor atrabilarius versus encephalum raptus<sup>33)</sup>, pituita

et

19) BAGLIV Opp. omn. p. 339. SCHULZE r. SCHMID de viro apoplexia ab incon-sulta haemorrhoidum suppr. extincto. Altorf 1722.

20) CULLEN l. c. §. 1040. no. 2. Tumor in pectore comprimens caavam superiorem et apopl. creans DE LA MOTTE traité complet de chir. II. p. 186. ceterum cf. omnino S. S. ADAMI diss. de causis quibusdam specialibus apoplexiae. Hal. 1764.

21) A. polyposa SAUV. sp. II. BOERH. et VAN SWIETEN §. 1001. WEPFER l. c. p. 116. 181. DE HAEN rat. med. IV. pag. 173. 177.

22) III. GRUNER Semiot. §. 939.

23) KREBS diss. de apoplexia petipneumoniâ iudicante. Helmst. 1780. Plerosque, quos tussis conuulsiva necat, mori apoplexia, docet SAVOYE diss. de tussis conuulsiva. Friburg. 1780. vel III. GRUNER Kritische Nachr. II. p. 33.

24) Auctores de capitis laesionibus, praecipue PETIT suppl. au Traité sur les maladies chir. Apoplexiam traumaticam vocat SAUVAGES et cum illo SAGAR omnem illam, quae a capitis laesionibus inducitur. Cum interim hae laesiones mirum quantum differant v. c. commotio cerebri sola absque extrava-satione, apoplexiam plane oppositi generis (nervosam nempe) ac extravasatio creet, appellationem istam generalem non satis convenire patet, et omnium

Ludwig script. neur. min. T. IV.

minime Nosologos, in multiplicandis morborum speciebus alias adeo liberales decere.

25) LEVRET art des accouch. ed. 3. Paris 1766. §. 874. sq. DELEURYE trait. des accouch. Par. 1770. §. 1059. PUZOT trait. des accouch. Par. 1759. p. 234. 387.

26) VALSALVA ap. MORGAGN. l. c. p. 38. ADAMI d. cit. §. 16.

27) WILLIS de urinis p. 369. BONET sepulchr. T. I. p. 128. BOERHAAVE Prael. acad. III. p. 315.

28) SCHAARSCHMIDT l. c. T. I. p. 317.

29) Haec tamen praecipue spasmodicam vel nervosam apoplexiam creat, uti alibi fusius dicitur.

30) BRUNNER apud WEPFER l. c. p. 427. Mortem ab hydrop<sup>e</sup> cerebri interno inductam huc quoque referre haud incongruum videtur. vid. WHYTT works p. 723. seq. III. MURRAY, Praeceptoris mei aeternum venerandi not. ad ROSENSTEINII Libr. von den Kinderkrankh. edit. IV. p. 601. CHR. LUDWIG de hydrop<sup>e</sup> cerebri puerorum. Lips. 1775. OBIER in mem. de la Société Royale de med. a. 1779. n<sup>o</sup>. XIII.

31) MORGAGN. Ep. V. n. 2. 4. 6. II. etc. III. METZGER Verm. Schr. II. pag. 200. Plura vid. in §. XVI.

32) SAUVAGES sp. 12. A. atrabilaria VAN SWIETEN III. p. 264. BOERH. morb. nerv. p. 536. MANGOLD l. c. §. XII. Non

D d d

tamen

et gluten<sup>33)</sup>, aer<sup>34)</sup> vel aqua<sup>35)</sup> intra meninges obhaerescens, pinguedo exsuperans<sup>36)</sup>. Notandum tamen, non unum semper horum vitiorum post mortem reperiri, sed multiplici saepe ratione complicari. Sic e. g. VALSALVA<sup>37)</sup> in apoplexia defuncto hydropem cerebri, haemorrhagiam cerebri et erosionem simul reperit.

B. Etiam *solida* encephalum *comprimere* et hac ratione morbum nostrum inferre possunt. Exostoses cranii<sup>38)</sup> internae, steatoma, lapides cerebri<sup>39)</sup>, ossescencia et chondrogenia vasorum<sup>40)</sup>, varicosus eorundem habitus, alique<sup>41)</sup> tumores.

II. *Apoplexia absque compressione*, nobis *neruosa* dicta. Cum ad eas, quae huc pertinent, species, sequens tractatio omnis spectet, hic tantum verbo praecipuas indicare lubet. Est nempe I. *cum materie* et quidem 1) in corpore ipso genita e. gr. arthritica, pforica, biliosa etc. 2) externe applicata aut ingesta, quorum venena varia referenda et venenati halitus I. *sine materie* e. g. ex inanitione, vehementioribus animi affectibus, commotione cerebri et s. p.

## §. IX.

### *Apoplexia praecordialis.*

Ordiamur itaque ab illo morbi attoniti genere, cuius fons et scaturigo in imo latet ventre. Animus hic non est, observationes de illo collectas exhibere, quippe quod ab aliis satis superque iam praestitum, sed tantum variis ex rationibus et medicorum observatis demonstrabo, vitia in abdomine haerentia quandoque per solum consensum apoplexiam inferre, absque ulla sanguinis in encephalum congestione, alioque ibidem producto vitio topico. Negari quidem nequit, a vitiis in abdomine interdum spasmos creari, qui ad caput urgent sanguinem et apoplexiam vere sanguineam excitant<sup>1)</sup>, quare etiam apoplexiam ex praecordiis supra (§. praec.) ad spasmodicam retuli. Sed si consideremus vitia abdominalia saepe in remotioribus partibus, praepri-

mis

tamen sola tenacitate apoplexiam producit humor atrabilarius, sed etiam acrimonia. VAN SWIETEN loc. cit. pag. 275 — 276. IDEM pag. 264. plerumque per consensum encephalum turbare humorem melancholicum.

33) MORG. I. c. p. 18. 27. 28. 29. 31. 37. COLUMBUS de re anat. L. XV. p. 265 — 266. Apoplexia pituitosa SAUV. sp. 7. et SAGAR I. c. p. 554. Haec fenes cachecticos, pituitosos obesosprehendit, et ad neruosam forte aliqua ex parte pertinet. Ex sanguine enim, tali qualitate peccante, inquit SCHREITER de apopl. Marburg. 1748. §. V.

spiritus boni animales ac sufficientes non separantur.

34) WILLIS anat. cer. cap. IX. p. 117. MORGAGN. I. c. p. 37. 41. SWIETEN §. 647. MANGOLD I. c. p. 28.

35) SWIETEN III. p. 262.

36) TISSOT Epist. p. 325.

37) ap. MORGAGN. p. 12.

38) SCHÖBER ap. WEPFER p. 508.

39) MECKEL ap. ADAM. p. 16.

40) MORGAGN. p. 18. 19. 23. 25. 40.

41) e. g. tumor faccatus in ventriculo cerebri anteriori sinistro ADAMI I. c. p. 15.

1) SCHROEDER diff. cit. p. 35.



mis capite vehementiores effectus absque congestione per solam nervorum sympathiam edere<sup>2)</sup>, cur non etiam, si vehementior causa fuerit, cerebrum ita possent afficere, ut eius actio momento tollatur, et morbus oriatur attonitus; quod quidem eo facilius fieri potest, quo saepius systema nervosum insigniter debilitatum, et ad praeternaturales consensus primum est in iis, quos apoplexia corripere solet. THIERRY<sup>3)</sup> iam monet, morbum nostrum in urbibus maioribus praesertim habitare, et sequelam mollietatis, intemperantiae et debilitatis nervorum esse; assentitque ei cl. WEIKARD<sup>4)</sup>. Agitationes animi nimias, tam frequentes apoplexiae causas praecipue perturbando praecordia efficaces se praebere, SCHROEDER<sup>5)</sup> sententia est; systema igitur nervosum iam vehementer commotum, agitatam, debilitatum erat, antequam bilis effusio fieret, et euaderet funesta apoplexiae genitrix. Porro tradit THIERRY<sup>6)</sup>, se quam plurima lustrasse cadauera apoplexia defunctorum, semperque non nisi leuissimam sanguinis in vasis accumulationem reperiisse; an non maxima verosimilitudine gaudet, ex his multis aliquos saltem apoplexia abdominali periisse cum illa SCHROEDER<sup>7)</sup> et multis aliis docentibus omnium sit frequentissima. Paralysis saepe ex ventriculo trahere originem inter omnes constat; sic nuper adhuc vidi hominem annum hemiplegia correptum, et sola emesi et catharsi sanatum; amauroseos creberrima ex abdomine origo, quis est, quem fugiat? Quid ex hisce in nostram rem concludi possit, §. VII. docuit. Coronidem hisce rationibus imponat ipsa experientia, qua constat satis numerosa, praesentaneum effectum persaepe hic emetica praestare absque phlebotomia praegressa; (licet illam aliquando, si nempe facies tumida ac rubore suffusa est praecedere debere, negare nolum, SCHROEDER<sup>8)</sup> sequens) manifesto indicio, congestionem sanguinis insignem morbum non induxisse; quia nempe tunc vomitus exacerbare debuisset, non imminuere illum. Deinde in apoplexiae biliosae insultu faciem non semper rubicundam esse, sed adeo expallescere interdum, probabile est; licet ab auctoribus vix expresse notatum sit. Memorabilis igitur mihi videtur casus, quem nuper hic loci accidisse a viro fide digno, artisque perito audiui, iuuenis viginti fere annorum ex nimio farciminum esu, subito prostrati ac soporosi, sola emesi absque praegressa phlebotomia restituti, facie semper naturalem habitum retinente.

Febrium apoplecticarum intermittentium et exacerbantium fomitem in abdomine plerumque latere, cuilibet notum est. Non reperimus mentionem de aliqua memorabili cerebri labe, ut idiopathica causa<sup>9)</sup>. Ill. MEDICUS<sup>9)</sup> dissecuit duo apoplexia periodica extinctorum cadauera, reperitque encephala integerrima sanissimaque, in abdomine vero ubique diffusam bilem. — In colica biliosa alia inter nervosa symptomata frequentem quoque observavit apoplexiam WERLHOF<sup>10)</sup>. — Ceterum praeter consensum etiam particulae quaedam biliosae acres ex primis viis in mias-

D d d 2

sam

2) RAHN diff. cit.

3) Med. exper. pag. 147.

4) l. c. St. I. p. 102.

5) Diff. cit. §. VIII. p. 21.

6) loc. cit. pag. 143.

7) Diff. cit. §. 12.

8) WERLHOF Obs. de febr. p. 21. MEDICUS Beobacht. I. p. 379.

9) Gesch. period. Krankh. B. II. p. 299.

10) loc. cit. p. 28. not. b.

sam humorum delatae, et nervos immediate irruentes, ad excitandam apoplexiam symbolam asserre possunt.

### §. X.

#### *Apoplexia arthritica et metastatica.*

Materiam arthriticam siue retentam in visceribus, nec ad articulos detrusam, siue ab his ad illa incaute repulsam apoplexiam produxisse, observatum saepius est <sup>1)</sup>. Qua autem ratione materies arthritidis hunc suum exserat effectum, disquirere operae pretium est, cum in medela ad illam sollicitè respiciendum sit. Duplici quidem modo apoplexia ab hac causa inferri posse videtur. *Vel* podagricus humor irritando nervos, per eorum satis notum in arterias imperium sanguinem ad caput urget, qui tunc sensorium commune premendo morbum nostrum infert. Hac ratione pertinet apoplexia arthritica ad spasmodicam (cf. §. VIII.) quae tunc praesertim locum habere videtur, si retrocedens materia non encephalum ipsum, sed alias internas partes, capite humilior locatas irruit. Diagnosin hic desumitur a signis spasmi et congestionis simul praesentis. *Vel* acrimonia incognita quadam ratione (an per spasnum, uti LE CAT et WEIKARD credunt?) sensorium commune immediate afficit, eiusque suspendit actionem, sanguinis effusione concurrente nulla vel tantum symptomatis instar accedente. Consentit CULLEN <sup>2)</sup>, in apoplexia arthritica causas comprimentes encephalum ac nervos post mortem non reperiri.

Priorem illum agendi modum unicum esse ill. METZGER <sup>3)</sup> censet, adeoque WEIKARDUM materiam arthriticam pro unica apoplexiae causa habentem, causam remotam ut proximam considerasse, et praecipitata conclusione reliquas exclusisse. Licet interim lubenter largiar, apoplexiam arthriticam in plerisque casibus ad spasmodicam pertinere, eam tamen aliquali ratione etiam nervosae accensendam esse, vix iri poterit inficias. Quis enim materiem morbosam tam acrem, ut in artibus haerens nervos gravissimis cruciatibus distorqueat, existimabit interiora petentem nervos relicturam esse intactos nec pessime mulctaturam? Maxima mihi gaudere videtur probabilitate ea sententia, quae materiam arthriticam tum systema nervosum ipsum irritando ac stupefaciendo, tum simul vasorum spasmos sanguinem ad caput pellentes et in cerebrum effundentes, ciendo funestam suam exserere sumit efficaciam <sup>4)</sup>. In rem meam hic vertere licebit assertum CULLENI <sup>5)</sup> sectiones cadaverum facile fallaciae in concludendo occasionem subministrare posse, dum apoplexia arthritica, quam ad solam nervosam refert, et sanguinea simul adesse potuerint. Curationem igitur in

1) vid. SWIETEN T. III. p. 376. IV. p. 533. MUSGRAVE arthrit. pag. 129. WEIKARD Verm. Schr. II. p. 69.

2) loc. cit. §. 1057.

3) Verm. Schr. I. p. 73. 74.

4) Polyposam quoque apoplexiam interdum ab arthritide oriri, confirmare vide-

tur exemplum ab HAENIO rat. med. IV. p. 191. narratum, ubi post diu praegressam arthritidem lenta mors sequebatur, et in vasis sanguiferis omnibus unus cohaerens polypus, quasi funis polyposus reperiatur.

5) §. 1056.



in plerisque casibus sanguinis per phlebotomiam a capite derivationē, epispasticis materiem peccantem ad externas corporis regiones reuocantibus, tum denique excitantibus contineri, in propatulo est.

Supereſt, ut paucis rimemur ſententiam praeunte LE CATIO nuper a cel. WEIKARDO <sup>6)</sup> declaratam, apoplexiae unicam materialem cauſam eſſe materiem arthriticam. Rationes quidem haud contemnendas et praecipue ſequentes aſſert. MOR-GAGNUM obſervationibus euiciſſe, arthriticis ſymptomatibus obnoxios lithiaſi tandem aut *apoplexia* enecari. Quae ad apoplexiam diſponunt cauſas occaſionales, luxuriam, otium, ſtudia immoderata, iram etc. etiam arthritidi patrocinari. Vere et autumnno, tempeſtate frigida et humida pleraſque obſeruari apoplexias, HOLLERII, HOMII, FORESTI, TISSOTI, CRAMERI auctoritate confirmat; iisdem quoque temporibus paroxyſmos athríticos adſtringi. Denique experientiam docere crebram manifeſtamque apoplexiae ex cauſa arthritica originem. — Nimis autem fere amplum eſt imperium, quod praedilectae ſibi arthriticae materiae tribuit cel. Auctor, quamuis illam ſaepe attoniti morbi cauſam eſſe, nemo negauerit. Adductas praeterea rationes dolendum eſt non ubique ſatis conuincentes eſſe. An non enim ver et autumnus, tempeſtas frigida et humida aequae fauent bilioſis morbis, aliisque, quorum fomes praecordiis inhaeret, ac arthritidi, et nonne inde aequae facili opera demonſtrare poſſemus, apoplexiam non niſi ex abdomine oriri? an non luxuries, venus immodica, ira etc. adeundem reuocari fontem? an non, uti quaerit ill. METZGER <sup>7)</sup>, aer humidus inſigni quoque, qua pollet, circulationem humorum turbandi efficacia, apoplexiam excitare poſſet, abſque concurrente arthritide? — Conuenientiſſimum fane erit, attonitum morbum, uti plures alios, non ex praeconcepta hypotheſi ad unicam cauſam reſtringere, ſed earum varias ſtatuerē. Materies igitur apoplectica, docente ſaepius laudato METZGERO <sup>8)</sup>, appellandum eſt omne id, quod qualicumque ratione nimiam ſanguinis ad caput congeſtionem, eiusque vel ſeri ex vaſis effuſionem creare poteſt, et addo, omne id, quod ſenſorii communis energiam immediate ſuſpendendi et vim nerveam ſubito delendi facultate gaudet. — De apoplexia nervoſa *ſine materie* infra dicetur uberius.

Etiam aliae, praeter arthriticam, acrimoniae e. g. rheumatica, ſcabies repulſa, ulcera intempeſtiue exſiccata <sup>9)</sup>, defluſiones antiquatae, incaute cohibitae, eryſipelas introuerſum, trichoma abſciſſum etc. apoplexiam, quam SAUVAGES et SAGAR *metaſtatica* nomine inſignunt, interdum excitare conſuerunt. De hac ſpecie, quoad cauſarum agendi rationem, eadem valent quae de arthritica modo propoſuimus. Vel enim ſpasmus et congeſtionem creando vel immediate ſyſtema nervoſum turbando

D d d 3

effica-

6) loc. cit. St. I. pag. 92.

7) l. c. B. I. p. 74. 8) ibid. p. 75.

9) Ipſe nuper talem caſum vidi in noſocomio academico, ubi ulcera pedum vetuſta et cuiſcunque curationi pertinaciter reſiſtentia ope carbonum ignitorum, me-

thodo FAURIANA aliquoties de die approximato tam celeriter exſiccabantur, ut ſopor oriretur, qui certe in lethalem tranſiſſet apoplexiam, niſi efficacioribus reuelentibus cruribus applicatis recruduerint ulcera.

efficaces se praebent huiusmodi acrimoniae, et posteriori hoc nomine ad apoplexiae nervosae fontes referri merentur.

## §. XI.

*Apoplexia ex inanitione.*

Dudum antiquiores de illa locuti sunt. Sic v. c. PETRUS PAAW <sup>1)</sup> apoplexiam a causa interna fieri notat, quatenus spiritibus animalibus exitus vel *aditus* denegatur etc. Neque SYDENHAMO <sup>2)</sup> ignota fuit apoplexia ex inanitione. Ait enim ille, interdum confestim a partu laboriosiori vel ubi magna sanguinis vis simul eiecta est, apoplexiam fieri, quam secus ac SAUVAGES, qui illam *hystericam* vocat, a collapsu vaforum cum BOERHAAVIO <sup>3)</sup> deriuat MANGOLD <sup>4)</sup>. Nec BOERHAAVIUS apoplexiam ex vacuatione nimia reticet. Impedimenta enim sanguinis ad caput appellendi <sup>5)</sup> pro causa agnoscit, et alibi <sup>6)</sup> defectum eius materiae, unde spiritus animales secerni possent. Idem alio loco <sup>7)</sup> diserte demonstrat apoplexiam quandoque oriri a sanguinis inopia, et praeprimis eam, quae ab insigni in partu haemorrhagia oritur, huc refert, quam HIPPOCRATI iam notam fuisse docet <sup>8)</sup>. In iis, qui sanguinis magnam vim perdidierunt, aut aliis quibuscunque causis debilitati et exinaniti sunt, collapsum vaforum et substantiae cerebri et concretionem adeo euenire, censet MANGOLD <sup>9)</sup>, cum MECKELIUS <sup>10)</sup> eiusmodi in casibus substantiam cerebri instar corii compactam deprehenderit. Etiam DE HAEN <sup>11)</sup> apoplexiam ex inanitione commemorat; et TISSOTUS <sup>12)</sup> siue, inquit, spiritus animales secerni impediuntur, et distribui siue *exhaustis viribus deficiant*, oritur apoplexia. Idem vidit huius morbi speciem, in qua debilitatem genuerant abdominis obstructions, laesa digestio, et impedita nutritio, quam prudenti virium conseruatione et impactorum solutione debellare iubet. — Praecipue vero haemorrhagiae magnae atque veloces, aquarum hydropticarum copia insignis una viceeducta, depletus ab incisa spina bifida subito hydrocephalus, diarrhoeae copiosissimae exhaurientes in causarum censum hic veniunt. Neque minus monente TISSOTO <sup>13)</sup> apoplexia ex defectu spirituum est illa, quae in morbis longis subito necat. Sic bene cl. PEZOLD <sup>14)</sup> in tabidis haud raro apoplexiam ex inanitione vitae filum abrumpere existimat. Illis enim quandoque ad ultimum usque vitae halitum spem superesse salutis, constat; mortisque post summam percoliquatius excretiones inductam exhaustionem contingentis celeritas huic sententiae fauet.

1) Succentur. anatom. L. B. 1616. p. 109.

2) Opp. univ. p. 388.

3) de morb. nerv. p. 652.

4) diff. cit. §. XIII.

5) instit. med. §. 860. no. 4.

6) de morb. nervor. p. 643.

7) l. c. p. 652.

8) Patet ex hisce, valde esse lapsum cl. PEZOLD, dum apoplexiam ex inanitione HIPPOCRATI, SYDENHAMO, BOERHAAVIO

plane ignotam fuisse perhibet diff. de apoplexia ex inanitione Gott. 1783. §. 3. Ex solo quippe silentio in SWIETENII commentariis de hac apoplexiae specie, ita iudicavit.

9) l. c. §. XXVIII.

10) ADAMI diff. cit. p. 9.

11) rat. med. T. IV. p. 183.

12) epist. p. 326.

13) l. c. p. 327.

14) Diff. cit. p. 11.



vet. Mors subitanea, quae in ictero diuturno consummatoque interdum euenit, quamque aliquoties se vidisse testatur Ill. TISSOT <sup>15)</sup>, eodem auctore ad apoplexiam ex viribus exhaustis pertinet; tum quoque, quae pharmacophilos continua medela mortem, quam effugere conantur arcessentes, quandoque abripit. Illa demum, quae senilem marasimum excipit, aut quos longe fregerunt curae occidit. Egregium exemplum narrat HAENIUS <sup>16)</sup> feminae CII annorum ex virium defectu tandem apoplexia defunctae. Cruor ater effusus sub cranio deprehendebatur, qui antea iam satis debilitatum encephalum premens sine dubio apoplexiam induxit.

Sunt qui apoplexiam ex inanitione fieri plane negant, eamque animi potius deliquium vocandam esse censent, v. c. SAUVAGES, SAGAR <sup>17)</sup>, cl. NICOLAI <sup>18)</sup>, et ipse cel. WEIKARD <sup>19)</sup>. Si interim ita comparata est humorum profusio, ut non satis versus encephalum sanguis possit promoueri, licet circulatio per pulmones et aortam descendentem adhuc continuetur, verae apoplexiae imaginem inde oriri patet. Licet praeterea, si causae exinantes ac debilitantes leuiiores sint, inde oriundum morbum lipothymiam vocari posse, non repugnem, in grauioribus tamen si homo subito concidit sideratus, mortique proximus, tot grauissimis viris praeuentibus apoplexiam hoc symptoma vocare, magis conueniet. Deinde etiam in morbo isto ex inanitione consequente, spasmus ille vasorum et systematis nervosi quandoque contingere videtur, qui secundum WEIKARDI sententiam, vera et proxima apoplexiae causa est; uti ex sequenti, quem haud ita pridem videre contigit, ad credendum inducor casu. Mulier grauida robusta satis ac torosa breui ante partum spontaneo ac per vices redeunte, a separata forsitan placentae parte oriundo, sanguinis ex naturalibus profluvio infestabatur; quod ad sedandum ipsi a rerum ignaro, insuper vena secabatur. Sub ipso partu, qui difficillimus erat et forcipe applicato absolui debebat, sanguinis fluxus sueto largior continuabat, et educta placenta tam vehementer crescebat, ut congruis vix satis cito fisci posset remediis. Insignis igitur hucusque facta vitalis laticis profusio finito partu statim lethale induxit animi deliquium seu potius Sydenhamianam illam apoplexiam, sub qua *ingens spumae vis ex ore protrudebatur*, quod quidem phaenomenon sub animi deliquio nunquam solet contingere nec sine respirationis aliqua persistencia fieri potest. Licet efficacissimorum excitantium et stimulantium sedula non negligeretur applicatio, impediri tamen nequivit, quin miseram statim animam efflaret puerpera. Me quidem non fugit, vulgatissimum illud ab HIPPOCRATE iam pronunciatum dogma; convulsiones etiam ab inanitione fieri; ex quo spumam illam a spasmo ex inanitione exprimi potuisse quis suspicaretur. Cum vero hic in externis membris convulsionum ne vestigia quidem adfuerint, et totum corpus statim quasi fulmine tactum sideratumque iacuerit, sententiae meae hac ratione nullam vim inferri patet. — Firmo igitur talo stare videtur SYDENHAMI observatio de apoplexia post puerperium, licet SAGAR <sup>20)</sup> illam reuera dari adhuc dubitet. — Fuerunt ceterum, qui omnes ex inanitione et debilitate uniuersali ortas apoplexias et partiales para-

15) l. c.

16) l. c. p. 163.

17) ll. cc.

18) Patholog. B. IV. p. 138.

19) l. c. l. p. 105.

20) Syst. morbor. p. 553.

paralyfes a sola vaforum fanguiferorum collapsorum in cerebrum nervosque pressione deriuarunt; quam vero opinionem ab omni verifimilitudine abhorrere, fed potius fyftema neruofum a vacuatione nimia immediate affici, quilibet facile cel. SELLIO <sup>21)</sup> credet.

## §. XII.

*Apoplexia hystERICA et hypochondriaca.*

Apoplexiam inter hysteriae laruas iam numeravit SYDENHAMUS; saepe se vidisse TISSOTUS <sup>1)</sup> testatur. Leuis est plerumque hic morbus et ab animi affectibus saepe excitatur; non tamen caret periculo, cum mors reapse hystERICA quandoque subsequatur; cuius exempla vidit TISSOTUS <sup>2)</sup>, in binis virginibus. Alterius post mortem caput tantum aperuit et encephalum *omni labe vacuum* deprehendit; alterius vero totum corpus *nullum conspicuum vitium* exhibuit. Simile exemplum idem ex HAENIO commemorat. Etiam SCHROEDERUS <sup>3)</sup> apoplexiam, refert, aliquando instar grauioris paroxysmi hystERICI suum exercere impetum, et cum hemiplegia aut minori paralyfi definere, ubi syftema neruofum valde imbecillum ac immobile est. Apoplexiam *hystericam* a SAUVAGESIO eam vocari, quae a SYDENHAMO post partum laboriosiore multa sanguinis effusione stipatum euenire dicitur, supra (§. pr.) iam notatum est. Apoplexia hypochondriaca et vaporosa, de qua loquitur d'APPLES apud SAUVAGESIUM <sup>4)</sup> secundum huius sententiam ab arthritica profecta est causa. WEIKARDUS <sup>5)</sup>, itidem apoplexiam hystericam ad arthriticam refert, in sola quippe per corporis nervos dispersa arthritica materia mali hypochondriaci et hystERICI fontem quaerens <sup>6)</sup>. Attamen plures praeter arthriticam, causas materiales in malo hypochondriaco et hystERICO subesse posse; ab aliis non dubitatur, uti et ex sola praeternaturali corporis irritabilitate, neruorum teneritudine et nimia sensibilitate hystERICAM quandoque nasci. — Sed an quoque hoc apoplexiae genus ad neruofam referendum? Aliquando potius spasmodico-sanguinea in hystERICIS apoplexia orietur, quia spasmi hystERICI, et algores saepe his immixti sanguinem ad caput urgere possunt. Rarius tamen hoc fiet, cum sanguinis plerumque penuria et totius corporis debilitate laborent hi aegri, quae vix sanguineae, omnino neruofae ansam dare videntur apoplexiae; quam sententiam obseruationes ex TISSOTO modo allatae stabiliunt.

## §. XIII.

*Apoplexia ex intenso gelu.*

GALENUS <sup>1)</sup> iam obseruat, eos, qui tempore hyemis in itineribus versantur, symptomatibus saepe apoplecticis infestari. WEFER <sup>2)</sup> historiam apoplexiae ex intenso gelu memoriae prodidit. S. T. QUELMALZ <sup>3)</sup> frigore enecati cadauer lustrauit et in

21) med. clin. p. 368.

1) epist. p. 328. 329.

2) l. c.

3) Diff. cit. p. 5.

4) l. c. gen. apopl. sp. 4.

5) l. c. l. p. 93. sq.

6) l. c. p. 112. sq.

1) de morbor. different. C. V.

2) l. c. p. 388.

3) Pr. frigoris acrioris in C. H. effectus, Lips. 1755. recus. in HALLERI Diff. pract. T. VI. p. 205.



in vasis omnibus sanguinis coagula funium instar, vasa encephali cruore turgida, et in ventriculis cerebri lympham viscidam effusam deprehendit. Idem <sup>4)</sup> tunc praecipue apoplexiam oriri experientia confirmat, si corpus valde excalescens fuerit, antequam frigori committeretur. Hinc patet, apoplexiam ab intenso gelu illatam praecipue pertinere ad spasmodico sanguineam (conf. §. VIII.) Non possum tamen quin ad stipuler sententiae ill. CULLEN <sup>5)</sup> a frigore vim nerveam non pressione accumulati sanguinis solummodo, sed etiam immediate suspendi. HIPPOCRATES <sup>6)</sup> iam annotavit, frigus valde nocivum esse cerebro, medullae spinali nervisque. SEELMATTER <sup>7)</sup> Tobini nervorum morbos valde familiares esse ait, praecipue ob diu durantem hyemem. Praeterea variae rationes veniam dant, mortem frigore perennantium aliquali modo apoplexiae nervosae accensendi. Digitos enim unicuique notum est intente frige factos fieri stupidos et tandem tactus sensum plane amittere. Quid ergo fiet, si encephalum ipsum gelu cogit? Haud dubie stupor totius sensorii communis et cum eo apoplexia. Illud autem reuera fieri, sequens probare videtur argumentum: Frigus soporem et lethalem apoplexiam tum demum infert, si valde intensum est, diuque aliquis in illo commoratur. Congestiones vero sanguinis ad viscera praecipue encephalum insignes exiguo temporis spatio iam orientur, cum, quanta gelu irritante ac constringente vi in peripheriam corporis polleat, inter omnes constet. Maxima igitur saltem cum probabilitate constituitur, tunc denique penetrabile frigus funestam suam apoplexiam generandi vim exserere, si ipsam calvariam transgressum est, ipsumque tetigit encephalum. Consentit fere mecum WEFERUS, dum ait <sup>8)</sup>: *Frigus sanguinem, cerebrum, et spiritus animales ita congelavit, ut nec spirituum animalium materia suppedicaretur, nec, si forte aliquid sanguinis arteriosi accederet; in cerebro et cerebello percolaretur, nec, si spiritus confecti adhuc fuissent, nervi ad loca debita detulissent.*

## §. XIV.

*Apoplexia pathematica.*

Quanta vehementiores animi commotiones in corpus polleant efficacia: quot quantasque in systemate nervoso, sanguinis circulo omnibusque fere corporis functionibus creent turbas, nemo est, quem fugiat <sup>1)</sup>. Has vero inter turbas apoplexiam ipsam, quin exanimationes subitaneas quandoque obuenire, res est haud minus confirmata, nec exemplis destituta creberrimis. Dudum ARETAEUS <sup>2)</sup> immodicas animi perturbationes et subito incussos terrores pro causis apoplexiae habuit. Quid quod

4) l. c.

5) l. c. §. 1052.

6) Aphor. V. 4.

7) Diss. cit. §. VII.

8) l. c. p. 391. in schol. ad modo allegatam obs.

1) Vid. praeter BOERHAAVIUM et HALLERUM III. ZIMMERMANN von der Erfahr.

p. 635. sq. Cl. DE MAREES diss. de animi perturbationum in corpus potentia. Gott. 775. (hor. script. IV.) et Cl. GOLDHAGEN resp. GESENIO diss. eiusdem argum. Hal. 782.

2) Diuturnor. l. c. 7.

quod omnium morborum veliementiores animi commotiones excipientium frequentissimus censeatur attonitus <sup>3)</sup>). Ipsas mortes subitaneas hic ad apoplexiam referre mihi liceat, clarissimorum virorum auctoritate nixo. Causae enim sunt eadem, curatio (apparenter enim mortui debitis auxiliis adhibitis in vitam saepe reuocare possunt) eadem; solus mali gradus differentiam constituit, iuxta quam apoplexiam vocant, si vitales restant functiones, asphyxiam vero si sufflaminantur eadem.

In limine statim scrutinii de dicta animi pathematum funesta efficacia, illa quaestio se offert, quam ratione suam exferant violentiam; neque sane frustranea est solaque theoria usu cassa continetur haec disquisitio, sed normam exhibet auxiliorum cum fructu applicandorum. Id quidem extra omnem dubitationis aleam positum est, quosdam animi affectus in solum nervosum systema immediate agere; absque ulla, saltem absque notabili et ad funestum effectum sufficiente circulationis conturbatione. Idem asserit CULLENIVS <sup>4)</sup>, quin ipse supra allegatus Anonymus <sup>5)</sup> WEIKARDO alias satis contrarius, subitaneas hasce mortes quas ad apoplexiam referendas esse mecum consentit, a subtilioribus quandoque oriri causis, quam vasorum encephali ruptura effusioque cruore, concedit, cadauerum, ut ait, sectionibus nixus. Non vero omnibus ac singulis animi pathematibus tanta potentia inest, ut apoplexiae excitandae sufficiant, neque omnes eadem ratione hoc praestant. Sequentes solummodo hic in censum veniunt. Rara est illa beatitudo, quae subito *gaudio* necat. Circa proximam huius mortis causam insigniter differunt medicorum sententiae, quae conciliari vix poterunt, nisi cadauer gaudio profuso enecati lustretur aliquando. Alii apoplexiam sanguineam esse credunt a subitanea sanguinis resolutione ac rarefactione cerebrum inundante oriundam, alii excessivam spirituum animalium transpirationem, iterum alii cordis subitaneam paralyfin arguunt. Sed missis hisce opinionibus ad ea, quae maiorem probabilitatem habent, accedamus. Subitanea et insigni cerebri concussione profusum gaudium, uti et alios vehementiores animi commotiones necare Ill. WEIKARD <sup>6)</sup> censet. Ill. MEZGER <sup>7)</sup> pathemata animi grauiora v. c. profusum gaudium in exemplo a TISSOTO <sup>8)</sup> allato, cerebri commotionem, illi, quae a violentia externa capiti applicata oritur, valde analogam inducere credit; et hac ratione quaestionem a se ipso olim <sup>9)</sup> motam: annon detur commotio cerebri ex causa interna? resoluit. Neque ill. TISSOTO <sup>10)</sup> apoplexiam ex compressione vel haemorrhagiam cerebri hic fieri probabile videtur, sed potius encephali absolutam paralyfin, cum illam nimis vehemens animae commotio omnino inducere possit. Alias tamen quodque causas concurrere, sentit IDEM <sup>11)</sup> nempe subitaneam spirituum dissipationem,

et

3) ZIMMERMANN l. c. p. 639.

4) l. c. §. 1052.

5) Allgem. deutsche Bibl. Vol. XLIII. St. I. p. 20.

6) Verm. Schr. St. II. p. 71.

7) Verm. Schr. T. I. p. 75.

8) Epist. med. pr. p. 218.

9) Aduersar. med. P. I. p. 278.

10) Maladies des nerfs Tom. II. P. I. pag. 332 — 333.

11) loc. cit.



et animi deliquium a corde motu vehementiori peristaltico sanguinem ad corporis peripheriam pellente, seque ipsum illo priuante, oriundum. An non igitur hic inanitio quaedam et encephali et cordis simul subest, cum gaudium exteriora corporis laxare omnesque augere secretiones, deplere e contrario internas partes, certo sit exploratum?

Sub ipso coitu in *oestro venereo* apoplexiae et mortes subitaneae obseruatae sunt praecipue in valde iam debilitatis. Exempla huius generis narrant HENR. AB HEERS<sup>12)</sup>, F. HOFFMANN<sup>13)</sup>, PIQUER<sup>14)</sup>. Etiam viri ill. MURRAY et RICHTER tales, qui ipsis occurrerunt, casus narrarunt. Hocce morbi genus certe non nisi nervosum symptomata est; in valde iam eneruatis ac imbecillis noua insigniter debilitans, nervosque mire concutiens<sup>15)</sup> causa accedens, ferri non potest, quin vitae filum abruptat. Frequentissimae sunt *irascendi* occasiones et ad iram saepe proclives<sup>17)</sup> apoplectici. Turgent medicorum libri obseruationibus, quae narrant apoplexiam iram excipientem. Mortem ira excandescentium plerumque apoplecticam esse, testatur ill. ZIMMERMANN<sup>17)</sup>. Sequatur *terror* et *metus*. Apoplexia inde orta est, quae per bimestre spatium paralytin sensuum motuumque voluntariorum reliquit<sup>18)</sup>. Suetum mortis quam terror inducere solet genus, apoplexiam esse, testatur LANGHANS<sup>19)</sup>. Apoplexiam ex sola imaginatione et assiduo metu, se aliquando hoc morbo perituros esse, hypochondriacos interdum reuera corripere, exemplis confirmauit WEIKARD<sup>20)</sup>. Idem<sup>21)</sup> narrat apoplexiam post insignem *moerorem* tempestate frigida ac humida ortam. — Uniuersum mihi videntur animi affectus quadruplici ratione apoplexiam inferre: 1) sola vel saltem symbolam afferente immediata in sensorium commune actione, 2) animi commotiones ope miri in praecordia imperii vitium quaecumque in abdomine producere possunt et hoc deum apoplexiam inferre (§. IX.), quare SCHROEDERUS<sup>22)</sup> non dubitauit apoplexiam ex vehementioribus animi contentionibus praecordiali suae annumerare<sup>23)</sup>. 3) Cum animi commotiones quaedam insignem ad caput congestionem, praesertim per spasmos, quas in variis corporis partibus excitant, creent, negari non potest, hanc ad funestum effectum producendum concurrere posse. Nisi tamen simul cerebrum et nerui vehementer fuissent affecti, et ad recipiendam nociuam ab accumulato sanguine factam inpressionem, quasi praeparati,

E e e 2

parati,

12) Obs. XVIII.

13) Diss. de morbis ex intempestiua venere oriundis.

14) Prax. med. cap. de apopl.

15) GAUBII Instit. Pathol. §. 562.

16) TISSOT epist. med. pr. p. 307.

17) l. c. pag. 641.

18) Mem. de l'ac. des sc. mem. 419.

19) Diss. cit. §. 43.

20) l. c. II. p. 19.

21) ibid. p. 68.

22) Diss. cit. §. VIII.

23) Sed haec explicatio ad mortes subitaneas ab animi affectibus ortas, nequiquam pertinet. Neque unquam ex gaudio obseruati fuerunt funesti in praecordia effectus; quare errauit egregiae diss. de exanthematibus fonte abdominali nuper hic loci editae auctor cl. WELTI, dum p. 8. mortem neptis LEIBNITII ex profuso gaudio subito consecutam, ex fonte praecordiali deriuat.

parati, apoplexiam non infecutam fuisse probabile est. 4) Diuturni tristesque animi affectus systema nervosum sensim ita debilitare possunt, ut graviuscula quaeque accedens causa occasionalis, encephalum male mulctans, apoplexiae excitandae sufficiat. Quae quidem omnia docent, me hic non plane incongruo loco apoplexiam pathematicam posuisse.

Commode praecedenti subnecti poterit sermo de illa apoplexia, quae literatos, sedentariam viuentes vitam et animi contentionibus intentisque meditationibus deditos non raro prehendere consuevit. Sed neque in huius apoplexiae natura rite determinanda consentiunt medici. Congestionibus sanguinis ad caput literatis adeo familiaribus illam natales debere, censent VAN SWIETEN<sup>24)</sup> et TISSOT<sup>25)</sup>. Vitam sedentariam cum animi contentionibus iunctam creare cephalagias et serosas in encephalo accumulationes et cerebrum quasi exhaurire tradit THOMAS SCHWENCKE<sup>26)</sup>. Etiam MANGOLDUS<sup>27)</sup> apoplexiam ex lucubrationibus nimis ortam inanitioni collapsui et exarescentiae cerebri tribuit. (§ XI.) SCHROEDERUS<sup>28)</sup> in conturbatis viscerum hypochondriacorum functionibus illius quaerit originem. Quidquid horum sit, lucubrationes immodicas systema nervosum insigniter debilitare, frangere, exhaurire certum est; ideoque hac etiam ratione ad apoplexiam excitandam symbolam afferre. Irritatio vero, quam intentae meditationes in encephalo proferunt, quamque quilibet attentus in se ipso animaduvertere potest, congestiones illas creat, quas hic omni culpa vacare, neque saltem occasionalem praebere causam asserere vix sustinuerim. Neque demum varia viscerum abdominalium vitia per mirum illud caput inter et inum ventrem commercium suborta, in morbo attonito, qui literatos invadere solet, producendo infontia pronunciare ausim, siue mediante spasmo et ab inde ortis congestionibus id perpetrent, siue incognita nobis ratione consensuali.

## §. XV.

### *Aliae quaedam causae.*

MORGAGNI<sup>1)</sup> seu potius VALSALVA in quamplurimis apoplexia defunctorum a se perquisitis cadaueribus praeter sanguinis seruae effusionem *exulcerati* quid et *corrosi* in encephalo reperit. Etiam TISSOTUS<sup>2)</sup> alique similia vitia deprehenderunt. Hanc corrosionem, nisi solam saepe causam fuisse, symbolam tamen ad apoplexiam excitandam contulisse verosimile est. Cl. NICOLAI<sup>3)</sup> in erosio fibris medullaribus materiae neruae motum non amplius fieri credit. Cl. WEIKARD erosiones censet

24) T. III. pag. 267.

25) Epist. p. 307.

26) Rari casus explicatio anat. med. Hag. Com. 1733. recens. in Diss. pract. HALLER. T. VII. p. 469.

27) loc. cit. §. 13.

28) Diss. cit. p. 21.

1) Epist. II. no. 9. 11. 12. 13. 15. 22.

2) Epist. p. 340.

3) l. c. p. 133.



cenſet cauſam apoplexiæ proximam fuiſſe, irritatione ſua ſpasmus illum ſyſtematis nervoſi inferendo; effuſos humores una inuentos coeffectum eiſdem cauſae. MEZGERUS <sup>4)</sup> demum extrauſationem cruoris aut lymphæ vel per ſe a propria cauſa, vel ab eroſione demum excitatam comprimendo ſiderationem produxiſſe ſentit; quod quidem maxima gaudet probabilitate, et cum ſupra (§. V.) declaratis optime conuenit. Cum tamen ſenſorium commune ab eroſione omnino idiopathice afficiatur, et in ipſa ſua ſubſtantia corrumpatur, quod non poteſt non illud alia quadam propiori ratione quam per compreſſionem ab effuſis humoribus inductam male mulclare, ad apoplexiæ nervoſae cauſas hanc quoque referre non dubitauit. — Quae epilepſiae et aliorum morborum conuulſionum paroxyſmos comitatur aut excipit apoplexia, ob rationes ſupra (§. VIII.) allatas, ex genere plerumque ſpſmodico-ſanguineae eſt. Cel. tamen CULLEN <sup>5)</sup> nervoſae annumerat, quia et hyſterici paroxyſmi ſaepe in coma quoddam deſinunt. Quod quidem argumentum licet non omnino nos conuincat, dubitari tamen nequit, a repetitis vehementiorum conuulſionum inſultibus ſyſtema nervoſum inſigniter concuti et debilitari, et ad recipiendas nociuas cauſarum accidentium accumulati nempe ſanguinis, et dilatatorum vaſorum varicum, impreſſiones aptius reddi. Ex quibus, quatenus haec apoplexiæ ſpecies ad nervoſam pertineat, facile perſpicitur. — Apoplexiæ hereditariae integris ſaepe hominum familiis infelici fato priuæ, cauſam prædiſponentem in congenita encephali debilitate potiſſimum latere, ſententia mihi videtur haud improbanda <sup>6)</sup>. — Notatum ſaepe, in inflammationibus partium ſenſiliorum v. c. ventriculi, inteſtinorum, vehementioribus, nec non in vulneribus magnis e. g. ab amputatione, aegros ſubito riguiſſe, et quaſi tetano uniuerſali correptos eſſaſſe animam. Poſt mortem nulla tam cito ſubſequentis fati conſpicua cauſa deprehendi potuit. Quod quidem necis genus haud inepte huc collocari videtur; ſicuti quoque ſubitanea totius corporis virium proſtratio, quin exanimatio, quae a morborum maxime malignorum v. c. peſtis acutiſſimae miaſmatibus vel contagiis ſaepe ſub prima inuaſione inducitur.

Multa adhuc dicenda ſuperſeſſent de *cerebri* ſic dicta *commotione*, communiffima laeſionum capitis ſequela; de *apoplexia electrica* SAGARII <sup>7)</sup>, eique ſatis analoga <sup>8)</sup> morte de coelo fulmine tactorum; de actione *venenorum* <sup>9)</sup> præcipue narcoticorum, ſyſtema nervoſum immediate <sup>10)</sup> ferientium; de *vaporibus nephriticis*, præcipue illis, qui ſtupefaciunt <sup>11)</sup>, vel ſaltem, licet pulmones ſtringendo reſpirationem cohibeant,

E e e 3

ſimul

4) l. c. I. p. 69. 70.

5) l. c. §. 1054 — 1055.

6) WEIKARD l. c. p. 102.

7) l. c. ſp. 9. p. 554.

8) BIDERMANN diſſ. de cauſis ſubitae mortis fulmine tactorum Lipſiae 1768. vel ill. MURRAY in b. VOGEL Bibl. med. VIII. p. 217. PLENCK Samml. von Beobachtungen etc. B. I. Abh. 2. UNZER med. Handb. pag. 545.

9) Vid. e. g. de opio ill. MURRAY appar. med. II. p. 235. 239.

10) Hoc revera fieri, nec ſanguine ſolummodo exagitato et rarefacto opium ſoporem inducere, inter alios bene demonſtrat REMMET diſſ. de uſu opii in morbis inflammator. rec. in medical and phil. comment. Vol. II. P. I.

11) Cel. GMELIN Allgem. Geſch. der Gifte I. p. 181. ſq. UNZER l. c. p. 514. ſq.

simul tamen <sup>12)</sup>, uti recentiora obseruata docent, vim nerueam immediate annihilandi et extinguendi facultate instruuntur; de apoplexia *temulenta*, non quidem illa, quae in ceterum sanis durante ipsa ebrietate euenit <sup>13)</sup>, sed illa, quae strenuos inde a longo tempore potatores, quorum systema neruosum a crebra spirituosorum ingestione valde iam debilitatum, infirmatumque est, prehendere solet etc. <sup>14)</sup> — quas nempe causas omnes ad apoplexiam neruosam referendas esse, existimo; licet in quibusdam humorum simul excitatas in encephalum congestiones ad funestum effectum concurrere non negauerim. Sed temporis angustia, praescriptique libelli academici limites ulterius dispatiari vetant, velaque iubent contrahere.

## §. XVI.

### *Breuis ad medelam morbi applicatio.*

Quam hucusque exhibuimus disputationem omnem non sola theoria utilitate cas-  
sa et ad medelam apoplexiae applicari nescia, contineri, sed insignem omnino in  
curationem morbi rite determinandam exferere influxum, paucis adhuc ostendere  
animus est. Constat antiquiores, sanguineam solummodo et serosam apoplexiam di-  
stinxisse, et medelam unius ab altera maxime differentem, quin illi contrariam fere  
constituuisse. Taxabant nempe in apoplexia sanguinea omnia vehementiora irritantia,  
frictiones, epispastica, (quae TISSOTUS *apoplexifera* vocanda esse censet) interna et  
externa cardiaca, clysmata acria, purgantia fortiora, emetica et s. p. quae omnia in  
serosa apoplexia optime conuenire aiebant, venaesectionem e contrario illic necessa-  
riam hic funestam esse. Missa hac vice apoplexia serosa, sanguineam praecipue cum  
neruosa, quoad medelam unicuique competentem comparabo. Praefari vero pauca  
de diagnosi necessarium erit. Haec quidem duobus potissimum nititur momentis, cau-  
sis praegressis, et habitu aegroti externo. Si nempe causae antea recensitae debilitan-  
tes, exinanientes, systema neruosum male afficientes adsuerunt, et aegri corpus inde  
a longo tempore infirmatum valetudinarium imbecillum fuit, tunc de apoplexia ner-  
uosa cogitandum erit praecipue si congestiones ad caput non valde urgere, faciem  
non prae rubore tumidam, nec linguam protrusam, conspiciamus. Sed in spasmo-  
dica etiam, quin interdum in ipsa neruosa apoplexia congestiones ad caput insignes  
euenire supra diximus. In priori signa spasmodorum simul praesentia hic non recensenda  
medelam dirigent; et in utraque saepe venaeseccio omnino necessaria erit, quasi  
remedium palliatium; semper vero non sine magna cautione sollicitoque ad aegri vi-  
res et causas praegressas respectu suscipienda. LE CAT <sup>1)</sup> saepe se vidisse refert; me-  
dicos imperitos non nisi sanguineam cogitantes cerebri inundationem, lanceolae usui  
tam

12) Cel. GMELIN l. c. p. 212. ÜNZER  
l. c. p. 519. sq.

VAGES l. c. sp. 3. SAGAR l. c. p. 552—553.  
MANGOLD. diff. cit. §. 25.

14) WEIKARD l. c. I. p. 98.

13) Huius generis exempla narrant SAU-

1) MONRO l. c. p. 363.



tam larga manu indulgisse, ut miseri per se satis imbecilles apoplectici animam efflarent. Etiam cll. WITHERS et GRANT<sup>2)</sup>, cautelas venaesectionum in apoplexia follicite obseruandas tradunt. Expleta indicatione ad venaesectionem, si quidem aderat ad excitantia confugiendum et irritantia, quae in sanguinea apoplexia, optime momente TISSOTO non sine summa cautione in usum trahenda, si vero nervosa est, tunc egregium omnino praestant effectum, saepeque sola absque praegressa venaesectione medelam constituunt, saepiusque, ac vulgo existimatur, conuenire, cel. WEIKARD theoria sua et experientia suffultus, praecipue contra TISSOTUM monet. Ceterum hic eadem excitantia locum habent, quae supra ab antiquis in apoplexia serosa commendata fuisse indicaui. De medela apoplexiae secundum diuersissimas causas remotiores valde variante hic differere supersedeo. Sufficiat indicasse generales ad venaesectionem et refrigerantia vel ad excitantia indicationes. Verbulo adhuc tangam fomentationes frigidas a cl. CRELL<sup>3)</sup> nuper in apoplexia valde commendatas ad imitationem medelae SCHMUCKERI et THEBENII in capitis laesionibus. Haec frigida epithemata non nisi venaesectione, si necessaria fuerit, peracta locum habere posse, facile perspicitur. Optime conueniunt in qualibet apoplexia, praecipue etiam illa, quae a systematis nervosi subitanea atonia ac paralyfi oritur; et applausum tulerunt cll. WEIKARDI<sup>4)</sup>, NICOLAI<sup>5)</sup>, KREBSII<sup>6)</sup>, aliorumque. In apoplexia interim ex inanitione i. e. ex sola inopia humorum in encephalo oriunda vix ac ne vix quidem admittendum erit hocce remedium.

2) ll. cc. Plura de hac re vid. in I. A. SCHOMBURG diff. de venaef. in apopl. etc. Gott. 1783.

3) In ill. BALDINGER N. Magazin für

Aerzte St. I. p. 17. sq. nec non Auszüge aus den Hallerschen prakt. Diff. I. p. 23. sq.

4) l. c. St. 2. p. 73.

5) Rec. und Curarten p. 243.

6) Diff. cit. p. 23.

## A D D E N D A.

ad pag. 1. Nullam humani corporis partem pauciores, quam cor, nervos habere asseruit quoque iam ante hos viginti octo annos Francogallus aliquis scriptor, in *Histoire naturelle de l'homme considéré dans l'état de maladie ou la médecine* rendue à sa première simplicité par LE CLERC à Paris 1767. 8. 2. Vol. L.

ad pag. 6. Ex meis experimentis modo nunc pauca enumerabo; reliqua in aliud tempus differam.

Exp. I. Resecaui ex ventre aequae ac dorso Ranae temporariae integumenta, quae facile in hoc frigido animali a subiecta tenuissima tela cellulosa separabantur atque mox et supra et infra nervi in conspectum venerunt. Quibus peractis imposui ranam imperiali argenteo ventre et in dorso laminam stanni foliati applicui, atque simulac bina metalla se attingere curarem vehementissimae convulsiones in toto animali sunt observatae.

Exp. II. Ex musculis istis, qui femur in rana circumdant, elegi vastissimum atque ex eius carne dissectione longitudinali separavi particulam aliquam, quam argenteae monetae imposui atque alia lamina non adeo lata stanni foliati obtegi, binisque metallis ad se invicem ductis in hacce carne plures repentinas convulsiones et viuidas seseque proxime insequentes contractiones tenuissimarum fibrillarum eleganti spectaculo observavi.

Exp. III. Corde R. temporariae exsecto eiusque basi ita resecta, ut sinum a corde ipso siue ventriculo separarem, ipsum asseri ex Tiliae ligno imposui pluresque eiusdem contractiones, paulo post debiliores, irritato vero corde iterum vehementiores factas esse contemplatus sum. Iam vero tota cordis carne debilitata ipsam stanno foliato admovi à latere neque motum neque contractionem in eodem cognovi, basi vero ipsius stanno foliato imposita, iterum suam contractilitatem ostendit atque maiorem adhuc si argento et stanno simul imponebatur cordis conus sc. sua basi. Ex quibus observatis manifesto apparet, cor animali electricitate affici atque nervis nequaquam carere.

Exp. IV. Tentavi quoque aliquoties electricitatem animale[m] vermium consuetis artificijs explorare atque ut hoc efficere[m] adhibui lumbricum terrestrem, quem secaui et iterum resecaui et transversim et sec. longitudinem, inponendo eius partes resectas stanno foliato, zinci regulo atque nunquam mihi contigit motum acceleratum fibrarum muscularium vel convulsionem nec minutissimam intueri. Ergone vermes nervis vere carent? L.

ad p. 180. Addidi tom[o] tertio loca istorum auctorum, qui usque ad illud tempus de electricitate animali illustrauerant quaestionem; iam lectorum intererit adiecisse, quae nuper accesserunt scripta. Et primum inter Italos scriptores nomino, qui sequuntur: *Reflessioni sopra alcuni punti di un nuovo sistema de' vasi assorbenti ed Esperienze sulla Elettricità animale lette nell' Accademia di Scienze, lettere et arti di Padova*, da FLOR. CALDANI in Padova 1792. 8. — Lettera del Dottore EUSEBIO VALLI sull' Elettricità animale ad un suo amico. 1792. 4. (Salz-



(Salzburg. med. Zeit. 1793. II. 6.) — Lettere sopra l'Elettricità animale, scritte al Sig. Cav. Fel. Fontana — dal Dottore GIOVACCHINO CORRADORI 1793. 8. (Salzb. med. Zeitung 1793. II. 337.) — Memoria su l'Elettricità animale inserite nel Giornale fisico-medico del Sgr. BRUGNATELLI Pavia 1792. 8. (Salzburg. med. Zeitung. 1793. II. 8.) — Neque omittere possum, quae vernaculo idiomate ex italico sermone sunt edita: ALOYSII GALVANI Abhandlung über die Kräfte der thierischen Electricität auf die Bewegung der Muskeln nebst einigen Schriften der Herren VALLI, CARMINATI, und VOLTA über eben diesen Gegenstand, von D. IOHANN MAYER. Prag 1793. 8. Porro: Dell' uso e dell' attività dell' arco conduttore nelle contrazioni dei muscoli A. S. Tommaso d'Aquino. Bologna 1794. 8. (Ephemeridi letterarie di Roma. num. 39. et 40. 1794.) — — Nec minus: Experiments and Observations relative to the influence lately discovered by Mr. Galvani and commonly called animal Electricity by RICHARD FOWLER. Edinb. et Lond. 1793. 8. — Experiments on animal Electricity with their Application to Physiology and some pathological and medical observations by EUSEBIUS VALLI. London 1793. 8. — Experiments on the nervous system with opium and metalline substances; made chiefly with the View of determining the Nature and Effects of animal Electricity by ALEXANDER MONRO. London 1793. 4. — An Account of some discoveries made by Mr. Galvani of Bologna with experiments and observations on them. In two lettres from Mr. ALEX. VOLTA F. R. S. Prof. of Pavia to Mr. TIBERIUS CAVALLO F. R. S. in Ph. Transact. 1793. Part. I. (Analyt. Review Mai 1794. p. 15.) — Medical Facts and Observations III. 1792. — — Legi super hac quaestione merentur ea, quae Cel. GREEN in diario physico (Journal der Physik VI. VII. u. VIII. Band.) ex scriptis virorum in hac re examinanda clarorum collegit. Porro VOIGTS Magazin für das Neueste in der Physik und Naturgeschichte IX. Band I. Stück. — CARL CASP. CREVE Beiträge zu Galvani's Versuchen über die Kräfte der thierischen Electricität. Frankf. u. Leipzig 1793. 8. (Salzb. med. Zeit. 1793. II. Band. S. 390.) — ID. in Schriften der Gesellschaft naturforsch. Freunde zu Berlin XI. B. 2. St. — CHRISTOPH HENR. PFAFF de electricitate sic dicta animali. Stuttgart 1793. — FRANC. XAVERIUS KLEIN de metallorum irritamento veram ad explorandam mortem. Moguntiae 1794. (GREENS neues Journal der Physik. I. I. p. 36.) — VON HAUCH von den galvanischen Entdeckungen in BÖTTCHER physikalische Aarbog. (cf. Göttingische gelehrte Anzeigen. 1794. 42. Stück.) — — Denique de electricitate animali quaedam quoque habent Francogalli: Lettre de Mr. DE GENETTES à Mr. DE LA METHERIE sur l'électricité animale. Journal de Physique (Analytical Review Mai 1794. p. 108.) et FOURCROY in la medecine éclairée par les sciences physiques etc. Tom. IV. — Audio quoque Cel. ABILGAARD Prof. Hafniensem in Raja Torpedine inter suae peregrinationis otia cepisse experimenta atque Gener. ALEXANDRUM AB HUMBOLDT limati iudicii virum in electricitate animali exploranda et quidem ea, quae diuersimode dissectis ner-

vis instituitur, nuper occupatum fuisse. Itaque hos Duumuiros mihi iucundissimo amicitiae vinculo iunctos rogo, velint proxime obseruata sua publici iuris facere, quae mecum certe omnes solidioris doctrinae physicae indagatores auide expectabunt. *L.*

- ad p. 204. Prodiit quoque expertiss. v. d. HAAR liber a VOSIO hor. script. Tom. IV. examinatus atque commentatione illustratus, vernaculo idiomate exscriptus: I. VAN DER HAAR über die Beschaffenheit des Gehirns, der Nerven und einige Krankheiten derselben. Nebst einem Anhang medicin. chirurg. Beobacht. Aus dem Holländ. nach der neuesten verm. Ausgabe des J. 1790. übersezt von D. KEUP. Stendal 1794. 8. Neque omittere vellem, quae in ephemeridibus ad rem litterariam in uniuersum spectantibus ex HAARII et VOSII scriptis excerpta leguntur. (A. L. Z. 1791. III. Band. S. 561. et 574.) *L.*
- ad p. 143. ad hunc locum et tractatum Rahnii viri meritissimi quoque notauisse iuuabit varia alia loca: IO. HEINEKEN de morbis neruorum eorumque frequentissima ex abdomine origine. Gott. 1783. hor. script. II. 291. — IO. JESSENIUS de sympathiae et antipathiae rerum naturalium causis. Viteb. 1599. 4. — BARTH. BAUSNERI de consensu partium c. h. Libri III. Amstel. 1656. — MICH. ERNST ETTMÜLLER de corpore humano sympathetico. Lips. 1701. 4. — HENR. IOS. REGA de sympathia seu consensu partium c. h. ac potissimum ventriculi in statu morbofo. Francof. et Lips. 1762. — EGGER de consensu neruorum. Viennae 1766. — FERDINANDI SPRENKEL DE LENIS de consensu part. c. h. inter se. Vindob. 1776. — DE NEUFVILLE von der Sympathie des Verdauungssystems zur Vereinfachung der Vorstellungen und Wirkungen des praktischen Arztes. Gott. 1786. — Inprimis vero etiam cf. ipsius IO. HENR. RAHNII exercit. phys. primam de causis physicis mirae illius, tum in homine, tum inter homines, tum denique inter caetera naturae corpora sympathia. Turici 1785. II. ib. 1788. et IO. CHRIST. TRAUOGOTT SCHLEGELII Sylloge selectiorum opusculorum de mirabili sympathia. Lipsiae 1787. 8. in qua recusae sunt dissertationes sequentes: 1) IANI PETERSEN MICHELL diff. de mirabili, quae caput inter et partes generationi dicatas intercedit, sympathia. Lugd. B. 1781. 2) PETRI IAS de mirabili, quae pectus inter et ventriculum intercedit, sympathia. L. B. 1784. 3) DIDERICI VEEGENS de sympathia inter ventriculum et caput praecipue in statu praeternaturali. L. B. 1784. 4) IAC. ANEMAET de mirabili, quae mammas inter et uterum intercedit sympathia. L. B. 1784. *L.*
- ad pag. 179. cf. FRANC. ZULIANI de apoplexia praesertim neruea Comment. Brixiae 1789. Lipsiae 1790. 8. *L.*



## INDEX PRIMUS

## CONTINENS

ENUMERATIONEM OPUSCULORUM IN HORUM SCRIPTORUM  
NEUROLOGICORUM MINORUM SELECTORUM  
QUATUOR TOMIS RECUSORUM.

ADOLPH, IO. TRAUG. *de nervorum longitudine in compensationem multitudinis et vice versa. A'torf 1769. IV. 181.*

ANDERSCHII *fragmentum descriptionis nervorum cardiacorum dextri lateris, iam ante aliquot decennia typis impressum, nunc denuum subiuncta auctoris tabula notulisque adiectis editum a S. TH. SOEMMERRING. II. 113.*

ASCH, GEORG THOMAS, *de primo pare nervorum medullae spinalis. Goettingae 1750. cum figg. I. 310.*

QVNG, IANI, *Nervorum cervicalium anatome. Havniae. cum fig. I. 343.*

BEHREND, IO. BERNARD IACOB, *Dissertatio qua demonstratur cor nervis carere addita disquisitione de vi nervorum arterias cingentium. Moguntiae. 1792. cum fig. III. 1.*

BOEHMER, IO. FRANCISCUS GUILIELMUS, *de nono pare nervorum cerebri. Goettingae 1777. cum fig. I. 279.*

BOSE, ERNEST. GOTTLOB, *de nervorum actione ex collisione. Lipsiae 1762. II. 251.*

BRUNN, IO. HENRIC. A, *Experimenta quaedam circa ligaturas nervorum in vivis animalibus instituta. Goettingae 1753. II. 271.*

CASTELL, PETR. *experimenta, quibus varias corporis humani partes sentiendi facultate carere constitit. Gottingae 1753. IV. 133.*

CRUSEN, CHRIST. BERNH. *de tensione nervorum. Goettingae 1765. IV. 189.*

EBEL, IO. GODOFREDI, *Observationes neurologicae ex anatome comparata. Traiecti ad Viadrum 1788. cum figg. III. 148.*

FROTSCHER, GEORG CHRISTIAN, *de medulla spinali eiusque nervis. Erlangae 1788. c. fig. IV. 70.*

GIRARDI, M. *de nervo intercostali. Florentiae 1791. III. 78.*

Fff 2

HAASE,

- HAASE, IO. GOTTLÖB, *de Gangliis nervorum. Lipsiae 1772. I. 61.*
- — *de nervo phrenico dextri lateris duplici parisque vagi per collum decursu. Lipsiae 1790. III. 112.*
- — *de plexibus oesophageis nervosis parisque vagi per pectus decursu. Lipsiae 1791. III. 117.*
- — *de nervis narium internis. Lipsiae 1791. IV. 11,*
- HEINEKEN, IO. *de morbis nervorum eorumque frequentissima ex abdomine origine. Goettingae 1783. II. 291.*
- HIRSCH, ANT. BALTH. RAYMUND, *Paris quinti nervorum encephali disquisitio anatomica in quantum ad ganglion sibi proprium semilunare et ad originem nervi intercostalis pertinet. Viennae 1765. cum fig. I. 244.*
- ISENFLAMM, IAC. FR. et IO. FR. DOERFLER *de vasis nervorum. Erlangae 1768. III. 162.*
- IWANOFF, DEMETRIUS, *de origine nervorum intercostalium. Argentorati 1780. III. 89.*
- KLINT, IAC. IO. *de nervis brachii. Goettingae 1784. cum fig. III. 122.*
- KORTUM, CARL GE. THEOD. *de apoplexia nervosa. Goettingae 1785. IV. 179.*
- KRAUSE, CAROL. CHRISTIAN. *de sensilibus partibus humani corporis. Lipsiae 1765. III. 185.*
- LOBSTEIN, IO. FR. *de nervis durae matris. Argentorati 1772. I. 89.*
- — *de nervo spinali ad par vagum accessorio. Argent. 1760. cum fig. II. 219.*
- LUDWIG, CHRIST. THEOPH. *de plexibus nervorum abdominalium atque nervo intercostali duplici observationes nonnullae, Lipsiae 1772. III. 105.*
- DE MARÉES, CHRIST. GUILIELM. HENRIC. *de animi perturbationum in corpus potentia. Goettingae 1775. IV. 344.*
- MECKEL, IO. FRIDR. *de quinto pare nervorum cerebri. Goettingae 1748. cum figg. I. 145.*
- — *de nervis faciei. 1751. cum fig. II. 204.*
- — *de ganglio secundi rami quinti paris nervorum cerebri nuper detecto, deque vera gangliorum utilitate. Berolini 1749. cum fig. IV. 7.*



MECKEL, IO. FRIDR. *Observationes anatomicae de glandula pineali, septo lucido et origine paris septimi nervorum cerebri. Berolini 1765. cum fig. IV. 9.*

METZGER, IO. DAN. *Nervorum primi paris historia. Argentinae 1766. I. 108.*

MICHELITZ, ANTONII, *Scrutinium hypotheseos spirituum animalium. Pragae 1782. III. 209.*

MÜLLER, GEORG. HENRIC. *Series experimentorum in musculis et nervis animalium quorundam institutorum horumque organorum functionem s. effectus naturales illustrantium. Stuttgart 1793. IV. 170.*

MURRAY, ADOLPHI, *Observationes anatomicae de infundibulo cerebri et variationibus quibusdam in parte cervicali nervi intercostalis. Upsaliae 1772. II. 242.*

— — *de sensibilitate ossium morbosae. Upsaliae 1780. IV. 252.*

PALETTA, IO. BAPT. *de nervis crotaphitico et buccinatorio. Mediolani 1784. III. 63.*

PEIPERS, GOSWINI FRIDERICI, *Tertii et quarti nervorum cervicalium descriptio, cui accedit succincta eorundem nervorum quinti; nervi phrenici praesertim ratione originis; nervi accessorii WILLISII, nervi duri eiusque praecipue inferioris nervi hypoglossi et occipitalis maximi a secundo cervicalium nervo adumbratio. Halae 1793. cum fig. IV. 18.*

PFEFFINGER, IO. *de structura nervorum.*

*Sectio prima. Argentorati 1782. I. 1.*

*Sectio altera. Argent. 1783. I. 31.*

PLATNER, ERNEST. *de causis consensus nervorum physiologicis. Lipsiae 1790. II. 266.*

PLOUCQUET, GUIL. GODOFR. et CHRISTIAN. LUDOV. BAUR *de cephalalgia methodo naturae accommodata in species digesta. Tubingae 1787. III. 294.*

RAHN, IO. HENR. *de miro inter caput et viscera abdominis commercio. Goettingae 1771. IV. 266.*

SOEMMERRING, SAM. THOMAS, et FRID. NICOL. NÖTHIG *de decussatione nervorum opticorum. Moguntinae 1786. cum fig. I. 127.*

— — *de basi encephali et originibus nervorum cranio egredientium Libri quinque Goettingae 1778. hoc in opere auctoris observationibus aucti. cum figg. II. 1.*

SOEEMMERRING, SAM. THOM. *de acervulo cerebri dissertatio* 1785 *primum edita, denuo reuisa, correctâ novisque observationibus aucta.* III. 322.

THAER, ALBRECHT *de actione systematis nervosi in febribus.* Goettingae 1774. III. 240.

VOS, CORN. IO. *de nutritione imprimis nervosa. Traiecti ad Rhenum* 1789. IV. 202.

WRISBERG, HENR. AUG. *Observationes anatomicae de quinto pare nervorum encephali et de nervis qui ex eodem duram matrem ingredi falso dicuntur.* Goettingae 1777. cum fig. I. 263.

— — *de nervis arterias venatque comitantibus.* Goettingae 1786. III. 24.

— — *de nervis pharyngis.* III. 48.

— — *de nervo phrenico quaedam animadversiones.* Goettingae 1763. IV. 16.

— — *Observationes anatomicae de nervis viscerum abdominalium Particula prima de ganglio plexuque semilunari.* Goettingae 1780. IV. 50.

ZERENER, ADOLPH, THEOPH. NICOL. *an cor nervis careat et iis carere possit?* Erfordiae 1794. IV. 1.

ZINN, IO. GOTTFR. *Experimenta quaedam circa corpus callosum, cerebellum, duram meningem in vivis animalibus instituta.* Goettingae 1749. IV. 106.



## INDEX SECUNDUS

## CONTINENS

NOMINA AUCTORUM QUORUM SCRIPTA MEDICA,  
NEVROLOGICA INPRIMIS HOC IN OPERE LAUDATA  
INVENIUNTUR.

## A.

**A**chillinus I. 313.  
Acolouthon IV. 342.  
*Adolph* IV. 181.  
*Adolphi* IV. 322.  
*Aegineta* P. IV. 379.  
*Aetius* IV. 303.  
*Aikenside* IV. 342.  
*Aimé* I. 267.  
*Albert* III. 183.  
*Albin B. S.* I. 4. 126. 164. 199. 317. II. 36.  
*Alexander* III. 280. 6)  
*Alpin P. I.* 306. IV. 269. 8)  
*Amman* II. 300. 23)  
*Andernac* II. 48.  
*Anderfch* I. 113. 264. III. 2.  
*Anderson* II. 11.  
*Andouillé* IV. 327.  
*Andrée* IV. 339.  
*Andry* IV. 340.  
*Aretaeus* I. 136.  
*Aristoteles* II. 1.  
*Artemann* I. 18. IV. 79. 5) 81.  
*Arnisaëus* I. 116.  
*Afch* I. 65. 295. 310. II. 6. 8) 23. 3)  
*Avicenna* I. 312. IV. 31. 3)  
*Aurivillius* II. 320. 6)  
*Auranti* I. 94.

## B.

*Baader* II. 11.  
*Bacchettoni* I. 158. II. 22. 27.  
*Bagieu* IV. 261. 13)  
*Bagliv* III. 289.  
*Baker* IV. 292. 4)  
*Baldinger* II. 301. 3) III. 247. 276. IV. 1. 97.  
*Ballonius* III. 298. 10) IV. 272. 278. 382.  
*Bang* I. 20. IV. 31. 38) 343.  
*Bara* II. 304. 15)  
*Barbeck* III. 334. 14)  
*Barthez* II. 12.  
*Bartholin* Th. (I. 118. 153.

*Bafius* IV. 151.  
*Battie* I. 126. III. 264.  
*Bauhin C.* I. 8. 32.  
*Bauzmann* IV. 321.  
*Becker* IV. 109. 343.  
*Behrends* III. 1.  
*Beireis* IV. 390.  
*Bellini* IV. 163.  
*Benedictus* I. 46. 148.  
*Benefeld* III. 198.  
*Beniueni* III. 207. IV. 329.  
*Berengarius* I. 313.  
*a Bergen* I. 9. 49. 104.  
*Berger* IV. 211.  
*Bergius* IV. 286.  
*Berner* IV. 312.  
*Bernoulli* II. 68.  
*Bernstein* IV. 81. 31)  
*Berrettini* I. 154.  
*Berthonie* IV. 326.  
*Bertin* IV. 257.  
*Besse* II. 62.  
*Beutler* III. 323. 4).  
*Beykert* II. 1.  
*Bianchi* IV. 65. 5) 270.  
*Bidloo* I. 15. 118.  
*Bierling* IV. 368.  
*Bilfinger* II. 314.  
*Binninger* III. 297. IV. 375.  
*Biffet* IV. 279. 11) 294. 12)  
*Bivald* III. 236. 2)  
*Blancard* II. 223.  
*Blankart* IV. 206.  
*Blasius* I. 4. 118. 134.  
*Blegny* III. 303. 8)  
*Blumenbach* II. 15. IV. 81.  
*Bockel* I. 115.  
*Bochmer* I. 12. 279. II. 103.  
*Boerhaave* I. 128. II. 11. 298.  
*Boerner* IV. 97.  
*Bohadsch* III. 238. 1)

Bohn

Bohn I. 6. 147. IV. 147.  
 Bonegarde II. 3.  
*Bonhomme* I. 287.  
 Bonn II. 13. 72.  
 Bannet Th. I. 280. III. 277. 297.  
 Bôot III. 302. 4)  
 Bordenave IV. 257.  
 Bording I. 115. 8)  
 Borelli II. 282. IV. 270.  
 van den Bosch I. 271. IV. 269.  
*Bose* II. 241.  
 Bosquillon II. 299.  
 Boucher IV. 336.  
 Boudon I. 157. 321.  
 Boudou IV. 327.  
 Bourdon I. 119. 321.  
 Brendel II. 303. 305. 307. 2) 321. 15) 18).  
 III. 75.  
 Briggs I. 9. III. 178.  
 Brogiani II. 306.  
 Broklesby IV. 302. 23)  
*Brown* Io. IV. 5. 19)  
*Bruckmann* II. 310. 5)  
*a Brunn* I. 118. II. 271. 276.  
 Brunner I. 34. 15.  
 Bucretius I. 315.  
 Buffon II. 18. 12)  
 Buichner II. 300 20) III. 322. 1)  
 Burferius IV. 71. 8)

## C.

Caesalpin I. 130.  
*Caldani* I. 100. II. 36.  
 Caldani F. IV. 408.  
 Camerarius IV. 338.  
*Camper* I. 134. 292. 306. II. 13. 291. III.  
 132. 323. 5)  
 Cant I. 325.  
 Cappel II. 290. \*)  
 Carcan I. 130.  
 Carellon II. 307. 4)  
 Carl IV. 287. 9)  
 Carpi I. 280. III. 64.  
*Carr* II. 60. 12)  
 Cartesius I. B. II. 21. 9)  
 Cartheuser III. 282. 5)  
 Cassebohm I. 12. 120.  
 Casserius I. 114.  
 Cassius I. 130.  
*Castell* IV. 133.  
*le Cat* I. 8. 272. IV. 81. 30)

Celsus II. 300. 17)  
 Chambon II. 14.  
 Charleton II. 275.  
 de la Charriere I. 156. 319.  
 le Chat de la Sourdiere IV. 186.  
 Chefelden I. 120.  
 Chevalier IV. 337.  
 Cheyne II. 294. 12) IV. 302.  
 Chirac II. 86. 4)  
 de Cilano IV. 289.  
 Clair IV. 286.  
 Cleghorn IV. 290. 23.  
 Clephane IV. 320. 66)  
 le Clerc I. 319.  
 Coiter I. 4. 317.  
 Cole IV. 206.  
 Collin IV. 306.  
 Collins I. 319.  
 Columbus II. 1.  
 Consolin IV. 338.  
*Coopmans* I. 265. II. 10.  
 Cophon I. 312.  
 Corfini II. 322.  
 Cornac III. 10.  
 Corradori IV. 409.  
 Coschwitz II. 312. 1)  
*Cotunni* II. 85. IV. 100.  
 Coulanuann IV. 338.  
*Cowper* I. 119.  
 Craanen IV. 206.  
 Craffus I. 110.  
*a Crell* IV. 407. 3)  
 Creve IV. 409.  
*Crusen* IV. 189.  
 Cullen II. 320. \*)  
 Cummius IV. 337.  
 Curtius III. 64. 8)

## D.

Dagoty II. 23. 31)  
 Daniel II. 292.  
 Darluc IV. 336.  
 Daubenton II. 22.  
 Deleurye IV. 393.  
 Delius II. 322. 10) III. 183. IV. 70. 1) 307.  
 Demiani II. 301. 3)  
 Diemberbroek I. 284. II. 62.  
 Dion I. 119. 319.  
 Dodonaeus IV. 339.  
 Doerfler I. 15.  
 van Doeveren IV. 296. 11)



Donati M. III. 301. 5)  
 Drake I. 120. 128. IV. 27. 25)  
 Drouin I. 119. 4) II. 226. 1)  
 Dryander II. 21 2)  
 Duverney I. 118. II. 1.

## E.

Ebell II. 15. III. 148.  
 Eggerdes IV. 304.  
 Eller IV. 293. 10) 322.  
 Engstroem II. 320. 6)  
 Entius II. 289. IV. 206.  
 Ephesius R. II. 35.  
 Eustachi I. 19. 44. II. 94.

## F.

Faber II. 308. 5)  
 Fabre IV. 282.  
 Fabri I. 100.  
 Fabricius II. 320. 3) IV. 322.  
 Fallopi I. 4. 246.  
 Fanoisi II. 17.  
 Fantoni III. 3. IV. 264.  
 Fauchard III. 193.  
 Fein IV. 325.  
 Fellinger IV. 301.  
 Fernel I. 10. 280.  
 Fischer I. L. IV. 100.  
 Floyer II. 312. III. 263.  
 Fludd I. 116.  
 Foefius IV. 150.  
 Fontana I. 18. II. 16.  
 Foresti I. 303. IV. 271.  
 Fourcroy IV. 100.  
 Fournier IV. 281.  
 Fracassati I. 117. 301.  
 Freind IV. 315.  
 Frotfcher IV. 70.  
 Fuchs I. 113.  
 Fürsten IV. 157.

## G.

Gahrlied IV. 272.  
 Galen I. 4. 314. III. 291.  
 Galvani III. 21.  
 Gardiner II. 15.  
 Garengot I. 69.  
 Gasnier IV. 211.  
 Gaubius II. 293. IV. 71. 250.  
 Gautier II. 18. 11) II. 124.  
 Geisweit IV. 211.  
 Gelée I. 315.  
 Ludwig script. neur. min. T. IV.

Gennari I. 15. II. 27.  
 Georgi IV. 211.  
 Gesner II. 306. 10) III. 301. 17)  
 Girardi I. 8. III. 78.  
 Girtanner IV. 1. 1)  
 Giulio IV. 4. 21)  
 Glandorp I. 130.  
 Glasfer I. 118.  
 Glafs IV. 335.  
 Glisson II. 275. IV. 206.  
 Gmelin IV. 392.  
 Godart IV. 283.  
 Goelicke IV. 147.  
 Goochi II. 11. IV. 264.  
 Goldhagen II. 299. 10) IV. 402.  
 Gorter I. 14. 70. II. 1. 302. IV. 303.  
 Gottsched IV. 152.  
 de Graaf III. 334. 6)  
 de Gradibus I. 111.  
 Grainger IV. 271. 302.  
 Grant II. 320. 24)  
 Graffek I. 116.  
 Grassius IV. 305.  
 Greatkrakes IV. 360.  
 Greding II. 37.  
 Gregory, T. II. 278. \*)  
 Greulich. IV. 299.  
 Grubel IV. 272.  
 Gruner IV. 71. 97. 293. 385.  
 Guericke I. 230.  
 Günther II. 36.  
 Günz III. 111.  
 Gundramm II. 322. 10)

## H.

Haagren III. 21.  
 van der Haar IV. 204.  
 Haase I. 20. 61. II. 39. 321. III. 49. 112.  
 IV. 11.  
 Hagedorn IV. 303. 331.  
 de Haen I. 100.  
 Haller I. 2. 5. 90. 125. 128. II. 2. III. 11.  
 IV. 269.  
 Hannes IV. 332.  
 Harder IV. 338.  
 Harris IV. 334.  
 Hartmann IV. 326.  
 Harvey III. 10.  
 Hebenstreit I. E. I. 74. II. 82.  
 Hebenstreit E. B. G. IV. 1.  
 ab Heers IV. 403.

Gg g

Heine-

*Heineken* II. 291.  
*Heister* I. 102. IV. 268. 4)  
*Helwich* IV. 282.  
*Henkel* II. 63. 1)  
*Herbert* III. 237.  
*Herzog* II. 299. 10)  
*Heucher* III. 201.  
*Heuermann* I. 303. III. 191. IV. 305.  
*de Heyde* IV. 128.  
*Higlmor* II. 17.  
*Hildanus* I. 102. 261. 275.  
*Hildebrandt* III. 3.  
*Hillary* II. 314. 262. 7) IV. 276.  
*Hippocrates* I. 7. II. 296. III. 306. 4)  
*Hirsch* I. 47. 244.  
*Hirschel* II. 321. 1) IV. 282.  
*Hirzel* IV. 340.  
*Hoechstetter* IV. 318.  
*Hoffberg* IV. 341. 90)  
*Hoffmann, F.* II. 301. 311. IV. 161.  
*Hoffmann, M.* I. 118.  
*Hoffmann, I. M.* I. 307.  
*Hoffmann, C. L.* III. 7.  
*Hollerius* III. 301. 18)  
*Hook* II. 26. 1.  
*van Horne* I. 118. II. 49.  
*Horst* IV. 356.  
*Hoyer* IV. 302.  
*Huber* I. 4. 99. 217. 332.  
*Huckel* IV. 340.  
*Hundt* II. 21. 1)  
*Hunter* II. 61.  
*Huxham* II. 304.

## I.

*Ianckius* I. 65.  
*Iansen* III. 16. 2) \*)  
*Iessl. a Iessen* I. 313.  
*Ingraffias* I. 312. IV. 84.  
*Ioel* IV. 163.  
*Ioerdens* IV. 287. 10)  
*Johnstone* I. 21.  
*Jenflamm* I. 15. II. 4. 65. III. 162.  
*Junker* III. 174.  
*Iwanoff* III. 61. 89.

## K.

*Kaempf* II. 308. 5)  
*de Kanilfeld* II. 36.  
*Kannengieser* IV. 379.

*Kaww* IV. 115.  
*Kemper* IV. 356.  
*Kerkringius* III. 325.  
*Ketham* II. 47.  
*Kirkland* I. 18.  
*Kisner* IV. 147.  
*Klein* II. 305.  
*Klinkofsch* II. 23.  
*Klint* III. 122. IV. 90. 32)  
*Koch* II. 308. 5)  
*Koenig* II. 86.  
*Kortum* IV. 379.  
*Kramp* III. 15.  
*Krause* III. 156. 185.  
*Krebs* IV. 393.  
*Krüger* I. 65.  
*Kulmus* IV. 150.  
*Kwiatkowski* I. 129. 15).

## L.

*Laghi* I. 272.  
*Lancisi* I. 323. II. 11.  
*Lange* I. 120.  
*Langguth* III. 322. 1)  
*Langhans* III. 187. IV. 268. 8) 388.  
*Lanzoni* I. 234.  
*Lavirotte* II. 306. 3)  
*Lauremberg* IV. 146.  
*Laurenti* I. 115.  
*Lazermé* IV. 321. 67)  
*Leber* II. 80.  
*Ledel* IV. 312.  
*Ledermüller* III. 169.  
*Lentilius* III. 307. 3)  
*Lentin* II. 306. III. 319.  
*Levret* IV. 393.  
*Leuwenhoek* I. 15.  
*Lieutaud* I. 91.  
*Limburg* II. 11.  
*van der Linden* I. 283. 315.  
*Littre* II. 38.  
*Lobstein* I. 2. 13. 51. 89. II. 219.  
*Loder* II. 4.  
*Loefeske* I. 103.  
*Lommus* I. 85. II. 294. III. 283. 3)  
*Lorry* I. 130. II. 304. IV. 368.  
*Lower* II. 38.  
*Luchtmanns* I. 301.  
*Ludwig, C. F.* II. 24. \*\*) 27.

Ludwig

\*) Cuius liber ibi commemoratus multis observationibus auctoris auctus vernacula lingua prodit  
 Düsseldorf 1792.



- Ludwig, C. G.* I. 63. III. 112. 169. 105. 191. IV. 16 2) 55 8) 262.  
*Lupin* IV. 314.  
*Lusitani* III. 300. 2) I. 303. IV. 273.  
M.  
*Maculay* IV. 307.  
*Maier I. C.* III. 225.  
*Malacarne* I. 18. II. 36. III. 325. 7) IV. 12. 3)  
*Malhos* IV. 340.  
*Malouin* IV. 326.  
*Malpighi* I. 227. IV. 370.  
*Manget* I. 7. 120.  
*Mangold* II. 319.  
*Manningham* II. 307.  
*Marcard* IV. 313.  
*de Marchettis* I. 126.  
*Marcus* I. 111.  
*Marcus* IV. 338. 344.  
*de Marées* IV. 402.  
*Marherr* I. 133. IV. 208.  
*Marteau* IV. 315.  
*Martianus* I. 130.  
*Martin* I. 54. 160. 288. III. 130. IV. 280.  
*Mascagni* II. 29.  
*Maffa* I. 32. 246. 314.  
*Maffini* I. 18. II. 5.  
*Mayer* I. 163.  
*Mazino* IV. 109.  
*Mead* IV. 358.  
*Meckel* I. 10. 14. 145. II. 2. 204. III. 37. IV. 7. 9.  
*Meckel fil.* II. 100.  
*Medicus* II. 320. 21) 309 7) IV. 274.  
*Meier* II. 312.  
*Meiners* III. 151.  
*Mercurialis* II. 37.  
*Mermann* IV. 327.  
*Mery* I. 9. II. 50.  
*Metzger* I. 7. 108. 129. II. 10. 29. IV. 384.  
*Michaelis* I. 18.  
*Michaelis, Ph.* II. 66.  
*Michel* IV. 319.  
*Michelitz* III. 209.  
*Millar* II. 312. 10)  
*Mistichelli* I. 57.  
*Moebius* III. 193.  
*Mohrenheim* IV. 385.  
*Molinelli* I. 129. 11. 281.  
*Molinet* I. 320.  
*Moller* IV. 329. 303.  
*Monro, A.* I. 7. 18. 120. 134. II. 3. 5. 12. III. 148. 3)  
*Monro fil.* II. 281. \*)  
*Morgagni* I. 10. 19. II. 61.  
*Morton* IV. 274. 14)  
*Moscato* I. 18.  
*la Motte* IV. 162.  
*Müller* IV. 117.  
*Mundini* I. 111. III. 63.  
*Munck* I. 118.  
*Muralti* I. 315. 118. II. 224. 4)  
*Murray* I. 163. 242. II. 34. III. 125. IV. 87. 29) 252.  
*Musgrave* II. 293.  
*Muys* III. 10.  
*Muzel* II. 316. IV. 263. 332.  
N.  
*Nenter* I. 229.  
*Nesbit* I. 90.  
*Neubauer* I. 20. III. 9. 2.  
*Newton* I. 133.  
*Nicolai* I. 91. IV. 317.  
*Nicoli* I. 280.  
*Noethig* II. 12.  
*Nuck* II. 72. III. 322. 1)  
O.  
*Oribasius* II. 35.  
*Ortlob* I. 301. 319. 321.  
*Osiander* III. 305. 3)  
*Ott* I. 165.  
P.  
*Pacchioni* I. 94.  
*Palfin* I. 7. 321. IV. 259. 11)  
*Palletta* II. 9. 55. III. 63.  
*Pamard* IV. 284.  
*Panarol* III. 184.  
*Paraeus* IV. 23 6)  
*Parissini* IV. 113.  
*Paw* III. 297. 4)  
*Peagetus* IV. 55. 6)  
*Peffault* IV. 319.  
*Peipers* IV. 18.  
*Perrault* IV. 109. 115.  
G g 2  
Perci-

Percival II. 321. 11)  
*Petit* I. 14. 251. IV. 116.  
*Petroli* I. 154.  
 la Peyronie II. 11. IV. 114.  
*Pezold* III. 283.  
*Pfeffinger* I. 1. 31. 245.  
 van Phelfum IV. 273.  
*Piccolhomini* I. 113.  
*Pigrai* I. 130.  
*Piquer* IV. 403.  
*Piso* III. 177.  
*Plater* I. 306. III. 302. 1)  
*Platner, E.* II. 7. 266. 276. 296. IV.  
 4. 4)  
*Platner, I. Z.* IV. 149.  
*Ploucquet* III. 294.  
*Pohl* II. 371.  
*Portal* I. 132.  
*Poupart* III. 312. 1)  
*Pre* II. 322. 10)  
*Prev* III. 187. 2)  
*Pringle* III. 175. IV. 323.  
*Prochaska* II. 8. 11. III. 1.  
*Protopatharius* I. 110.  
*Pruggmayer* IV. 322.

## Q.

*Quarin* III. 287.

## R.

*Radnizky* IV. 169.  
*Rahn* I. 306. IV. 266.  
*Rau* II. 7. IV. 296. 2)  
*Ravery* III. 276.  
*Rayger* IV. 374.  
*Remi* IV. 157.  
*Remmet* IV. 405. 10)  
 van Revenhorst I. 301.  
*Revillon* II. 308. 16)  
*Reusner* IV. 302.  
*Ribe* IV. 282.  
*Richter* I. 129. II. 11. III. 162. 283. 5)  
 IV. 386. 157.  
*Ridley* I. 119. 292. II. 1.  
*Riedlin* III. 184.  
*Riolan Pat.* I. 114.  
*Riolan fil.* I. 4.  
*Rissler* III. 1.  
*Riverius* IV. 271.

*Robinson* III. 263. IV. 363.  
*Roederer* III. 280. 7)  
*Rolfink* I. 102. 118.  
*Rondelet* IV. 282.  
*Rosen* IV. 290. 31)  
*Rosenstein* II. 310. 2)  
*Rouchaut* IV. 130.  
*Rougemont* II. 27.  
*Rouppen* III. 192.  
*Rouffel* III. 273. 6.  
*Rozier* IV. 308.  
*Rucker* IV. 338.  
*Ruyfch* I. 7. IV. 12. 7)  
*Ryamps* IV. 338.

## S.

*Sabatier* I. 95.  
*Sagar* III. 296. 3) IV. 399.  
*Salmuth* IV. 375.  
*Salzmann* II. 45. III. 301. 6) IV. 97.  
*Sambuco* IV. 206.  
*Sandifort* J. 108. II. 5. III. 1.  
*Santorini* I. 5. 11.  
*Sarcone* II. 304.  
*Savanarola* I. 111.  
*Savoye* IV. 393.  
 de Sauvages II. 307. 2)  
*Scarpa* I. 9. 22. 108. II. 61. 95. 97. III.  
 27.  
*Schaefer* IV. I. 9.  
*Schenk* I. 315. II. 306.  
*Schaarschmidt* I. 247. III. 200.  
*Schlichting* IV. 149.  
*Schmalz* III. 304. 1)  
*Schmidt, I. A.* IV. 100.  
*Schmiedel* I. 67. II. 298.  
*Schmuk* III. 157.  
*Schneider* J. 7. III. 152. 204.  
*Schobinger* I. 98.  
*Schomburg* IV. 407. 2)  
*Schrader* II. 13. III. 322. 2)  
*Schreger* II. 293.  
*Schreiter* IV. 394.  
*Schroeder* II. 304. 320. 27) IV. 301.  
*Schulze* II. 3. III. 162.  
*Scwencke* II. 11. IV. 404.  
*Schwerdtner* IV. 300.  
*Sebitz* IV. 147.  
*Seelmatter* IV. 383.  
*Segner* IV. 157.



Selle II. 292.  
 Senac III. 2. 248.  
 Sennert I. 303. III. 313. 1) IV. 283.  
 Severinus II. 6. 49.  
 Sharp IV. 118.  
 Sidobre I. 271.  
 Siebold IV. 5. 18.  
 Siegwart II. 307.  
 Simson II. 5.  
 Slevogt III. 49.  
 Sloane IV. 314.  
 Smetius I. 130.  
 Soemmerring I. 8. 127. 133. II. 1. 13. \*)  
 III. 322. 327. 2)  
 Sommer IV. 334.  
 Spangenberg II. 310. 5)  
 Spigel I. 32. 114. 283.  
 Spindler IV. 370.  
 Stabel III. 313. 1)  
 Stahl IV. 163.  
 Stalpart II. 306. 3)  
 Steinbergen III. 322. 1)  
 Steno II. 6. IV. 125.  
 Stephan I. 7. 281.  
 Stoeller II. 316.  
 Stoerck IV. 383.  
 Stoll II. 304.  
 Strack IV. 279.  
 Struve II. 297.  
 Styx IV. 95.  
 Sylvius I. 313. III. 208.  
 Swammerdam II. 72.  
 van Swieten I. 306.

## T.

Tabarrani I. 11.  
 Taliacotius I. 115.  
 Tarci I. 45.  
 Targier III. 322. 1)  
 Tarin II. 176.  
 Taube II. 311. III. 216.  
 Tauvry I. 118.  
 Teichmeyer II. 38.  
 Thaer II. 291. III. 240.  
 Theden II. 315.  
 Themel IV. 304.  
 Theophrastus III. 183.  
 Tiling III. 322. 1)  
 Tiffot II. 295. IV. 87. 71) 275. 292. 5)  
 309.

de la Torre I. 18. III. 222.  
 Torti IV. 274. 13)  
 Tofetti I. 100.  
 de la Touche II. 12.  
 Tralles III. 234. IV. 278.  
 Trallioni, Al. IV. 303.  
 Treutler III. 340.  
 Trew IV. 283.  
 Tribolet II. 306. 3)  
 Trincavelli III. 301. 15)  
 Trnka II. 314. III. 238.  
 Troia IV. 258.  
 Tzschepp II. 278. \*)  
 Tual IV. 296.  
 Tulpius II. 11. IV. 312.  
 Tyfon II. 22.

## U.

Unzer III. 233.  
 Uteri III. 2.

## V.

Vacher IV. 306.  
 Valcarengi IV. 309.  
 Valeriola IV. 342.  
 Valli IV. 408.  
 Valfalva I. 9. 100.  
 Valverda I. 113. 315.  
 Vandermonde IV. 282.  
 Varol I. 7. II. 21.  
 Vassaeus I. 115.  
 Vater I. 133.  
 Verdier I. 103.  
 Verheyen I. 120. II. 225. 3)  
 Verschuir II. 293. III. 15.  
 Vesal I. 31. III. 46. IV. 24. 17)  
 Verling I. 15.  
 Vetter III. 334. 10)  
 Vicq d'Azyr II. 10.  
 Vidius I. 46.  
 Vieussens I. 2. 91.  
 Vogel II. 307. 3) IV. 97.  
 Vos IV. 202.  
 Vuillich I. 114.

## W.

Waenneberg IV. 341. 90)  
 Walter, I. G. I. 76. II. 14. 85) II. 102.  
 Gg g 3 Walter,

- Walter, A. F. I. 286.  
 Watfon IV. 337.  
 Weber IV. 1. 7)  
 Wedekind III. 7. 15.  
 Wedel II. 320. 6)  
 Weiße II. 293. III. 200.  
 Weitbrecht II. 29. 50. III. 139.  
 Welsch IV. 309.  
 Welti IV. 403. 23)  
 Wendt IV. 296. 61) 325.  
 Wepfer II. 4. III. 334. 8)  
 Werlhof II. 305.  
 de Weyenberg I. 261.  
 Whytt I. 84. 85. II. 279. 291. IV. 218.  
 Wiedenfeld IV. 296. 10)  
 van der Wiel III. 334. 6) IV. 285.  
 Willis I. 67. 76. 85. 119. 246. III. 42.  
 303. 5)  
 Wilfon III. 14.  
 Winslow I. 12. III. I.  
 Winter IV. 152.  
 Winterl I. 21.  
 Wirtensohn III. 13.  
 Witters IV. 383.  
 Wolf III. 9. 12) 325. 7)  
 Woodward IV. 363.  
 Wrisberg I. 2. 10. 47. 263. II. 83. 298.  
 III. 24. 48. 112. 280. 7) IV. 14. 13)  
 16. 50.  
  
 Y.  
 Ypey IV. 1. 5)  
  
 Z.  
 a Zeidlern I. 315.  
 de Zerbis I. 313.  
 Zerener IV. 1.  
 de Ziegler IV. 298.  
 Zimmermann II. 314. 320. 3) III. 197.  
 IV. 148.  
 Zinn I. 38. II. 6. IV. 106.  
 Zwinger I. 94.



## INDEX TERTIVS

RERVVM HIS IN OPERIBVS NEVROLOGICIS MINORI-  
BVS CONTENTARVM.

## A.

**A**bdomen, mater multorum morborum nervuorum II. 296. eius viscera irritata sternutationes efficiunt IV. 286. eius nervi stimulo affecti palpebrales et bulbi oculi musculos saepe afficiunt IV. 284.

*Abducens nervus* II. 9. eius synonyma II. 86. enascitur ex corporibus pyramidalibus ib. 86. 87. portione altera minore ex ponte provenit II. 88. varietas huius decursus ib.

*Abortus* ab ira IV. 377.

*Abcessus* in cerebro, delirio affecto III. 178.

*Acanthia*, in qua decussatio nervuorum opticorum observata est I. 133.

*Accessorium par* s. *accessorius nervus* II.

9. s. *accessorius nervus* ad par vagum IV. 101. WILLISIO tribuunt huius nervi inuentionis gloriam II. 222. quid scriptores de eo commemorant v. c. GALEN. II. 219. AVICENNA, AL. BENEDICTUS ib. A. VESALIUS ib. R. COLUMBUS II. 220. EUSTACHIUS ib. 221. VID. VIDIVS ib. V. COITER II. 222. RIOLANUS; WILLIS ib. BLASIUS 224. MURALTII ib. VIEUSSENS II. 224. BOURDON 225. RUYSCH 226. RIDLEY, COWPER ib. SANTORINI 227. VALSALVA ib. MORGAGNI 228. MANGET ib. WINSLOW 229. HUBER 229 I). 231. LIEUTAUD, BONHOMME 230. LE CAT 231. HALLER ib. ASCH 231. de secandi methodo ad eum demonstrandum II. 232. eius origo II. 233. variat in progressu II. 233\*). ut et numero radicularum II. 234. eius truncus tenuissimis fibris constat et ad sympathicos refertur a PALETTA III. 72. transitus eius per duram matrem II. 104. eius decursus III. 59. se afficiat pari vago III. 234. unam vaginam cum eo habet II. 234\*). eius portio in ceruice

conspicienda IV. 45. quid agendum ad eius decursum ulterius inquirendum II. 236. historia huius nervi a substantia demandata II. 219. 220. 221. eius usus II. 237. eius rotunda circumferentia II. 15. eius ganglion III. 60. causa multorum phaenomenorum III. 60. *Accessorius MALACARNEI* ad oculomotorium II. 75. III. 65 12).

*Aceruulus* a Cl. SÖMMERRING dictus illa lapillorum collectio in glandula pineali III. 323. eius situs et figura III. 326. lapilli eius propria natura videntur esse ib. 327. num in omnibus hominibus adsit ib. 333. observationes de eo in homine factae III. 327 sqq. qui conarium commemorant auctores III. 331. Cl. MECKEL Pat. figuram aceruuli dedit primam ib. GREDINGII observationes de eo III. 332. si non adfuerunt conarii lapilli, incuria anatomici aut ob substantiam cerebri flaccidiorem non inuenti sunt III. 335. in plus quam ducentis cadaueribus illum inuenit Cl. SÖMMERRING III. 336. in plexu choroideo saepe lapillos inuenit ib. lapilli isti differunt aetate III. 363. analysis eorum chemica a Cl. MOLITOR instituta ib. 336. terra iis inesse videtur calcarea III. 337. acido saccharino et phlogistico componi docuit Cl. MÜNCH III. 337.

*Achorosa Cephalalgiae species* III. 313.

*Acidum*, primarum viarum causa convulsio- num in infantibus II. 294. amaurosin procreare potest II. 321. in ventriculo frigoris sensum excitat II. 300. sitim consensualem gignit IV. 305.

*Acusticus nervus*, v. *auditivum nervum*.

*Adnata tunica oculi* sensitiissima redditur nervis e glandula lacrymali I. 233.

*Aer*, eius in systema nervosum influxus III. 270. eius accumulatio causa mul-  
torum

- torum morborum II. 303. intra meninges causa apoplexiae IV. 394.
- Aëstus febrilis III. 277. 279. in decursu regrediens quid indicat III. 281. non negligendus in febribus acutis III. 282.
- Aethiopes maiora organa sensuum minorem vero copiam cerebri nacti sunt III. 151.
- Affectus animi s. pathemata externis se produnt signis III. 252. frequentes februm causae occasionales III. 265. soporosi consensuales IV. 314. calculis felleis ansam praebent IV. 318. narium sympatheticus, v. narium affect. sympath. — quidam in solum nervosum systema agunt IV. 402. quadruplici ratione apoplexiam inferre videntur IV. 403. quomodo ex ipsa hominis natura fluant et in quem usum IV. 354. summa inter eos cognatio IV. 355.
- Agrypnia consensualis a colluvie primarum viarum IV. 309. a vermibus ib. varia huius morbi exempla commemorantur IV. 310.
- Agrypnica, species neuriticae cephalalgiae III. 310. 315.
- Alae sphenoidales nervulos a subtilissimis temporum ramis accipere videntur IV. 256.
- Albae glandulae WILLISII II. 33.
- Alveolaris nervus maxillae superioris III. 33. maxillae inferioris III. 36. eius relatio ad vasa in vitulo et in corpore humano ib.
- Alvus eius obstructio a tensione et inflammatione gingivarum IV. 298.
- Amaurosis, eius causae II. 321. a laesione supraorbitalis nervi II. 299. num unquam ex sola nervi frontalis laesione deriuari possit III. 28. a vermibus IV. 281.
- Amblyopia a vermibus IV. 281. a nimia irritabilitate ib. 282.
- Ambulatorius nervus VESLINGII i. q. par vagum.
- Amor, animi affectus, quibus se prodat signis IV. 362.
- Amphibia et pisces ratione cerebri conueniunt IV. 113.
- Analogia, quid probat in fluidi nervi theoria III. 221.
- Anas, cerebrum eius ratione magnitudinis aestimatur III. 160. eius intercostalis nervus cum ganglio III. 161.
- Anfractus cerebri II. 24. labyrinthaei cerebri ib.
- Anastomosis nervorum non constans est. I. 167. et ei nihiltribuendum III. 248. utilitas eius, scilicet ut nervi longius producerentur IV. 184. cur natura tot fecerit I. 233. 234.
- Anastomosis s. communicatio — nervi paris primi cum Nasopalatino SCARPAE III. 31. — pterygoidei rami cum ramo pharyngeo ex glossopharyngeo III. 31. — dentalis posterioris rami secundi Par. V. cum dentali anteriore I. 193. 195. — palpebralis exterioris cum communicantis nervi ramulo ascendente I. 198. — eiusdem cum octavo pari, quae rara est III. 38. — superficialis minoris rami Vidiani cum nervo duro I. 185. — ramorum secundi et tertii Quinti cum Communicante WRISBERGII I. 203\*) — ramulorum lacrymalis nervi in glandula lacrymali inter se I. 172. — eiusdem nervi cum ramulo ex secundi rami quinti Paris ramo subcutaneo malarum I. 171. — furculorum ex praecedente anastom. ortorum cum ramulo ex temporalis profundo ramo tert. ram. Par. Quint. I. 172. — ciliaris interioris ex nasal. ramo prim. ram. P. quinti cum ciliari interiori et superiori ex ganglio ophthalmico I. 175. — palpebralis interioris cum exteriori ramulo I. 198. — cum furculo alio ex ramo infratrochleari ib. — infratrochlearis nervi nasalis rami cum supratrochleari ramo frontalis I. 178. — furculi prioris nervi cum ramo ascendente P. septimi ib. — infratrochlearis cum ramulo ex frontal. ramo prim. rami P. quint. I. 169 178. — eiusdem cum infraorbitali I. 178. — nasalis nervuli ram. prim. P. quint. cum ramis prim. par. a WINSLOWIO nec unquam a MECKELIO obseruata I. 177. — nasalis superficialis inferioris cum ramulo super. Communicant. fac. I. 200. — labialis super. cum nasali superficiali inferiori I. 200. — labialis rami inferioris exterioris cum ramulo ex inferiore ramo nervi communicant. I. 211. — dentalium atque palatinorum quid exinde



de patet I. 198 \*). — temporalis profundus interioris cum nervo buccinatorio I. 205. — eiusdem cum furculo ex lacrymali et secundi paris ramulo coniuncto I. 205. — rami subcutanei cum nervo lacrymali primi Quinti I. 180. — alius rami cum ramo temporali profundo interno tertii Quinti I. 181. — eiusdem rami cum ramis nervi duri f. communicantis faciei ib. — furculorum huius rami cum ramulo adscendente P. septimi I. 181. — quorundam horum furculorum cum ramulo ex palpebrali inferiori exteriori nervi infraorbitalis I. 181. — chordae tympani cum linguali I. 212. et 212 8). — secundi rami ramorum labialium superiorum cum ramo superiori nervi communicantis I. 201. — quinque nervorum infraorbitalium descendentes rami inter se et pluribus anastomosis cum ramis communicantis faciei conueniunt ib. — ramulorum ex communicantis superiori ramo adscendente cum superficiali ramo nervi frontalis I. 170. — communicantis f. facialis cum ganglio molli temporali II. 173. — inferioris maioris buccinatorii nervi cum ramo communicantis faciei I. 207. — rami ex ganglio temporali orti cum glossopharyngei gracili ramo II. 174. — inferioris rami ganglii temporalis cum ramo arteriam labialem comitante II. 175. — rami temporalis superficialis cum temporali superficiali a tertio ramo P. quinti II. 176. — ramuli ex ganglio maxillari orti (qui quidem non semper adest I. 214. 216.) cum ramo ex nervo linguali noni paris I. 214. — ramulorum duorum vel trium nervi lingualis tertii rami quinti paris cum ramis nervi lingualis Par. noni adscendentibus I. 215. — rami communicantis primi glossopharyngei cum pharyngeo III. 53. — secundi cum eodem III. 54. eiusdem cum tonsillari. ib. — communicatorii rami cum vago II. 116. — lingualis cum gustatorio nervo II. 153. — ramulorum glossopharyngei in tonsilla inter se II. 119. — anastomotici cutanei mastoidei cum anastomotico cutaneo e cutaneo medio superficiali IV. 42. — duri nervi in ceruice cum variorum ra-

*Ludwig script. neur. min. T. IV.*

mis IV. 46. — ramorum maioris auricularis nervi posterioris ex temporali superficiali cum ramulis nervi occipitalis ex secundo ramo ceruicali I. 220. — auricularium ramorum ceruicalium trium cum accessorio Willisii IV. 38. — profundus colli subcutanei medii cum nervo cutaneo superficiali IV. 41. — nervi posterioris arteriae vertebralis cum trunculo nervi septimi ceruicalium II. 184. — pharyngei nervi cum ramo a portione parva Par. vagi II. 121. 236. IV. 103. — pharyngei secundi cum ramo e ganglio colli primo II. 127. — filorum accessorii nervi cum tertio pari ceruicalium II. 236. vagi cum cardiaco dextro II. 135. — nervi laryngei interni et recurrentis II. 129. 139. — tertii nervi colli cum ramulo ex ganglio primo colli II. 177. — recurrentis cum inferiori ramo superficialis colli II. 248. — accessorii cum tertio et quarto pare nervor. ceruicalium II. 233. 236. III. 56. — eiusdem cum nono pare bis tantum a LOEBSTEINIO observata II. 236. — rami Par. vagi cum ramis ganglii thyreoidei f. ceruicalis inferioris III. 220. — vagi et intercostalis III. 80. 220. — intercostalis cum quinto pari etc. IV. 268. — paris octavi cerebri cum primo pare ceruicalium IV. 268. — rami sternothyreoidei cum phrenico nervo I. 298. — ceruicalium nervorum quorum insignes inuenies anastomoses in BANGII tabula I. 344 2), 9), 13). d). I. 345. 21), 22), 25), 27), 28), 29), 33), 34). I. 346. 38), 42), 43), 45), 50). I. 347. 60), 61), 64), 66), 70), 73), 74), 75), 76), 78). I. 348. 81), 83), 84), 85), 88), 92). — phrenici nervi cum nono III. 114. — vagi cum communicante faciei, quae rara inuenitur III. 115. — rami subaxillaris nervi maxillaris inferioris II. 170. — rami tertii ceruicalis in scaleno cum ramis secundi ceruicalis IV. 34. — occipitalis anastomotici cum occipitali magno. — IV. 36. — filamentorum posticae radices primi paris medullae spinalis cum accessorio I. 330. — eiusdem posticae radices cum postica secundi paris I. 331. 332. — noni paris cum portione dura et cum glossopharyngeo in ipsa lingua, quam quidem anastomosis BOEHMERUS Hhh reiecit

- relicuit I. 285. — eiusdem in supremo collo cum Glossopharyngeo I. 289. — eiusdem cum cervicalibus I. 306. — eiusdem cum anteriori ramo cervicalis, nervi primi I. 295. 331. — rami huius cervicalis rami cum octavo capitis pare I. 332. — noni nervi cum trunculo nervo, ex variis furculis a ganglio cervical. superiori nervi intercostalis exortis, enato I. 295. 331. — rami superficialis aortici cum ramo superficiali interno cardiaco II. 191. — nervus cardiacos inter et recurrentes colli II. 194. — subcutanei externi ex radiali ramo nervi mediani cum ramis musculo-cutanei et inferioribus radialis ramis III. 134. — nervi cubitalis cum ramo ex radiali III. 137. — dorsalis ex cubitali cum superficiali ex radiali III. 138.
- Anastomoticus auricularis nervus*, ramus tert. *Cervicalis* IV. 37. — *colli descendens* IV. 42.
- Aneurisma*, quomodo a metu oriri possit IV. 370. quomodo se habeat terrore IV. 374.
- Angina paralytica*, et quae eius causa II. 237.
- vera, unde convulsiones in scapula, quae eam comitantur III. 61.
- Animi contentio* una cum vita sedentaria literatorum apoplexiam procreare potest IV. 404.
- Annulus arachnoideae tunicae tertium nervorum* par ambiens I. 43.
- Ansa nervorum* v. *laqueus*.
- Aorticus nervus superficialis* II. 191.
- Aper* unam tantum inter cerebri crura eminentiam candicantem habet II. 33.
- Aphoniae consensuales* IV. 303. earum origo IV. 304. species paralyseos unde oriatur IV. 167.
- Aponeuroses*, num sensu destitutae IV. 144.
- Apoplexia* eius descriptio et causae II. 319. IV. 382. quaedam circa eius definitionem IV. 379. num mortes subitaneae huc pertineant? IV. 380. definitio Cl. KORTUM ib. certus non datur character, quo a syncope dignosci possit IV. 381. apoplexiam dari, censet SEELMATTER, in qua nullae stagnationes IV. 383. variorumque sententia ib. theoria LE CATT et Cl. WEIKARDI scilicet eam nunquam ab humoribus in encephalum congestis vel effusis oriri IV. 383. divisio posterioris in debilem et fortem IV. 384. quatenam illi repugnent ib. absque ulla compressione cerebri oriri possescil. nervosam IV. 384. distinguendum est inter subitaneam et lentam encephali compressionem IV. 386. a suppuratione in sinu frontali ib. modica sufficit sanguinis effusi quantitas ad eam producendam IV. 388. spasmodica cuius fons in abdomine IV. 389. quid ex analogia apoplexiae cum paralytibus concludere liceat IV. 390. orta a variis causis in abdomine haerentibus IV. 316 sqq. metastatica IV. 392-10). epileptica IV. 392-16). traumatica IV. 393-24). haereditaria IV. 405. electrica ib. temulenta IV. 406. antiquiores sanguineam solam et serosam distinxerunt IV. 406. praecordialis IV. 394. in urribus maioribus praesertim habitat IV. 395. hysterica et hypochondriaca IV. 400. ex intenso gelu-ib. quae pertinet ad spasmodico-sanguineam IV. 401. pathematica IV. 401. in ipsius coitus libidine observata IV. 403. a corrosione encephali IV. 404. epilepticae aliorumque morborum convulsivorum comitans IV. 405. conspectus differentiarum apoplexiae a Cl. KORTUM constitutus IV. 391. in sanissimis frequentissimus affectus II. 292. num doctrinam de gangliis illustret I. 86. cessat in ea animalis actio, sensus et motus manente actione vitali I. 258. in qua functiones, in quibus cerebri nulla est potestas, adhuc peraguntur III. 12. historia cuiusdam hoc morbo affecti III. 180. quomodo in ea paralytis linguae declaratur III. 26 \*).
- Appendix ad cerebrum* v. *cerebellum*.
- Appetitus deperditus* transpiratione suppressa II. 300.
- Aqua intra meninges cerebri causa apoplexiae* IV. 394.
- Aquae ductus* BRUNNII v. *Infundibulum*.
- Arachnoidea*, eius descriptio I. 5. 327. annulum refert circa tertium nervorum par



- par I. 43. *medullae spinalis inuolucrum* IV. 75. et *cerebri* I. 6.
- Arcus* f. *ansa neruorum* I. 295. 296. 297.  
— *transuersalis lingualis nerui* III. 70.  
*colli longus* II. 161. vide etiam *laqueus neruorum*.
- Argentum, optimus conductor in experimentis Galvanianis IV. 172.
- Armillā MALACARNEI* III. 66.  
— *PALLETAE quinti paris* I. 161\*\*).  
v. in *tumescētia semilunaris*.
- Arteriae num facultate sentiendi praeditae III. 19. 186. earum vis ab irritabilitate proficiscitur III. 14. quae a neruis fovetur III. 16. gaudent fibris muscularibus III. 256. *Senaci* sententia III. 258.
- Arteria carotis cerebialis I. 96. cerebri in uniuersum II. 29. vertebralis sinistri lateris I. 290. profunda cerebelli I. 291. transuersalis faciei III. 39. auricularis posterior II. 173. ganglii temporalis II. 174. temporalis includitur neruis I. 219. maxillaris interna I. 98. maxillaris externa lateralis I. 97. coronaria sinistra III. 7.
- Articularis neruus* v. *axillaris neruus*.
- Arthritis IV. 320. ex morbis biliosis male curatis ib. eius symptoma frequens deiectio animi IV. 333.
- Arthritica species Cephalalgiae III. 312.
- Asphyxia, ex qua irretitis phrenicis neruis aeger resuscitari potest more Galvaniano III. 23.
- Asthēnica species neuriticae Cephalalgiae III. 316. consensualis IV. 310. a sola putrida primarum viarum colluie IV. 311.
- Asthma quomodo differt a catarrho suffocatio II. 312. quomodo se habeat ira IV. 376.
- Athymia a lumbricis IV. 329.
- Atrabilaria Cephalalgia III. 311.
- Atrabilarius humor versus encephalon raptus causa apoplexiae IV. 393.
- Atrophia in paralyti IV. 214. 221 6).
- Auditorius* f. *acusticus neruus* II. 90. IV. 10. eius origo I. 51. II. 95. IV. 10. a ventriculo quarto et nodo II. 96. eius sinuata circumferentia II. 15. num eius fibrae sese decussent in calamo scriptorio I. 52. ex protuberantiae substantia potius, quam ex ventriculo quarto originem suam trahere videtur I. 52.
- Auditus, eius vis in viscera motumque cordis I. 234.
- Aues corpore calloso destituti sunt IV. 113. nec diaphragma nec neruum phrenicum habent IV. 16. quae de earum neruis opticis cognita I. 134.
- Auricularis facialis neruus* f. *auriculae inferior* IV. 41. principalis I. 30. 345. ramus *temporalis superficialis* I. 220. posterior magnus IV. 32. superior ramus *cervicalis tertii* IV. 37.
- Aures, cur duabus unus sonus tantum percipiatur II. 96. earum affectus consensuales IV. 294.
- Aurum, conductor optimus in experimentis Cl. GALVANI IV. 172.
- Axillaris neruus* et eius synonyma III. 131. eius rami III. 132. et quidem primarius *radialis* est ib.

## B.

- Balbuties consensualis IV. 303. a vermicibus ib. 304. ab ulcerosa metastasi ad ventriculum ib.
- Balneare par* II. 83.
- Biliarii canales unde neruos petant? III. 26.
- Bilis, causa morborum neruorum II. 302. degenerando melancholiam etc. proferre potest II. 316.
- Boeoticum temperamentum quid? IV. 348.
- Bos, eius cerebrum ratione magnitudinis indicatur et ponderis III. 159. eius neruus intercostalis cum ganglio aestimatur III. 161. unam tantum inter crura habet eminentiam candicantem II. 33.
- Brachiales nerui*, eorum origo III. 122. et rami, v. g. *musculo-cutaneus* ib. *radialis* III. 123. *cubitalis* ib. ligati, qualia producant phaenomena II. 273. eorum chiasma III. 29.
- Brachialis medius* BERETTINI III. 126. plexus IV. 90.
- Buccales glandulae unde petant neruos I. 207.
- Buccinatorio-labialis* III. 73. variat ortu III. 74.
- H h h 2

Buc.

*Buccinatorius nervus ramus tertii rami Quinti Paris* I. 206. II. 71. eius rami 72.  
*Bulbus cinereus paris primi* II. 56. maximam cum gangliis similitudinem habet II. 57.  
*Bulbus oculi, eius muscoli afficiuntur, nervis abdominis irritatis* IV. 284.

## C.

*Cachectici, eius cerebrum semper peralbum* II. 14. ex suppressa perspiratione IV. 367. 368 33).  
*Cacoplastica cephalalgia* III. 297.  
*Caecitas a nimia sternutatione* I. 232. de qua observatio *MONROI* II. 5.  
*Calamus scriptorius* II. 43.  
*Calculus urinaris excitat vomitum* II. 300. — et felleus pathemata creant IV. 392 7). ab ira 376.  
*Calendula officinalis nullum edit signum irritabilitatis in experimentis* *CL. GALVANI* III. 21.  
*Calidum innatum* III. 247. in quo veteres omnem posuerunt vitam III. 280.  
*Callosus corpus non sedes animi est* IV. 113. 114. *LANCISII* sententia de eo IV. 109. cui varii acceperunt IV. 110. qui quidem refutantur IV. 111 sq. usus eius princeps scilicet communicationis motuum et sensuum inter utrumque hemisphaerium IV. 117. decussationem fibrarum in eo locum habere *MORGAGNI* putavit IV. 117. praeter homines et bestias quadrupedes omnia eo carent animalia IV. 113. laeso eo quale symptoma in cane apparuit IV. 106 et eiusmodi experimenta 107. potest discindi sensu motuque integerrimis IV. 108. 114. in hydrocephalis IV. 114. in cachecticis semper peralbum II. 14. a *CL. SÖMMERING* commissura maxima appellatur II. 27.  
*Canalis condyloideus anterior lamina ossea interdum bipartitum est* I. 294.  
*Cancellus eremita, in qua decussationem nervorum opticorum observavit* *SWAMMERDAM* I. 133.  
*Cancro iam extirpati ob stasim humorum recrudescentes* IV. 368.

*Canis, eius cerebrum ratione magnitudine et ponderis aestimatur* III. 159. intercostalis eius nervus et ganglion comparantur III. 161. mordacissimus fit laesione meticulosus IV. 172. duas habet, ut homo inter crura cerebri eminentias candicantes II. 34.

*Canities subita a metu* IV. 371 45).

*Caprea, cuius cerebrum magnitudine et pondere aestimatur* III. 159. et eius intercostalis cum ganglio comparatur III. 161. unam tantum inter cerebri crura habet eminentiam candicantem II. 33.

*Caput rosae, i. q. Infundibulum.*

*Carabus coriaceus obscure tantum ostendit, eum posse affici experimentis* *GALVANIANIS* IV. 174.

*Cardiaci nervi* II. 187. quadruplex eorum fons ib. superficiales II. 187. externus 188. eius progressus ad usque insertionem in primum ganglion thoracis II. 189. ne furculum quidem in cordis carnem deducit II. 190 \*) internus et eius rami II. 190. eius distributio in ramos II. 193. *communicatorius nervi cardiaci.* interni et *nervi recurrentis* II. 194. dexter II. 194. 195. alii rami eiusdem II. 196. 197. dextri truncus sinister II. 198. *cardiacus nervus magnus* III. 43. eius ortus III. 44. cardiaci vulgo dicti nervi nondum bene cogniti III. 2. irritati cordis motum non accelerant, destructi non tollunt III. 4. *HALLERUS* in isto phaenomeno declarando sibi repugnat ib. ne furculum quidem ad cordis carnem dispergunt III. 5. experimentis demonstratur III. 11. morborum quorundam ratio docet III. 12. analogia reiciuntur III. 8. artiarum tunicis immixti III. 9. reiciuntur etiam insensibili cordis natura III. 10. eorum usus III. 21. amplectuntur cordis vasa III. 42. distributio eorum in ramos III. 45.

*Cardialgia hysterica exinde convulsiones* III. 61.

*Carus, morbus soporofus* II. 318.

*Catalepsis, eius descriptio et causae* II. 321. in puella octo annorum observata II. 322. ex nimia nervorum debilitate IV. 367, a metu IV. 371.

Catar.



- Catarrhus suffocatiuus** II. 312. **catarrhi spurii** IV. 294.
- Cavitas conchularis** i. q. *Infundibulum*.
- Causa proxima** quid? III. 260. singulares et epidemicae III. 262.
- Cellulosa tela** num sensu careat III. 190. IV. 254. nervosarum, quae intrant, fibrarum natura II. 255. variant pro vario nervorum situ I. 3. quod in dubium vocatur ab aliis I. 4 14).
- Cephalaea** sub cephalalgia complect. II. 296. quomodo diuiditur a SAUVAGES. III. 321.
- Cephalalgia consensualis** ab obstructione alui IV. 269. a colluue primarum viarum vitiosa IV. 270. hinc in febribus, quarum causa in primis viis est IV. 271. a vita sedentaria liberatorum et animi contentione IV. 404. alia exempla commemorantur IV. 272. a vermibus intestinalibus IV. 273. a praeternaturali sensibilitate et irritabilitate ventriculi et intestinorum ib. 273. periodicae simili ratione ortae ib. 274. a plethora vasorum abdominalium ib. 275. ab obstructione hepatis atque lienis ib. 275. ab exulceratione viscerum sensibilibus ib. 276. in febribus phreniticis etc. ib. sympathica III. 316. diuiditur a Cl. PLOUQUET in gastricam ib. 317. splanchnicam 318. masticam 319. odonticam ib. nasalem ib. ophthalmicam 320. perialgicam ib. idiopathicae signa fallacia sunt IV. 277. haereditariae exemplum ib. 278. species idiopathicae cephalalgiae enumeratas inuenies III. 296 sqq. dimissio eius a SAUVAGESIO et SAGAR facta III. 320.
- Ceratoglossus nervus** II. 152.
- Cerebrum** quatuor partibus constans IV. 19. facilis id delineandi ratio II. 19. eius lobi anteriores II. 27. lobi posteriores II. 30. fundum camerae ALBINI II. 30. hiatus eius inter lobos posteriores maior anteriori II. 31. eius processus medullaris II. 31. medullae vasa I. 56. a tenui membrana colliguntur ib. exsulant rorem I. 56. conspicua ea reddidit VIEUSSENS I. 57. duplex eorum genus statui potest I. 56 57. utrum arteriosi solum sint, an simul etiam venosi generis I. 59. eius gyri a sulcis distinguit Cl. SOEEMMERRING II. 24. in sinistro omnes in dextro plerosque a vertice ad basin descendunt II. 25. eius globuli nantes in humore ex obseruatione DELLA TORRE, elastico nexu cohaerentes sententia PROCHASCAE II. 223. non moventur a cerebro per nervos totius corporis II. 222. eius appendix vid. *cerebellum*; eius operinentum GALENI I. 4. eius puppis et prora II. 23. eius eminentiae candicantes II. 53. utrum in viro an femina maius sit II. 6. eius color differt pro populorum diuersitate II. 13. summam esse nervorum extremitatem IV. 201. neque fibris neque vasis constare IV. 225. quae tamen ALBIN et RUYSCH repleverunt cera. ib. venae eius II. 29. eius vasa absorbentia II. 29. eo memorabiles secretiones locum habere ex ingenti sanguinis, quae encephalon petit, quantitate concluditur IV. 214. fiunt quidem plures secretiones IV. 225. *cerebra secundaria minora* I. 21. humanum maximum, graciles pro mole sua nervos emittere II. 14. quae Cl. SOEEMMERRINGII obseruatio ab aliis confirmatur II. 15. ut ex anatomia comparata e. g. Lemuris Mungoz ibid. num eius moles in iunioribus animalibus grandior sit quam in adultis IV. 211. humana quoad generaliorum gyrorum habitum semper fere inter se conueniunt II. 24. maximum homini esse III. 148. 149. ratione nervorum III. 150. quo ponderosior eius moles eo crassior dura meninx III. 149. \*) eius pondus in variis animalibus III. 150. sqq. eius et membranarum erosio vel exulceratio causae apoplexiae IV. 393. eius lapides causae apoplexiae IV. 394. fons praecipuus virinum IV. 310. eius mutationes in affectibus IV. 351. baseos tabulae auctorum chronologice enarrantur a Cl. SOEEMMERRING II. 21. duo lobi in basi adsunt II. 20. per totum corpus diffusum esse dici potest I. 64. quam sententiam et VAN DER HAAR defendit IV. 215. in quo ista nititur IV. 233. motus a respiratione pendens IV. 227. \*) sed ille motus non naturalis existit IV. 227. non apparet in experimentis 228. et ubi phaenomenon

- non istud apparuit, respiratio profundior et anxiosa magis fuit IV. 228. non ubique sensum edit IV. 230. vasa habet ib. quintuplo quidem plus sanguinis habet hepate II. 282. num quid in eo seceratur III. 217. num sit eius functio secerandi fluidum nervium III. 113. totum fluidum observatur in ovis incubatis quinque diebus elapsis IV. 235. eius firmitas num in animalibus minor II. 27. piscium cum eo auium similitudo IV. 113. in amphibiiis ib. pondus eius indicatur in foetu III. 159. et in variis animalibus III. 160. sq. eius alterum latus resoluitur laeso altero corporis II. 11.
- Cerebrum abdominale* i. q. ganglion f. plexus semilunaris IV. 69.
- Cerebrum oblongum* HIPPOCRATIS et GALENI IV. 80.
- Cerebrum paruum* i. q. cerebellum.
- Cerebellum* II. 41. eius substantia triplex II. 43. minoribus globulis constare videtur Cl. DE LA TORRE III. 222. optime delineatum a Cl. SOEMMERRING II. 110. plurimum confert ad medullam oblongatam efformandam II. 45. eius vulnera subito lethalia IV. 112. in cane stylo irritatum hinc opisthotono affectus IV. 120. in alio cane convulsiones horrendae apparuerunt IV. 121. hoc laeso in homine, qui sanatus est IV. 122. eius vermis II. 41. laminae II. 42. eius impressiones digitatae II. 42. eius substantia intermedia II. 43. eius processus II. 43. 44. eius pons VAROLII II. 44. eius protuberantia annularis WILLISII II. 44. eius nodus ib. eius corpora olivaria et pyramidalia II. 44. 45. eius substantia luteola vel fusca II. 44.
- Cervicalium nervorum* octo paria numerantur IV. 18. I. 343. quae communia habent inter se ib. et sq. par primum (cerebri decimum WILLISII) IV. 84. secundum IV. 85. tertium IV. 34. 86. origo et eius rami IV. 32. 33. 35. 87. quartum IV. 20. 87. quae GALENUS de iis habet IV. 21. quae AVICENNA ib. quae ANDR. VESALIUS IV. 22. auctores qui eum verbotenus repetierunt IV. 23. C. STEPHANI sententia IV. 24. VALVERDE DE HAMUSCO ibid. EUSTACHIUS IV. 24.
- TH. WILLISIUS IV. 25. RAYM. VIEUSSENS IV. 25. DRAKE septem paria cervicalium agnoscit IV. 27. WINSLOW IV. 27. quae LIEUTAUD habet IV. 29. et HALLER IV. 29. HUBER ibid. et recentiores IV. 30. 31. inprimis IAN. BANGIUS IV. 31. quintum par IV. 88. eius portio superior IV. 45. sextum et septimum IV. 89.
- Cervus, unam tantum habet inter cerebri crura eminentiam candicantem II. 33.
- Chameleon, in quo decussatio nervorum opticorum observatum I. 133.
- Cholericum temperamentum quid? IV. 348.
- Chorda tympani* I. 112. I. 155. 3) eius utilitas I. 232. appellatio huius nervi minime conveniens III. 35.
- Chorea St. Viti, eius causae in abdomine sitae II. 310. emeticis et catharticiis sanata IV. 338. anthelminthicis alio curata. ib.
- Choroidea tunica*, eius origo et structura I. 9. 10.
- Chronici morbi quid? II. 307. 318.
- Chylus quomodo praeparatur? IV. 203.
- Ciliares nervi* I. 174. in decem vel duodecim diuiduntur ramos I. 176. cum vasculis ad uenam repunt I. 176. variant loco et ordine I. 175. quarti eorum firma cum optico nervo cohaesio I. 175. 2) eorum utilitas I. 233.
- Cinerea substantia f. cinerities cerebri melior magisque pellucida est II. 26. in qua vasorum rubrorum ora conspici possunt II. 27. quomodo in cerebello oculis se praebeat II. 43.
- Circulus tonsillaris* II. 118. qui etiam plexus dicitur. ib. dexter 119.
- Circuli liuidi circa palpebras praecordiorum vitiosorum signum IV. 297.
- Circumflexi nervi* musculi stylopharyngei II. 117.
- Circumflexus nervus* v. *Axillaris*.
- Circumgyrationes cerebri* II. 24.
- Coarctatio pupillae in hemisrania II. 299.
- Colatoria pelvis i. q. Infundibulum.
- Colica spasmodica, eius symptomata IV. 302. pictonum III. 87. cur quidam in ea obmuerint I. 306.
- Collateralis nervus* v. *Splanchnicus*.
- Collisio quae sit eius natura. II. 260. negatur in nervis. II. 261. physiologica mome-



- momenta eam non confirmant II. 262.  
nec morbis comprobatur II. 263.
- Colluuias vitiosa primarum viarum, causa cephalalgiae IV. 270. causa inflammationis oculorum IV. 278.
- Colytica cephalalgia ad subdivisiones pertinet PLOUCQUETII III. 310.
- Coma, morbus soporofus II. 318. in erysipelate IV. 298.
- Combinatio tertia MOLINETI II. 73.
- Commercium inter caput et viscera v. *consensus*.
- Commiffura maxima SOEMMERINGII denominatio partis cerebri, alias corpus callosum dictae II. 27.
- Communicans faciei WRISBERGII I. 51. eius origo ib. a SOEMMERRINGIO facialis dictus. quem vid.
- Communicatio neruorum v. Anastomofin.
- Complexus BIDLOOI vid. *lingualem neruum*.
- Conarium v. glandulam pinealem.
- Concoctio in febribus III. 282. 283. 288. vid. et *febrem*.
- Coniugatio neruorum unde hoc nomen II. 8. tertiae linguae sensum gustus tribuit CURTIUS III. 64. GALENI I. 245. quinta STEPHANI v. *vagum par*.
- Coniugium neruorum II. 8. septimum CL. VAN HORN v. *vagum par*.
- Conoides glandula i. q. *pinealis glandula*.
- Consensus s. sympathia s. commercium neruorum quid? III. 250. II. 266. utrum in neruorum propaginibus an in cerebro eueniat II. 267. num animus plane a consensu remoueri possit II. 268. saepe a coniunctione idearum pendet II. 269. num omnes perturbationes neruorum, quae simul accidunt, sympathiae continuae sint attribuendae II. 270. naturales et praeternaturales III. 253. inter omnes corporis humani partes locum habet III. 248. inter caput et quaelibet viscera ini ventris IV. 267. eius causa scilicet nerui ib. diuersissimas subit modificationes III. 249. linguae et glandularum saluialium I. 230. narium et linguae I. 232. inter abdomen atque reliquas partes arctissimus II. 299. morbi exinde II. 301. ventriculi cum facie III. 39. quomodo declarandus III. 39. trunci corporis cum facie I. 221. 223. ab in-
- tercostali neruo proueniens III. 207. faciei in aliis commotionibus vix ab anastomosi duri et quinti nerui dependet IV. 353. scriptores de consensu IV. 410.
- Contagium non commutandum esse cum causis singularibus et epidemicis. III. 262.
- Contractio musculorum in experimentis GALVANI variat duratione etc. IV. 172. desinit tabula vitrea neruo subiecta IV. 173. spasmodica musculorum faciei in inflammatione diaphragmatis I. 226.
- Coutusio in arcu superciliari dextro III. 28.
- Conuulsiones, in quibus irritamentum totius generis neruosi I. 224. unde oriri possunt I. 225. II. 294. a metastasi materiae purulentae III. 178. a sordibus intestinorum IV. 336. musculorum faciei IV. 295. consensualium frequentissima sedes in abdominis visceribus IV. 333. lethales ab infinito in ieiuno lumbricorum numero IV. 338. etiam a nimia irritabilitate dependent, inprimis in hysteri- cis IV. 340. earum frequens causa, plethora vaporum abdominalium ib. grauidarum unde deriuandae IV. 341. ex calculis cystidis felleae, renum, vesicae IV. 342. a terrore IV. 375.
- Cor, musculus princeps sensilissimus III. 207. eius fabrica non paucos sibi vindicans neruos III. 255. praepollet irritabilitate III. 259. ante cerebrum in ouiparis euoluitur IV. 236. uno ictu ecano excisso irritatum per quatuor minuta pulsabat IV. 120. num neruis careat IV. 2. refutatio argumentorum ex anatomia IV. 2. analogia IV. 3. numero neruorum IV. 4. insensibili cordis natura ib. experimentis in brutis IV. 5. opio IV. 6. eius motus non pendet a neruis III. 12. eius contractiones crebriores et dolores in pectore in morbis infimi ventris III. 121. eius palpitatio a terrore IV. 374. in nimio affectu IV. 396. auriculae dextrae nerui II. 196. quid ex experimentis GALVANI concludi potest I. 6. quidam id conuulsam esse electricitate animali adhibita obseruarunt IV. 6. 21. irritamenti acerrimum genus nullus effectus in eo producit III. 20. vid. quoque *cardiaci nerui*.
- Cortex v. corticalis substantia cerebri.

*Corticalis substantia* f. *cortex cerebri*, eam neque vasculosam neque glandulosam vix organifatam esse IV. 214. 233. meris constat vasculis IV. 129. sed sensu non pollet I. 125. IV. 129. 230. irritata in cane nullum doloris signum excitauit IV. 120.

*Coryza* vid. *grauedo*.

*Crisis* in morbis, quomodo mutetur III. 25. in febribus III. 282. duplex genus III. 290.

*Crotaphiticus nervus* III. 71. eiusque rami ib. 72.

*Cruditas*, stadium in febribus III. 282.

*Crura fornices* vid. *fornix cerebri*.

*Cruralis nervus* posticus III. 178.

*Cubitalis nervus* IV. 91. eius ramificatio III. 138. IV. 92. eius synonyma III. 136. eius decursus III. 137.

*Cuniculus*, cuius cerebrum ratione magnitudinis ponderisque aestimatur III. 160. eius intercostalis cum ganglio comparatur III. 161.

*Cutaneo-ulnaris nervus* ramus cutanei interni III. 141.

*Cutaneus nervus* faciei superior IV. 42. occipito-sincipitalis IV. 36. superficialis colli anterior IV. 43.

*Cutaneus nervus* externus v. *musculocutaneum*.

*Cutaneus nervus* internus III. 239. eius synonyma III. 140. eius origo et ramificatio III. 140. 141. minor internus f. ulnaris a multis praeteruisus est III. 135. eius decursus III. 136. illi adscribenda est causa grauium dolorum in pressione regionis anconae III. 136.

*Cutis* sensu pollet III. 190. inflammatione sicut aliae partes sensibilibus redditur ib. pallor unde? IV. 350.

*Cyctica cephalalgia* III. 309.

*Cyprinus carpio* eius cerebrum cum corpore comparatur III. 160.

*Cystici tumores* in fronte III. 28.

## D.

*Decimum par* v. *linguale par*.

*Decimum par* ANDERSCHII I. 289.

*Decussatio* nervorum in uniuersum I. 128. qua de re his sub iudice est I. 130 sqq. iam ab ARETAEO CAPPADOCE comme-

morata II. 10. nervorum optidorum III. 153.

*Delirium* in erysipelate IV. 298. est et consensuale, eius frequentissima ex praecordii origo IV. 323. a metastasi purulenta III. 178. a colluuie, a vermicibus intestinorum IV. 324. a lumbricis valde delirans infans IV. 325. ab inflammationibus viscerum ib. continuum a taenia in virgine excitatum IV. 329. sunt et deliria chronica consensualia a sola viscerum debilitate et sensibilitate orta IV. 330. a plethora abdominali propter spasmos ib. 330. a nimio gaudio IV. 356. 357.

*Dentalis nervus* ramus rami secundi Par. V. I. 193. eius rami anter. poster. ib. — anterior maxillaris superior I. 195.

*Dentes* num sensu praediti? IV. 193. eorum affectiones in infantibus quomodo explicandae II. 270. morbi eorum sympathici IV. 298. eorum dolores unde petendi I. 228. cur ad oris internam usque cavitatem sese propagantur I. 229.

*Dentitio difficilis* III. 181.

*Descendens nervus* ramus secundi paris quinti I. 256. colli internus II. 146. 158. externus II. 160. eius plexus ib. 161.

*Diaphragma*, eius motus mixtus I. 28. eius inflammatio num causa paraphrenitidis? IV. 327.

*Diaphragmaticus nervus* I. 346. 50) II. 164. vid. etiam *phrenicus nervus*.

*Diarrhoea*, a tensione et inflammatione gingivarum IV. 298. a metu IV. 370. a moerore IV. 368. 32)

*Difficultas loquendi* a vulnere trapezii quomodo explicanda III. 56. scapulae movendae unde deriuanda II. 237.

*Digastricus nervus* IV. 43.

*Digestio* debilis hinc Epiphora molesta IV. 283.

*Distentio* nervorum apud Latinos id quod spasmus IV. 150.

*Diuisum par* vid. *trigeminum par*.

*Dolores* a quacunque irritatione nervorum II. 313. in pectore in morbis abdominalis III. 121. capitis consensuales IV. 267. ab obstructione ib. 269. a colluuie primarum viarum vitiosa ibid. 270. capitis ab odontalgia II. 300. vid. etiam

Cepha-



- Cephalalgia*; gravissimi in pressione anconeici adscribendi sunt uluari nervo s. cutaneo minori interno III. 136. phreniticorum num in inflammatione durae matris positi IV. 130.
- Dorsales nervi* IV. 90. quidam cum quatuor cervicalibus axillaribus communicant IV. 91. reliqui simpliciiori structura gaudent, alias simillimi ib. 93.
- Dorsalis nervus*, ramus ex cubitali et eius tres rami III. 138. ramus superficialis nervi radialis III. 134. ramificatio eius et inprimis *recurvus ramus*, a nemine descriptus III. 134.
- Ductus excretorii etiam cinguntur nervis III. 117.
- Ductus instrumenti olfactus vid. *olfactus*.
- Dura mater* s. *meninx* I. 2. diuidi potest in duas laminas ib. huius rei primus observator I. 2. 5) in quas laminas eam etiam diuisam inuenies in exitu cum nervo olfactorio I. 7. sic in oculo I. 8. de eius sensibilitate magna vehementia disputatum est I. 270. III. 109. sensus expers ex ZINNII auctoritate IV. 126. irritata in cane nullum doloris signum edidit IV. 120. quod quidem a KRAUSIO et aliis affirmatur III. 197. sq. facile quis seduci potest, ut nervos assumat in ea I. 274. nervi a VIEUSSENIO indicati I. 91. quid pro nervo forsan habuit? I. 92. 99. alii etiam contenderunt nervosos funiculos adesse I. 93. 100. a PACCHIONIO in duas classes diuiduntur I. 105. sed contrarium demonstratur I. 95. 8) VRISBERGIUS nullibi fibras nerveas in duram matrem ingredientibus ipsa lente vitrea vidit I. 275. ei adhaerent nervi I. 276. non inhaerent IV. 201. igitur insensibilis recte adfirmata I. 229. observata HUBERI de eius nervis I. 106. 5) eius vasa pro nervis habita sunt I. 278. eo crassior est quo ponderosior cerebri moles III. 149. \*) spinalem medullam inuoluens IV. 73. eius fibrae carnosae non vidit FROTSCHEI IV. 74. variat diametro ib. in specu vertebrarum crassior apparet, quam intra cranii capsam I. 13.
- Durus nervus* vid. *facialis nervus*.
- Dysenteria a tensione et inflammatione gingivarum IV. 298.
- Ludwig script. neur. min. T. IV.
- E.
- Ebrietas, in qua paralyssis linguae, quomodo declaretur III. 26. \*) quam inertia scapularum sequitur III. 61.
- Ecphymatica cephalalgia III. 305.
- Eγγοργον* vide cerebellum.
- Elastica corpora quorum tria genera sunt IV. 191.
- Elater, quid sit IV. 192. differt a tensione IV. 191.
- Electrica apoplexia vid. *apoplexia*.
- Electricitas animalis III. 339. observata quaedam III. 340. scriptores super ipsa III. ib. IV. 409.
- Ελγμος*; II. 24.
- Embotum* i. q. *infundibulum*.
- Embryo triplici modo alimentum accipit IV. 203.
- Eminentiae glandulosae TARINI II. 30. candicantes in infante neonato II. 33. in animalibus ibid. solidum statuitur II. 35. quod alii negant II. 38. SOEMMERRINGII hac de re sententia II. 41.
- Empyria medica III. 241. semper incerta ib. 242.
- Empyriothonus, singulare symptomata in eo IV. 285.
- Enaërea species thlipticae cephalalgiae III. 314.
- Encephalon* vid. *cerebrum*.
- Ενεφαλονχηλη* IV. 227. 229.
- Enthusiasmi ex imo ventre IV. 328.
- Ephialtes s. Incubus, respirandi difficultas II. 312.
- Επεγοργον* v. cerebellum.
- Epidemiae num ex aeris constitutione repetendae III. 171. quod in dubium vocatur III. 273.
- Epidermis num sensu careat III. 189.
- Epiglottideus nervus* II. 130.
- Epilepsia quid II. 309. Harlemenses hoc morbo affecti metu candentis ferri fanati III. 276. in qua sensus cuiusdam foetoris ex hypochondriacis IV. 285. clysteribus fanata IV. 338. ex calculis cystidis felleae, renum, vesicae ib. 342. a nimia debilitate nervorum IV. 367. a metu IV. 371. a terrore IV. 375. a nimio gaudio IV. 356. 357.
- Epileptica apoplexia vid. *apoplexia*.

Epiphora in debili digestionem IV. 283.  
 Epifchetica cephalalgia III. 309.  
 Equus, in quo obseruata decussatio neruorum opticorum I. 135. et in alio ib. 136. eius cerebrum ratione ponderis et magnitudinis aestimatur III. 159.  
 Erethistica cephalalgia vid. *thlypticam cephalalgiam*.  
 Erinaceus, unam tantum inter crura cerebri habet eminentiam candicantem II. 33.  
 Erysipelas faciei et aliarum partium, argumentum hepatis commercii cum cute IV. 297. causa comatis fieri potest II. 318. in terrore IV. 374.  
 Eclampsia, quomodo differat ab epilepsia II. 310.  
 Efox lucius, cuius cerebrum ratione ponderis et magnitudinis aestimatur III. 160.  
 Ethica cephalalgia III. 308.  
 Exallactica cephalalgia III. 297.  
 Exostoses cranii causae apoplexiae IV. 394.  
 Exotica cephalalgia III. 300.  
 Experimenta cum canibus, de ligamentorum sensibilitate IV. 153. sqq. ad sensum piaie matris explorandum IV. 163. propter pleurae sensibilitatem IV. 164. cum iisdem animalibus, qui cerebro toto exempto sex horas vixerunt IV. 115. et alia sq. quibus sinus longitudinales erant pertusi IV. 118. cum cane, cui lateraliter instrumento caput perforatum f. ab osse occipitis immisum erat IV. 119. cum cane, qui, stylo in dextrum cerebri hemisphaerium immisso, per gyrum circumambulauit IV. 132. a dextris sinistrorsum ib. et sq. cum neruis diaphragmaticis capta IV. 124. cum cane, cui cerebrum cum malleo diffractum IV. 128.  
 Experimenta Galuaniana vario modo repetita a MÜLLERO IV. 171. cum carabo coriaceo LIN. instituta IV. 174. ad sensationem per neruos spectant IV. 175. num a materia expansili pendeat IV. 178. scriptores et restauratores horum experimentorum III. 20. \*) quae etiam cum plantis CL. SCHMUK instituit III. 21. in not. Quaedam ipsorum repetita IV. 408.  
 Exterior ramus nerui palati I. 191. deest aliquando cum canali suo I. 192.  
 Exulcerationes viscerum sensibilibus causa cephalalgiae IV. 276.

## F.

*Facialis neruus f. communicans faciei f. portio dura nerui acustici* II. 9. 89. III. 37. de eius diuisione ab auditorio neruo II. 90. eius origo II. 92. eius rara cum octauo anastomosis III. 38. eius relatio ad vasa III. 40. num durae matri propagines tradat I. 101. eius portio minor f. fibrae accessoriae II. 93. quae et in Phocaena Delphino adsunt II. 94. eius plexus III. 40. et circumuolutiones cum vasis circa ductum saliualem III. 41. faciales nerui descripti et delineati a MECKELIO II. 204. sq. posterior facialis III. 39. portio cervicalis IV. 45. occipitalis profundus ib. neruus digastricus IV. 46.

Facies, eius tumor qui comitatur dentium dolores III. 26. \*) eius affectus consensuales IV. 295. eius musculi convulsi ib. eius nerui vid. *facialem neruum*.

Falco gentilis, eius cerebrum ratione ponderis et magnitudinis aestimatur III. 160.

Fames canina, a vermibus IV. 329.

Febrilis materia vid. *febris*.

Febris quid III. 259. descriptio, quam CL. THAER exhibet III. 288. eius causa proxima III. 260. cuius symptomata essentialia III. 274. a calore naturae aucto vel imminuto desumi non possunt, tamen frequentissime in eo posita III. 276. in iis inter incrementum et decrementum pulsus calorisque nullam esse proportionem III. 279. irritamenta in iis vitanda III. 281. alia symptomata III. 285. febres acutae sanissimis solemniores quam cacochymicis III. 285. eius status, qui concoctio dicitur III. 282. lenta nervosa II. 306. a moerore III. 266. biliosa ab ira diuturna III. 266. in multis materiale quid assumi potest, quo stimuletur corpus III. 269. num ista febrilis materia quae criticis euacuationibus eiicitur, in febre generetur III. 287. febrim pro lubitu sese excitare posse FONTANA asseruit III. 85. acutissimae a cerebri irritatione IV. 377. a nimio gaudio IV. 356. lenta a moerore cuius exempla laudata IV. 368. 33)

Felis,



**Fells**, cuius cerebrum ratione magnitudinis et ponderis indicatur III. 159. eius intercostalis cum ganglio comparatio III. 161. duas, ut homo, habet eminentias candicantes inter crura cerebri II. 34.

**Femur erosum** III. 178.

**Fibrae nervosae** II. 254. nervi sexti I. 49. motrices GORTERI I. 23. tendineae praecisae renatae IV. 145. ad facialem accessoriae vid. *facialem nervum*.

**Fiducia** quid? IV. 355. summam videtur habere potestatem in nervos IV. 359.

**Fistula sacra** MORGAGNI i. q. annuli vertebrales IV. 82.

**Fomentationes frigidae** in apoplexia valde commendatae IV. 407.

**Flexus sinuosi cerebri** II. 24.

**Fluidum nervum** II. 252. 282. 284. III. 99. eius natura II. 257. unde ista hypothesis derivata II. 212. quae refellitur II. 213. argumentis vix comprobari potest III. 104. eius secretio nec incremento cerebri probatur III. 219. nec analogia III. 220. nec vinculis nervorum ib. 224. alii Cl. viri contra hanc sententiam pugnant III. 232. num sensationes eo propagentur ad cerebrum III. 233. de eius electrica vi III. 235. quae contra dici possunt III. 236.

**Fluxus menstruus**, suppressus ruborem et inflammationes oculorum producit IV. 280. convulsiones exinde IV. 340.

**Fluxus haemorrhoidalis**, eius anomalia causa inflammationum oculorum IV. 280.

**Foetus primordia**, quomodo in ovis incubatis se habeant IV. 235. humanus, cuius intercostalis nervus cum ganglio comparatur III. 161. caput post duodecim dies a partu minuitur IV. 216.

**Foramen opticum**, in equo canalis est I. 135. offis sphenoidis minus in sciuro I. 135.

**Fornix cerebri**, eius crura III. 154.

**Fossa Sylvii** II. 28.

**Fossulae cerebri** II. 24.

**Frigus febrile** III. 278. ipsam calvariā transgressum ipsumque tangens cerebrum apoplexiam generat IV. 401.

**Fringilla Spinus**, cuius cerebrum ratione ponderis et magnitudinis aestimatur III. 160.

**Frontalis nervus** ramus ophthalmici paris

quinti I. 168. II. 204. III. 27. eius ramus versus pinguedinem anguli oculi abscedens ib. eius supratrochlearis ramus I. 168. 169. infratrochlearis ibid. ramus ad musculum levatorem palpebrae ibid. eius rami superficiales et profundi I. 170. interdum tertium stratum observavit Cei. MECKEL I. 171.

**Functiones multae corporis humani**, quem ad finem spectent IV. 202.

**Fundum camerae cerebri** ALBINI II. 30.

## G.

**Ganglion** non solum nervis constat I. 67. sententia WILLISII et VIEUSSENSII de iis ib. LANCISII I. 69. recentissimorum anatomicorum I. 70. nullae fibrae motrices in iis demonstrari possunt I. 70. eorum triplex usus I. 23. 71. IV. 7. quibus alii quartum adiecerunt ibid. esse parva cerebra secundum sententiam Cl. JOHNSTONE I. 71. quid contra dici potest I. 80. sqq. ex filamentis nascuntur I. 72. plures rami egrediuntur quam ingressi sunt, saltem maiores ib. experimenta cum iis maceratione peracta I. 23. 72; ex iniectione vasorum capta I. 74. tunica cellulosa laxa inuoluuntur ib. matre dura inuolui contenditur I. 23. altera eorum tunica I. 75. usque eorum qui ex observationibus Cl. HAASE apparet I. 75. 76. num nervi in iis uniantur? I. 77. num nervi novum contextum cellulosum in iis accipiant? I. 78. an vasa in gangliis ad nervos distribuuntur I. 79. singula nervorum et vasorum coordinatio in iis II. 256. vasis praebent nervos III. 8. vel simplicia, spinalia vel non spinalia sunt I. 61. \*); num in radiculis accessorii nervi adsit II. 234. num sensus in iis imminuitur I. 84.

**Ganglion cernicale**, superius, s. supremum I. 74. II. 246. III. 6. in sinu Atlantis situm I. 331.

— — — — medium I. 74. II. 247. ad cor quosdam ramos abire patitur III. 6.

— — — — inferius s. imum I. 74. II. 248. 250. III. 7.

- Ganglion ceruicale intercostalis nerui* I. 186.  
 — — *ceruicale subcutaneum* IV. 39.  
 — — *colli primum* II. 165. eiusque rami ib. et sqq. eius rami ad collum et musculos colli diuisi II. 176.  
 — — *colli secundum* II. 181.  
 — — GASSERI I. 161. \*\*)  
 — — GLASERI vid. *lenticulare*.  
 — — *intercostalis nerui* I. 73. III. 79. magnum ramorum numerum spargit ex sese, non nisi tenues accipiens ramos a vertebralibus III. 100.  
 — — *lenticulare* I. 75. 174. a quo pendet contractio iridis inuoluntaria I. 84.  
 — — *longitudinale dextri lateris* III. 43.  
 — — *maxillare* I. 214.  
 — — *molle temporale* II. 172. rami eius II. 174.  
 — — *oliuare* vid. *ceruicale supremum*.  
 — — *ophthalmicum* I. 158. 173. duplex eius radix I. 174.  
 — — *petrosum* III. 52. glossopharyngei II. 115.  
 — — *pharyngeum* III. 58.  
 — — *semilunare* I. 74. 253. 268. 273. III. 79. IV. 65. merum plexum filamentorum nerueorum esse, Cl. VRISBERG affirmat I. 268. eius usus triplex: VIEUSSENI I. 254. differt in variis subiectis IV. 68. supra vasa renalia III. 109. mesenterica magna I. 85.  
 — — *sphenopalatinum* siue secundi rami quinti paris I. 75. IV. 7.  
 — — *thoracis primum* II. 182. eius figura deltoidea II. 184. eius rami adscendentes II. 188.  
 — — *thoracis secundum* II. 186.  
 — — *thyreoideum* s. *ceruicale inferius* coniunctum cum thoracico III. 120. trigemini paris I. 93. (quod etiam intumescencia semilunaris.)  
*Gangraena*, a neruo discisso II. 258.  
 GASSERI *Ganglion* I. 161. \*\*)  
*Gastrica cephalalgia*, sympathicae species III. 317. quae diuiditur in saburralem ib. biliosam, pituitosam, asthenicam III. 317.  
*Gastricus succus*, spiritibus diues mente BOERHAVII IV. 210.  
*Gaudium*, animi affectus IV. 355. necat etsi raro IV. 402. circa causam huius mortis differunt scriptores ib. alii sanguineam apoplexiam esse credunt ib.  
*Gemelli musculi*, quorum tendines cum solei, sicut in homine, coniuncti non erant, sed separati in cane IV. 138.  
*Geniculata corpora* SANTORINI II. 109.  
*Genioglossus musculus*, unde neruos accipiat II. 150. 151. 156. 157.  
*Geniohyoideus musculus* unde neruos accipiat II. 150. 151. 156.  
*Gingiu*a, eius inflammatio tensionem producens IV. 298.  
*Glandulae*, num sensu praeditae sint III. 206. albae WILLISII II. 33. pituitaria, turbinata etc. vid. *pituitaria*, *turbinata glandula*. — pone *infundibulum* VERHEYENII II. 33.  
*Glandularia corpora* TARINI II. 33.  
*Glandulosi processus* PETRIOLI II. 33.  
*Glaucoma*, in quo nullus est pupillae motus, ciliares nerui laesi adfunt I. 233.  
*Globuli cerebri* III. 222. vid. *Cerebrum*.  
*Glossopharyngeus neruus* II. 97. 114. III. 31. 115. eius historia litteraria II. 98. 99 100. eius origo quatuor vel quinque fibris a processu cerebelli prope corpus oliuare II. 100. origo gangliorum eius II. 115. eius tractus ib. 116. eius diuisio in ramos; dat nimirum ramos tres *circumflexos* stylopharyngei II. 116. *tonsillares* ib. 117. *plexum tonsillarem* ab eo formatum ib. 119. *lingualem* externum et internum ib. 120. *ramum communicatorium cum pari vago* ib. 121. eius diuisio in variis subiectis, quomodo se habeat? III. 53.  
*Gluten* intra meninges causa potest esse apoplexiae IV. 394.  
*Grauedo* s. *coryza* causa apoplexiae IV. 393.  
*Gustatorius neruus* I. 202. BLASII I. 154. synonymum paris noni I. 290. tertius, ramus quinti paris, vid. *linguale par*.  
*Gyri cerebri* distinguit Cl. SÖMMERRING a sulcis II. 24. in sinistro omnes in dextro



tro plerosque a vertice ad basin descendunt II. 25. memoratu reliquis omnibus dignus II. 30.

## H.

**Haemodia** quid? III. 193.

**Haemorrhagiae**, ortum ducunt et cessant in terrore IV. 374. in ira IV. 377. narium ex vitiis praecordiorum IV. 287. qua de re phaenomena memorabilia IV. 289.

**Haemorrhoidalis cephalalgia** III. 309.

**Haemorrhoides suppressae** in ira IV. 376.

**Haereditaria apoplexia**, vid. *apoplexia*.

**Hedra anterior** MECKELII I. 249.

**Hedysarum gyrans**, experimenta cum eo instituta III. 21.

**Hemeralopia**, a vermibus IV. 281.

**Hemicrania** III. 296. quomodo a SAUVAGESIO diuidatur? III. 21. quaedam phaenomena II. 299. sinistri lateris cum erysipelatofo faciei tumore et odontalgia quauis nocte accedens IV. 274. in qua amissio splendoris oculi II. 299.

**Hemisphaerici globuli** II. 33.

**Hemisphaerica tubercula** II. 33.

**Hepar**, doloris sensu non pollet IV. 255. irritabilitate destitutum est IV. 169. magnum eius cum cute commercium IV. 297. eius obstructions IV. 368 33). ab ira IV. 376. eius inflammatio cum delirio iunctum IV. 325.

**Herniae a terrore ortae** IV. 374.

**Herpetica cephalalgia** III. 312.

**Hiatus inter lobos cerebri posteriores maior anteriori** II. 31.

**Horror**, quid in uniuersum IV. 355. febris III. 277.

**Humores corrupti**, morbos neruinos producere possunt II. 295.

**Hydatidosa cephalalgia** III. 304.

**Hydrophobia curata**, subita in aquam frigidam submersione III. 276. spontanea II. 305. eius causae II. 306. conuulsiones scapulae in ea III. 61.

**Hydrops cerebri causa apoplexiae** IV. 393.

**Hypochondriaca apoplexia**, vid. *apoplexia*.

**Hypochondriacum malum** II. 307. eius causae II. 308. frequens eius fedes II. 296. sputa frequentia in eo unde? IV. 302. hoc morbo affecti interdum et paralytici fiunt IV. 322. iis frequentes lacrymae per genas dilabuntur, quomodo hoc phaenomenon declarari possit III. 87. obseruationes de hypochondriacis affectionibus solummodo laudatae IV. 368 33). in quo saepe maxillae clauduntur, quae inopinato sponte soluuntur IV. 307. de qua re exempla plura ib. vertigo frequens in eo IV. 308.

**Hypoglossus neruus** IV. 46. nonum par a quibusdam ita dictum I. 290.

**Hysteria** II. 307. IV. 368. 33). causae eius II. 308.

**Hysterica apoplexia**, vid. *apoplexia*.

**Hystericae feminae**, saepe dolores conuulsivos in ventriculo etc. patiuntur III. 61. saepe sibi molestae IV. 305. quod antispasmodicis, citissime opio, tollitur? ib. saepe lacrymae effundunt IV. 284. paralyti etiam afficiuntur IV. 322. subito maxillas claudunt, quae inopinato sponte soluuntur IV. 307. de qua re plura exempla iuuenies ib. vertigine frequenter vexantur IV. 308. paroxysmi in coma quoddam desinere videntur IV. 405.

## I.

**Icterus**, in quo aqua serosa ex parietibus medullae spinalis effluxum, per conuulsiones cerebrum inundauit III. 177. a moerore IV. 368 33). ab ira IV. 376.

**Idiopathici morbi** II. 295.

**Idiosyncrasiae**, phaenomena memorabilia III. 261. eiusdem exempla ib.

**Iecur**, num sensum habeat doloris? III. 208.

**Impressiones digitatae cerebri** II. 42.

**Incubus**, vid. *Ephialtes*.

**Incunabula neruorum**, ubi quaerenda sint? I. 55.

**Inertia scapulae in ebrietate** III. 61.

**Infimus venter**, vid. *abdomen*.

**Inflammatio diaphragmatis unde dolor in ea** I. 226. num causa paraphrenitidis sit? II. 305.

**Inflammatoria cephalalgia**, III. 306.

- Infraorbitalis nervus* ramus secundi rami paris quinti I. 169. 193. II. 205. III. 32. unde petat nomen I. 194. irretitur partim cum arteriis eiusdem nominis partim cum plexu venoso-sphenomaxillari III. 33. per canalem egressus in quinque vel sex ramos diuiditur I. 197. *secundarius* I. 202 1).
- Infratrochlearis nervus* I. 178.
- Infundibulum*, eius completa synonymia II. 34. II. 242. situs eius ib. utrum solidum an cauum sit II. 243. apertum est ex MURRAYI sententia II. 243. canalis in glandula in duos abit ramos II. 244.
- Ingluuias primarum viarum*, quomodo tanquam causa multorum morborum conspici possit II. 294.
- Innomminatum par* vid. *trigeminum par*.
- Inquilina cephalalgia* diuiditur a Cl. PLOUQUETIO in futuralem III. 302. oncothlipticam III. 303. lithiasticam ib. polyposam III. 304. hydatidosam ib. ecphymaticam III. 305.
- Infantia a nimio gaudio* IV. 356. chronica ab ira IV. 376.
- Insecta*, eorum cerebrum IV. 113.
- Inspiratio et exspiratio* num pendeat a tensione in nervo phrenico per diaphragma IV. 16. negatur IV. 17.
- Intercostalis nervus* I. 10. eius origo I. 99 4). a gangliis originem ducere PALETTA arguit III. 85. eius a pari quinto origo I. 186. controuersiae de hac origine I. 255. 257. sententia Cl. A BERGEN I. 260. varietates eiusdem originis I. 186. 187. 188. utrum constituat *Vidianum nervum*, an ex eo originem ducat I. 188. 189. non accipere radices a sexto et quinto, sed iis immittere potius, PETIT primus observauit III. 82. sententiam pleno in luce posuit FEL. FONTANA III. 83. fibrae eius albicantes sunt, cum sexti sint cinereae, lentis ope consideratae III. 84. pituitariae glandulae filamenta tribuit IV. 55. quinque interdum fibris consociatur, cum *Vidiano* ibid. Cl. HIRSCHII distinctio inter principalem et minus principalem originem I. 261. cum plantis parasiticis eum comparat I. 262. eius inuolucrum differt ab eo aliorum nervorum I. 14. consideratur qua longus IV. 187. 188. duplex III. 108. eius nexus III. 107. eius progressus in abdomine III. 79. eius *ganglia* ib.
- Intercurrentes morbi* III. 273.
- Intermedia substantia cerebelli* II. 43.
- Intermedii nerui HUBERI* vid. *accessorium par*.
- Interosseus nervus* ramus nerui mediani III. 129. externus III. 135.
- Intestinula cerebri* II. 24.
- Intumescencia similunaris VRISBERGII* s. *arnilla MALACARNEI* III. 66. a quibusdam pro ganglio accepta est ib. VRISBERG inter plexus nervorum refert III. 66. cui SCARPA adfentitur III. 67. ab eo dicitur et *ganglio affinis* I. 161 \*\*).
- Inuolutiones intestinales cerebri* II. 24.
- Ira* quid? IV. 355. omnium violentissima animi perturbatio IV. 376. abortum gignit IV. 377. diuturna, febrem biliosam procreari potest III. 266.
- Irritabilitas*, cuius naturae? III. 245. II. 293. cum sensibilitate connubium ib. diuersis phaenomenis se manifestant III. 246. unde petenda III. 4. non in nervis quaerenda II. 283. 284. a vi nervosa differt III. 13. num omnibus corporis humani partibus adscribenda sit III. 24. ad varia phaenomena explicanda apta IV. 125. pathologice considerata III. 246. si aucta est, est etiam aucta dispositio ad nervosos morbos II. 294. limites inter eam et sensibilitatem IV. 252. vasorum a nervis fouetur III. 16.
- Ischepistactica cephalalgia* III. 309.
- Ischiadici nerui* IV. 98. ligatorum phaenomena II. 277. 278.
- Ischias*, quomodo oriri possit? IV. 243. arthritica, nervosa IV. 100. diuisio et causae praedisponentes ib.

## K.

Καρυδοχῆν i. q. Infundibulum.  
Κωνάριον III. 323 1).

## L.

Labia, oris acutissimum sensum habent I. 128. unde ib. eorum tremor a cruditate



- tate et colluue primarum viarum IV. 297.
- Labiales nervi inferiores* I. 211. eorum ramificatio ib. *superiores* I. 299. 390.
- Labrum MUNDINI* i. q. *Infundibulum*.
- Lacrymalis nervus* I. 171. eius origo in variis subiectis ib. eius anastomoses v. *anastomosis*. — eius ramuli et ad tunicam adnatam tendunt I. 172.
- Lacrymae*, cur a sola tristitia fluant? IV. 249. earum in hemicrania effluxus II. 299. eius organa secretoria afficiuntur spasmis abdominalibus IV. 283.
- Lactea metastasis causa apoplexiae* IV. 393.
- Lacuna BAUHINI* i. q. *Infundibulum*.
- Laetitia minor gaudii gradus* IV. 355. eius signa pulsus magnus et frequens, respiratio libera et citior etc. IV. 356. eius, si immodica, tristes effectus IV. 356. eius effectus salubres IV. 358.
- Laminae cerebelli* II. 42.
- Lapides cerebri*, causa apoplexiae IV. 394.
- Laquei nervosi* quid III. 25. nimium iis tributum est ib. circa carotidem nervi recessui II. 169. 172. — circa arteriam meningeam mediam ex radicibus temporalis superficialis constans I. 217. quid iis declarari possit? I. 225. arteriae thyreoideae inferioris II. 188. arteriae vertebralis II. 185. subclaviae arteriae II. 189. principii arteriae labialis II. 175. noni nervi circa arteriam occipitalem I. 295. lingualis nervi circa arteriam occipitalem II. 147. pharyngei inferioris cum ramo ex intercostali circa arteriam pharyngeam III. 59. circa venam facialem a plexu nervorum formatus I. 207. 208. circa arteriam labialem I. 208. pulmonarii II. 198.
- Laryngeus nervus* III. 116. externus II. 132. internus II. 128. eiusque rami II. 130.
- Lemur Mungoz*, unam tanrum inter cerebri crura eminentiam candicantem habet II. 33.
- Lepus*, eius interrostialis nervus ratione magnitudinis III. 161. unam tantum habet eminentiam candicantem inter cerebri crura II. 33.
- Lethargus a tercore* IV. 375.
- Libido* quid IV. 362. eius signa ib.
- Lien sensu doloris praeditus* III. 208. vix percipit irritabilitatem IV. 169.
- Lienterici maculas omnium colorum in facie habent* IV. 297.
- Ligamenta*, num sint sensu destituta III. 199. in variis eorum morbis sensus III. 200. ex ipsa eorum natura III. 202. observationibus et exemplis probatur 203 sq. sed sensu destituta esse arguitur IV. 152. experimentis probatur multis IV. 153 sq. *denticulatum* I. 328. IV. 76.
- Ligaturae nervorum* II. 272 sq. symptoma etc. II. 288. nervorum brachialium difficilis est II. 276. octavi paris in utroque latere cuniculi II. 285. eiusdem nervi in cane II. 277. 286. in cuniculo albo, fusco II. 287.
- Lilium bulbiferum*, quomodo se habeat in experimentis Cl. GALVANI III. 21.
- Linea alba*, vulnerata et quae inde sequuntur symptomata III. 205.
- Lingua soli ramo tertii quinti paris rami gustum debet* I. 230. eius paralyxis I. 303. praecurrit apoplexiam I. 306. tremula et balbutiens in phreniticis I. 306. cur tremit in spasmis abdominis hystericeis et hypochondriacis I. 306. eius consensus cum glandulis salivalibus I. 230. eius affectiones sympathicae IV. 302. dolor eius a pure in thorace III. 88.
- Linguale par* I. 209. 212. 290. II. 124. 140. eius synonyma I. 54. eius origo I. 54. II. 141. duobus fasciculis ex corpore olivari et medulla spinali II. 143. eius septem ad novem fibrae radicales pia matre cinguntur I. 55. desinunt omnes eius furculi in papillosam linguae dorsi partem I. 215. eius descendens ramus II. 146. circa arteriam occipitalem inflectitur II. 147. eius rami communicantes II. 149. eius flexura secunda II. 149. eius arcus transversalis II. 150. lateralis externus et internus II. 120. lateralis posterior II. 119.
- Lingualis nervus ramus glossopharyngei* III. 55. rami eius in lingua discinduntur II. 154. terminatur in genioglossio II. 157.
- Lingualis medius s. linguale par nervorum medium*

*medium* II. 9. 102. 103. eius origo II. 103. eius ad vasa relationes III. 35.  
*Lipothymia* quid? III. 177. IV. 381. 399. eius causae IV. 382. quomodo a metu oriri possit IV. 370. a nimio gaudio IV. 356.  
*Lirae cerebri* II. 24.  
*Lobi cerebri* II. 30. vid. *cerebrum*.  
*Lockia* in terrore cessant IV. 374.  
*Lucidum septum* IV. 9.  
*Lucius*, eius quinti nervi anatomes I. 220\*).  
*Luctus* quid? IV. 355. vehementioris descriptio et effectus IV. 364.  
*Lucubrationes*, teste MORGAGNO, apoplexiam procreare possunt IV. 404.  
*Lues venerea* morbos nervosos producere potest II. 290.  
*Lumbares nervi* eorumque origo IV. 94. primi eius origo et ramificatio ib. secundus ad quasnam partes nervos distribuit IV. 95. nervo ischiadico constituendo inferiunt IV. 98.  
*Luteola* vel *fusca cerebelli substantia* II. 44.  
*Lutra vulgaris*, duas uti homo eminentias candicantes habet intra cerebri crura II. 34.  
*Lymantérica cephalalgia* et eius species coordinatae, traumatica scil. III. 297. apostematodes III. 298. purulenta ib. septica III. 299. evrodes ib.

## M.

*Maeandri cerebri* II. 24.  
*Mania* et *Melancholica* sibi saepe similes II. 315. a moerore IV. 368 33). a metu IV. 371.  
*Mammillares processus* I. 7 1). II. 33. in diuersis animalibus diuersi inveniuntur I. 116.  
*Massetericus nervus* III. 73. ramus *gustatorii nervi* I. 203. 204 1).  
*Materies*, medullam spinalem et membranas inuoluens IV. 72.  
*Maxillare ganglion* I. 224. vid. *Ganglion*.  
*Maxillaris nervus superior* I. 178. 250. pluribus circumlegitur sureulis vasorum III. 29. difficilis cognitu ob nimis reconditum situm I. 179. VIEUSSENI huius nervi denominatio I. 179 1). delitescens adhuc intra canalem *subcutaneum* malae edit I. 180. quem vide, uti reliquos eius ramos *Vidianum* scilicet; *Palatinum*; *infraorbitalem*; — inferior I. 250. optime ita dictus I. 209. unam vel duplicem radicem plerumque habet I. 209 2). eius relatio ad vasa III. 34.  
*Meatus auditorius externus* sensibilissimus est I. 229. *visorius* vid. *opticum nervum*.  
*Medianus nervus* et eius synonyma III. 126. ortus ib. 127. rami eius ib. 128. 129. 130. continuati trunci ramificatio ib. 131.  
*Medicamenta olfactu recepta*, quomodo horum agendi modus explicetur I. 222.  
*Medulla cerebri* s. *medullaris cerebri substantia* num in condensatione partium gelatinosarum quaerenda IV. 230. nullum habere sensum HALLER et alii docent III. 206. quod negatur ab aliis III. 207. ei stylus immixtus canem eiulantem reddidit IV. 120.  
*Medulla oblongata* vid. *oblongata medulla*.  
*Medulla ossium*, ei sensibilitas adscribitur IV. 257. laminae eius solidae aliis sensu pollere videntur III. 191. in rubia tinctorum pastis animalibus non tingitur II. 27.  
*Medulla spinalis*, eius diuisio in quatuor virgas I. 328. vid. *oblongatam medullam*.  
*Medullares columnae descendentes*, earum in cornu ordo I. 36. 37 5).  
*Medullaris cerebelli substantia* II. 43.  
*Melancholia* similis maniae II. 315. humoralis Celi. LORRY origo IV. 367. 368. 33). ex metu IV. 271.  
*Membrana*, in quam arteriae et venae per textae, facultate sentiendi destituta non sit, contendit KRAUSE III. 199. et alii IV. 127. tenuis cerebri vide *piam matrem*.  
*Menostatica cephalalgia* III. 309.  
*Menses* in terrore cessantes IV. 374. vide *fluxus menstruus*.  
*Mercurialis cephalalgia* III. 300.  
*Metastasis* cuiuscunque humoris ad cerebrum in febribus malignis apoplexiam creat IV. 395. lactea etc. vid. *lacteam metastasin*.  
*Metus*, num fibrae in illo sint constrictae IV. 369. eius effectus in corpus humanum



manum IV. 370. apoplexia exinde IV. 403.

Mimosa pudica, quomodo se habeat in experimentis GALVANIANIS III. 21.

Moeror, minor gradus luctus IV. 355. febris lenta nervosa exinde III. 266. ex insigni apoplexia IV. 403. diurnus IV. 365. lentus et eius effectus IV. 367. frequentes diarrhoeas gignit IV. 368 32).

Mollis nervus vid. auditorius nervus.

Monstrum suillum bicipitatum, eius descriptio I. 136.

Monticulus VAROLII in basi cerebri II. 28.

Morbi, cur quidam semel tantum corpus afficiant III. 261. absque materia s. immateriales quid? III. 254. nervosi morbi ita dicti II. 294. 295.

Mortes subitaneae ad apoplexias refert KORTUM IV. 402. solus gradus differentiam constituit ib. a nimio gaudio IV. 357. a metu IV. 371 44).

Motorium par s. motorius nervus linguae I. 290. GALENI I. 300. externus vid. abducens nervus.

Motus epilepticus a titillatione plantae pedis II. 294. musculorum in experimentis observatorum vid. musculum.

Muscularis nervus CHESELDENII III. 126. ramus glossopharyngei III. 53. trapezii IV. 45.

Musculo-cutaneus nervus, eius synonyma III. 123. eius ortus III. 124. decursus eius ib. eius rami superficiales, profundi et musculares III. 125.

Musculus, eorum motus in experimentis observatis IV. 171. ranae cum nervo excisi experimentum SWAMMERDAMII IV. 124. sensu praediti sunt III. 200. quo magis movetur, tanto plures nervi ad eum proveniunt III. 10. quo intensius ac protrahitur solet fatigari, eo largior sibi deponit copiam fluidi nervi IV. 185.

Musica, eius commendatio in morbis IV. 345. eius effectus in tarantismo I. 234.

Muti, cur simul auditu careant II. 96.

Mydriasis, quae sit et a quibus causis oritur IV. 281.

Mylohyoideus nervus, ramus maxillaris inferioris I. 209.

\* Ludwиг script. neur. min. T. IV.

## N.

Narcotica venena mydriasis excitant IV. 257.

Nares, earum affectus sympathici IV. 285. pruritus ibid. sternutatio IV. 286. haemorrhagia IV. 287. earum rubor, alui humefcentis index IV. 297.

Nasales nervi I. 172. superiores anteriores I. 183. IV. 13. anteriores inferiores eorumque rami ascendens et descendens I. 183. \*) I. 190. IV. 15. interni IV. 13. superiores posteriores I. 184. superficiales I. 199. eorum ramificatio ib. ramus parvus Quinti I. 182. \*) eius elongatio IV. 187.

Nasopalatinus nervus I. 182. \*) Exp. SCARPAE III. 30. IV. 14. cum nullo septi membranae dato furculo ad palatum procedere VRISBERG dubitat III. 31. retia format circa arterias ib.

Nervosa nutritio vid. nutritionem nervosam.

Nervosi morbi, eorum definitio II. 291. dubia quaedam prolata II. 292. eorum divisio II. 303. ex humorum spontanea corruptione II. 295. ab obstructione in visceribus II. 302. a bile ibid. a pituita, a vermibus II. 303. nimis adhuc manca eorum theoria IV. 321.

Nervus quid sit? I. 63. II. 252. 272. eius vagina I. 3. eius involucria I. 17. II. 253. eius fibrae II. 254. eius tela cellulosa II. 255. praeditus est vasculis sanguiferis I. 14. II. 256. a RUYSCHIO imprimis iniectionis arte demonstratis I. 15. quod etiam experimento VIEUSSENI confirmatur I. 16. ista nervorum vasa in inueniuntur cadaueribus cuncta melius conspici possunt I. 16. in ischiadico anastomoses alunt I. 17. quas Cl. PFEFFINGER et in octavo pare observavit ib. num etiam venas habeant I. 17. in omni eorum incessu vasis prospiciuntur I. 55. num eorum medulla ex ipsa cerebri substantia nascatur ibid. in angulis incurvantur priusquam exeunt e cerebro II. 16. originem eorum medullae oblongatae pluri mi adscribunt IV. 80. a tunicis cerebri involuentibus oriri contendit MARRAT II. 5. quomodo eorum origines differant II. 6. eorum structura gelatinoso-globu-

globularis I. 18. \*) eorum diuisio GALENI in *duros* et *molles* I. 299. et 300. quomodo diuisio ista intelligenda II. 255. diuisio in *molliores*, *duros* II. 6. et *sensorios*, *motorios* II. 7. 8. canalis mollis est, secundum CL. CRUSEN, solido permanente repleto IV. 201. sub eorum nomine olim cum tendines tum ligamenta intellexerunt IV. 150. denominationem eorum a munere sumere optimum esset III. 71. materies iis insita III. 253. 2); pro crassitie diuersa recensiti II. 10. eorum peculiaris structura plicata II. 10. num quid corticalis in se immisceant? II. 16. instrumenta sunt sensationis II. 279. IV. 253. non omni tempore et in omnibus hominibus eundem sensibilitatis gradum possident II. 301. peculiari sensui dicati, uti variant ratione obiecti, ita et originis et fabricae II. 15. esse cauos II. 281. III. 211. num solidi et chordarum elasticae in modum tensi III. 211. IV. 195. num chordarum ad instar tremant et ocillant II. 259. ad tensionem sustinendam non medulla sed tunica neruum inuestiens apta est IV. 195. pressus resistentiam insignem digito tangenti obicit IV. 197. actio neruo impressa per eum propagatur ib. quae contra istam sententiam de tensione neruorum possint moneri IV. 197. refutatio ib. et sqq. SANTORINI argumentum contra istam sententiam debilitatur IV. 199. eos relaxari potius, alii affirmant IV. 200. eos causam esse voluntarii motus sed non unicam II. 274. quod ligaturae eorum demonstrant II. 277. eorum robur et actio minui potest III. 174. numerus eorum in iunioribus animalibus grandis est IV. 211. ii dextri lateris saepius potiores I. 143. II. 13. eorum paria, quo tempore primum in foetu distincta appareant II. 13. organa inuoluntaria adeuntes non ex solo cerebello oriri praemisissis quibusdam experimentis concluditur IV. 121. amant in diuicatione angulum recto minorem I. 65. IV. 184. quid de eorum ramificatione iudicat PALFIN I. 23. ratione longitudinis considerati IV. 181. cur maior sit extra cranium et spinae thecam IV. 188. qualis structurae e gangliis egressi nerui

sint I. 22. MECKELII atque ZINNII hac de re sententia I. 22. quomodo eorum trunci ramos dispergant? I. 23. eos succum naturae peculiaris aduehere VAN DER HAAR opinatur IV. 205. num theoria de vi neruorum nutriente in Veterum scriptis inueniatur IV. 205. qui hac de re scripsit auctor IV. 206. BOERHAAVII sententia IV. 207. eius consensio cum illa theoria vix ex verbis suis concludi potest IV. 208. alio loco huic opinioni accedere videtur IV. 209. ubi vero vascula non neruos intelligit ibid. igitur neruis nutritionis munus non tribuit IV. 209. argumenta quae possint proferri ad istam sententiam tuendam IV. 211. et quae possint in uniuersum contradici IV. 247. — eorum ganglia I. 18. horum notio vera et historia apud incisores I. 19. 1) veterum opinio I. 20. sqq. unde eorum color rubellus I. 21. reliqua de gangliis vid. *ganglion*. — eorum imperium in vascula minima IV. 249. in arterias III. 24. cum valis transitum ad ganglion parant I. 64. insignem habent circuli sanguinis mutandi potestatem III. 258. de neruis ligatis experimenta II. 273. — eorum passiones anne potius ad humorum, igitur ad valorum morbos referendae sint III. 183. eorum theoria nimis manca adhuc est IV. 321. sola inertia destruuntur I. 143. in cholericiis eorum principia solida, dura etc. sunt II. 16.

Neurica cephalalgia III. 315. eius species, spudastica et aliae III. 315. sqq.

Neuropathia a materia acri neruos irritante III. 182.

Nictitatio palpebrae in hemicrania II. 299.

Nodus cerebelli II. 44.

Nonus capitis neruus ANDERSCHII vid. *va-gum par*.

Nonus neruus s. *nonum par* I. 279. GALENI de eo sententia I. 279. ut et aliorum sc. AL. BENEDICTI I. 280. SYLVII ibid. FERNELII et REALD. COLUMBI I. 281. B. EUSTACHII I. 282. VID. VIDII ibid. CASP. BAUHINI; A. LAURENTII I. 282. I. CASSERII I. 283. TH. WILLISHI I. 283. G. RIVAE I. 284. WINSLOWII I. 285. CHESELDENII ib. AL. MON-ROI



ROI I. 286. A.F. WALTHERI ib. HAL-  
LERI; BONHOMMI I. 287. ANDER-  
SCHII ib. ROL. MARTINI I. 288. DA-  
GOTII; SABATIER ib. — eius synony-  
ma I. 289. 290. eius origo I. 292. fila-  
menta eius in plures fasciculos coeun-  
tes I. 293. quatuor filamentis composi-  
tum est I. 12. variae de eius usu sen-  
tentiae I. 300. quae quidem reiciun-  
tur I. 301. propagines eius non ad su-  
perioiorem linguae tunicam perueniunt I.  
302. sq. confert ad vocem acutiores  
reddendam I. 304. eius utilitas in lo-  
quela I. 305. et insignis in masticatio-  
nis et deglutitionis usu ib.; morbi ab eo  
pendentes I. 305. in piscibus eximiae  
magnitudinis est III. 152. ex latere in-  
terno nervi octavi surculum nervaeum ac-  
cipit I. 295.

Notalgia IV. 77.

Nutritio quid? IV. 202. de vero, quo  
fit, modo dissensus ib. non in omni vi-  
tae stadio eodem modo fit IV. 202. quo-  
modo fiat in foetu IV. 203. nervosa  
quid? IV. 204. adde hic pauca quae sub  
articulo *nervus* de eorum vi nutriente  
dicta sunt. — perit in artu, cuius ner-  
vus vulneratus est IV. 214. 220. 5) hu-  
ius theoriae adversarii IV. 217. quae in  
VAN DER HAAR hypotheseos fauorem  
adhuc commemorari possunt IV. 224.  
eius explicatio totius hypotheseos IV.  
214. et argumenta probantia IV. 215.  
quae fuerunt antiquiorum principia hac  
de re IV. 213. quae contra dici possint  
IV. 247. per sanguinem nutritio fit, cui  
materies nutrititia inest IV. 249.

Nyctalopia a vermibus IV. 217. ab asca-  
ridibus IV. 282.

## O.

*Oblongata medulla* I. 326. II. 31. IV. 71.  
spinalis nomen accepit in cavitatem in-  
ter vertebrae continuata I. 326. summus  
corporis humani nervus IV. 81. eius  
inuolucra I. 13. eius pars media angus-  
tior IV. 82. divisio FROTSCHERI ibid.  
eius longitudo varia IV. 80. substantia  
medullaris externa IV. 81. corticalis  
interna ibid. subalbida modo hic modo  
illis conspicitur IV. 81. ad primam dun-

taxat vertebram lumborum pertingit III.  
89. in eam sedem animi quidam posue-  
runt IV. 109. morbi et symptomata ex  
illius laesione IV. 81. a laesione globu-  
lo plumbeo in homine sanata IV. 117.

Obstructio alui, causa cephalalgiae IV. 269.  
causa hysterici et hypochondriaci mali  
II. 308. in visceribus non raro nervoso-  
rum morborum causa II. 302.

*Occipitalis nervus magnus* ramus *cervicalis*  
*secundi* I. 34. 18) IV. 46. parvus I. 34. 26)  
IV. 32. 36.

*Occipito-auricularis nervus*, ramus tertii  
*cervicalis* IV. 36.

*Oftaum* par vid. *vagum nervum*.

*Oftaum* par *cervicale* III. 348.

*Oculomotorium* par s. par tertium *encephali*  
II. 9. 73. eius synonyma I. 41. eius or-  
tus descriptio I. 41. variae hac de re  
opiniones II. 73. vera eius origo in  
eminentiis candicantibus et pontis sul-  
cis II. 73. fibris numero variantibus  
constat II. 74. quid prorsus singulare  
habet II. 75. in basi encephali cum op-  
ticis sese decussat I. 42. vasculis sangui-  
feris amicitur ibid.

*Oculomotorium* par *secundum* BIPLOOI vid.  
*trochlearem nervum*.

Oculus, eius tumor in hemicrania II. 299.  
eius morbi consensuales IV. 278. a col-  
luvie primarum IV. 278. eius inflam-  
matio viarum ibid. eius morbi curatio  
vitiis in abdomine latentibus difficilior  
redditur IV. 280.

Odontalgia I. 198. \*) saepius ex abdomi-  
ne originem ducit IV. 299. ex ventri-  
culo non semper emeticis et purgantibus  
tollitur IV. 300. a stasibus sanguineis ib.  
in ea deglutitio difficilis III. 26.

Odores, eorum in reficiendis viribus effe-  
ctus I. 224. cur interdum gustum quo-  
que excitant I. 232.

Odoratus quibus partibus inprimis tribuen-  
dus IV. 15.

Oesophageus circulus, constans ex nervis  
recurrentis et vagi II. 136.

Oesophagus, unde accipit nervos III. 117.

*Olfactorium* s. primum par *nervorum cere-*  
*bri* I. 7. II. 9. eius origo I. 32. 1) 33.  
108. \*) I. 122. eius origo a variis diuersi-  
mode indicata II. 51. 52. duabus fibris  
medul-

- medullaribus et tertia propagine cinerea e fossa Sylvii venit II. 53. eius forma prismatica II. 54. in bulbum cinereum dissolvitur II. 56. in embryonibus crassitudine omnia reliqua paria superat II. 10. 54. eius substantiae cinereae magna tribuitur vis I. 34. eius synonyma II. 47. 48. in auctoribus graecis et aliis nihil fere inuenitur I. 110. usque ad VESALII tempora I. 112. sententia aliorum I. 114. et sqq. palmae in modum ramuli se diffundunt I. 35. peculiaris in foetu habitus I. 35. in foetu praematurum iam perfectus II. 51. peculiaris eius sub anterioribus cerebri lobis incessus I. 8. per foramen cribrosum tendens multis vasculis comitatur, hinc observationes pathologicae I. 36. in osse cribriformi intumescit in conicam papillam I. 34. rore humectatur vasculorum in transitu I. 35. in animalibus diuersum inuenitur I. 123. peculiaris eius compositio ex cortice et medulla I. 108\*) 124. num peruium sit II. 58. subtilius sulcatum esse transuersa sectio docet II. 59. usus huius structurae II. 60. eius vasa comitantia ib. in aethiopibus ib. repetitio eorum; quae notanda de eo veniunt II. 60. eius circumferentia triangularis II. 15.
- Olfactorium* par DIEMERBROEKII I. 155.
- Olfactus*, cui ministrat par quintum ramis suis I. 231.
- Oliuaria corpora* II. 44.
- Oliuare ganglion* s. *cervicale supremum* II. 246.
- Oncothliptica cephalalgia* III. 303.
- Operimentum cerebri* GALENI I. 4.
- Ophthalmia cum cacochyliarum arte cohaerens* IV. 278. vid. *oculorum morbos*.
- Ophthalmicae arteriae*, earum nervi III. 27. et usus III. 29.
- Ophthalmicum ganglion* I. 158.
- Ophthalmicus frontalis* i. q. *ophthalmicus nervus*.
- Ophthalmicus nervus* III. 27.
- Opisthotonus emeticus sanatus* IV. 338.
- Opium*, cordis vires non exstinguens III. 11. 13. maiori dosi vertiginem creat IV. 307.
- Opticus nervus* I. 8. II. 9. 61. s. *viforius* I. 36. eius synonyma II. 61. eius ortus I. 36. de eius origine variorum sententia II. 61. 62. sqq. ex hippocampi pede originem trahere qui contendunt? I. 38. ex taenia semicirculari tres vel quatuor radículas accipit I. 38. num cauus sit II. 70. SCHACHERI ingeniosum experimentum super hac re II. 71. quomodo diffensus ille componi possit? II. 71. nec spongiosum est ib. vasa huius nervi sanguifera II. 72. in sepia in ganglion crassescit ib. de eorum coniunctione I. 132. eius decussatio I. 38. 127. II. 64. III. 153. plures Veteres crediderunt decussationem I. 133. negatur a CL. PFEFFINGER I. 39. eos tantum inter se cohaerere ib. sed pathologia priorem sententiam sustinet II. 66. observationes hac de re in animalibus factae I. 133. in sciuro I. 134. in equo I. 135. in suis ib. in canibus I. 137. in fele ib. in homine I. 138. sqq. alii ex parte decussationem statuerunt II. 66. utilitas huius coniunctionis I. 141. II. 67. e laminis cerebri complicatum in piscibus sed non in homine II. 69. 70. ab origine usque ad exitum e cranio meninge sua cingitur I. 40. vasa in eo observantur copiosissima ibid. eorum *thalami* I. 36. eius *circumferentia ovalis* II. 15. cinereum et multo muco repletum post caecitatem III. 78.
- Orbicularis ciliaris oculorum unde nervos suos petat?* I. 176.
- Orbitarius nervus* I. 250.
- Organa secretoria lacrymarum afficiuntur spasmis abdominalibus* IV. 283.
- Orgastica cephalalgia* III. 308.
- Os*, eius diductio in inflammatione diaphragmatis I. 226.
- Oscillatio palpebrarum apud hypochondriacos* IV. 284.
- Ossa*, eorum substantia num sensu praedita IV. 258. in carie saepe sensu praedita est IV. 461. eorum sensibilitas IV. 255. num nervos habeant? IV. 255. 256. in nonnullis locis usque ad ossa deduci possunt ib. inprimis in artubus IV. 257. sine doloris sensu praecidi possunt III. 191. ab aliis iis sensus tribuitur III. 192. eius medulla vid. *medulla ossium*.



Officulum sesamoideum inter laminas du-  
rae matris I. 269. 1)  
Osteoclastica cephalalgia III. 305.  
Osteophymatica cephalalgia III. 305.  
Ouis, unam tantum eminentiam candican-  
tem habet inter crura cerebri. II. 33.

## P.

- Pachyaemica cephalalgia* III. 310.  
*Palatinus nervus* I. 182. 190. diuisio eius  
in ramum posteriorem minorem I. 192.  
et minimum anteriorem I. 192. ramus  
nervi VIDIANI III. 31. eius retia circa  
vasa III. 32.  
*Palato-pharyngeus nervus* III. 50.  
Pallor cutis unde? IV. 350. faciei comes  
variorum affectuum unde petendus? I.  
225.  
*Palmaris nervus* III. 142.  
Palpebrae, earum musculi afficiuntur irrita-  
tis nervis abdominalibus IV. 284. ea-  
rum oscillatio apud hypochondriacos ib.  
*Palpebralis nervus* inferior I. 197. non ita  
constans est I. 198 1). exterior interior  
I. 198.  
Palpitatio subsequente morte IV. 368-33).  
Papillae labii superioris, quarum fabrica  
III. 33. et usus III. 34. — linguae ori-  
untur quinti paris ramo linguale I. 302.  
*Papillares processus* II. 33.  
Paralysis descriptio II. 320. eius causae  
II. 320. III. 239. quid in ganglii doctri-  
nam arguit I. 86. unde provenire pos-  
sit III. 178. sequitur affectus catarrha-  
les III. 181. — consensualis IV. 321.  
a vermibus, a mensium subita suppres-  
sione IV. 322. a terrore IV. 375. a  
pure in thorace III. 87. ex moerore de-  
bili IV. 367. ex innumeris seque diuer-  
sis causis inducitur IV. 390. oritur ad-  
verso corporis latere, laeso alterutro I.  
128. exemplum ab HIPPOCRATE rela-  
tum ib. quae ab aliis hac de re defi-  
gnata I. 129. linguae in ebrietate III.  
26 \*).  
Paraphrenitis, eius symptoma I. 226. eius  
cum phrenitide comparatio II. 305.  
num recte inflammationi diaphragmatis  
tribuatur IV. 325.  
*Paraplegia*, in qua omnes nervi infra lo-  
cum laesionis ex medulla spinali produ-  
cti, resoluti I. 63.  
*Parenchyma*, huius infirma Veterum theo-  
ria IV. 226.  
*Paria nervorum*, quorum numerus II. 8. 9.  
*Pathemata animi* externis se produnt signis  
III. 252. eorum signa IV. 347. vid. et  
*affectus*.  
*Pathematica apoplexia* vid. *apoplexiam*.  
*Pathetica species neuriticae cephalalgiae*  
III. 315.  
*Pathetici nervi* II. 9. 77.  
*Pedunculi crurum cerebri* II. 32.  
Πεπασμος quid? III. 285.  
Πεψις quid? III. 285.  
Perceptio? quomodo fiat in mente III. 251.  
*Perforans Casserii* vid. *musculo-cutaneus*  
*nervus*.  
*Pericranium*, num nervos habeat IV. 161.  
ad sensilissimas partes refertur III. 194.  
ab aliis negatur III. 195. 196.  
*Periostium sensu praeditum* contenditur  
III. 194. ab aliis negatur III. 195. 196.  
observatio, qua demonstratur id sensu  
destitutum esse IV. 160.  
*Peroneus nervus* IV. 98.  
Perspirabilis materia indole sua non nocet  
III. 265.  
Perspiratio, de qua SANTORINI et aliorum  
observationes III. 263.  
*Peritoneum sentiendi facultate caret* IV.  
167. experimentis in animalibus brutis  
demonstratur IV. 167. aliorum obser-  
vationes IV. 168. nervi solum per eius  
superficiem migrant IV. 169.  
*Pes anserinus gallorum* I. 201.  
*Pharyngeus nervus* II. 236. III. 49. pri-  
mus II. 126. secundus II. 127. ex  
VIDIANO eius origo III. 50. ex pala-  
tino nervo anteriori hinc palato-phar-  
yngeus ib. diuisio ramorum III. 58.  
— inferior III. 59. binis fontibus in-  
tercostali et vago ortus ib. — ex gan-  
glio ceruicali superiore et inferiore III.  
62.  
*Phaenomena experimentorum GALVANI*  
quomodo a Cl. MUELLERO declarentur  
IV. 178. cum canibus institutorum va-  
ria ratione vid. *experimenta*.

- Phocaena Delphinus, observatio in ea de fibris ad facialem accessoriis II. 94.
- Phlegmaticum temperamentum quid? IV. 348.
- Phrenicus nervus IV. 52. eius origo III. 113. variat admodum origine IV. 54. in sinistro latere IV. 56. eius cum intercostali coniunctio III. 113. cum intercostali et plexibus vicinis abdominis coniunctio I. 346. operosa est eius disquisitio III. 115. duplex in latere dextro ib. et 116. ratione longitudinis consideratur IV. 187.
- Phrenitis II. 303. causa eius nisi semper, tamen frequentissime in abdomine latet. II. 304. eius symptomata ib. a musca curata III. 376. in ira IV. 377.
- Phrudus Hippocratis III. 282.
- Physiognomia, eius studium unde egredi debet I. 263. continet in genere signa externa affectuum IV. 350.
- Pia mater s. pia menyux I. 4. in intimos cerebri recessus producitur ib. nervos ubiuis comitatur I. 5. papillam nervaeam formare iuvat in tunica SCHNEIDERIANA I. 8. variorum opiniones de eius divisione in orbita I. 9. tegumentum medullae spinalis I. 326. IV. 77. eius vasorum rete IV. 77. nullo sensu gaudet IV. 162. quod multis experimentis probatur ib. et sqq. non potest adeoque esse doloris capitis causa IV. 163.
- Pinealis glandula, eius descriptio III. 323. IV. 9. et synonyma III. 323. in feminis maior III. 324. totam semel excavatam inuenit Cl. SÖMMERRING III. 324. num unquam defuerit III. 325. in brutis distincte cernitur III. 325 7). eius calculosa grana a lymphâ stagnante deriuat Cl. MECKEL IV. 9. CARTESIO animi sedes III. 322. huius hypotheseos impugnatores III. 322 1). in ea semper acervulum adesse III. 323.
- Piniiformis glandula i. q. pinealis glandula.
- Pisces, eorum neruorum opticorum decussatio I. 134. quorum cerebrum auium simile IV. 113.
- Pituita, causa morborum nervosorum II. 303.
- Pituitaria glandula III. 153. semper solida inuenta ib. in multis animalibus maior quam in homine III. 154 \*). materia turbida repleta III. 178.
- Pituitosa cephalalgia III. 311.
- Plethora grauiatua ad vires III. 174. vasorum abdominalium frequens causa convulsionum IV. 340. causa cephalalgiae IV. 275.
- Plethorica cephalalgia III. 307.
- Pleura IV. 164. non tanta sentiendi facultate pollet ac pars muscularis et cutis externa IV. 164. experimentis probatur in catulis, haedis etc. IV. 165 sqq. nervi non intrant sed superficiei eius instrati sunt IV. 166.
- Pleuritis, eius dolores sedem in pleura habere non possunt IV. 166. quos in sanguinis inflammatione ponit CASTELL IV. 167.
- Plexus choroidaeus laceratus post convulsionem III. 178.
- Plexus nervi in minoribus canaliculis in primis locum habent III. 34. eorum utilitas, ut nervi longiores producerentur IV. 184.
- aorticus anterior II. 192. posterior II. 198.
  - cardiacus I. 88. superficialis II. 246. secundus II. 249. posterior ib. eius repraesentatio dubia et difficilis est, propter vasa absorbentia ibi numerosissima III. 42.
  - carotidis arteriae superficialis III. 166.
  - cervicales III. 106.
  - coeliacam circa et mesaraicam arteriam III. 110.
  - colli lateralis superior II. 178. colli medius II. 161. huius rami emissi II. 162. 163.
  - dorsales III. 106.
  - excretorium circa ductum III. 26. eiusmodi exempla ib.
  - gangliiformis III. 81.
  - gastricus anterior IV. 60.
  - hepaticus, eius ortus III. 80. finis s. minor IV. 60.
  - infraorbitalis I. 202.
  - lumbares III. 106.
  - mesentericus III. 80.



- Plexus oesophageus* III. 117.  
 — ophthalmicae artericae III. 29. eius-  
   que usus ib.  
 — pulmonalis III. 81. 117.  
 — palatini nervi circa vasa in gingiva  
   III. 32.  
 — renalis III. 80.  
 — semilunaris II. 297. IV. 65. fabri-  
   ca differt in diuersis subiectis IV.  
   cur abdominale cerebrum dictum  
   fit IV. 69.  
 — solaris III. 80.  
 — splenicus III. 80.  
 — tonsillares II. 118.  
 — vertebrales circa arterias III. 46.  
   47.  
 — volaris nervi rami superficialis ra-  
   dialis circa saluatellam venam III.  
   137.  
*Plicaturae cerebri* II. 24.  
*Podagra* verum, cum conuulsionibus inci-  
   piens a nervorum muco corpore oriri  
   videtur IV. 216. commemorata uberius  
   urgentur IV. 245.  
*Pollex*, eius nervus volaris III. 131. ulna-  
   ris ib.  
*Polypus* IV. 368 30). quomodo metu ori-  
   ri possit IV. 370. a terrore IV. 374.  
*Polyposa cephalalgia* III. 304.  
*Pons cerebelli* s. VAROLII II. 44.  
*Poplitei nervi* erosi II. 178.  
*Porcus*, eius cerebrum ratione magnitudi-  
   nis et ponderis aestimatur III. 159. eius  
   intercostalis et ganglion huius nervi com-  
   parantur ib. 161.  
*Ποροι*, cur nervi optici ita nominati sint II.  
   70.  
*Portio dura nervi auditorii* vid. *facialem*  
   nervum; *mollis* vid. *auditorium nervum*.  
*Praecordialis apoplexia* vid. *apoplexiam*.  
*Praecordia*, eorum vitia sequuntur narium  
   haemorrhagias IV. 267.  
*Praedispositio ad febrem* III. 266. differt  
   pro diuersa subiectorum natura ib.  
*Primae viae causae* malorum frequentes II.  
   297. ex vi venenorum II. 300. earum  
   colluies causae spasmodorum maxillae  
   infantum IV. 306.  
*Primum par nervorum* vid. *olfactorium ner-*  
   vum; — GALENI I. 36. 37.  
*Primum par cervicalium nervorum* s. *medul-*  
   lae spinalis vid. *cervicales nervi*.  
*Processus cerebri singularis medullofus* a  
   SÖMMERRINGIO inuentus et de-  
   lineatus I. 144. tendens ad  
   nares vid. *olfactorium nervum*.  
 — cerebelli II. 43. 44.  
 — enteroides cerebri II. 24.  
 — mammillares I. 109. 115.  
 — medullares II. 31.  
 — papillares I. 109. 115.  
*Productiones procerae* vid. *olfactorium ner-*  
   vum.  
*Profundus nervus colli medius* IV. 41.  
*Propugnaculum cerebri* GALENI I. 4.  
*Prora cerebri* II. 23.  
*Protensiones glandulares* ORTLOBI II. 33.  
*Protuberantia annularis* WILLISH II. 44.  
   a medulla oblongata a quibusdam sepa-  
   rati IV. 80.  
*Protuberantiae glandulares* PETRIOLI II.  
   33.  
*Pruritus in naribus a vermibus* IV. 285.  
*Psytica cephalalgia* III. 310.  
*Pterygoideus nervus* I. 203 2). III. 73. ra-  
   mus gustatorii nervi I. 208. ramus ner-  
   vi VIDIANI III. 31. eius progressus III.  
   74. prerygoideus WINSLOWII I. 102.  
*Pterygo-palatinum foramen* I. 190 5).  
*Ptyalismi consensuales*, colicis spasmodicis  
   se adiungunt IV. 302.  
*Πυελον* vid. *Infundibili synonyma*.  
*Pudor* IV. 355. effectus IV. 372. mors  
   exinde IV. 373. vid. et *rubor faciei*.  
*Puer*, cuius historia morbi, dentientis et  
   diarrhoea viridescencia copiose profun-  
   dientis IV. 298.  
*Pulmonarii nervi* dextri I. 196.  
*Pulmones*, obscure tantum afficiuntur III.  
   207.  
*Pulsus irritationis*, non criticus, conuulsi-  
   vus nervosus III. 288. vibratus III. 289.  
*Punctum saliens* III. 11.  
*Puppis cerebri* II. 23.  
*Pupilla*, eius coarctatio et dilatio unde  
   petenda I. 233.  
*Purgantia eorum abusus* III. 290 2).  
*Purulenta metastasis*, causa apoplexiae IV.  
   393.  
*Πυελος* i. q. *Infundibulum*.  
*Pyramidalia corpora* II. 45.

## Q.

*Quantum par* I. 346. tertio adiungit VESLINGIUS I. 151. COLUMBI videtur esse maxillaris noster inferior III. 64. vt et BLASII quantum par ad ramos *quinti paris* pertinent I. 154. num in sinu cauernofo positum I. 94 4). NICOLAI MASSAE I. 148.

*Quartus brachialis nervus* VESALII i. q. *radialis*.

*Quartus crassissimus nervus* DIEMERBROECKII i. q. *radialis*.

*Quintum par* BENEDICTI II. 81. MASSAE ibid.

*Quintus nervus brachialis* VIEUSSENSII i. q. *radialis*.

## R.

*Rachitis* a Cel. VAN DER HAAR ad cerebri neruorumque morbos refertur IV. 207. eius diiudicatio IV. 246.

*Radialis nervus* MONROI III. 126.

*Radialis nervus* eiusque synonyma III. 132. omnium brachii neruorum crassissimus III. 133. eius ramus *subcutaneus internus* III. 133. eius diuifio in *superficiale* et *profundum* III. 134. prioris diuifio in *volarem* et *dorsalem* ib. posterioris rami *interosseus externus* et *muscularis* I I. 135.

*Raia*, in qua decussatio neruorum opticorum obseruata I. 133.

*Raia* clauata, cuius quintus nervus I. 220 \*).

*Raia torpedo*, eius vis in electricitate ponitur IV. 178.

*Rana esculenta*, eius corpus, cerebrum etc. ratione ponderis, consideratum III. 160.

*Raphania* quae sit? II. 311.

*Recurrentes nervi* II. 246. colli II. 135. eius rami II. 136. ad tracheam 5 — 6 ramos dat II. 137. vid. et *accessorius nervus*.

*Refrigeratio* frequentissima febrium causa III. 263. saepe lethifera III. 265.

*Renes* sensum habent doloris III. 208. irritari posse sine doloris sensu alii contendunt IV. 255.

*Retia* neruorum circa venas in brachio III. 142.

*Reticulum paris quinti* i. q. *armilla*.

*Retina* plexiformis in cuniculo II. 72.

*Rimula* TARINI inter corpora pyramidalia II. 108.

*Rifus sardonius* in paraphrenitide I. 226.

*Rhevmatica cephalalgia* III. 312.

*Rubor faciei*, comes variorum affectuum unde deriuandus I. 225. in iis, quibus alius dura et viscera obstrueta IV. 297.

## S.

*Saburra* primarum viarum causa melancholiae II. 316. stomachalis causa cataleptis II. 321. in ventriculo, exinde physiognomiae mutationes et musculorum faciei lufus et agitatio III. 39.

*Saliales glandulae*, earum affectus consensuales IV. 301. earum ductus Ste-noniani III. 41.

*Saluationes sympathicae* a stimulo intercostalis ramis abdominis applicato IV. 301. a vermibus ib.

*Sanguinea cephalalgia* III. 306.

*Sanguineum temperamentum* IV. 348.

*Sanguis* ad encephalum latus num diuersae indolis III. 215. arteriosus rubicundior II. 278.

*Sarcophymatica cephalalgia* III. 305.

*Scabiola cephalalgia* III. 313.

*Scirthus mammae* a solo terrore IV. 249. in cerebello puellae IV. 123. extirpatus recrudescens ob statim humorum IV. 368. pylori cum symptomate abundantiae salinae IV. 301.

*Sciurus*, cataracta laborans I. 134. unam tantum inter cerebri crura eminentiam candicantem habet II. 33.

*Scorbutica cephalalgia* III. 313.

*Scotomia* a vermibus IV. 281. peculiaris a Cl. ALBRECHT obseruata IV. 283.

*Scrophulosa cephalalgia* III. 313.

*Scyphus* i. q. *infundibulum*.

*Secretiones glandularum*, compressis earum neruis imminuitur III. 246. absorptiioni proportionatae IV. 232.

*Secundum neruorum par* vid. *opticus nervus*, *Secundus nervus colli* II. 179.

*Semilunare ganglion* I. 74. III. 79.

*Sensatio*, quam via ad cerebrum perueniat



- niat III. 233. HALLERI hac de re sententia III. 234.
- Sensorium* num sensus in eo percipiatur III. 251. sponte non agit III. 252.
- Sensibilitas eius fons in nervis quaerendus II. 285. non solum gradu sed etiam pro ratione nervorum differt II. 301. eius et irritabilitatis limites IV. 252. conubium earum arctissimum III. 245. 246. diuersis se prodant phaenomenis III. 246. telae cellulosa IV. 254. in variis indiuiduis diuersa III. 262. praeternaturalis in intestinis, causa cephalalgiae IV. 273.
- Senfiles corporis hum. partes quae sint III. 186.
- Sentina encephali* i. q. *infundibulum*.
- Septimum par nervorum* I. 12. ex ipso ventriculo quarto originem ducens IV. 113. ex duobus distinctis nervis constat I. 50. vid. *auditorius nervus* et *facialis*.
- Septimum par nervorum cervicalium* III. 348.
- Serosa cephalalgia III. 311.
- Serosae excretionis suppressae causa apoplexiae IV. 393.
- Sesamoideum osseculum inter laminae durae matris I. 269. 1)
- Sextum par* I. 11. II. 86. III. 93. eius synonyma I. 47. eius origo I. 48. ex duabus portionibus conflatum hunc nervum vidit Cl. PFEFFINGER I. 49. fibrae eius cinerae III. 54. inter sinus cauernosus I. 248. crassior sit ramo ab intercostali accepto III. 94.
- Sextum par cervicalium* IV. 347. eius ramuli admodum absconditi II. 184.
- Sextus nervus Fallopii* I. 66.
- Silurus Glanis, eius corpus et cerebrum ratione magnitudinis aestimatur III. 160.
- Singultus, quomodo oritur III. 179.
- Sinus* s. interstitium relictum a fibris nervis septimi paris I. 53. maxillares eorumque obstrukciones I. 198. \*) cauernosus I. 96. *Ridleyanus* I. 96. transversus I. 96. 2)
- Sitis, consensualis affectio IV. 305. a spastica constrictione in emissariis glandularum ib.
- Sopor consensualis IV. 314. a narcoticis, a vermibus quomodo excitatur IV. 321.
- Spasmi abdominales organa secretoria la-  
*Ludwig script. neur. min. T. IV.*
- crymarum afficiunt IV. 283. in abdominis visceribus ab inflammatione gignuarum IV. 298. infimi ventris cum dentium affectione coniuncti II. 270. abdominales in hypochondriacis sputa frequentia gignunt IV. 302. in parturientibus paralytin creant IV. 322. faciei I. 198. \*) maxillae inferioris vid. *Trismus*.
- Spasmodici morbi, quomodo declarandi I. 27.
- Spes IV. 355. quae ei competunt vires IV. 361.
- Sphacelus pedis IV. 368. 33)
- Sphaericae prominentiae* II. 24.
- Sphenopalatinum ganglion* I. 182. 3)
- Sphenopalatinus nervus* WINSLOWII I. 75.
- Spina bifida incompleta IV. 81.
- Spinalis medulla* vid. *oblongata medulla*.
- Spinales nervi* IV. 52. 82. eorum notae II. 8. conueniunt origine IV. 83. eorum radices differunt longitudine IV. 84. differunt a cervicalibus I. 329. eorum structura flavescentes I. 13.
- Spirae cerebri* II. 24.
- Spiritus animales III. 209. 211. eorum theoria IV. 213. variorum sententia III. 210. instrumenta per quae obiecta in sensorium propagantur III. 211. num ista hypothesis cum phaenomenis motus congruit III. 229. parum huic fauere videntur experimenta HALLERI III. 230.
- Splanchnica cephalalgia diuiditur in hepaticam III. 318. splenicam, nephraligicam, hysterica III. 319.
- Splanchnicus nervus* III. 79. 109. IV. 61. ortus eius in colli regione comprobatur III. 120. prima radice a ganglio thoracico sexto venit IV. 64. *superior* IV. 52. et *inferior* IV. 53. ramus eius minor et maior IV. 66. *sinister* IV. 67.
- Splen irritari potest sine doloris sensu IV. 255.
- Spudastica species neuricae cephalalgiae III. 315.
- Sputa, num in febribus certa sunt III. 284.
- Squalus, in quo decussatio opticorum nervorum obseruata I. 133.
- Squalus Catulus, eius quintus nervus I. 220. \*)

- Stases sanguinis in abdominis visceribus  
 causa odontalgiae IV. 300.  
 Stationariae febres III. 272.  
 Steatoma, causa apoplexiae IV. 394.  
 Stenonianus ductus plexibus neruorum cir-  
 cumductus III. 26.  
 Stereoticae cephalalgiae sunt vel exoticae  
 III. 300. vel inquilinae III. 302.  
 Stereoelectrica species neuricae cephalal-  
 giae III. 316.  
 Sternocleidomastoideus, unde accipit ner-  
 vos suos II. 236.  
 Sternutatio, unde optimo iure deriuanda  
 I. 223. ex visu obiecti fortioris I. 232.  
 ex irritamento viscerum IV. 286.  
 Stillicidium narium in hemicrania II.  
 299.  
 Stimuli, quorum effectus variant secundum  
 differentiam et constitutionem partium  
 III. 262.  
 Stramonium, mydriasin excitare potest IV.  
 257.  
 Stranguria, a tensione et inflammatione  
 gingiuarum IV. 298.  
 Strix ulula, eius corporis et cerebri pon-  
 dus III. 160.  
 Styptica cephalalgia III. 310.  
 Subcutaneus nervus colli IV. 32. *medius*  
 IV. 38. et eius rami IV. 39. *profun-*  
*dus* IV. 40.  
 Subcutaneus nervus malae I. 180. 255. III.  
 33. eius anastomosis cum nervo lacry-  
 mali I. 180. semper fere adest I. 181. 4)  
 Subcutaneus scapulae IV. 40. — *internus*  
 ex radiali III. 133. ex cubitali IV. 137.  
 Sublimis nervus ramus volaris ex cubitali  
 III. 138.  
 Sublingualis i. q. *hypoglossus* nervus I. 290.  
 Sulci cerebri II. 24. in parvis quadrupe-  
 dibus raro inveniuntur ib. nervo dicati  
 II. 29. primo nervo dicati arachnoidea  
 supertensi II. 55.  
 Superficialis nervus colli I. 346. 40) II.  
 246. nati III. 33. ramus frontalis ner-  
 vi vid. *frontalis nervus*; scapulae I. 346.  
 minor Vidiani I. 184.  
 Supraclavicularis nervus communis IV. 40.  
 Suprascapularis nervus I. 347. 70)  
 Supratrochlearis nervus I. 169.  
 Suppressio mensium, hinc paralytis IV. 322.  
 lochiorum, inde tetanus IV. 340.  
 Suppuratio cerebri, causa apoplexiae IV.  
 393. in sinu frontali IV. 386.  
 Sordi nati, cur sint plerumque simul muti  
 I. 232.  
 Surditas unde producta II. 5.  
 Suturalis cephalalgia III. 302.  
 Sympathia neruorum vid. *consensus*.  
 Sympathicus nervus I. 264. II. 297. eius  
 initium a multis radiculis I. 53. brevis  
 descriptio huius nervi III. 90. iam an-  
 tiquitus notus III. 90. 91. quid GALE-  
 NUS de eo profert III. 91. origo eius a  
 variis vario modo indicatur II. 92. PE-  
 TITI sententia III. 92. 93. cui IWANOFF  
 accedit III. 94. eius origo ex *Vidiano*  
 dubia III. 96. quid a colore concludi  
 possit III. 97. integumenta originem  
 eius a quinto et sexto nervo diducere  
 non sinunt III. 97. argumentum a *gan-*  
*glio cervicali* primo petatum III. 98. ab  
 insertionem III. 99. experimentum de  
 cooperatione huius nervi in visus organo  
 III. 100. WINSLOWII sententia III. 101.  
 HALLERI obiectiones III. 101. 1) eius  
*ganglion cervicale* superius I. 238. 60)  
 intra canalem caroticum nullum eius *gan-*  
*glion* reperitur I. 238. 1) variat in pri-  
 mis in sinistro latere II. 245. in parte  
 cervicali in duos ramos diuisus II. 247.  
 in dextro latere II. 250. in animantibus  
 III. 154. eius magnitudo in nonnullis  
 animalibus in tabulam redacta III. 161.  
 ex primo *ganglio* thoracis eductus II.  
 186. in secundum demissus II. 187. —  
*maximus* II. 163. IV. 52. 61. eius pro-  
 gressus ib. 180. sqq. in ganglia intu-  
 mescit IV. 62. 63. rami ex gangliis pro-  
 gressi IV. 64. qui plexum femilunarem  
 formant IV. 65. — *medius* WINSLOWII  
 i. q. *vagus par*; — *medius* VRISBER-  
 GII et *parvus* WINSLOWII i. q. *facialis*  
*nervus*. conf. et *intercost. nerv.*  
 Symphoretica cephalalgia III. 308.  
 Symphytica cephalalgia III. 305.  
 Symptomata apoplexiae IV. 406. eorum  
 medela ib. et 407.  
 Syncope, quomodo oritur III. 177. quo-  
 modo hoc morbo correpti resuscitari  
 possint I. 224.  
 Syphyilitica cephalalgia III. 313.  
 Syzygia neruorum s. *συζυγία* II. 8. *τρίτη*  
 II. 82.



- II. 82. ad tubercula papillaria narium  
III. 63. tertia AL. BENEDICTI I. 245.

## T.

Tabes dorsalis IV. 216. eius diiudicatio IV. 246.

Tabula ANDERSCHII initium *cardiacorum nervorum* sinistri lateris continens II. 199. Tab. V. et V. A.

— Cl. ASCHII exhibens partem supremam *medullae spinalis* et exinde ortum *nervum cervicalem primum* utriusque lateris cum partibus adiacentibus I. 334 sqq. Tab. VIII. IX. X.

— Cl. BANGII de *nervorum cervicalium* originibus I. 344. Tab. XI.

— Cl. BEHRENDIS *nervorum vasa cordis* concomitantium III. 23. Tab. I.

— Cl. BOEHMERI continens originem *paris noni*, sicuti partes et nervos adiacentes I. 307. Tab. VI. VII.

— Cl. EBELL, exhibens *delineationes cerebri plurium animalium* III. 155. Tab. IV. V.

— Cl. FROTSCHERI *medullae spinalis* tribus figuris exaratae IV. 105.

— Cl. HIRSCHII originis *ramorum paris quinti* cum ganglio s. *intumescencia semilunari* (B. C.) I. 262. Tab. IV.

— Cl. KLINT *nervorum brachii* III. 143. Tab. III.

— LOBSTEINI *nerui spinalis ad par vagum accessorii* II. 239. Tab. VII. VIII.

— I. F. MECKELII propaginum *ramorum paris quinti* I. 235. Tab. II. III. — Figg. II — VI. Tab. secundae continent variantem *sympathici nerui* originem I. 241.

— — — *nervorum faciei* II. 206. Tab. VI.

— — — *ganglii sphenopalatini* atque *nervorum* ibi conspirantium IV. 8. Tab. I. fig. I.

— — — — — quarundam *cerebri* partium ab anteriori parte ad spectarum Tab. I. fig. 2. a posteriori facie fig. 3. IV. 10.

— Cl. PALETTAE exhibens *basin calvariae* et *origines nervorum* in-

primis *crotaphitici* et *buccinatorii* III. 75. Tab. II.

Tabula Cl. PISTERS *nervorum cervicalium* aliorumque *nervorum* et partium in collo conspiciendarum IV. 47.

— Cl. SÖMMERRINGII *decussationem nervorum opticom* exhibens I. 144. Tab. I. — fig. 4. continet singularem *processum medullosum* ab Auctore semel observatum.

— — — *basin cerebri* et *nervorum* *origines* continens II. 104. Tab. I.

— — — eiusdem obiecti, ubi tamen partes paululum diductae sunt ad *nervorum origines* clariores reddendas II. 106. Tab. II. III.

— — — sectionis verticalis *cerebri* ad instructionem maxime idonea I. 110. Tab. IV.

— Cl. VRISBERGII *origines paris quinti* et alias partes adiacentes proferens I. 278. Tab. V.

*Taenia nervosa* MECKELII I. 161. 252.

*Taenia* in virgine et continua deliria exinde IV. 329.

*Tagetes* erecta, patula, ab auctoribus plantis fulgurantibus adnumerata III. 21.

*Talpa*, duas, sicuti homo, habet inter crura *cerebri eminentias candicantes* II. 34.

*Tarantismus* et eius symptomata I. 234.

*Temulenta apoplexia* vid. *apoplexia*.

*Temperamentum*, quid confert ad effectus quosdam facilitandos aut impediendos IV. 347. eius divisio vulgaris a sanguine petita ib. quae reiicitur IV. 348. a quibusnam rebus dependet IV. 349.

*Temporale ganglion molle* II. 172. eius rami II. 174.

*Temporalis nervus superficialis* I. 209. 216 sqq. eius rami profundiores I. 219. *profundi exteriores* I. 205. alter eorum interdum deest I. 206. *profundi interiores* I. 205.

*Tendines*, eorum fibrillae nil nisi fibrae musculosae productae sunt. III. 202. omni sensu carent IV. 135. experimentis comprobatur in cane, haedo IV. 135 sqq. in homine iuvene IV. 143. eorum textura compacta, firma etiam perceptioni repugnare videtur IV. 146. vasculis instructi sunt IV. 147. num forte a nervorum



vorum inuolucris orti sint, quaestio Cl.  
CASTELL IV. 148.

Tenesmi ab inflammatione et tensione gingiuarum IV. 298.

Tensio, in quoniam corpore locum habet IV. 193. causa IV. 193. 195. effectus eius IV. 194. 196. eius signa in uniuersum IV. 196 — *neruorum* IV. 189. iam a GALENO accepta ib. a SANTORINO reiecta IV. 190. refutatur IV. 199. variis corporibus adscribitur IV. 191. ab elatere differt ib.

Terror IV. 355. 373. eius symptomata IV. 356. 374. nonnullis auxilio fuit IV. 376. exinde apoplexia IV. 403.

*Tertium par neruorum* I. 10. per faciem spargi dicit CARPUS III. 64. duo eorum principia descripsit R. COLUMBUS ib. vid. *oculomotorium*.

*Tertium par MUNDINI* III. 63.

Testudo marina, eius *quintus neruus* I. 220. \*)

Tetanus II. 313. eius causae a variis vario modo indicatae II. 314. a minimo vulnere II. 294. uniuersus in vulneribus magnis IV. 405. ex calculis cystidis, renum et vesicae IV. 342. anthelminticis curatus IV. 338. ex suppreffione fluxus lochiorum IV. 340.

*Thalami neruorum opticoeum* eorum situs I. 36.

Thlipticae cephalalgiae sunt vel stereoticae III. 299. vel humorales III. 306.

*Thoracicus neruus minor* I. 347. 77)

*Thyreoidaeum ganglion* s. *cervicale inferius* coniunctum cum *thoracico* III. 120.

Tinnitus aurium a repleto ventriculo IV. 294.

Titillatio plantae pedis exinde epilepsia II. 294.

*Tonsillaris neruus* III. 54. *inferior* II. 118.

Tormina a tensione et inflammatione gingiuarum IV. 298.

Toxica cephalalgia III. 315.

*Tracheales nerui* II. 136.

Transpiratio suppreffa exinde deperditus appetitus II. 300.

*Transuersalis neruus* arteriae carotidis anterioris II. 167. posterioris II. 168.

Traumatica apoplexia vid. *apoplexia*.

Tremor labiorum vid. *labiorum tremor*.

Trichomatica cephalalgia III. 313.

*Trigeminum* s. *quintum par neruorum* I. 92.

II. 81. 82. eius synonyma I. 46. eius

historia ib. quid GALENUS de eo ha-

bet? I. 147. quid VESALIUS I. 149.

R. COLUMBUS ibid. FALLOPIUS ibid.

PICCOLHOMINI I. 150. VIDIUS ibid.

C. BAUHINUS I. 151. VESLINGIUS ib.

IO. RIOLANUS I. 152. SPIGELIUS I.

152. J. VAN HORNE ibid. DE MAR-

CHETTIS ibid. TH. BARTHOLINUS I.

153. TH. WILLISIUS ib. RIVA I. 154.

BLASIUS ib. DIEMERBROEK I. 155.

DE LA CHARRIERE I. 156. WINS-

LOW ib. BACHETTONUS I. 158. LE

CAT ib. CHESOLDEN I. 159. LIEU-

TAUD ib. quid N. MASSA I. 246. qui

de eo scripserunt inter recentiores I. 47.

— eius vera origo a laterali parte *pe-*

*dunculorum cerebri* I. 160. 247. 265. II.

85. 86. IV. 113. qui de eius origine post

MECKELIUM scripserunt I. 160. \*) obser-

uatio Cl. HAASII ib. \*\*).

non semper a *pedunculis* I. 267. eius origo optime de-

picta a WILLISIO I. 153. num sinu ca-

uernofo positum sit I. 94. 4) excluditur

sinu cauernofo I. 162. 167. ante proces-

sus clinoidaeum ossis sphenoidis ei valde

adhaeret I. 168. constat fibrillis numero

et crassitie variantibus a septuaginta ad

centum usque I. 161. III. 68. numerus

fibrarum in foetu minor II. 83. portio

eius minor *plexui gangliiformi* non immi-

scetur II. 84. eius *fasciculi* a PALETTA

descripti II. 70. eius *taenia neruosa* ib.

filamenta eius iam adsunt in foetibus

quinque — mensium I. 265. adhaerent

*durae matri* I. 162. nectuntur *arachnoi-*

*dea* I. 268. — sub alis clinoidaeis in tres

diuiditur ramos I. 250. *primus ramus la-*

*crymalis* I. 159. vid. *lacrymalis neruus* et

huius ramuli *ophthalmicus*. etc. — num fi-

brillas *intercostali neruo* tribuat I. 164. 168.

*nasalis*; *frontalis*, quos vid. sub nomine

*nasal. front.* — *minor ramus super.* VIEUS-

SENII I. 167. — eius *ramus secundus* a

Cl. HIRSCHIO diuisus in *infraorbitalem*

et *descendentem* vid. quoque *maxillaris*

*superior*; — *tertius* s. *posterior ramus*

vid. *linguale par* et *gustatorius neruus*.

*Trimellum par* II. 82.

*Trismus* s. *spasmus maxillae inferioris* III. 74. consen.



consensualis in infantibus recens natis frequens IV. 305. eius symptomata IV. 306. eius sedes in primis viis ib. febrium intermittentium paroxysmis se adiungens IV. 306. in hysteriis et hypochondriacis IV. 307.

Tristitia quid prae reliquis affectibus ei proprium IV. 362. a iactura quacunque creatur IV. 363. artuum et corporis languor in ea IV. 366.

*Trochlearis nervus* s. *trochleatorium par* II. 77. qui sit eius inuentor I. 43. eius synonyma II. 77. eius situs I. 44. originis peculiaris lusus I. 45. origine statim tenui membrana cingitur ib.

Tropaeolum maius, quomodo se habeat in experimentis Galuanianis III. 21.

Tuberculum occipitale praeter vasa et nervos accipere videtur IV. 256.

Tumores a terrore IV. 274. duri in cerebro quorum observatio a Cl. BRISSEAU IV. 123.

Turbinata glandula vid. *pinealis gland.*

Turbo i. q. *pinealis gland.*

Tussis convulsiva II. 311. causae et symptomata II. 312.

## U.

Ulcus in ventriculo IV. 276. quinam effectus? ib.

*Ulnaris nervus* vid. *cutaneus minor.*

Urethra in gonorrhoea inflammata alias partes in consensum rapit II. 301.

Urina et in sanissimis variat III. 284. tenuis et aquosa, quodnam symptoma III. 182.

Urinosa metastasis causa apoplexiae IV. 393.

Ursus lotor, duas, sicuti homo, eminentias candicantes habet inter crura cerebri II. 34.

Uterus inflammatus cum delirio iunctus IV. 325.

Uvea, unde eius fibrae radiatae oriuntur? I. 176. 177. aliorum sententia I. 177.\*)

## V.

*Vagina nervorum* I. 3.

*Vagus* s. *octavum cerebri par* I. 103. II. 9. 101. 288. 297. III. 51. IV. 52. 57. in uni-

versum consideratur III. 51. eius origo II. 101. 122. multis filamentis constat I. 12. per foramen lacerum egressum accipit ramos duos communicatorios II. 123. eius progressus in collo III. 57. 119. in dextro latere III. 108. IV. 58. in sinistro latere ib. in dextro latere formato *plexu gastrico* cum eo sinistri lateris communicat IV. 59. in unum truncum conflunt IV. 60. eius rami III. 119. *laryngeus internus* II. 128. *pharyngeus* primus II. 126. secundus II. 127. divisio huius nervi II. 102. in duas portiones quasi divisum vidit LOBSTEIN II. 235. eius laesio eiusdem est efficaciae, quam vinculum II. 290. \*) eo ligato appetitum amiserunt II. 289. uti vocem ib. attentione dignum est, propter eius accessiorem ad *plexum abdominalem* III. 107. eius atque intercostalis coniunctio I. 27. longitudine consideratur IV. 187. 188. in piscibus eximiae magnitudinis III. 152.

Varicosa pars cerebri II. 24.

Variolae, eius materies repulsa, causa apoplexiae IV. 393.

Variolosa cephalalgia III. 313.

Vasa nervos concomitantur III. 166. materia tincta repleta III. 168. nutriendi functionem habent III. 169. eorum status morbosus III. 174. eorum nervos a gangliis oriri III. 8.

— lactea utrum vi capillari agunt an peculiari vitali vi, discrepant physiologi IV. 204.

— sanguifera et ad nervos tendunt II. 256. vid. *nervus.*

Venae num facultate sentiendi praediti III. 186. irritabiliores arteriis stimulo chemico affectae III. 17. ferro autem nunquam afficiuntur III. 18. iugulares maiorem capacitatem habent, quam arteriae carotides III. 214. magna facialis quoniam ambitur nervo III. 40. mesaraicae, num quid chyli absorbeant sub iudice lis IV. 203.

Veneae, eorum vis in corpus II. 300. quid odore resorpta agunt I. 221.

*Ventriculi cerebri, quartus* II. 43. eorum communicatio III. 154.

Ventriculus inflammatus cum delirio iunctus IV. 325. repletus hinc aurium tinnitus IV. 294. vasa in abdomine com-

- primere potest, hinc respirandi difficultas IV. 392. 6) senilis, hinc Epiphora molesta IV. 283.
- Vermes** intestinales motum linguae prorsus tollere possunt I. 306. melancholiam creant II. 316. in febre terribilia excitant symptomata III. 290. causae cephalalgiae IV. 273. mydriasis gignunt IV. 281. causa pruritus narium IV. 285. causa salivationis sympathicae IV. 301. nervorum morborum II. 303. oris siccitatem producant IV. 305. vertiginem creant IV. 308. agrypniam gignunt IV. 309. causa Chorea St. Viti II. 310. tetani causa II. 314. sopores consensuales exinde IV. 314. paralysis ib. 321. delirium ib. 324. fames canina ibid. 329. omnes fere convulsionum species ab iis produci possunt ib. 339.
- Vermis cerebelli** II. 41.
- Vertigo** consensualis, eius sedes in abdomine IV. 307. hinc a vino, opio etc. ib. ex vermibus intestinalibus IV. 308.
- Veruex**, eius cerebri et corporis pondus III. 159. eius intercostalis nervus et ganglion III. 161.
- Vesica urinaria** inflammata delirio iuncta IV. 325.
- Vesiculae** in plexu choroideo III. 178.
- Vidianus nervus** I. 182. III. 30. eius synonyma I. 182. ortus I. 183. utrum radix an ramus sit *intercostalis* III. 96. color indicat, esse ramum intercostalem III. 97. intrat canalem suum arteria concomitante III. 30. eius ramificatio I. 184. profundus major I. 184. 185. varietates I. 187.
- Vincula nervorum** quid probant pro fluído nervo III. 224.
- Vinum** in nimia copia vertiginem producit IV. 307.
- Virga medullae spinalis** I. 328.
- Vis**, vitalis II. 293. insita ib. nervosa differt ab irritabilitate III. 13. expulsi-  
va in plantis III. 226.
- Visus nervus** CARPI vid. *opticus nervus*.
- Vita** sedentaria literatorum et contentio animi apoplexiam procreare potest IV. 404. creare cephalalgiam et serosam accumulationem, Cl. SCHWENKE contendit ib.
- Vitulus**, eius cerebri et corporis pondus III. 159.
- Volaris nervus** ex cubitali III. 138. eius rete circa arterias ulnares ib. eius ramus *sublimis* III. 138. et *profundus* III. 139.
- Vomit** a tensione et inflammatione gingivarum IV. 298. a calculo II. 300. a vulneribus capitis ib.
- Vulnera** magna tetanum uniuersum procreare interdum possunt IV. 405. capitis, vomitum excitant II. 300.
- Vulpes**, duas, sicuti homo, habet eminentias candicantes inter crura cerebri II. 34.

## X.

**Xyphia piscis**, cuius nervus opticus a laminis cerebri complicatum II. 70.

## Z.

**Zeugos** nervorum II. 8.

**Zoica** cephalalgia III. 300.

**Zona** i. q. *armilla* s. *intumescencia semilunaris*.

**Zyzygia** nervorum II. 8.



QUAE IN HAC SCRIPTORUM NEVROLOGICORUM  
COLLECTIONE AB EDITORE OMISSAE VIDERI  
POSSENT COMMENTATIONES.

- I.) IO. HADRIAN SLEVOGT et CARL CHRISTI. XYLANDER de dura matre. Ienae 1690.
- II.) CAROL. AUG. A BERGEN de structura piaë matris. Frf. ad Viadr. 1736.
- III.) EIUSD. Noua tabula ventriculorum cerebri lateralium. ibid. 1734.
- IV.) IO. HADR. SLEVOGT de processibus cerebri mammillaribus ex neruorum olfacto-  
riorum numero exemtis. Ienae 1715.
- V.) CAROL. AUG. A BERGEN de neruo intercostali. Frfti ad Viadr. 1731.
- VI.) AUG. FRID. WALTHERI anatome paris intercostalis et vagi. Lipf. 1733. Pars al-  
tera. ibid. 1735.
- VII.) ALB. HALLER et TAUBE de origine nerui intercostalis. Gott. 1743.
- VIII.) ABRAH. VATER de consensu partium corporis humani. Viteb. 1741.
- IX.) ALB. HALLER et BERKELMANN de neruorum in arterias imperio. Gott. 1744.
- X.) IO. ASTRUC de phantasia. Monspel. 1723.
- XI.) ID. An sympathia partium a certa neruorum positura in interno sensorio? 1736.
- XII.) FRANCISCUS DE SAUVAGES de motuum vitalium causa. Monsp. 1740.
- XIII.) CAROL. AUG. A BERGEN de neruis quibusdam cranii ad nouem paria hactenus  
non relatis. Frf. ad Viadr. 1738.
- XIV.) IO. HENR. MOELLER de tunica retina et neruo optico. Halae 1749.  
Hae Prolusiones et Disputationes omnes inueniuntur in HALLERI Disputatio-  
nibus anatomicis selectis.
- XV.) IO. IAC. HUBER de medulla spinali. Gottingae 1739.
- XVI.) ID. de medulla spinali et speciatim de neruis medullae spinalis. Gottingae 1741.  
Cf. HALLERI Iconum anatomicarum Fasciculi.
- XVII.) ID. ad WOLRATH WIGAND de neruo intercostali, de neruis octauæ et noni paris  
deque accessorio nonnulla. Gottingae 1744. 4.
- XVIII.) HENCKEL de nonnullis singularibus circa neruos opticos. Halae 1738.
- XIX.) I. A. HEYM animaduersiones anatomicae iuxta neruum opticum. Kilonii.
- XX.) CAS. CPH. SCHMIDEL de controuersa origine nerui intercostalis. Erlangae 1747. 4.
- XXI.) ID. de neruo intercostali. ibid. 1754. 4.
- XXII.) LUCHINI et RAPPOLT sensus et organi sensus examen. Heidelbergae 1740.
- XXIII.) HENSEY de existentia variaque liquoris neruosi ad quosdam explicandos morbos  
necessitate. L. B. 1749.
- XXIV.) EPHR. KRÜGER de neruo phrenico. Lipsiae 1758. 4. c. figg.  
Cf. SANDIFORTI Thesaurus Dissertatt.
- XXV.) AIME MATHEI Tentamen physiologico-anatomicum de neruis in genere, ac-  
cedente primi, secundi, tertii et quarti neruorum paris descriptione, cum nonnullis  
in Cl. MECKELII Diff. de quinto pare annotationibus. L. B. 1758.  
Hoc hucusque ad meos oculos nondum venit. Audio scriptum esse minoris  
momenti.
- XXVI.) BONIOTY de fluidi neruei secretionem, natura et usu. Auenione 1762.
- XXVII.) MITTIE et DARCET E. a gangliis nerui intercostalis partium omnium consen-  
sus? Paris. 1764.

XXVIII.)

- XXVIII.) EGGER de consensu neruorum. Viennae 1766.  
 XXIX.) G. CHR. ARNOLD de motu fluidi neruei per fibras medullares neruorum. Lipsiae 1768. 4.  
 XXX.) GOLDHAGEN et IETZEL de tensione neruorum. Halae 1770. 4.  
 XXXI.) AD. NIETZKI et IO. CHRISTI. SCHREIBER de fluidi neruei existentia improbabili. Halae 1771. 4.  
 XXXII.) IO. CPH. POHL de neruis animaduersiones. Lipsiae 1774. 4.  
 XXXIII.) DRIESSEN Diss. icone illustrans neruos musculorum abdominalium et superficiei inguinis. Groningae 1775.  
 XXXIV.) IAN de materiae nerueae secretione. Erlangae 1776. 4.  
 XXXV. a.) BALDINGER epitome neurologiae physiologico-pathologicae. Gott. 1778. 4.  
 XXXV. b.) IUST. CHRISTI. LODER de tumore scirrholo et organo olfactus. Ienae 1779. c. f. 4.  
 XXXVI.) FRANCISC. HIERON. BRÜCKMANN de morbis neruorum obseruationes quasdam singulares cum epicrisi. Goettingae 1780.  
 XXXVII.) IO. FRID. LUD. CAPPEL de epilepsia e tumore neruo vago inhaerente. Helmstadii 1781.  
 XXXVIII.) M. E. STYX de neruo crurali et obturatorio. Ienae 1782. 4. c. figg.  
 XXXIX.) KWIATKOWSKY de neruorum fluido, decussatione et gangliis. Regiomontii 1784. cff. CL. METZGERI Opuscula.  
 XL.) I. F. ACKERMANN de neruorum opticorum inter se nexu. Goettingae 1788.  
 XLI.) G. I. WOLF Diss. inaug. sist. Quaestiones medicas varii argumenti. Harderouici 1791. 4.  
 XLII.) N. ULR. STIEK de quinque prioribus encephali neruis. Gott. 1791. 8.  
 XLIII.) IUST. ERIC. BOLLMANN de irritabilitate vis neruosae tantum modificatione. Goettingae 1791. 8.  
 XLIV.) AD. MURRAY et IAC. ACKERMANN sciographica neruorum capitis descriptio et quidem paris 1mi, 2di, 3tii, 4ti et 5ti. Upsaliae 1793. 4.  
 XLV.) EIUSD. et IO. NORAEI sciagr. neru. capitis descriptio et quidem paris 6ti, 7mi, 8vi, 9ni, 10mi et 11mi. Upsaliae 1793. 4.  
 XLVI.) IO. CHRISTI. REIL et IO. LUD. GAUTIER de irritabilitatis notione natura et morbis. Halae 1793. 8.  
 XLVII.) EIUSD. et CHRISTI. FRID. HÜBNER Caenesthesis. Halae 1794. 8.  
 XLVIII.) EIUSD. et CASP. A ZOLLIKOFER AB ALTENKLINGEN Sensus externus. Halae 1794. 8.  
 XLIX.) EIUSD. et CAROL. FRID. BÜTTNER Functiones organo animae peculiares. Halae 1794. 8.

Has quatuor commentationes, quemadmodum ex litteris Cl. Viri ad nos datis accepimus, edet uno volumine proxime Cl. auctor, qui non solum nuper rursus cerebri et neruorum structuram disquisiuit (v. GRENS neues Journal der Physick I. I. 96.) verum quoque fragmenta anatomica varii argumenti inprimis systematis neruosi structuram illustrantia, tabulis adiectis se editurum esse promisit.

- L.) PH. FRID. MECKEL et STEGMANN de usu et dignitate neurologiae. Halae 1794. 8.

Quas praeterea adhuc omisimus, ad usum supplementorum forsan edendorum indicabunt fautores atque amici nostri, quos ergo humanissimis verbis rogatos cupimus. L.













Fig. I.

Tab. III.




Fig. II.






Fig. III.































PRIX  
DONNÉ AU NOM DE L'EMPEREUR,  
PAR LE MINISTRE  
DE L'INTÉRIEUR  
AN XII.